

Niniejsza publikacja jest przeznaczona dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 „Prawo farmaceutyczne” (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami).

## RECEPTARIUSZ FARMACEUTY

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – w układzie alfabetycznym.  
**(Obowiązuje od 1 kwietnia 2024)**

sponsor aktualizacji



Korzystasz z bazy leków?

Nie kupuj! **Pobierz bezpłatnie**,  
dzięki firmie Polpharma.



[www.leksykon.com.pl](http://www.leksykon.com.pl)

Copyright © 2003-2024 by LekSeek Polska

Reprodukcja i rozpowszechnianie części lub całości publikacji w jakiegokolwiek formie może odbywać się tylko za uprzednią zgodą wydawcy.

W niniejszej publikacji zamieszczono opisy wybranych preparatów, których treść została ustalona z podmiotami odpowiedzialnymi. Ze względu na ograniczoną objętość opracowanie nie obejmuje wszystkich preparatów dostępnych w Polsce.

Publikacja nie ma statusu urzędowego, dlatego wszelkie decyzje mogące mieć poważne konsekwencje terapeutyczne bądź finansowe powinny być podejmowane w oparciu o materiały źródłowe – oryginalne szczegółowe informacje o leku zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i podmiot odpowiedzialny. Wydawnictwo nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności ani konsekwencji z tytułu aktualności podanych informacji, możliwych błędów lub ewentualnych nieścisłości. Przytaczane nazwy handlowe nie oznaczają ich promocji, stosowane są jedynie w celu identyfikacji produktu. Wydawnictwo nie ponosi również odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam. Zastrzega jednocześnie, że ich lokalizacja wynika z ustaleń z ogłoszeniodawcą oraz z technicznych i prawnych możliwości zamieszczenia reklamy w danym miejscu książki. Niniejsza publikacja jest przeznaczona wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 „Prawo farmaceutyczne” (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami).

LekSeek Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa, tel./faks: 22 350-00-06, kom. 723-700-700

e-mail: [lekseek@lekseek.com](mailto:lekseek@lekseek.com) [www.lekseek.com](http://www.lekseek.com)



# Objaśnienia oznaczeń

## Kategoria dostępności

- Rx** - wydawany na receptę
- Rx-z** - wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania
- Rx-w** - wydawany na receptę (leki z grup I-N lub II-P)
- Lz** - do stosowania w lecznictwie zamkniętym
- ŚŻ** - środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego
- WM** - wyrób medyczny wydawany na receptę

## Poziom odpłatności

- B** wydawany bezpłatnie do wysokości limitu
- S** wydawany bezpłatnie dla pacjentów 65+
- C** wydawany bezpłatnie dla kobiet w ciąży
- DZ** wydawany bezpłatnie dla pacjentów do ukończenia 18 lat
- R** odpłatność ryczałtowa
- 30%** odpłatność 30%
- 50%** odpłatność 50%
- 100%** pełna odpłatność lub cena hurtowa brutto (dla leków z Programów Lekowych i Chemioterapii)

**Furosemidum Polpharma: tabl. 40 mg - 30 szt.**

Rx	100%	3,69
Limit		3,69
r <sup>(1)</sup>		3,20

INN: **Furosemide**

ATC: **C03CA01** | wyk: **B** | EAN - **135028**

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Postępowanie wspomagające przy objawowych przerzutach w OUN. Leczenie nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca u dzieci. | Kat. ciąży: **C**

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA 

**Odpowiedniki:** Furosemidum Polfarmex [3,69], Furosemidum Polpharma [3,69]

Limit - wysokość limitu finansowania

## Wskazania do refundacji

Odnośniki (1) (2) przy poziomie odpłatności kierują do odpowiednich **wskazań do refundacji**.

**W:** wskazania

**WP:** wskazania pozarejestrycyjne

**Chemioterapia** - leki bezpłatne w ramach chemioterapii

**Program lekowy** - leki bezpłatne w określonych programach lekowych

**Polfenon®: tabl. powł. 150 mg - 20 szt. ◆**

Rx	100%	7,70
Limit		6,92
r <sup>(1)</sup>		3,98

INN: **Pronafenone hydrochloride**

ATC: **C01BC03** | wyk: **B** | EAN - **034123**


(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Leczenie doraźne i profilaktyka nawrotów nadkomorowych zaburzeń rytmu serca zwłaszcza u chorych z objawowym migotaniem przedsionków bez choroby organicznej serca lub w przebiegu nadciśnienia tętniczego bez cech istotnego przerostu lewej komory. Zaburzenia rytmu serca w zespole WPW oraz komorowe zaburzenia rytmu serca - u dzieci do 18 roku życia. | Kat. ciąży: **C**

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA


## Klasyfikacja FDA leków stosowanych w ciąży


- A** Badania z grupą kontrolną nie wykazały istnienia ryzyka dla płodu w I trymestrze, możliwość uszkodzenia płodu wydaje się mało prawdopodobna.
- B** Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
- C** Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
- D** Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne, bezpieczne leki nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne).
- X** Badania przeprowadzone na zwierzętach lub u ludzi wykazały nieprawidłowości płodu w wyniku stosowania danego leku bądź istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód ludzki i ryzyko zdecydowanie przewyższa potencjalne korzyści z jego zastosowania.
- N** Nie dotyczy.

## Oznaczenia specjalne

środek odurzający (N)   
z grupy I-N

substancja psychotropowa (P) 

substancja psychotropowa (P) z grupy II-P 

Lek dodatkowo monitorowany 

## Leki oznaczone symbolem

1. zapis słowny ilości substancji psychotropowej w postaci iloczynu jednostek dawkowania i dawki
2. na jednej receptycie można przepisać tylko jeden lek

## Leki oznaczone jednym z symboli

1. zapis słowny ilości substancji psychotropowej i środka odurzającego w postaci iloczynu jednostek dawkowania i dawki
2. na jednej receptycie można przepisać tylko jeden lek
3. maksymalnie na 90 dni stosowania
4. sposób dawkowania

- ◆ Produkt leczniczy, który może wpływać opóźniająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne opóźlenie sprawności psychomotorycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności.
- ◇ Produkt leczniczy silnie opóźniający sprawność psychomotoryczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i

**Durogesic™: system transdermalny 25 µg/h - 5 szt.**

Rx-w	100%	52,28
Limit		45,41
r <sup>(1)</sup>		10,07

INN: **Fentanyl**

ATC: **N02AB01** | wyk: **N** | EAN - **765416**

(1) Neuralgia popłaskowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulzalgia | Kat. ciąży: **C**

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** Fentanyl Actavis [51,62], Durogesic™ [52,28], Dolforin® [54,59], Matrifen® [54,59], Fenta MX 25 [54,85]

**Odpowiedniki:** leki o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, opakowaniu, postaci nie powodującej różnic terapeutycznych - uporządkowane rosnąco wg ceny detalicznej podanej w nawiasie kwadratowym. Przed preparatem zaznaczonym **boldem** znajdują się leki tańsze lub w równej cenie i mogą być wydane zamiennie z lekiem przepisany na receptycie. Za preparatem oznaczonym **boldem** znajdują się leki droższe, które nie mogą być wydawane jako zamienniki.

- A** - Produkt leczniczy zawierający substancję czynną bardzo silnie działającą.
- B** - Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.
- N** - Produkt leczniczy zawierający środek odurzający grupy I-N lub II-N.

▼Abasaglar: inj. [roztw.] 100 j.m./ml - 10 wkł. 3 ml ◆	Rx	100%	309,91
		Limit	309,91
		30% <sup>(1)</sup>	92,97
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Insulin glargine</i>   ATC: A10AE04   wyk: B   EAN ~ 201982			
(1) Cukrzyca typu 1 u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia, Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 m-cy i z HbA1c ≥ 8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 m-cy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku 2-6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)(2) Kobiety w ciąży(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A Eli Lilly Polska Sp. z o.o.			
Abilify®: tabl. 10 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	134,39
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	4,26
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
		INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 600257	
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.			
Odpowiedniki: Aripixor [127,42], Aribit [134,39], Abilify® [134,39], Apra [145,97], Aryzaleria [160,39], Aripiprazole Sandoz [163,14]			
Abilify®: tabl. 15 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	105,54
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	8,16
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
		INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 000230	
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.			
Odpowiedniki: Aripiprazol Glenmark [X], Abilify® - (IR) [86,03], Abilify® - (IR) [86,05], Aripiprazole Orion [87,65], Aricogan [96,93], Aripixor [97,91], Aprimax [100,14], Aribit [100,98], Asduter [100,98], Aripilek [106,09], Explemed [106,21], Apra [109,87], Aripiprazole Aurovitas [120,09], Aryzaleria [122,62], Aripiprazole Sandoz [125,84]			
Abilify®: tabl. 15 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	201,16
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,97
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
		INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 002337	
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.			
Odpowiedniki: Abilify® - (IR) [162,19], Abilify® - (IR) [162,23], Aripixor [185,95], Abilify® [201,16], Apra [201,22], Aribit [201,22], Aripilek [201,22], Explemed [201,22], Aryzaleria [235,37], Aripiprazole Sandoz [243,23]			
Abilify®: tabl. 30 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	389,49
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	11,95
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
		INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 002382	
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.			
Odpowiedniki: Aripixor [358,95], Abilify® [389,49], Aribit [402,10]			
Abilify® - (IR): tabl. 15 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	86,05
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
		INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 274352	
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Inpharm Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Aripiprazol Glenmark [X], Abilify® - (IR) [86,03], Abilify® - (IR) [86,05], Aripiprazole Orion [87,65], Aricogan [96,93], Aripixor [97,91], Aprimax [100,14], Aribit [100,98], Asduter [100,98], Abilify® [105,54], Aripilek [106,09], Explemed [106,21], Apra [109,87], Aripiprazole Aurovitas [120,09], Aryzaleria [122,62], Aripiprazole Sandoz [125,84]			
Abilify® - (IR): tabl. 15 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	86,03
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
		INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 860088	
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Delfarma Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Aripiprazol Glenmark [X], Abilify® - (IR) [86,03], Abilify® - (IR) [86,05], Aripiprazole Orion [87,65], Aricogan [96,93], Aripixor [97,91], Aprimax [100,14], Aribit [100,98], Asduter [100,98], Abilify® [105,54], Aripilek [106,09], Explemed [106,21], Apra [109,87], Aripiprazole Aurovitas [120,09], Aryzaleria [122,62], Aripiprazole Sandoz [125,84]			

Abilify® - (IR): tabl. 15 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	162,19		
		Limit	0,00		
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		
		R <sup>(2)</sup>	5,97		
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
		INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 860089			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Delfarma Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Abilify® - (IR) [162,19], Abilify® - (IR) [162,23], Aripixor [185,95], Abilify® [201,16], Apra [201,22], Aribit [201,22], Aripilek [201,22], Explemed [201,22], Aryzaleria [235,37], Aripiprazole Sandoz [243,23]					
Abilify® - (IR): tabl. 15 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	162,23		
		Limit	0,00		
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		
		R <sup>(2)</sup>	5,97		
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
		INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 274353			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Inpharm Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Abilify® - (IR) [162,19], Abilify® - (IR) [162,23], Aripixor [185,95], Abilify® [201,16], Apra [201,22], Aribit [201,22], Aripilek [201,22], Explemed [201,22], Aryzaleria [235,37], Aripiprazole Sandoz [243,23]					
Abilify® Maintena: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw. o przedl. uwalnianiu] 400 mg - 1 fiol. ◆	Rx	100%	935,21		
		Limit	935,21		
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.		
		INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 142200			
		(1) Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia aripiprazolem w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego   Kat. ciąży: C Lundbeck Poland Sp. z o.o.			
		Odpowiedniki: Abilify® - (IR) [162,19], Abilify® - (IR) [162,23], Aripixor [185,95], Abilify® [201,16], Apra [201,22], Aribit [201,22], Aripilek [201,22], Explemed [201,22], Aryzaleria [235,37], Aripiprazole Sandoz [243,23]			
Abra: test diagnostyczny do szybkich oznaczeń - 50 szt.	WM	100%	39,27		
		Limit	39,09		
		30% <sup>(1)</sup>	11,91		
		R <sup>(2)</sup>	3,38		
		INN: <i>Glukoza we krwi</i>   ATC: V07AD   wyk: B   EAN ~ 253625			
		(1) Cukrzyca(2) Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej   Kat. ciąży: N Diagnosis Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: DIAVUE ToGo [35,43], OKmeter Core [35,43], Wellion SymPhar [36,63], G-BIO [37,55], Multisure GK [37,66], Everchek [37,77], Examedin® Fast [38,12], GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A [38,23], Cera-Chek 1 Code [38,33], VivaChek Ino [38,33], VivaChek Ino [38,33], One Touch Select Plus [38,35], Glucomaxx 01 Sensor [38,66], Glucosense® [38,77], EverCare [38,80], GensuCare [38,80], Optimum Xido [38,88], Contour Plus [39,09], Contour TS [39,09], iXell® [39,15], Accu-Chek® Performa [39,27], Abra [39,27], Diagnostic Gold Strip [39,49], Glucomaxx® [39,55]					
▼Absenor®: tabl. o przedl. uwalnianiu 300 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	43,03		
		Limit	43,03		
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.		
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		
		R <sup>(3)</sup>	3,20		
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.		
INN: <i>Valproate sodium</i>   ATC: N03AG01   wyk: B   EAN ~ 042371					
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Orion Pharma Poland Sp. o.o.					
Odpowiedniki: DIAVUE ToGo [35,43], OKmeter Core [35,43], Wellion SymPhar [36,63], G-BIO [37,55], Multisure GK [37,66], Everchek [37,77], Examedin® Fast [38,12], GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A [38,23], Cera-Chek 1 Code [38,33], VivaChek Ino [38,33], VivaChek Ino [38,33], One Touch Select Plus [38,35], Glucomaxx 01 Sensor [38,66], Glucosense® [38,77], EverCare [38,80], GensuCare [38,80], Optimum Xido [38,88], Contour Plus [39,09], Contour TS [39,09], iXell® [39,15], Accu-Chek® Performa [39,27], Abra [39,27], Diagnostic Gold Strip [39,49], Glucomaxx® [39,55]					
▼Absenor®: tabl. o przedl. uwalnianiu 500 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	70,81		
		Limit	70,81		
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.		
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		
		R <sup>(3)</sup>	3,56		
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.		
INN: <i>Valproate sodium</i>   ATC: N03AG01   wyk: B   EAN ~ 042364					
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Orion Pharma Poland Sp. o.o.					
Odpowiedniki: DIAVUE ToGo [35,43], OKmeter Core [35,43], Wellion SymPhar [36,63], G-BIO [37,55], Multisure GK [37,66], Everchek [37,77], Examedin® Fast [38,12], GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A [38,23], Cera-Chek 1 Code [38,33], VivaChek Ino [38,33], VivaChek Ino [38,33], One Touch Select Plus [38,35], Glucomaxx 01 Sensor [38,66], Glucosense® [38,77], EverCare [38,80], GensuCare [38,80], Optimum Xido [38,88], Contour Plus [39,09], Contour TS [39,09], iXell® [39,15], Accu-Chek® Performa [39,27], Abra [39,27], Diagnostic Gold Strip [39,49], Glucomaxx® [39,55]					
▼Acarizax: liof. doustny 12 SQ-HDM - 30 szt.	Rx	100%	401,89		
		Limit	306,62		
		30% <sup>(1)</sup>	187,26		
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		
		INN: <i>Allergen extracts</i>   ATC: V01AA03   wyk: B   EAN ~ 257521			
		(1) Leczenie młodzieży w wieku od ukończenia 12. roku życia do ukończenia 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się mimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E)(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia   Kat. ciąży: C ALK-Abelló Poland Sp. z o.o.			



Naszym wyborem

**enarenal**  
 enalapryli maleas

▼ <b>Accofil:</b> inj./inf. [roztw.] 30 mln j.m./0,5 ml - 1 amp.-strzyk.	Rx-z	100%	<b>60,67</b>
		Limit	<b>58,88</b>
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	<b>38,38</b>
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Filgrastim** ATC: L03AA02 wyk: B EAN ~ 713846  
 (1) Chemioterapia ICD10: C.0.06.(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP:** Gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

▼ <b>Accofil:</b> inj./inf. [roztw.] 30 mln j.m./0,5 ml - 5 amp.-strzyk.	Rx-z	100%	<b>303,37</b>
		Limit	<b>294,38</b>
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	<b>8,61</b>
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Filgrastim** ATC: L03AA02 wyk: B EAN ~ 713860  
 (1) Chemioterapia ICD10: C.0.06.(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP:** Gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

▼ <b>Accofil:</b> inj./inf. [roztw.] 30 mln j.m./0,5 ml - 7 amp.-strzyk.	Rx-z	100%	<b>239,02</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	<b>11,40</b>

INN: **Filgrastim** ATC: L03AA02 wyk: B EAN ~ 726068  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP:** Gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

▼ <b>Accofil:</b> inj./inf. [roztw.] 48 mln j.m./0,5 ml - 1 amp.-strzyk.	Rx-z	100%	<b>97,08</b>
		Limit	<b>94,20</b>
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	<b>62,10</b>
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Filgrastim** ATC: L03AA02 wyk: B EAN ~ 713853  
 (1) Chemioterapia ICD10: C.0.06.(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP:** Gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

▼ <b>Accofil:</b> inj./inf. [roztw.] 48 mln j.m./0,5 ml - 5 amp.-strzyk.	Rx-z	100%	<b>485,40</b>
		Limit	<b>471,00</b>
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	<b>14,48</b>
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Filgrastim** ATC: L03AA02 wyk: B EAN ~ 713877  
 (1) Chemioterapia ICD10: C.0.06.(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP:** Gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

▼ <b>Accofil:</b> inj./inf. [roztw.] 48 mln j.m./0,5 ml - 7 amp.-strzyk.	Rx-z	100%	<b>386,31</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	<b>20,20</b>

INN: **Filgrastim** ATC: L03AA02 wyk: B EAN ~ 726075  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP:** Gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

■ <b>Accordeon:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu 10 mg - 100 szt. ◇	Rx-w	100%	<b>73,77</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>18,12</b>

INN: **Oxycodone hydrochloride** ATC: N02AA05 wyk: B EAN ~ 940769  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Nowotwory złośliwe(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobojawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulalgia(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

■ <b>Accordeon:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu 20 mg - 100 szt. ◇	Rx-w	100%	<b>140,74</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>26,25</b>

INN: **Oxycodone hydrochloride** ATC: N02AA05 wyk: B EAN ~ 941247  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobojawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulalgia, Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

■ <b>Accordeon:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu 40 mg - 100 szt. ◇	Rx-w	100%	<b>270,82</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>41,13</b>

INN: **Oxycodone hydrochloride** ATC: N02AA05 wyk: B EAN ~ 941407  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Wieloobojawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulalgia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, Nowotwory złośliwe, Neuralgia popółpaścowa przewlekła(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Opowiedniki: Xancodal [X], **Accordeon** [270,82]

■ <b>Accordeon:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu 80 mg - 100 szt. ◇	Rx-w	100%	<b>528,68</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>69,29</b>

INN: **Oxycodone hydrochloride** ATC: N02AA05 wyk: B EAN ~ 941568  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Wieloobojawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulalgia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Opowiedniki: Xancodal [X], **Accordeon** [528,68]

■ <b>Accu-Chek Instant:</b> test diagnostyczny do szybkich oznaczeń - 100 szt.	WM	100%	<b>74,08</b>
		Limit	<b>74,08</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>22,22</b>

INN: **Glukoza we krwi** ATC: V07AD wyk: B EAN ~ 067732  
 (1) Cukrzyca(2) Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | Kat. ciąży: B  
 Roche Polska Sp. z o.o.

■ <b>Accu-Chek® Performa:</b> test diagnostyczny do szybkich oznaczeń - 50 szt.	WM	100%	<b>39,27</b>
		Limit	<b>39,09</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>11,91</b>

INN: **Glukoza we krwi** ATC: V07AD wyk: B EAN ~ 980987  
 (1) Cukrzyca(2) Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | Kat. ciąży: B  
 Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

Opowiedniki: DIAVUE ToGo [35,43], OKmeter Core [35,43], Wellion SymPhar [36,63], G-BIO [37,55], Multisure GK [37,66], Everchek [37,77], Examedin® Fast [38,12], GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A [38,23], Cera-Chek 1 Code [38,33], VivaChek Ino [38,33], VivaChek Ino [38,33], One Touch Select Plus [38,35], Glucocard 01 Sensor [38,66], Glucosense® [38,77], EverCare [38,80], GensuCare [38,80], Optium Xido [38,88], Contour Plus [39,09], Contour TS [39,09], iXell® [39,15], Abra [39,27], **Accu-Chek® Performa** [39,27], Diagnostic Gold Strip [39,49], Glucomax® [39,55]

■ <b>Acebutolol Gedeon Richter:</b> tabl. powł. 200 mg - 30 szt.	Rx	100%	<b>11,26</b>
		Limit	<b>6,50</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>7,16</b>

INN: **Acebutolol** ATC: C07AB04 wyk: B EAN ~ 109920  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:B, T2:D, T3:D  
 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

■ <b>Acenocumarol WZF:</b> tabl. 4 mg - 60 szt.	Rx	100%	<b>14,56</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>4,35</b>

INN: **Acenocumarol** ATC: B01AA07 wyk: B EAN ~ 055715  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
 Polfa Warszawa SA

■ <b>Aciclovir Aurovitas:</b> tabl. 200 mg - 30 szt.	Rx	100%	<b>14,21</b>		
		Limit	<b>12,67</b>		
		50% <sup>(1)</sup>	<b>7,88</b>		
				DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
				S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Aciclovir** ATC: J05AB01 wyk: B EAN ~ 141359  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.  
 Opowiedniki: Aciclovir Aurovitas [14,21], Hascovir [15,95], Heviran® [16,14]

<b>Aciclovir Aurovitas: tabl. 400 mg - 30 szt.</b> INN: <i>Aciclovir</i>   ATC: J05AB01   wyk: B   EAN ~ 141367 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Aciclovir Aurovitas [23,04], Hascovir [26,47], Heviran® [28,73]	R <sub>x</sub>	100%	23,04
		Limit	23,04
		50% <sup>(1)</sup>	11,52
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
<b>Aciclovir Aurovitas: tabl. 800 mg - 30 szt.</b> INN: <i>Aciclovir</i>   ATC: J05AB01   wyk: B   EAN ~ 141373 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Aciclovir Aurovitas [42,67], Hascovir [49,54], Heviran® [50,67]	R <sub>x</sub>	100%	42,67
		Limit	42,67
		50% <sup>(1)</sup>	21,34
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
<b>Acidum folicum Richter : tabl. 5 mg - 30 szt.</b> INN: <i>Folic acid</i>   ATC: B03BB   wyk:   EAN ~ 109210 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby reumatyczne - u pacjentów leczonych metotreksatem; łuszczyca - u pacjentów leczonych metotreksatem (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.	R <sub>x</sub>	100%	5,03
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	4,53
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
<b>Acidum folicum Richter : tabl. 15 mg - 30 szt.</b> INN: <i>Folic acid</i>   ATC: B03BB   wyk:   EAN ~ 109319 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby reumatyczne - u pacjentów leczonych metotreksatem; łuszczyca - u pacjentów leczonych metotreksatem (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.	R <sub>x</sub>	100%	13,32
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	11,99
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
<b>▼ Acitren: kaps. twarde 10 mg - 30 szt.</b> INN: <i>Acitretin</i>   ATC: D05BB02   wyk: B   EAN ~ 907731 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Sun-Farm Sp. z o.o. Odpowiedniki: Neotigason [55,54], Acitren [55,54]	R <sub>x</sub>	100%	55,54
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	8,84
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
<b>▼ Acitren: kaps. twarde 10 mg - 100 szt.</b> INN: <i>Acitretin</i>   ATC: D05BB02   wyk: B   EAN ~ 907755 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Sun-Farm Sp. z o.o. Odpowiedniki: Neotigason [163,21], Acitren [163,21]	R <sub>x</sub>	100%	163,21
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
<b>▼ Acitren: kaps. twarde 25 mg - 30 szt.</b> INN: <i>Acitretin</i>   ATC: D05BB02   wyk: B   EAN ~ 907762 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Sun-Farm Sp. z o.o. Odpowiedniki: Neotigason [X], Acitren [124,75]	R <sub>x</sub>	100%	124,75
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
<b>▼ Acitren: kaps. twarde 25 mg - 100 szt.</b> INN: <i>Acitretin</i>   ATC: D05BB02   wyk: B   EAN ~ 907786 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Sun-Farm Sp. z o.o. Odpowiedniki: Neotigason [389,36], Acitren [389,36]	R <sub>x</sub>	100%	389,36
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,62
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
<b>Aclostin®: tabl. powł. 250 mg - 20 szt.</b> INN: <i>Ticlopidine</i>   ATC: B01AC05   wyk: B   EAN ~ 667116 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach   Kat. ciąży: B Bausch Health	R <sub>x</sub>	100%	13,29
		Limit	11,95
		30% <sup>(1)</sup>	4,93
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
<b>Aclostin®: tabl. powł. 250 mg - 60 szt.</b> INN: <i>Ticlopidine</i>   ATC: B01AC05   wyk: B   EAN ~ 334971 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach   Kat. ciąży: B Bausch Health Odpowiedniki: Apo-Clodin [X], Aclostin® [35,86]	R <sub>x</sub>	100%	35,86
		Limit	35,86
		30% <sup>(1)</sup>	10,76
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
<b>Actelsar: tabl. 40 mg - 28 szt.</b> INN: <i>Telmisartan</i>   ATC: C09CA07   wyk: B   EAN ~ 891832 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Actavis Group PTC ehf. Odpowiedniki: Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tezeo - (IR) [11,23], Tezeo - (IR) [11,24], Telmisartan Bluefish [11,80], Telmisartan Mylan [11,91], Telmabax [12,07], Zanafodar [12,77], Telmisartan Genoptim [12,86], Toptelmi [13,41], Tezeo [13,46], Telmisartan EGIS [13,58], Actelsar [13,75], Tolura [14,61], Telmix [15,74], Telmizek [16,88], Polsart [17,16], Pritor® [18,81], Micardis® [24,02]	R <sub>x</sub>	100%	13,75
		Limit	10,70
		30% <sup>(1)</sup>	6,26
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
<b>Actelsar: tabl. 80 mg - 28 szt.</b> INN: <i>Telmisartan</i>   ATC: C09CA07   wyk: B   EAN ~ 891863 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Actavis Group PTC ehf. Odpowiedniki: Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tolura - (IR) [X], Tolura - (IR) [20,22], Telmisartan EGIS - (IR) [21,31], Tezeo - (IR) [21,34], Tezeo - (IR) [21,34], Telmabax [22,53], Telmisartan Mylan [22,65], Telmisartan Bluefish [22,75], Telmisartan EGIS - (IR) [22,99], Zanafodar [24,59], Telmisartan Genoptim [24,76], Pritor® [24,98], Toptelmi [25,85], Tezeo [25,97], Telmisartan EGIS [26,19], Actelsar [26,88], Tolura [28,26], Telmix [30,52], Telmizek [32,79], Polsart [33,36], Micardis® [33,56]	R <sub>x</sub>	100%	26,88
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	11,90
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
<b>Actelsar HCT: tabl. 80/12,5 mg - 28 szt.</b> INN: <i>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09DA07   wyk: B   EAN ~ 056247 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Actavis Group PTC ehf. Odpowiedniki: Toptelmi HCT [23,61], Telmisartan + HCT Genoptim [25,51], Telmix Plus [27,46], Tezeo HCT [29,52], Tolucombi [30,55], Telmisartan HCT EGIS [31,00], Actelsar HCT [31,00], Gisartan [31,12], Zanafodar Combi [31,12], Polsart Plus [31,65], Telmizek HCT [33,98], PritorPlus® [35,35], MicardisPlus [38,59]	R <sub>x</sub>	100%	31,00
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	16,02
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
<b>Actelsar HCT: tabl. 80/25 mg - 28 szt.</b> INN: <i>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09DA07   wyk: B   EAN ~ 056773 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Actavis Group PTC ehf. Odpowiedniki: Toptelmi HCT [23,61], Telmisartan + HCT Genoptim [25,51], Telmix Plus [27,46], Tezeo HCT [29,52], Tolucombi [30,55], Telmisartan HCT EGIS [31,00], Actelsar HCT [31,00], Gisartan [31,12], Zanafodar Combi [31,12], Polsart Plus [31,65], Telmizek HCT [33,98], PritorPlus® [35,35], MicardisPlus [39,36]	R <sub>x</sub>	100%	31,00
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	16,02
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
<b>Acticoat® Flex 3: opatrunek leczniczy 10x20 cm - 1 szt.</b> INN: <i>Emplastrum antimicrobicum</i>   ATC: V20AA   wyk:   EAN ~ 124858 (1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N Smith & Nephew Sp. z o.o. Odpowiedniki: Atrauman Ag [29,69], Acticoat® Flex 3 [32,97]	WM	100%	32,97
		Limit	32,97
		30% <sup>(1)</sup>	9,89
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
<b>Acticoat® Flex 3: opatrunek leczniczy 10x10 cm - 1 szt.</b> INN: <i>Emplastrum antimicrobicum</i>   ATC: V20AA   wyk:   EAN ~ 124810 (1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N Smith & Nephew Sp. z o.o. Odpowiedniki: Atrauman Ag [15,66], Allevyn® Ag Non Adhesive [16,10], Allevyn® Ag Adhesive [16,20], Acticoat® Flex 3 [19,77]	WM	100%	19,77
		Limit	16,49
		30% <sup>(1)</sup>	8,23
		B <sup>(2)</sup>	3,28
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.



Acticoat® Flex 3: opatrunek leczniczy 20x40 cm - 1 szt.	WM	100%	100,36
		Limit	100,36
		30% <sup>(1)</sup>	30,11
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Emplastr antimicrobiotica* ATC: V20AA wyk: EAN ~ 124872  
 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N Smith & Nephew Sp. z o.o.

Activelle®: tabl. powł. 1 mg+ 0,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	27,00
		Limit	16,23
		30% <sup>(1)</sup>	15,64
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Estradiol + Norethisterone (stałe dawki)* ATC: G03FA01 wyk: B EAN ~ 451210  
 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Cliovelle® [23,56], Activelle® [27,00]

Actrapid® Penfill®: inj. [roztw.] 100 j.m./ml - 5 wkł. 3 ml	Rx	100%	96,88
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	4,00
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Insulin human* ATC: A10AB01 wyk: B EAN ~ 237920  
 (1)Kobiety w ciąży(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Cukrzyca(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: A Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Actrapid® Penfill® [96,88], Polhumin® R [97,72], Humulin® R [100,90], Gensulin R [104,40]

Acurenal®: tabl. powł. 5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	9,37
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	9,37
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Quinapril* ATC: C09AA06 wyk: B EAN ~ 125417  
 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci od 6 do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 rż.(3)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Bausch Health

Odpowiedniki: Accupro® 5 [X], Acurenal® [9,37]

Acurenal®: tabl. powł. 10 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	13,11
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	12,59
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Quinapril* ATC: C09AA06 wyk: B EAN ~ 125516  
 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci od 6 do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 rż.(3)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Bausch Health

Odpowiedniki: Accupro® 10 [X], Acurenal® [13,11]

Acurenal®: tabl. powł. 20 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	19,25
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	16,07
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Quinapril* ATC: C09AA06 wyk: B EAN ~ 125615  
 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci od 6 do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 rż.(3)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Bausch Health

Odpowiedniki: Accupro® 20 [X], Pulsaren® 20 [15,85], Acurenal® [19,25]

Acurenal®: tabl. powł. 40 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	31,25
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	24,89
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Quinapril* ATC: C09AA06 wyk: B EAN ~ 953882  
 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci od 6 do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 rż.(3)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Bausch Health

Adablok: tabl. powł. 5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	21,99
		Limit	17,65
		30% <sup>(1)</sup>	9,64
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Solifenacin succinate* ATC: G04BD08 wyk: B EAN ~ 400374  
 (1)Zespół pęcherza nadreaktywnego(2)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Solifenacin Stada [X], Solifurin [X], Beloflow [15,41], Silamil [16,15], Soreca [18,54], Aurosolin [18,55], Solinco [18,85], Vesisol [20,21], Afenix [20,38], Zevesin [20,39], Uronorm [20,85], Vesoligo [20,85], Adablok [21,99]

Adablok: tabl. powł. 10 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	41,86
		Limit	35,29
		30% <sup>(1)</sup>	17,16
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Solifenacin succinate* ATC: G04BD08 wyk: B EAN ~ 400375  
 (1)Zespół pęcherza nadreaktywnego(2)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Solifenacin Stada [X], Beloflow [28,70], Soreca [34,95], Aurosolin [34,97], Silamil [35,29], Solifenacin Medreg [35,29], Solinco [35,57], Solifurin [36,14], Vesisol [37,63], Afenix [38,65], Zevesin [38,66], Uronorm [39,57], Vesoligo [39,57], Adablok [41,86]

Adadox: tabl. 2 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	9,01
		Limit	9,01
		30% <sup>(1)</sup>	2,70
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Doxazosin* ATC: G04CA wyk: EAN ~ 901890

(1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż.; nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż. (2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Przerost gruczołu krokowego(4)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Doxorin [X], Doxazosin Aurovitas [8,33], Adadox [9,01], Kamiren® [17,45], Doxonex® [17,60], Zoxon® 2 [17,61], Apo-Doxan 2 [17,73], Doxonorm® [18,45], Doxar [18,90]

Adadox: tabl. 4 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	16,82
		Limit	16,82
		30% <sup>(1)</sup>	5,05
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Doxazosin* ATC: G04CA wyk: EAN ~ 902255

(1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Przerost gruczołu krokowego(4)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Doxorin [X], Doxazosin Aurovitas [15,40], Adadox [16,82], Doxar [23,53], Dozox [23,96], Zoxon® 4 [23,97], Doxonorm® [24,61], Kamiren® [24,73], Apo-Doxan 4 [26,90], Doxonex® [27,12]

Adadox: tabl. 4 mg - 90 szt. ◆	Rx	100%	45,36
		Limit	45,36
		30% <sup>(1)</sup>	13,61
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	9,60
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Doxazosin* ATC: G04CA wyk: EAN ~ 902293

(1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Przerost gruczołu krokowego(4)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Adadox [45,36], Dozox [66,76], Zoxon® 4 [68,02]

Adadut: kaps. miękkie 0,5 mg - 30 szt.	Rx	100%	30,20
		Limit	26,72
		30% <sup>(1)</sup>	11,50
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Dutasteride* ATC: G04CB02 wyk: B EAN ~ 328696

(1)Leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego(2)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: N Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Findarts [24,03], Adadut [30,20]

Adaptic: opatrunek leczniczy 7,6x40,6 cm - 1 szt.	WM	100%	38,90
		Limit	38,90
		30% <sup>(1)</sup>	11,67
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Emplastr microfibricum cellulosae* ATC: V20 wyk: EAN ~ 800016  
 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N Systemed sp.j Kusiak D., Zawirski P.

Adaptic: opatrunek leczniczy 12,7x22,9 cm - 1 szt.	WM	100%	36,86
		Limit	36,66
		30% <sup>(1)</sup>	11,20
		B <sup>(2)</sup>	0,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Emplastr microfibricum cellulosae* ATC: V20 wyk: EAN ~ 800017

(1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N Systemed sp.j Kusiak D., Zawirski P.

Adaster: tabl. powł. 5 mg - 30 szt.	Rx	100%	29,86
		Limit	26,72
		R <sup>(1)</sup>	6,34
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Finasteride* ATC: G04CB01 wyk: B EAN ~ 711949

(1)Przerost gruczołu krokowego(2)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: N Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Finahit [X], Finaride [X], Finasteridum Bluefish [22,20], Finasterid Stada [24,01], Finamef - (IR) [26,17], Uronezyr [27,24], Finaran [28,33], Symasteride [28,38], Finpros [28,45], Penester® [29,58], Hyplafin [29,82], Antiprost [29,85], Adaster [29,86], Androster [30,02], Finamef [30,07], Apo-Fina [30,11], Finaster® [30,19]

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

<b>Adaster:</b> tabl. powł. 5 mg - 90 szt.	Rx	100%	81,49
		Limit	80,15
		R <sup>(1)</sup>	10,94
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Finasteride</i>   ATC: G04CB01   wyk: B   EAN ~ 711987			
(1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N   Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Finahit [X], Finasteridum Bluefish [58,50], Finasterid Stada [62,95], Symasteride [73,12], Penester <sup>®</sup> [79,74], Finaster <sup>®</sup> [80,15], Apo-Fina [80,81], Adaster [81,49], Androster [81,97], Finamef [82,11]			
<b>Adatam:</b> kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde 0,4 mg - 30 szt.	Rx	100%	23,97
		Limit	19,21
		R <sup>(1)</sup>	7,96
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i>   ATC: G04CA02   wyk: B   EAN ~ 622726			
(1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N   Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: TamsuGen <sup>®</sup> [17,94], Tamoptim [19,96], Adatam [23,97], Uprox [23,98], Prostammic [24,04], Tanyz <sup>®</sup> [24,10], Tamsudil [24,84], Omnic <sup>®</sup> 0,4 [24,85]			
<b>Adatam:</b> kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde 0,4 mg - 90 szt.	Rx	100%	66,85
		Limit	57,63
		R <sup>(1)</sup>	18,82
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i>   ATC: G04CA02   wyk: B   EAN ~ 001501			
(1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N   Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Tamsudil [X], Tamoptim [54,74], Uprox [66,83], Adatam [66,85]			
<b>Adatam XR:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu 0,4 mg - 30 szt.	Rx	100%	23,99
		Limit	19,21
		R <sup>(1)</sup>	7,18
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i>   ATC: G04CA02   wyk: B   EAN ~ 100588			
(1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N   Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Omsal - (IR) [X], Urostat 0,4 mg [X], Urostat 0,4 mg - (IR) [X], Tamsiger [16,35], Urostat 0,4 mg - (IR) [16,35], Tamiron [16,49], Bazetham Retard [23,61], Omsal [23,81], Symlosin SR <sup>®</sup> [23,81], Tanyz <sup>®</sup> ERAS [23,90], Uprox XR [23,98], Ranlosin [23,99], Adatam XR [23,99], TamisPras [24,34], Apo-Tamis [24,36], Omnic Ocas <sup>®</sup> 0,4 [25,18]			
<b>Adatam XR:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu 0,4 mg - 90 szt.	Rx	100%	66,87
		Limit	57,63
		R <sup>(1)</sup>	16,96
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i>   ATC: G04CA02   wyk: B   EAN ~ 100590			
(1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N   Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Symlosin SR <sup>®</sup> [50,85], Bazetham Retard [65,74], Ranlosin [66,31], Uprox XR [66,83], Adatam XR [66,87], Apo-Tamis [68,02]			
<b>Adatam XR:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu 0,4 mg - 120 szt.	Rx	100%	87,37
		Limit	76,84
		R <sup>(1)</sup>	23,33
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i>   ATC: G04CA02   wyk: B   EAN ~ 100592			
(1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N   Adamed Sp. z o.o.			
<b>Adeksa:</b> tabl. 50 mg - 30 szt.	Rx	100%	12,77
		Limit	9,48
		30% <sup>(1)</sup>	6,13
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Acarbose</i>   ATC: A10BF01   wyk: B   EAN ~ 893386			
(1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Polfarmex S.A.			
Odpowiedniki: Glucobay <sup>®</sup> 50 [X], Adeksa [12,77]			
<b>Adeksa:</b> tabl. 100 mg - 30 szt.	Rx	100%	18,95
		Limit	18,95
		30% <sup>(1)</sup>	5,69
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Acarbose</i>   ATC: A10BF01   wyk: B   EAN ~ 893423			
(1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Polfarmex S.A.			
Odpowiedniki: Glucobay <sup>®</sup> 100 [X], Adeksa [18,95]			
<b>Adenuric<sup>®</sup>:</b> tabl. powł. 80 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	46,68
		Limit	20,20
		30% <sup>(1)</sup>	32,54
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Febuxostat</i>   ATC: M04AA03   wyk: B   EAN ~ 761548			
(1) Leczenie przewlekłej hiperurykemie u dorosłych pacjentów w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złożeń moczianowych, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Menarini International Oper. Luxemburg S.A.			
Odpowiedniki: Febuxostat Aurovitas [33,86], Prohidna [33,86], Febuxostat Krka [35,36], Denofix [35,40], Adenuric <sup>®</sup> [46,68]			

<b>Adenuric<sup>®</sup>:</b> tabl. powł. 120 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	51,11
		Limit	30,31
		30% <sup>(1)</sup>	29,89
		50% <sup>(2)</sup>	35,96
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Febuxostat</i>   ATC: M04AA03   wyk: B   EAN ~ 761562			
(1) Leczenie przewlekłej hiperurykemie u dorosłych pacjentów w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złożeń moczianowych, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych (2) Zapobieganie i leczenie przewlekłej hiperurykemie u dorosłych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Menarini International Oper. Luxemburg S.A.			
Odpowiedniki: Febuxostat Aurovitas [49,94], Adenuric <sup>®</sup> [51,11], Febuxostat Krka [52,22], Denofix [52,25]			
<b>Adipine:</b> tabl. 5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	8,21
		Limit	8,21
		30% <sup>(1)</sup>	2,46
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Amlodipine</i>   ATC: C08CA01   wyk: B   EAN ~ 642311			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Bausch Health			
Odpowiedniki: Almiden [X], Amlodipine Aurobindo [X], Finamlox [X], Amlodipine Aurovitas [6,15], Amlodipine Bluefish [6,86], Amlomyl [7,02], Normodipine <sup>®</sup> [7,34], Amlonor <sup>®</sup> [7,56], ApoAmlor 5 [7,78], Cardilopin [7,99], Agen <sup>®</sup> 5 [8,03], Adipine [8,21], Vilpin <sup>®</sup> [8,26], Alneta [8,48], Tenox <sup>®</sup> [8,48], Aldan <sup>®</sup> [8,64], Amlopin <sup>®</sup> [9,23], Amlozek <sup>®</sup> [13,79]			
<b>Adipine:</b> tabl. 10 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	13,62
		Limit	13,62
		30% <sup>(1)</sup>	4,09
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Amlodipine</i>   ATC: C08CA01   wyk: B   EAN ~ 642267			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Bausch Health			
Odpowiedniki: Almiden [X], Amlodipine Aurobindo [X], Finamlox [X], Amlodipine Aurovitas [11,03], Amlodipine Bluefish [11,72], Amlomyl [12,00], Normodipine <sup>®</sup> [13,58], Adipine [13,62], Amlonor <sup>®</sup> [14,55], Amlopin <sup>®</sup> - (IR) [14,68], Amlopin <sup>®</sup> - (IR) [14,68], Amlopin <sup>®</sup> - (IR) [14,73], Cardilopin [14,85], Agen <sup>®</sup> 10 [14,90], ApoAmlor 10 [14,98], Vilpin <sup>®</sup> [15,65], Aldan <sup>®</sup> [15,88], Alneta [15,88], Tenox <sup>®</sup> [15,88], Amlopin <sup>®</sup> [17,54], Amlozek <sup>®</sup> [20,26]			
<b>Adrenalina WZF:</b> inj. [roztw.] 0,3 mg/0,3 ml - 1 amp.-strzyk. 1 ml ◆	Rx	100%	56,98
		Limit	56,98
		50% <sup>(1)</sup>	28,49
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Epinephrine</i>   ATC: C01CA24   wyk: A   EAN ~ 069711			
(1) Leczenie doraźne w nagłych przypadkach ostrych reakcji alergicznych (anafilaksji), wywołanych przez pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów oraz inne alergeny, jak również w przypadku anafilaksji samoistnej (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Polfa Warszawa SA			
<b>Advagraf:</b> kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde 0,5 mg - 30 szt.	Rx	100%	57,92
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,83
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tacrolimus</i>   ATC: L04AD02   wyk: B   EAN ~ 051052			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Astellas Pharma Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Dailiport [49,86], Advagraf [57,92]			
<b>Advagraf:</b> kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde 1 mg - 30 szt.	Rx	100%	114,58
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tacrolimus</i>   ATC: L04AD02   wyk: B   EAN ~ 051076			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Astellas Pharma Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Dailiport [93,35], Advagraf [114,58], Envarsus [164,08]			

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.

**Sumamigren**  
Sumatriptanum

Advagraf: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde 3 mg - 30 szt.	Rx	100%	344,67
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	4,13
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Tacrolimus** ATC: L04AD02 wyk: B EAN ~ 699957  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanki lub komórek; miastenia; idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Astellas Pharma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Dailiport [258,19], Advagraf [344,67]

Advagraf: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde 5 mg - 30 szt.	Rx	100%	570,70
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Tacrolimus** ATC: L04AD02 wyk: B EAN ~ 051137  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanki lub komórek; miastenia; idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Astellas Pharma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Dailiport [421,69], Advagraf [570,70]

Afenix: tabl. powł. 5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	20,38
		Limit	17,65
		30% <sup>(1)</sup>	7,23
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Solifenacin succinate** ATC: G04BD08 wyk: B EAN ~ 134922  
 (1) Zespół pęcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA  
 Odpowiedniki: Solifenacin Stada [X], Solifurin [X], Beloflow [15,41], Silamil [16,15], Soreca [18,54], Aurosolin [18,55], Solinco [18,85], Vesisol [20,21], Afenix [20,38], Zevesin [20,39], Uronorm [20,85], Vesoligo [20,85], Adablock [21,99]

Afenix: tabl. powł. 10 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	38,65
		Limit	35,29
		30% <sup>(1)</sup>	12,56
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Solifenacin succinate** ATC: G04BD08 wyk: B EAN ~ 134932  
 (1) Zespół pęcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA  
 Odpowiedniki: Solifenacin Stada [X], Beloflow [28,70], Soreca [34,95], Aurosolin [34,97], Silamil [35,29], Solifenacin Medreg [35,29], Solinco [35,57], Solifurin [36,14], Vesisol [37,63], Afenix [38,65], Zevesin [38,66], Uronorm [39,57], Vesoligo [39,57], Adablock [41,86]

Agastin®: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 28 szt.	Rx	100%	11,85
		Limit	11,85
		50% <sup>(1)</sup>	5,93
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Omeprazole** ATC: A02BC01 wyk: B EAN ~ 068425  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Exeltris Poland Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Prenom [9,47], Heligen Neo [9,66], Omeprazole Genoptim [10,75], Agastin® [11,85], Goprazol [12,39], Progestim [14,57], Ultop [16,26], Gasec®-20 Gastrocaps® [16,34], Helicid® 20 [18,49], Prazol® [19,18], Bio-prazol® [19,76], Polprazol® [20,92]

Agen 5 - (IR): tabl. 5 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	13,30
		Limit	13,30
		30% <sup>(1)</sup>	3,99
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amlodipine** ATC: C08CA01 wyk: B EAN ~ 143675  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Delfarma Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Almiden [X], Agen 5 - (IR) [13,30], Agen® 5 [13,51], Alneta [15,12]

Agen 10 - (IR): tabl. 10 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	24,58
		Limit	24,58
		30% <sup>(1)</sup>	7,37
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amlodipine** ATC: C08CA01 wyk: B EAN ~ 143663  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Delfarma Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Almiden [X], Agen 10 - (IR) [24,58], Agen® 10 [25,04], Alneta [28,34]

Agen® 5: tabl. 5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	8,03
		Limit	8,03
		30% <sup>(1)</sup>	2,41
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amlodipine** ATC: C08CA01 wyk: B EAN ~ 098926  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Zentiva PL Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Almiden [X], Amlodipine Aurobindo [X], Finamlox [X], Amlodipine Aurovitas [6,15], Amlodipine Bluefish [6,86], Amlomyl [7,02], Normodipine® [7,34], Amlonor® [7,56], ApoAmlo 5 [7,78], Cardilopin [7,99], Agen® 5 [8,03], Adipine [8,21], Vilpin® [8,26], Alneta [8,48], Tenox® [8,48], Aldan® [8,64], Amlopin® [9,23], Amlozek® [13,79]

Agen® 5: tabl. 5 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	13,51
		Limit	13,51
		30% <sup>(1)</sup>	4,05
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amlodipine** ATC: C08CA01 wyk: B EAN ~ 067533  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Zentiva PL Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Almiden [X], Agen 5 - (IR) [13,30], Agen® 5 [13,51], Alneta [15,12]

Agen® 10: tabl. 10 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	14,90
		Limit	14,90
		30% <sup>(1)</sup>	4,47
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amlodipine** ATC: C08CA01 wyk: B EAN ~ 099022  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Zentiva PL Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Almiden [X], Amlodipine Aurobindo [X], Finamlox [X], Amlodipine Aurovitas [11,03], Amlodipine Bluefish [11,72], Amlomyl [12,00], Normodipine® [13,58], Adipine [13,62], Amlonor® [14,55], Amlopin® - (IR) [14,68], Amlopin® - (IR) [14,68], Amlopin® - (IR) [14,73], Cardilopin [14,85], Agen® 10 [14,90], ApoAmlo 10 [14,98], Vilpin® [15,65], Aldan® [15,88], Alneta [15,88], Tenox® [15,88], Amlopin® [17,54], Amlozek® [20,26]

Agen® 10: tabl. 10 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	25,04
		Limit	25,04
		30% <sup>(1)</sup>	7,51
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amlodipine** ATC: C08CA01 wyk: B EAN ~ 067540  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Zentiva PL Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Almiden [X], Agen 10 - (IR) [24,58], Agen® 10 [25,04], Alneta [28,34]

Aglan® 15: tabl. 15 mg - 20 szt.	Rx	100%	11,55
		Limit	10,22
		50% <sup>(1)</sup>	6,44
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Meloxicam** ATC: M01AC06 wyk: B EAN ~ 224883  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:C, T3:D Zentiva PL Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Remolexam [9,82], Meloxistad® [10,22], Aglan® 15 [11,55], Aspicam [12,87], Movalis® [13,79]

Aglan® 15: tabl. 15 mg - 30 szt.	Rx	100%	15,26
		Limit	15,26
		50% <sup>(1)</sup>	7,63
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Meloxicam** ATC: M01AC06 wyk: B EAN ~ 610006  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:C, T3:D Zentiva PL Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Opokan forte [14,39], Aglan® 15 [15,26], Aspicam [18,25]

Agolek: tabl. powł. 25 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	64,28
		Limit	62,94
		30% <sup>(1)</sup>	20,22
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Agomelatine** ATC: N06AX22 wyk: B EAN ~ 388768  
 (1) Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku, lub anhedonii (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Agomelatine Adamed [X], Agomelatine G.L. Pharma [62,11], Lamegom [62,94], Symago [62,94], Agomelatyna Egis [63,20], Sedival® [63,25], Agolek [64,28]





# ZOLPIC

zolidem

Daj owcom odpocząć.



<b>Agomelatine +pharma:</b> tabl. powł. 25 mg - 30 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>66,48</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>66,48</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>19,94</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	66,48		Limit	66,48		30% <sup>(1)</sup>	19,94		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<b>Airbufo Forspiro:</b> prosz. do inhal. 160/4,5 µg/dawkę - 1 inhal. (60 dawek)	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>59,90</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(3)</sup></td><td>16,11</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	59,90		Limit	0,00		C <sup>(1)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	16,11		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
Rx	100%	66,48																															
	Limit	66,48																															
	30% <sup>(1)</sup>	19,94																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	59,90																															
	Limit	0,00																															
	C <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(3)</sup>	16,11																															
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.																															
INN: <i>Agomelatine</i>   ATC: N06AX22   wyk: B   EAN ~ 014049 (1) Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku, lub anhedonii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	+pharma Polska Sp. z o.o.	INN: <i>Budesonide + Formoterol</i>   ATC: R03AK07   wyk: A   EAN ~ 102086 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	Sandoz GmbH																														
<b>Agomelatine G.L. Pharma:</b> tabl. powł. 25 mg - 28 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>62,11</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>62,11</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>18,63</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	62,11		Limit	62,11		30% <sup>(1)</sup>	18,63		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<b>Airbufo Forspiro:</b> prosz. do inhal. 160/4,5 µg/dawkę - 2 inhal. (120 dawek)	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>109,69</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(3)</sup></td><td>18,90</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	109,69		Limit	0,00		C <sup>(1)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	18,90		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
Rx	100%	62,11																															
	Limit	62,11																															
	30% <sup>(1)</sup>	18,63																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	109,69																															
	Limit	0,00																															
	C <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(3)</sup>	18,90																															
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.																															
INN: <i>Agomelatine</i>   ATC: N06AX22   wyk: B   EAN ~ 200929 (1) Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku, lub anhedonii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.	(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	Sandoz GmbH																														
<b>Agomelatyna Egis:</b> tabl. powł. 25 mg - 28 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>63,20</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>62,94</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>19,14</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	63,20		Limit	62,94		30% <sup>(1)</sup>	19,14		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<b>Airbufo Forspiro:</b> prosz. do inhal. 320/9 µg/dawkę - 1 inhal. (60 dawek)	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>110,84</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(3)</sup></td><td>20,05</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	110,84		Limit	0,00		C <sup>(1)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	20,05		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
Rx	100%	63,20																															
	Limit	62,94																															
	30% <sup>(1)</sup>	19,14																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	110,84																															
	Limit	0,00																															
	C <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(3)</sup>	20,05																															
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.																															
INN: <i>Agomelatine</i>   ATC: N06AX22   wyk: B   EAN ~ 717495 (1) Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku, lub anhedonii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	Egis Polska Sp. z o.o.	(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	Sandoz GmbH																														
<b>Agomelatyna Adamed [X], Agomelatyna G.L. Pharma [62,11], Lamegom [62,94], Symago [62,94], Agomelatyna Egis [63,20], Sedival® [63,25], Agolek [64,28]</b>	<b>Odpowiedniki:</b> Agomelatyna Adamed [X], Agomelatyna G.L. Pharma [62,11], Lamegom [62,94], Symago [62,94], Agomelatyna Egis [63,20], Sedival® [63,25], Agolek [64,28]	<b>Airbufo Forspiro:</b> prosz. do inhal. 320/9 µg/dawkę - 1 inhal. (60 dawek)	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>104,54</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(3)</sup></td><td>13,75</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	104,54		Limit	0,00		C <sup>(1)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	13,75		S <sup>(4)</sup>	bezpł.												
Rx	100%	104,54																															
	Limit	0,00																															
	C <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(3)</sup>	13,75																															
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.																															
<b>Agomelatyna Adamed [X], Agomelatyna G.L. Pharma [62,11], Lamegom [62,94], Symago [62,94], Agomelatyna Egis [63,20], Sedival® [63,25], Agolek [64,28]</b>	<b>Odpowiedniki:</b> Agomelatyna Adamed [X], Agomelatyna G.L. Pharma [62,11], Lamegom [62,94], Symago [62,94], Agomelatyna Egis [63,20], Sedival® [63,25], Agolek [64,28]	<b>Airbufo Forspiro:</b> prosz. do inhal. 320/9 µg/dawkę - 1 inhal. (60 dawek)	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>110,84</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(3)</sup></td><td>20,05</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	110,84		Limit	0,00		C <sup>(1)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	20,05		S <sup>(4)</sup>	bezpł.												
Rx	100%	110,84																															
	Limit	0,00																															
	C <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(3)</sup>	20,05																															
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.																															
<b>Agrexex:</b> tabl. powł. 75 mg - 28 szt.	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>25,80</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>25,80</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>7,74</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	25,80		Limit	25,80		30% <sup>(1)</sup>	7,74		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<b>Airbufo Forspiro:</b> prosz. do inhal. 320/9 µg/dawkę - 1 inhal. (60 dawek)	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>110,84</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(3)</sup></td><td>20,05</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	110,84		Limit	0,00		C <sup>(1)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	20,05		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
Rx	100%	25,80																															
	Limit	25,80																															
	30% <sup>(1)</sup>	7,74																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	110,84																															
	Limit	0,00																															
	C <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(3)</sup>	20,05																															
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.																															
INN: <i>Clonidogrel</i>   ATC: B01AC04   wyk: B   EAN ~ 754748 (1) Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania, Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom. Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B	Actavis Group PTC ehf.	<b>AirFluSal Forspiro:</b> prosz. do inhal. 50/500 µg/dawkę - 1 inhal. (60 dawek)	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>104,54</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(3)</sup></td><td>13,75</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	104,54		Limit	0,00		C <sup>(1)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	13,75		S <sup>(4)</sup>	bezpł.												
Rx	100%	104,54																															
	Limit	0,00																															
	C <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(3)</sup>	13,75																															
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.																															
<b>Odpowiedniki:</b> Clonidogrel Teva [X], Trombex [X], Clonidogrel Genoptim [14,40], Zyllt - (IR) [21,32], Zyllt® - (IR) [21,35], Clonidogrel Bluefish [21,75], Agrexex - (IR) [21,80], Agrexex - (IR) [22,36], Agrexex - (IR) [22,38], Grepid [22,95], Pegorel [22,95], Clonidogrel KRKA [23,52], Zyllt® [23,52], Clonidogrel Apotex [25,70], Clonidogrel Aurovitas [25,76], Agrexex [25,80], Clonidex [26,33], Plavocorin® [27,08], Areplex® [34,83]	<b>Odpowiedniki:</b> Clonidogrel Teva [X], Trombex [X], Clonidogrel Genoptim [14,40], Zyllt - (IR) [21,32], Zyllt® - (IR) [21,35], Clonidogrel Bluefish [21,75], Agrexex - (IR) [21,80], Agrexex - (IR) [22,36], Agrexex - (IR) [22,38], Grepid [22,95], Pegorel [22,95], Clonidogrel KRKA [23,52], Zyllt® [23,52], Clonidogrel Apotex [25,70], Clonidogrel Aurovitas [25,76], Agrexex [25,80], Clonidex [26,33], Plavocorin® [27,08], Areplex® [34,83]	(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	Sandoz GmbH																														
<b>Agrexex - (IR):</b> tabl. powł. 75 mg - 28 szt.	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>22,36</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>22,36</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>6,71</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	22,36		Limit	22,36		30% <sup>(1)</sup>	6,71		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<b>AirFluSal Forspiro:</b> prosz. do inhal. 50/250 µg/dawkę - 1 inhal. (60 dawek)	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>87,87</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(3)</sup></td><td>12,75</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	87,87		Limit	0,00		C <sup>(1)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	12,75		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
Rx	100%	22,36																															
	Limit	22,36																															
	30% <sup>(1)</sup>	6,71																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	87,87																															
	Limit	0,00																															
	C <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(3)</sup>	12,75																															
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.																															
INN: <i>Clonidogrel</i>   ATC: B01AC04   wyk: B   EAN ~ 251949 (1) Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom. Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B	Delfarma Sp. z o.o.	(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	Sandoz GmbH																														
<b>Odpowiedniki:</b> Clonidogrel Teva [X], Trombex [X], Clonidogrel Genoptim [14,40], Zyllt - (IR) [21,32], Zyllt® - (IR) [21,35], Clonidogrel Bluefish [21,75], Agrexex - (IR) [21,80], Agrexex - (IR) [22,36], Agrexex - (IR) [22,38], Grepid [22,95], Pegorel [22,95], Clonidogrel KRKA [23,52], Zyllt® [23,52], Clonidogrel Apotex [25,70], Clonidogrel Aurovitas [25,76], Agrexex [25,80], Clonidex [26,33], Plavocorin® [27,08], Areplex® [34,83]	<b>Odpowiedniki:</b> Clonidogrel Teva [X], Trombex [X], Clonidogrel Genoptim [14,40], Zyllt - (IR) [21,32], Zyllt® - (IR) [21,35], Clonidogrel Bluefish [21,75], Agrexex - (IR) [21,80], Agrexex - (IR) [22,36], Agrexex - (IR) [22,38], Grepid [22,95], Pegorel [22,95], Clonidogrel KRKA [23,52], Zyllt® [23,52], Clonidogrel Apotex [25,70], Clonidogrel Aurovitas [25,76], Agrexex [25,80], Clonidex [26,33], Plavocorin® [27,08], Areplex® [34,83]	<b>AirFluSal Forspiro - (IR):</b> prosz. do inhal. 50/250 µg/dawkę - 1 inhal. (60 dawek)	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>85,30</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(3)</sup></td><td>10,18</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	85,30		Limit	0,00		C <sup>(1)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	10,18		S <sup>(4)</sup>	bezpł.												
Rx	100%	85,30																															
	Limit	0,00																															
	C <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(3)</sup>	10,18																															
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.																															
<b>Agrexex - (IR):</b> tabl. powł. 75 mg - 28 szt.	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>21,80</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>21,80</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>6,54</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	21,80		Limit	21,80		30% <sup>(1)</sup>	6,54		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<b>AirFluSal Forspiro - (IR):</b> prosz. do inhal. 50/250 µg/dawkę - 1 inhal. (60 dawek)	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>85,30</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(3)</sup></td><td>10,18</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	85,30		Limit	0,00		C <sup>(1)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	10,18		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
Rx	100%	21,80																															
	Limit	21,80																															
	30% <sup>(1)</sup>	6,54																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	85,30																															
	Limit	0,00																															
	C <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(3)</sup>	10,18																															
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.																															
INN: <i>Clonidogrel</i>   ATC: B01AC04   wyk: B   EAN ~ 144831 (1) Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B	Medezin	(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	Inpharm Sp. z o.o.																														
<b>Odpowiedniki:</b> Clonidogrel Teva [X], Trombex [X], Clonidogrel Genoptim [14,40], Zyllt - (IR) [21,32], Zyllt® - (IR) [21,35], Clonidogrel Bluefish [21,75], Agrexex - (IR) [21,80], Agrexex - (IR) [22,36], Agrexex - (IR) [22,38], Grepid [22,95], Pegorel [22,95], Clonidogrel KRKA [23,52], Zyllt® [23,52], Clonidogrel Apotex [25,70], Clonidogrel Aurovitas [25,76], Agrexex [25,80], Clonidex [26,33], Plavocorin® [27,08], Areplex® [34,83]	<b>Odpowiedniki:</b> Clonidogrel Teva [X], Trombex [X], Clonidogrel Genoptim [14,40], Zyllt - (IR) [21,32], Zyllt® - (IR) [21,35], Clonidogrel Bluefish [21,75], Agrexex - (IR) [21,80], Agrexex - (IR) [22,36], Agrexex - (IR) [22,38], Grepid [22,95], Pegorel [22,95], Clonidogrel KRKA [23,52], Zyllt® [23,52], Clonidogrel Apotex [25,70], Clonidogrel Aurovitas [25,76], Agrexex [25,80], Clonidex [26,33], Plavocorin® [27,08], Areplex® [34,83]	<b>AirFluSal Forspiro - (IR):</b> prosz. do inhal. 50/250 µg/dawkę - 1 inhal. (60 dawek)	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>87,41</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(3)</sup></td><td>12,29</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	87,41		Limit	0,00		C <sup>(1)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	12,29		S <sup>(4)</sup>	bezpł.												
Rx	100%	87,41																															
	Limit	0,00																															
	C <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(3)</sup>	12,29																															
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.																															
<b>Agrexex - (IR):</b> tabl. powł. 75 mg - 28 szt.	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>22,38</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>22,38</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>6,71</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	22,38		Limit	22,38		30% <sup>(1)</sup>	6,71		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<b>AirFluSal Forspiro - (IR):</b> prosz. do inhal. 50/250 µg/dawkę - 1 inhal. (60 dawek)	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>87,41</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(3)</sup></td><td>12,29</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	87,41		Limit	0,00		C <sup>(1)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	12,29		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
Rx	100%	22,38																															
	Limit	22,38																															
	30% <sup>(1)</sup>	6,71																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	87,41																															
	Limit	0,00																															
	C <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(3)</sup>	12,29																															
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.																															
INN: <i>Clonidogrel</i>   ATC: B01AC04   wyk: B   EAN ~ 139700 (1) Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania, Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B	Inpharm Sp. z o.o.	(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	Delfarma Sp. z o.o.																														
<b>Odpowiedniki:</b> Clonidogrel Teva [X], Trombex [X], Clonidogrel Genoptim [14,40], Zyllt - (IR) [21,32], Zyllt® - (IR) [21,35], Clonidogrel Bluefish [21,75], Agrexex - (IR) [21,80], Agrexex - (IR) [22,36], Agrexex - (IR) [22,38], Grepid [22,95], Pegorel [22,95], Clonidogrel KRKA [23,52], Zyllt® [23,52], Clonidogrel Apotex [25,70], Clonidogrel Aurovitas [25,76], Agrexex [25,80], Clonidex [26,33], Plavocorin® [27,08], Areplex® [34,83]	<b>Odpowiedniki:</b> Clonidogrel Teva [X], Trombex [X], Clonidogrel Genoptim [14,40], Zyllt - (IR) [21,32], Zyllt® - (IR) [21,35], Clonidogrel Bluefish [21,75], Agrexex - (IR) [21,80], Agrexex - (IR) [22,36], Agrexex - (IR) [22,38], Grepid [22,95], Pegorel [22,95], Clonidogrel KRKA [23,52], Zyllt® [23,52], Clonidogrel Apotex [25,70], Clonidogrel Aurovitas [25,76], Agrexex [25,80], Clonidex [26,33], Plavocorin® [27,08], Areplex® [34,83]	<b>AirFluSal Forspiro - (IR):</b> prosz. do inhal. 50/250 µg/dawkę - 1 inhal. (60 dawek)	<b>Odpowiedniki:</b> AirFluSal Forspiro - (IR) [85,30], AirFluSal Forspiro - (IR) [87,41], AirFluSal Forspiro [87,87]																														

<b>Airiam:</b> aerozol inhalacyjny [roztw.] (100 µg+ 6 µg)/dawkę - 1 poj. po 120 daw.	Rx 100% <b>89,09</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Aldan®:</b> tabl. 5 mg - 30 szt. ◆	Rx 100% <b>8,64</b> Limit <b>8,64</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>2,59</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Beclomethasone dipropionate + Formoterol fumarate dihydric</i> (1)Kobiety w ciąży(2)Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	ATC: R03AA08 wyk: EAN ~ 150350 Zentiva PL Sp. z o.o.	INN: <i>Amlodipine</i> (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: C08CA01 wyk: B EAN ~ 008635 Polfarmex S.A.
<b>Akineton - (IR):</b> tabl. 2 mg - 50 szt.	Rx 100% <b>15,00</b> Limit <b>14,16</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,09</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Aldan®:</b> tabl. 10 mg - 30 szt. ◆	Rx 100% <b>15,88</b> Limit <b>15,88</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>4,76</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Biperiden hydrochloride</i> (1)Choroba i zespół Parkinsona(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: N04AA02 wyk: B EAN ~ 144731 Delfarma Sp. z o.o.	INN: <i>Amlodipine</i> (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: C08CA01 wyk: B EAN ~ 008734 Polfarmex S.A.
<b>Akineton®:</b> tabl. 2 mg - 50 szt. ◆	Rx 100% <b>14,16</b> Limit <b>14,16</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>4,25</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Aldran 70:</b> tabl. 70 mg - 4 szt.	Rx 100% <b>12,30</b> Limit <b>12,30</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>3,69</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Biperiden hydrochloride</i> (1)Choroba i zespół Parkinsona(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: N04AA02 wyk: B EAN ~ 193219 Mercapharm Sp. z o.o. Polska	INN: <i>Alendronic acid</i> (1)Osteoporoza(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: M05BA04 wyk: B EAN ~ 072156 Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
<b>Akineton® SR 4 mg:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu 4 mg - 30 szt. ◆	Rx 100% <b>17,42</b> Limit <b>16,99</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,53</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Alendrogen:</b> tabl. 70 mg - 4 szt.	Rx 100% <b>10,63</b> Limit <b>10,63</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>3,19</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Biperiden hydrochloride</i> (1)Choroba i zespół Parkinsona(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: N04AA02 wyk: B EAN ~ 088421 Mercapharm Sp. z o.o. Polska	INN: <i>Alendronic acid</i> (1)Osteoporoza(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: M05BA04 wyk: B EAN ~ 623112 Mylan Ireland Limited
<b>Akistan:</b> krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml - 1 but. 2,5 ml	Rx 100% <b>31,83</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,38</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Alendronat Bluefish:</b> tabl. 70 mg - 4 szt.	Rx 100% <b>9,44</b> Limit <b>9,44</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>2,83</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Latanoprost</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: S01EE01 wyk: EAN ~ 995479 Pharmaselect International Beteiligungs	INN: <i>Alendronic acid</i> (1)Osteoporoza(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: M05BA04 wyk: B EAN ~ 737673 Bluefish Pharmaceuticals
<b>Akistan:</b> krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml - 3 but. 2,5 ml	Rx 100% <b>86,49</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>8,00</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Alergimed:</b> tabl. powł. 5 mg - 30 szt. ◆	Rx 100% <b>14,94</b> Limit <b>13,46</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,52</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Latanoprost</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: S01EE01 wyk: EAN ~ 189792 Pharmaselect International Beteiligungs	INN: <i>Levocetirizine dihydrochloride</i> (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke'go - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B	ATC: R06AE09 wyk: B EAN ~ 645229 MedReg sro
<b>Akistan Duo:</b> krople do oczu [roztw.] (50 µg+ 5 mg)/ml - 1 but. 2,5 ml ◆	Rx 100% <b>31,83</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,38</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Alarmed®:</b> tabl. 10 mg - 30 szt.	Rx 100% <b>15,36</b> Limit <b>13,46</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,94</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Latanoprost + Timolol</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	ATC: S01ED51 wyk: B EAN ~ 142924 Pharmaselect International Beteiligungs	INN: <i>Cetirizine dihydrochloride</i> (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke'go - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B	ATC: R06AE07 wyk: B EAN ~ 910793 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
<b>Akistan Duo:</b> krople do oczu [roztw.] (50 µg+ 5 mg)/ml - 3 but. 2,5 ml ◆	Rx 100% <b>86,49</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>8,00</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Alfabax:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu 10 mg - 30 szt.	Rx 100% <b>26,72</b> Limit <b>25,61</b> R <sup>(1)</sup> <b>5,38</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Latanoprost + Timolol</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	ATC: S01ED51 wyk: B EAN ~ 142925 Pharmaselect International Beteiligungs	INN: <i>Alfuzosin</i> (1)Przerost gruczołu krokowego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N	ATC: G04CA01 wyk: B EAN ~ 746576 Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
		<b>Odpowiedniki:</b> Alfuzostad® 10 mg [X], Alfurion [20,42], <b>Alfabax</b> [26,72], Dalfaz® Uno [31,87]	



Naszym wyborem

**enarenal**  
 enalaprilii maleas

<b>Alfurion:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>10 mg</b> - 30 szt. ◆ Rx	100% <b>20,42</b> Limit <b>20,42</b> B <sup>(1)</sup> <b>4,27</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Allevyn® Ag Adhesive:</b> opatrunek leczniczy <b>7,5x7,5 cm</b> - 1 szt. WM	100% <b>10,53</b> Limit <b>7,50</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,28</b> B <sup>(2)</sup> <b>3,03</b>
INN: <i>Alfuzosin</i>   ATC: G04CA01   wyk: B   EAN ~ 291945 (1)Przerost gruczołu krokowego(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N   Orion Pharma Poland Sp. o.o. Odpowiedniki: Alfuzostad® 10 mg [X], <b>Alfurion [20,42]</b> , Alfabax [26,72], Dalfaz® Uno [31,87]		INN: <i>Emplastrum antimicrobionicum</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 461621 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N   Smith & Nephew Sp. z o.o.	
<b>Alkeran®:</b> tabl. powł. <b>2 mg</b> - 25 szt. Rx	100% <b>114,48</b> Limit <b>119,94</b> B <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Allevyn® Ag Adhesive:</b> opatrunek leczniczy <b>10x10 cm</b> - 1 szt. WM	100% <b>16,20</b> Limit <b>13,33</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>6,87</b> B <sup>(2)</sup> <b>2,87</b>
INN: <i>Melphalan</i>   ATC: L01AA03   wyk: B   EAN ~ 283514 (1)Nowotwory złośliwe(2)Chemioterapia ICD10: C.39.(3)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D   Aspen Pharma Trading Limited		INN: <i>Emplastrum antimicrobionicum</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 461652 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N   Smith & Nephew Sp. z o.o. Odpowiedniki: Atrauman Ag [15,66], <b>Allevyn® Ag Non Adhesive [16,10]</b> , <b>Allevyn® Ag Adhesive [16,20]</b> , Acticoat® Flex 3 [19,77]	
<b>Allertec®:</b> krople doustne <b>10 mg/ml</b> - 1 fl. 10 ml Rx	100% <b>10,56</b> Limit <b>10,56</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>2,85</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Allevyn® Ag Adhesive:</b> opatrunek leczniczy [pianka] <b>12,5x12,5 cm</b> - 1 szt. WM	100% <b>22,88</b> Limit <b>20,84</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>8,29</b> B <sup>(2)</sup> <b>2,04</b>
INN: <i>Cetirizine dihydrochloride</i>   ATC: R06AE07   wyk: B   EAN ~ 103811 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Polfa Warszawa SA		INN: <i>Emplastrum antimicrobionicum</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 462222 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N   Smith & Nephew Sp. z o.o.	
<b>Allertec®:</b> krople doustne <b>10 mg/ml</b> - 1 fl. 20 ml Rx	100% <b>18,17</b> Limit <b>18,17</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>4,90</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Allevyn® Ag Heel:</b> opatrunek leczniczy <b>10,5x13,5 cm</b> - 1 szt. WM	100% <b>28,15</b> Limit <b>18,90</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>14,92</b> B <sup>(2)</sup> <b>9,25</b>
INN: <i>Cetirizine dihydrochloride</i>   ATC: R06AE07   wyk: B   EAN ~ 103835 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Polfa Warszawa SA		INN: <i>Emplastrum antimicrobionicum</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 461928 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N   Smith & Nephew Sp. z o.o. Odpowiedniki: <b>Allevyn® Heel [10,74]</b> , <b>Allevyn® Ag Heel [28,15]</b>	
<b>Allertec®:</b> syrop <b>5 mg/5 ml</b> - 1 but. 100 ml Rx	100% <b>13,80</b> Limit <b>11,39</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,25</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Allevyn® Ag Non Adhesive:</b> opatrunek leczniczy <b>10x10 cm</b> - 1 szt. WM	100% <b>16,10</b> Limit <b>13,33</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>6,77</b> B <sup>(2)</sup> <b>2,77</b>
INN: <i>Cetirizine dihydrochloride</i>   ATC: R06AE07   wyk: B   EAN ~ 103835 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Polfa Warszawa SA		INN: <i>Emplastrum antimicrobionicum</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 462314 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N   Smith & Nephew Sp. z o.o. Odpowiedniki: Atrauman Ag [15,66], <b>Allevyn® Ag Non Adhesive [16,10]</b> , <b>Allevyn® Ag Adhesive [16,20]</b> , Acticoat® Flex 3 [19,77]	
<b>Allertec®:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 30 szt. Rx	100% <b>15,35</b> Limit <b>13,46</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,34</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Allevyn® Ag Non Adhesive:</b> opatrunek leczniczy <b>15x15 cm</b> - 1 szt. WM	100% <b>38,01</b> Limit <b>30,00</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>17,01</b> B <sup>(2)</sup> <b>8,01</b>
INN: <i>Cetirizine dihydrochloride</i>   ATC: R06AE07   wyk: B   EAN ~ 851119 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Polfa Warszawa SA		INN: <i>Emplastrum antimicrobionicum</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 461805 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N   Smith & Nephew Sp. z o.o.	
<b>Allertec®:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 30 szt. Rx	100% <b>15,35</b> Limit <b>13,46</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,34</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Allevyn® Ag Non Adhesive:</b> opatrunek leczniczy <b>20x20 cm</b> - 1 szt. WM	100% <b>57,24</b> Limit <b>53,34</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>19,90</b> B <sup>(2)</sup> <b>3,90</b>
INN: <i>Cetirizine dihydrochloride</i>   ATC: R06AE07   wyk: B   EAN ~ 569441 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Polfa Warszawa SA		INN: <i>Emplastrum antimicrobionicum</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 461836 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N   Smith & Nephew Sp. z o.o.	
<b>Allervyn® Adhesive:</b> opatrunek leczniczy <b>12,5x12,5 cm</b> - 1 szt. WM	100% <b>10,48</b> Limit <b>9,28</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>3,98</b> B <sup>(2)</sup> <b>1,20</b>	<b>Allevyn® Ag Sacrum:</b> opatrunek leczniczy <b>17x17 cm</b> - 1 szt. WM	100% <b>42,51</b> Limit <b>38,54</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>15,53</b> B <sup>(2)</sup> <b>3,97</b>
INN: <i>Emplastrum polyurethanum spumatum</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 415587 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N   Smith & Nephew Sp. z o.o.		INN: <i>Emplastrum antimicrobionicum</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 461867 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N   Smith & Nephew Sp. z o.o.	
<b>Allervyn® Adhesive:</b> opatrunek leczniczy <b>17,5x17,5 cm</b> - 1 szt. WM	100% <b>19,58</b> Limit <b>18,20</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>6,84</b> B <sup>(2)</sup> <b>1,38</b>	<b>Allevyn® Ag Sacrum:</b> opatrunek leczniczy <b>22x22 cm</b> - 1 szt. WM	100% <b>64,54</b> Limit <b>64,54</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>19,36</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Emplastrum polyurethanum spumatum</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 415594 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N   Smith & Nephew Sp. z o.o.		INN: <i>Emplastrum antimicrobionicum</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 461898 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N   Smith & Nephew Sp. z o.o.	
<b>Allervyn® Adhesive:</b> opatrunek leczniczy <b>22,5x22,5 cm</b> - 1 szt. WM	100% <b>30,08</b> Limit <b>30,08</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>9,02</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Allevyn® Gentle Border:</b> opatrunek piankowy z warstwą adhezyjną zawierającą silikon <b>7,5 x7,5 cm</b> - 1 szt. WM	100% <b>6,76</b> Limit <b>6,41</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>2,27</b> B <sup>(2)</sup> <b>0,35</b>
INN: <i>Emplastrum polyurethanum spumatum</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 416799 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N   Smith & Nephew Sp. z o.o.		INN: <i>Emplastrum microfibrillum cellulosa</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 463878 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N   Smith & Nephew Sp. z o.o.	
<b>Allervyn® Adhesive:</b> opatrunek leczniczy <b>22,5x22,5 cm</b> - 1 szt. WM	100% <b>30,08</b> Limit <b>30,08</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>9,02</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Allevyn® Gentle Border:</b> opatrunek piankowy z warstwą adhezyjną zawierającą silikon <b>10x10 cm</b> - 1 szt. WM	100% <b>10,90</b> Limit <b>10,90</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>3,27</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Emplastrum polyurethanum spumatum</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 416799 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N   Smith & Nephew Sp. z o.o.		INN: <i>Emplastrum microfibrillum cellulosa</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 463908 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N   Smith & Nephew Sp. z o.o.	

<p><b>Allevyn® Gentle Border:</b> opatrunek piankowy z warstwą adhezyjną zawierającą silikon <b>10x20 cm</b> - 1 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>20,81</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>20,81</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>6,24</b></td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>20,81</b>	Limit	<b>20,81</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>6,24</b>	B <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	<p><b>Allevyn® Life:</b> opatrunek leczniczy [samoprzylepny] <b>15,4x15,4 cm</b> - 1 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>27,93</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>24,05</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>11,10</b></td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td><b>3,88</b></td></tr> </table>	100%	<b>27,93</b>	Limit	<b>24,05</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>11,10</b>	B <sup>(2)</sup>	<b>3,88</b>		
100%	<b>20,81</b>																				
Limit	<b>20,81</b>																				
30% <sup>(1)</sup>	<b>6,24</b>																				
B <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																				
100%	<b>27,93</b>																				
Limit	<b>24,05</b>																				
30% <sup>(1)</sup>	<b>11,10</b>																				
B <sup>(2)</sup>	<b>3,88</b>																				
<p>INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N</p>	<p>wyk: EAN ~ 476182 Smith &amp; Nephew Sp. z o.o.</p>	<p>INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N</p>	<p>wyk: EAN ~ 478049 Smith &amp; Nephew Sp. z o.o.</p>																		
<p><b>Allevyn® Gentle Border:</b> opatrunek piankowy z warstwą adhezyjną zawierającą silikon <b>12,5x12,5 cm</b> - 1 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>16,26</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>16,26</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>4,88</b></td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>16,26</b>	Limit	<b>16,26</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>4,88</b>	B <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	<p><b>Allevyn® Non Adhesive:</b> opatrunek leczniczy [nieprzylepny] <b>10x20 cm</b> - 1 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>12,20</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>11,88</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>3,88</b></td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td><b>0,32</b></td></tr> </table>	100%	<b>12,20</b>	Limit	<b>11,88</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>3,88</b>	B <sup>(2)</sup>	<b>0,32</b>		
100%	<b>16,26</b>																				
Limit	<b>16,26</b>																				
30% <sup>(1)</sup>	<b>4,88</b>																				
B <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																				
100%	<b>12,20</b>																				
Limit	<b>11,88</b>																				
30% <sup>(1)</sup>	<b>3,88</b>																				
B <sup>(2)</sup>	<b>0,32</b>																				
<p>INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N</p>	<p>wyk: EAN ~ 463960 Smith &amp; Nephew Sp. z o.o.</p>	<p>INN: <i>Emplastri polyurethanum spumatum</i> ATC: V20 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N</p>	<p>wyk: EAN ~ 416775 Smith &amp; Nephew Sp. z o.o.</p>																		
<p><b>Allevyn® Gentle Border:</b> opatrunek piankowy z warstwą adhezyjną zawierającą silikon <b>17,5x17,5 cm</b> - 1 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>30,34</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>30,34</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>9,10</b></td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>30,34</b>	Limit	<b>30,34</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>9,10</b>	B <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	<p><b>Allevyn® Non Adhesive:</b> opatrunek leczniczy [nieprzylepny] <b>10x10 cm</b> - 1 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>6,82</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>5,94</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>2,66</b></td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td><b>0,88</b></td></tr> </table>	100%	<b>6,82</b>	Limit	<b>5,94</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>2,66</b>	B <sup>(2)</sup>	<b>0,88</b>		
100%	<b>30,34</b>																				
Limit	<b>30,34</b>																				
30% <sup>(1)</sup>	<b>9,10</b>																				
B <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																				
100%	<b>6,82</b>																				
Limit	<b>5,94</b>																				
30% <sup>(1)</sup>	<b>2,66</b>																				
B <sup>(2)</sup>	<b>0,88</b>																				
<p>INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N</p>	<p>wyk: EAN ~ 463991 Smith &amp; Nephew Sp. z o.o.</p>	<p>INN: <i>Emplastri polyurethanum spumatum</i> ATC: V20 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N</p>	<p>wyk: EAN ~ 415846 Smith &amp; Nephew Sp. z o.o.</p>																		
<p><b>Allevyn® Gentle Border Heel:</b> opatrunek piankowy z warstwą adhezyjną zawierającą silikon <b>23x23,2 cm</b> - 1 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>45,15</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>45,15</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>13,55</b></td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>45,15</b>	Limit	<b>45,15</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>13,55</b>	B <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	<p><b>Allevyn® Non Adhesive:</b> opatrunek leczniczy [nieprzylepny] <b>20x20 cm</b> - 1 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>24,26</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>23,77</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>7,62</b></td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td><b>0,49</b></td></tr> </table>	100%	<b>24,26</b>	Limit	<b>23,77</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>7,62</b>	B <sup>(2)</sup>	<b>0,49</b>		
100%	<b>45,15</b>																				
Limit	<b>45,15</b>																				
30% <sup>(1)</sup>	<b>13,55</b>																				
B <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																				
100%	<b>24,26</b>																				
Limit	<b>23,77</b>																				
30% <sup>(1)</sup>	<b>7,62</b>																				
B <sup>(2)</sup>	<b>0,49</b>																				
<p>INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V06DA (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N</p>	<p>wyk: EAN ~ 465230 Smith &amp; Nephew Sp. z o.o.</p>	<p>INN: <i>Emplastri polyurethanum spumatum</i> ATC: V20 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N</p>	<p>wyk: EAN ~ 415853 Smith &amp; Nephew Sp. z o.o.</p>																		
<p><b>Allevyn® Gentle Border Lite:</b> opatrunek piankowy z warstwą adhezyjną zawierającą silikon <b>8x8 cm</b> - 1 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>7,57</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>7,30</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>2,46</b></td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td><b>0,27</b></td></tr> </table>	100%	<b>7,57</b>	Limit	<b>7,30</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>2,46</b>	B <sup>(2)</sup>	<b>0,27</b>	<p><b>Allevyn® Sacrum:</b> opatrunek leczniczy <b>22x22 cm</b> - 1 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>29,12</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>28,76</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>8,99</b></td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td><b>0,36</b></td></tr> </table>	100%	<b>29,12</b>	Limit	<b>28,76</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>8,99</b>	B <sup>(2)</sup>	<b>0,36</b>		
100%	<b>7,57</b>																				
Limit	<b>7,30</b>																				
30% <sup>(1)</sup>	<b>2,46</b>																				
B <sup>(2)</sup>	<b>0,27</b>																				
100%	<b>29,12</b>																				
Limit	<b>28,76</b>																				
30% <sup>(1)</sup>	<b>8,99</b>																				
B <sup>(2)</sup>	<b>0,36</b>																				
<p>INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V06DA (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N</p>	<p>wyk: EAN ~ 475611 Smith &amp; Nephew Sp. z o.o.</p>	<p>INN: <i>Emplastri antimicrobiotica</i> ATC: V20AA (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N</p>	<p>wyk: EAN ~ 426736 Smith &amp; Nephew Sp. z o.o.</p>																		
<p><b>Allevyn® Gentle Border Lite:</b> opatrunek piankowy z warstwą adhezyjną zawierającą silikon <b>10x10 cm</b> - 1 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>10,90</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>10,90</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>3,27</b></td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>10,90</b>	Limit	<b>10,90</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>3,27</b>	B <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	<p><b>Odpowiedniki: Allevyn® Sacrum [29,12], Allevyn® Ag Sacrum [64,54]</b></p>											
100%	<b>10,90</b>																				
Limit	<b>10,90</b>																				
30% <sup>(1)</sup>	<b>3,27</b>																				
B <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																				
<p>INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V06DA (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N</p>	<p>wyk: EAN ~ 475499 Smith &amp; Nephew Sp. z o.o.</p>	<p><b>Allupol®:</b> tabl. <b>100 mg</b> - 50 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>8,81</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>2,88</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>8,81</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>	R <sup>(2)</sup>	<b>2,88</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>								
100%	<b>8,81</b>																				
Limit	<b>0,00</b>																				
DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																				
R <sup>(2)</sup>	<b>2,88</b>																				
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																				
<p><b>Allevyn® Gentle Border Lite:</b> opatrunek piankowy z warstwą adhezyjną zawierającą silikon <b>15x15 cm</b> - 1 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>23,61</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>23,61</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>7,08</b></td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>23,61</b>	Limit	<b>23,61</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>7,08</b>	B <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	<p>INN: <i>Allopurinol</i> ATC: M04AA01 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C</p>	<p>wyk: B EAN ~ 109418 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.</p>										
100%	<b>23,61</b>																				
Limit	<b>23,61</b>																				
30% <sup>(1)</sup>	<b>7,08</b>																				
B <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																				
<p>INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V06DA (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N</p>	<p>wyk: EAN ~ 475581 Smith &amp; Nephew Sp. z o.o.</p>	<p><b>Odpowiedniki: Dnor [8,64], Argadopin [8,65], Allupol® [8,81], Milurit® [9,02]</b></p>																			
<p><b>Allevyn® Gentle Border Lite Oval:</b> opatrunek piankowy z warstwą adhezyjną zawierającą silikon <b>15,2x13,1 cm</b> - 1 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>16,82</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>16,82</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>5,05</b></td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>16,82</b>	Limit	<b>16,82</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>5,05</b>	B <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	<p><b>Allupol®:</b> tabl. <b>300 mg</b> - 30 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>15,46</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>2,88</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>15,46</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>	R <sup>(2)</sup>	<b>2,88</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>16,82</b>																				
Limit	<b>16,82</b>																				
30% <sup>(1)</sup>	<b>5,05</b>																				
B <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																				
100%	<b>15,46</b>																				
Limit	<b>0,00</b>																				
DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																				
R <sup>(2)</sup>	<b>2,88</b>																				
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																				
<p>INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V06DA (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N</p>	<p>wyk: EAN ~ 476885 Smith &amp; Nephew Sp. z o.o.</p>	<p>INN: <i>Allopurinol</i> ATC: M04AA01 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C</p>	<p>wyk: B EAN ~ 316228 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.</p>																		
<p><b>Allevyn® Gentle Border Multisite:</b> opatrunek piankowy z warstwą adhezyjną zawierającą silikon <b>17,1x17,9</b> - 1 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>23,04</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>23,04</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>6,91</b></td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>23,04</b>	Limit	<b>23,04</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>6,91</b>	B <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	<p><b>Odpowiedniki: Dnor [14,74], Argadopin [14,75], Allupol® [15,46], Milurit® [15,57]</b></p>											
100%	<b>23,04</b>																				
Limit	<b>23,04</b>																				
30% <sup>(1)</sup>	<b>6,91</b>																				
B <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																				
<p>INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V06DA (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N</p>	<p>wyk: EAN ~ 476502 Smith &amp; Nephew Sp. z o.o.</p>	<p><b>Alneta:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 30 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>8,48</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>8,48</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>2,54</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>8,48</b>	Limit	<b>8,48</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>2,54</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>								
100%	<b>8,48</b>																				
Limit	<b>8,48</b>																				
30% <sup>(1)</sup>	<b>2,54</b>																				
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																				
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																				
<p><b>Allevyn® Heel:</b> opatrunek leczniczy <b>10,5x13,5 cm</b> - 1 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>10,74</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>8,42</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>4,85</b></td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td><b>2,32</b></td></tr> </table>	100%	<b>10,74</b>	Limit	<b>8,42</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>4,85</b>	B <sup>(2)</sup>	<b>2,32</b>	<p>INN: <i>Amlodipine</i> ATC: C08CA01 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C</p>	<p>wyk: B EAN ~ 067977 Krka Polska Sp. z o.o.</p>										
100%	<b>10,74</b>																				
Limit	<b>8,42</b>																				
30% <sup>(1)</sup>	<b>4,85</b>																				
B <sup>(2)</sup>	<b>2,32</b>																				
<p>INN: <i>Emplastri antimicrobiotica</i> ATC: V20AA (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N</p>	<p>wyk: EAN ~ 426705 Smith &amp; Nephew Sp. z o.o.</p>	<p><b>Odpowiedniki: Almidin [X], Amlodipine Aurobindo [X], Finamlox [X], Amlodipine Aurovitas [6,15], Amlodipine Bluefish [6,86], Amlomyl [7,02], Normodipine® [7,34], Amlonor® [7,56], ApoAmlo 5 [7,78], Cardilopin [7,99], Agen® 5 [8,03], Adipine [8,21], Vilpin® [8,26], Tenox® [8,48], Alneta [8,48], Aldan® [8,64], Amlopin® [9,23], Amlozek® [13,79]</b></p>																			
<p><b>Odpowiedniki: Allevyn® Heel [10,74], Allevyn® Ag Heel [28,15]</b></p>		<p><b>Alneta:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 60 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>15,12</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>15,12</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>4,54</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>15,12</b>	Limit	<b>15,12</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>4,54</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>								
100%	<b>15,12</b>																				
Limit	<b>15,12</b>																				
30% <sup>(1)</sup>	<b>4,54</b>																				
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																				
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																				
<p><b>Allevyn® Life:</b> opatrunek leczniczy [samoprzylepny] <b>10,3x10,3 cm</b> - 1 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>13,51</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>10,60</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>6,09</b></td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td><b>2,91</b></td></tr> </table>	100%	<b>13,51</b>	Limit	<b>10,60</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>6,09</b>	B <sup>(2)</sup>	<b>2,91</b>	<p>INN: <i>Amlodipine</i> ATC: C08CA01 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C</p>	<p>wyk: B EAN ~ 067991 Krka Polska Sp. z o.o.</p>										
100%	<b>13,51</b>																				
Limit	<b>10,60</b>																				
30% <sup>(1)</sup>	<b>6,09</b>																				
B <sup>(2)</sup>	<b>2,91</b>																				
<p>INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N</p>	<p>wyk: EAN ~ 477981 Smith &amp; Nephew Sp. z o.o.</p>	<p><b>Odpowiedniki: Almidin [X], Agen 5 - (IR) [13,30], Agen® 5 [13,51], Alneta [15,12]</b></p>																			
<p><b>Allevyn® Life:</b> opatrunek leczniczy [samoprzylepny] <b>12,9x12,9 cm</b> - 1 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>20,26</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>16,64</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>8,61</b></td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td><b>3,62</b></td></tr> </table>	100%	<b>20,26</b>	Limit	<b>16,64</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>8,61</b>	B <sup>(2)</sup>	<b>3,62</b>												
100%	<b>20,26</b>																				
Limit	<b>16,64</b>																				
30% <sup>(1)</sup>	<b>8,61</b>																				
B <sup>(2)</sup>	<b>3,62</b>																				
<p>INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N</p>	<p>wyk: EAN ~ 478018 Smith &amp; Nephew Sp. z o.o.</p>																				





Skuteczny przepływ



400 mg x 20 tabl. ♥ 400 mg x 60 tabl.

Althyxin®: tabl. 150 µg - 50 szt.	Rx	100%	11,79
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	5,33
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Levothyroxine sodium* ATC: H03AA01 wyk: B EAN ~ 143973  
 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Niedoczynność tarczycy (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: A  
 Zentiva PL Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Althyxin® [11,79], Letrox® 150 [11,97], Euthyrox® N 150 [12,41]

Althyxin®: tabl. 150 µg - 100 szt.	Rx	100%	22,24
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	10,67
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Levothyroxine sodium* ATC: H03AA01 wyk: B EAN ~ 143974  
 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Niedoczynność tarczycy (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: A  
 Zentiva PL Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Althyxin® [22,24], Euthyrox® N 150 [22,57]

Althyxin®: tabl. 175 µg - 50 szt.	Rx	100%	13,54
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	6,22
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Levothyroxine sodium* ATC: H03AA01 wyk: B EAN ~ 143975  
 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Niedoczynność tarczycy (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: A  
 Zentiva PL Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Althyxin® [13,54], Euthyrox® N 175 [14,66]

Althyxin®: tabl. 200 µg - 50 szt.	Rx	100%	15,27
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	7,11
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Levothyroxine sodium* ATC: H03AA01 wyk: B EAN ~ 143977  
 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Niedoczynność tarczycy (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: A  
 Zentiva PL Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Althyxin® [15,27], Euthyrox® N 200 [16,02]

Alventa®: kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde 37,5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	12,77
		Limit	10,92
		30% <sup>(1)</sup>	5,13
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Venlafaxine* ATC: N06AX16 wyk: B EAN ~ 047901  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Symfaksin ER® [10,37], Oriven [10,53], Faxigen XL [11,02], Efevelon SR [11,39], Lafactin [12,03], Velaxin® ER 37,5 [12,56], Venlectine [12,69], Alventa® [12,77], Venlafaxine Apotex [12,82], Faxelet ER [13,10], Axyven [13,37], Prefaxine [13,80]

Alventa®: kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde 75 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	23,03
		Limit	21,84
		30% <sup>(1)</sup>	7,74
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Venlafaxine* ATC: N06AX16 wyk: B EAN ~ 047895  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Venlafaxine Bluefish XL [17,37], Alventa® - (IR) [17,75], Symfaksin ER® [19,46], Oriven [19,60], Faxigen XL [20,62], Lafactin [22,78], Alventa® [23,03], Efevelon SR [23,60], Velaxin® ER 75 [23,91], Venlectine [24,18], Venlafaxine Apotex [24,46], Faxelet ER [24,62], Axyven [25,04], Efectin® ER 75 [25,55], Prefaxine [26,50]

Alventa®: kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde 75 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	45,41
		Limit	45,41
		30% <sup>(1)</sup>	13,62
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Venlafaxine* ATC: N06AX16 wyk: B EAN ~ 197728  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Alventa®: kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde 150 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	43,10
		Limit	43,10
		30% <sup>(1)</sup>	12,93
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Venlafaxine* ATC: N06AX16 wyk: B EAN ~ 047956  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Venlafaxine Bluefish XL [31,86], Symfaksin ER® [32,21], Alventa® - (IR) [32,27], Oriven [32,80], Faxigen XL [38,30], Lafactin [42,60], Alventa® [43,10], Efevelon SR [44,25], Efectin® ER 150 [44,82], Velaxin® ER 150 [44,84], Venlectine [45,62], Axyven [46,26], Venlafaxine Apotex [46,77], Faxelet ER [47,11], Prefaxine [50,06]

Alventa® - (IR): kaps. o przedl. uwalnianiu 75 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	17,75
		Limit	17,75
		30% <sup>(1)</sup>	5,33
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Venlafaxine* ATC: N06AX16 wyk: B EAN ~ 139431  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Inpharm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Venlafaxine Bluefish XL [17,37], Alventa® - (IR) [17,75], Symfaksin ER® [19,46], Oriven [19,60], Faxigen XL [20,62], Lafactin [22,78], Alventa® [23,03], Efevelon SR [23,60], Velaxin® ER 75 [23,91], Venlectine [24,18], Venlafaxine Apotex [24,46], Faxelet ER [24,62], Axyven [25,04], Efectin® ER 75 [25,55], Prefaxine [26,50]

Alventa® - (IR): kaps. o przedl. uwalnianiu 150 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	32,27
		Limit	32,27
		30% <sup>(1)</sup>	9,68
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Venlafaxine* ATC: N06AX16 wyk: B EAN ~ 139440  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Inpharm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Venlafaxine Bluefish XL [17,37], Alventa® - (IR) [17,75], Symfaksin ER® [19,46], Oriven [19,60], Faxigen XL [20,62], Lafactin [22,78], Alventa® [23,03], Efevelon SR [23,60], Velaxin® ER 75 [23,91], Venlectine [24,18], Venlafaxine Apotex [24,46], Faxelet ER [24,62], Axyven [25,04], Efectin® ER 75 [25,55], Prefaxine [26,50]

Alventa® - (IR): kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde 75 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	17,69
		Limit	17,69
		30% <sup>(1)</sup>	5,31
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Venlafaxine* ATC: N06AX16 wyk: B EAN ~ 138397  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Delfarma Sp. z o.o.

Alventa® - (IR): kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde 150 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	32,25
		Limit	32,25
		30% <sup>(1)</sup>	9,68
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Venlafaxine* ATC: N06AX16 wyk: B EAN ~ 138388  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Alventa® - (IR) [27,78], Alventa® - (IR) [32,25]

Alventa® - (IR): kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde 150 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	27,78
		Limit	27,78
		30% <sup>(1)</sup>	8,33
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Venlafaxine* ATC: N06AX16 wyk: B EAN ~ 145387  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Medezin

Odpowiedniki: Alventa® - (IR) [27,78], Alventa® - (IR) [32,25]

Alvesco® 80: aerozol inhal. [roztw.] 80 µg/dawkę - 1 poj. (120 dawek)	Rx	100%	95,17
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	28,37
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Ciclesonide* ATC: R03BA08 wyk: B EAN ~ 212057  
 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

<b>Alvesco® 160:</b> aerozol inhal. [roztw.] 160 µg/dawkę - 1 poj. (120 dawek)	R <sub>x</sub>	100%	146,39
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	12,80
INN: <i>Ciclesonide</i>   ATC: R03BA08   wyk: B   EAN ~ 212064 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.			
<b>Amaryl® 1:</b> tabl. 1 mg - 30 szt.	R <sub>x</sub>	100%	6,63
		Limit	4,91
		R <sup>(1)</sup>	4,92
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
		INN: <i>Glimepiride</i>   ATC: A10BB12   wyk: B   EAN ~ 744817 (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Odpowiedniki: Glitoprel [X], Symglic® [4,89], GlimeHEXAL 1 [5,14], Diaril® [6,00], Glibetic 1 mg [6,05], Amaryl® 1 [6,63]	
<b>Amaryl® 2:</b> tabl. 2 mg - 30 szt.	R <sub>x</sub>	100%	11,23
		Limit	9,83
		R <sup>(1)</sup>	4,60
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
		INN: <i>Glimepiride</i>   ATC: A10BB12   wyk: B   EAN ~ 744916 (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Odpowiedniki: Glimepiride Aurovitas [X], Glitoprel [X], Symglic® [9,02], GlimeHEXAL 2 [9,39], Diaril® [10,09], Amaryl® 2 [11,23], Glibetic 2 mg [11,30]	
<b>Amaryl® 3:</b> tabl. 3 mg - 30 szt.	R <sub>x</sub>	100%	17,61
		Limit	14,74
		R <sup>(1)</sup>	7,67
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
		INN: <i>Glimepiride</i>   ATC: A10BB12   wyk: B   EAN ~ 745012 (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Odpowiedniki: Glimepiride Aurovitas [X], Glitoprel [X], Symglic® [12,32], GlimeHEXAL 3 [13,55], Diaril® [14,14], Glibetic 3 mg [16,34], Amaryl® 3 [17,61]	
<b>Amaryl® 4:</b> tabl. 4 mg - 30 szt.	R <sub>x</sub>	100%	17,60
		Limit	17,60
		R <sup>(1)</sup>	6,40
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
		INN: <i>Glimepiride</i>   ATC: A10BB12   wyk: B   EAN ~ 745111 (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Odpowiedniki: Glimepiride Aurovitas [X], Glitoprel [X], Symglic® [16,46], Diaril® [17,55], GlimeHEXAL 4 [17,55], Amaryl® 4 [17,60], Glibetic 4 mg [17,65]	
<b>Amertil®:</b> tabl. powł. 10 mg - 20 szt. ◆	R <sub>x</sub>	100%	9,76
		Limit	8,97
		30% <sup>(1)</sup>	3,48
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Cetirizine dihydrochloride</i>   ATC: R06AE07   wyk: B   EAN ~ 410729 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke'go - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Biofarm Sp. z o.o. Odpowiedniki: Amertil® [9,76], Letizen [10,38], Allertec® [16,47], Allertec® WZF [19,22], Zyrtec® [24,52]			
<b>Amertil®:</b> tabl. powł. 10 mg - 30 szt. ◆	R <sub>x</sub>	100%	14,54
		Limit	13,46
		30% <sup>(1)</sup>	5,12
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Cetirizine dihydrochloride</i>   ATC: R06AE07   wyk: B   EAN ~ 410736 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke'go - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Biofarm Sp. z o.o. Odpowiedniki: Amertil® [14,54], Allertec® [15,35], Alermed® [15,36], Zyrtec® [16,62]			
<b>Amertil®:</b> tabl. powł. 10 mg - 60 szt. ◆	R <sub>x</sub>	100%	26,97
		Limit	26,91
		30% <sup>(1)</sup>	8,13
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Cetirizine dihydrochloride</i>   ATC: R06AE07   wyk: B   EAN ~ 215250 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke'go - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Biofarm Sp. z o.o.			
<b>Amipryd:</b> tabl. 100 mg - 30 szt. ◆	R <sub>x</sub>	100%	31,80
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,08
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Amisulpride</i>   ATC: N05AL05   wyk: B   EAN ~ 141287 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA Odpowiedniki: Amipryd [31,80], Solian® [32,26]			
<b>Amipryd:</b> tabl. 200 mg - 30 szt. ◆	R <sub>x</sub>	100%	59,75
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Amisulpride</i>   ATC: N05AL05   wyk: B   EAN ~ 141288 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA Odpowiedniki: Amisan [56,96], Masultab [58,38], Symamis [59,75], Amipryd [59,75], ApoSuprid [59,84], Solian® [60,62]			
<b>Amipryd:</b> tabl. 400 mg - 30 szt. ◆	R <sub>x</sub>	100%	113,21
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Amisulpride</i>   ATC: N05AL05   wyk: B   EAN ~ 141290 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA Odpowiedniki: Solian® - (IR) [110,34], Solian® - (IR) [110,34], Masultab [110,46], Solian® - (IR) [110,46], Symamis [113,21], Amipryd [113,21], ApoSuprid [113,37], Amisan [113,44], Solian® [114,92]			
<b>Amisan:</b> tabl. 50 mg - 60 szt. ◆	R <sub>x</sub>	100%	32,14
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,42
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Amisulpride</i>   ATC: N05AL05   wyk: B   EAN ~ 762880 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   PRO. MED. PL Sp. z o.o.			
<b>Amisan:</b> tabl. 200 mg - 30 szt. ◆	R <sub>x</sub>	100%	56,96
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Amisulpride</i>   ATC: N05AL05   wyk: B   EAN ~ 762965 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   PRO. MED. PL Sp. z o.o. Odpowiedniki: Amisan [56,96], Masultab [58,38], Amipryd [59,75], Symamis [59,75], ApoSuprid [59,84], Solian® [60,62]			
<b>Amisan:</b> tabl. 200 mg - 60 szt. ◆	R <sub>x</sub>	100%	113,55
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Amisulpride</i>   ATC: N05AL05   wyk: B   EAN ~ 762972 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   PRO. MED. PL Sp. z o.o.			
<b>Amisan:</b> tabl. powł. 400 mg - 30 szt. ◆	R <sub>x</sub>	100%	113,44
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Amisulpride</i>   ATC: N05AL05   wyk: B   EAN ~ 762996 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   PRO. MED. PL Sp. z o.o.			
<b>Amizepin®:</b> tabl. 200 mg - 50 szt. ◆	R <sub>x</sub>	100%	14,71
		Limit	11,34
		B <sup>(1)</sup>	2,86
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Carbamazepine</i>   ATC: N03AF01   wyk: B   EAN ~ 043910 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie OUN; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające; neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach innych niż określone w ChPL (5) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D   Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA Odpowiedniki: Finlepsin [14,71], Amizepin® [14,71]			



Amlessa: tabl. 4/5 mg - 30 szt. ◆		Rx	100% 14,69 Limit 5,58 R <sup>(1)</sup> 12,31 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Amlodipine + Perindopril tert-butylo-amine</i>	ATC: C09BB04	wyk: B	EAN ~ 908134
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnięcie tetnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Prestozek Combi [14,69], Amlessa [14,69]			
Amlessa: tabl. 4/10 mg - 30 szt. ◆		Rx	100% 14,69 Limit 5,58 R <sup>(1)</sup> 12,31 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Amlodipine + Perindopril tert-butylo-amine</i>	ATC: C09BB04	wyk: B	EAN ~ 908165
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnięcie tetnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Prestozek Combi [14,69], Amlessa [14,69]			
Amlessa: tabl. 4/10 mg - 90 szt. ◆		Rx	100% 42,12 Limit 16,75 R <sup>(1)</sup> 34,97 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Amlodipine + Perindopril tert-butylo-amine</i>	ATC: C09BB04	wyk: B	EAN ~ 908189
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnięcie tetnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.			
Amlessa: tabl. 4/5 mg - 90 szt. ◆		Rx	100% 42,12 Limit 16,75 R <sup>(1)</sup> 34,97 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Amlodipine + Perindopril tert-butylo-amine</i>	ATC: C09BB04	wyk: B	EAN ~ 908158
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnięcie tetnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.			
Amlessa: tabl. 8/10 mg - 30 szt. ◆		Rx	100% 29,04 Limit 11,17 R <sup>(1)</sup> 24,27 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Amlodipine + Perindopril tert-butylo-amine</i>	ATC: C09BB04	wyk: B	EAN ~ 908240
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnięcie tetnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Prestozek Combi [29,04], Amlessa [29,04]			
Amlessa: tabl. 8/5 mg - 30 szt. ◆		Rx	100% 29,04 Limit 11,17 R <sup>(1)</sup> 24,27 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Amlodipine + Perindopril tert-butylo-amine</i>	ATC: C09BB04	wyk: B	EAN ~ 908196
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnięcie tetnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Prestozek Combi [29,04], Amlessa [29,04]			
Amlessa: tabl. 8/10 mg - 90 szt. ◆		Rx	100% 82,28 Limit 33,51 R <sup>(1)</sup> 67,97 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Amlodipine + Perindopril tert-butylo-amine</i>	ATC: C09BB04	wyk: B	EAN ~ 908264
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnięcie tetnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.			
Amlessa: tabl. 8/5 mg - 90 szt. ◆		Rx	100% 82,28 Limit 33,51 R <sup>(1)</sup> 67,97 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Amlodipine + Perindopril tert-butylo-amine</i>	ATC: C09BB04	wyk: B	EAN ~ 908233
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnięcie tetnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.			

Amlodipine Aurovitas: tabl. 5 mg - 30 szt. ◆		Rx	100% 6,15 Limit 6,15 30% <sup>(1)</sup> 1,85 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Amlodipine</i>	ATC: C08CA01	wyk: B	EAN ~ 132281
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziłą układową - leczenie pierwszoliniowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Almiden [X], Amlodipine Aurobindo [X], Finamlox [X], Amlodipine Aurovitas [6,15], Amlodipine Bluefish [6,86], Amlomyl [7,02], Normodipine® [7,34], Amlonor® [7,56], ApoAmlor 5 [7,78], Cardiolipin [7,99], Agen® 5 [8,03], Adipine [8,21], Vilpin® [8,26], Alneta [8,48], Tenox® [8,48], Aldan® [8,64], Amlopin® [9,23], Amlozek® [13,79]			
Amlodipine Aurovitas: tabl. 10 mg - 30 szt. ◆		Rx	100% 11,03 Limit 11,03 30% <sup>(1)</sup> 3,31 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Amlodipine</i>	ATC: C08CA01	wyk: B	EAN ~ 132288
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziłą układową - leczenie pierwszoliniowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Almiden [X], Amlodipine Aurobindo [X], Finamlox [X], Amlodipine Aurovitas [6,15], Amlodipine Bluefish [6,86], Amlomyl [7,02], Normodipine® [7,34], Amlonor® [7,56], ApoAmlor 5 [7,78], Cardiolipin [7,99], Agen® 5 [8,03], Adipine [8,21], Vilpin® [8,26], Alneta [8,48], Tenox® [8,48], Aldan® [8,64], Amlopin® [9,23], Amlozek® [20,26]			
Amlodipine Bluefish: tabl. 5 mg - 30 szt. ◆		Rx	100% 6,86 Limit 6,86 30% <sup>(1)</sup> 2,06 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Amlodipine</i>	ATC: C08CA01	wyk: B	EAN ~ 800469
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziłą układową - leczenie pierwszoliniowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Bluefish Pharmaceuticals			
Odpowiedniki: Almiden [X], Amlodipine Aurobindo [X], Finamlox [X], Amlodipine Aurovitas [6,15], Amlodipine Bluefish [6,86], Amlomyl [7,02], Normodipine® [7,34], Amlonor® [7,56], ApoAmlor 5 [7,78], Cardiolipin [7,99], Agen® 5 [8,03], Adipine [8,21], Vilpin® [8,26], Alneta [8,48], Tenox® [8,48], Aldan® [8,64], Amlopin® [9,23], Amlozek® [13,79]			
Amlodipine Bluefish: tabl. 10 mg - 30 szt. ◆		Rx	100% 11,72 Limit 11,72 30% <sup>(1)</sup> 3,52 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Amlodipine</i>	ATC: C08CA01	wyk: B	EAN ~ 800551
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziłą układową - leczenie pierwszoliniowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Bluefish Pharmaceuticals			
Odpowiedniki: Almiden [X], Amlodipine Aurobindo [X], Finamlox [X], Amlodipine Aurovitas [6,15], Amlodipine Bluefish [6,86], Amlomyl [7,02], Normodipine® [7,34], Amlonor® [7,56], ApoAmlor 5 [7,78], Cardiolipin [7,99], Agen® 5 [8,03], Adipine [8,21], Vilpin® [8,26], Alneta [8,48], Tenox® [8,48], Aldan® [8,64], Amlopin® [9,23], Amlozek® [20,26]			
Amlomyl: tabl. 5 mg - 30 szt. ◆		Rx	100% 7,02 Limit 7,02 30% <sup>(1)</sup> 2,11 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Amlodipine</i>	ATC: C08CA01	wyk: B	EAN ~ 842476
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziłą układową - leczenie pierwszoliniowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Mylan Ireland Limited			
Odpowiedniki: Almiden [X], Amlodipine Aurobindo [X], Finamlox [X], Amlodipine Aurovitas [6,15], Amlodipine Bluefish [6,86], Amlomyl [7,02], Normodipine® [7,34], Amlonor® [7,56], ApoAmlor 5 [7,78], Cardiolipin [7,99], Agen® 5 [8,03], Adipine [8,21], Vilpin® [8,26], Alneta [8,48], Tenox® [8,48], Aldan® [8,64], Amlopin® [9,23], Amlozek® [13,79]			
Amlomyl: tabl. 10 mg - 30 szt. ◆		Rx	100% 12,00 Limit 12,00 30% <sup>(1)</sup> 3,60 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Amlodipine</i>	ATC: C08CA01	wyk: B	EAN ~ 842698
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziłą układową - leczenie pierwszoliniowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Mylan Ireland Limited			
Odpowiedniki: Almiden [X], Amlodipine Aurobindo [X], Finamlox [X], Amlodipine Aurovitas [6,15], Amlodipine Bluefish [6,86], Amlomyl [7,02], Normodipine® [7,34], Amlonor® [7,56], ApoAmlor 5 [7,78], Cardiolipin [7,99], Agen® 5 [8,03], Adipine [8,21], Vilpin® [8,26], Alneta [8,48], Tenox® [8,48], Aldan® [8,64], Amlopin® [9,23], Amlozek® [20,26]			



<b>Amlopin®: tabl. 5 mg - 30 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>9,23</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>8,67</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>3,16</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	9,23	Limit	8,67	30% <sup>(1)</sup>	3,16	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Amlozek®: tabl. 5 mg - 30 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>13,79</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>8,67</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>6,95</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	13,79	Limit	8,67	30% <sup>(1)</sup>	6,95	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	9,23																						
Limit	8,67																						
30% <sup>(1)</sup>	3,16																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	13,79																						
Limit	8,67																						
30% <sup>(1)</sup>	6,95																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Amlodipine</i> ATC: C08CA01 wyk: B EAN ~ 048939 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sandoz GmbH Odpowiedniki: Almiden [X], Amlodipine Aurobindo [X], Finamlox [X], Amlodipine Aurovitas [6,15], Amlodipine Bluefish [6,86], Amlomyl [7,02], Normodipine® [7,34], Amlonor® [7,56], ApoAmlo 5 [7,78], Cardiolipin [7,99], Agen® 5 [8,03], Adipine [8,21], Vilpin® [8,26], Alneta [8,48], Tenox® [8,48], Aldan® [8,64], <b>Amlopin® [9,23]</b> , Amlozek® [13,79]		INN: <i>Amlodipine</i> ATC: C08CA01 wyk: B EAN ~ 799718 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Adamed Sp. z o.o. Odpowiedniki: Almiden [X], Amlodipine Aurobindo [X], Finamlox [X], Amlodipine Aurovitas [6,15], Amlodipine Bluefish [6,86], Amlomyl [7,02], Normodipine® [7,34], Amlonor® [7,56], ApoAmlo 5 [7,78], Cardiolipin [7,99], Agen® 5 [8,03], Adipine [8,21], Vilpin® [8,26], Alneta [8,48], Tenox® [8,48], Aldan® [8,64], <b>Amlopin® [9,23]</b> , Amlozek® [13,79]																					
<b>Amlopin®: tabl. 10 mg - 30 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>17,54</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>17,33</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>5,41</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	17,54	Limit	17,33	30% <sup>(1)</sup>	5,41	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Amlozek®: tabl. 10 mg - 30 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>20,26</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>17,33</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>7,32</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	20,26	Limit	17,33	30% <sup>(1)</sup>	7,32	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	17,54																						
Limit	17,33																						
30% <sup>(1)</sup>	5,41																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	20,26																						
Limit	17,33																						
30% <sup>(1)</sup>	7,32																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Amlodipine</i> ATC: C08CA01 wyk: B EAN ~ 048977 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sandoz GmbH Odpowiedniki: Almiden [X], Amlodipine Aurobindo [X], Finamlox [X], Amlodipine Aurovitas [11,03], Amlodipine Bluefish [11,72], Amlomyl [12,00], Normodipine® [13,58], Adipine [13,62], Amlonor® [14,55], Amlopin® - (IR) [14,68], Amlopin® - (IR) [14,68], Amlopin® - (IR) [14,73], Cardiolipin [14,85], Agen® 10 [14,90], ApoAmlo 10 [14,98], Vilpin® [15,65], Aldan® [15,88], Alneta [15,88], Tenox® [15,88], <b>Amlopin® [17,54]</b> , Amlozek® [20,26]		INN: <i>Amlodipine</i> ATC: C08CA01 wyk: B EAN ~ 799817 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Adamed Sp. z o.o. Odpowiedniki: Almiden [X], Amlodipine Aurobindo [X], Finamlox [X], Amlodipine Aurovitas [11,03], Amlodipine Bluefish [11,72], Amlomyl [12,00], Normodipine® [13,58], Adipine [13,62], Amlonor® [14,55], Amlopin® - (IR) [14,68], Amlopin® - (IR) [14,68], Amlopin® - (IR) [14,73], Cardiolipin [14,85], Agen® 10 [14,90], ApoAmlo 10 [14,98], Vilpin® [15,65], Aldan® [15,88], Alneta [15,88], Tenox® [15,88], <b>Amlopin® [17,54]</b> , Amlozek® [20,26]																					
<b>Amlopin® - (IR): tabl. 5 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>7,05</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>7,05</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>2,12</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	7,05	Limit	7,05	30% <sup>(1)</sup>	2,12	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Amoksiklav®: prosz. do przyg. zaw. doust. 457 mg/5 ml - 1 fl. 35 ml ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>12,71</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>8,88</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>8,27</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	12,71	Limit	8,88	50% <sup>(1)</sup>	8,27	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	7,05																						
Limit	7,05																						
30% <sup>(1)</sup>	2,12																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	12,71																						
Limit	8,88																						
50% <sup>(1)</sup>	8,27																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Amlodipine</i> ATC: C08CA01 wyk: B EAN ~ 361013 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Delfarma Sp. z o.o. Odpowiedniki: Vilpin® - (IR) [X], Vilpin® - (IR) [X], Amlopin® - (IR) [9,84], <b>Amlopin® - (IR) [11,02]</b>		INN: <i>Amoxicillin + Clavulanic acid</i> ATC: J01CR02 wyk: B EAN ~ 894819 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Sandoz GmbH Odpowiedniki: Auglavin PPH [18,54], <b>Amoksiklav® [18,71]</b> , Augmentin® [19,92], Taromentin® [23,98]																					
<b>Amlopin® - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>11,02</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>11,02</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>3,31</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	11,02	Limit	11,02	30% <sup>(1)</sup>	3,31	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Amoksiklav®: prosz. do przyg. zaw. doust. 457 mg/5 ml - 1 fl. 70 ml ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>23,59</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>17,77</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>14,71</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	23,59	Limit	17,77	50% <sup>(1)</sup>	14,71	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	11,02																						
Limit	11,02																						
30% <sup>(1)</sup>	3,31																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	23,59																						
Limit	17,77																						
50% <sup>(1)</sup>	14,71																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Amlodipine</i> ATC: C08CA01 wyk: B EAN ~ 361020 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Delfarma Sp. z o.o. Odpowiedniki: Vilpin® - (IR) [X], Vilpin® - (IR) [X], Amlopin® - (IR) [9,84], <b>Amlopin® - (IR) [11,02]</b>		INN: <i>Amoxicillin + Clavulanic acid</i> ATC: J01CR02 wyk: B EAN ~ 894826 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Sandoz GmbH Odpowiedniki: Auglavin PPH [18,54], <b>Amoksiklav® [18,71]</b> , Augmentin® [19,92], Taromentin® [23,98]																					
<b>Amlopin® - (IR): tabl. 10 mg - 30 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>14,68</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>14,68</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>4,40</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	14,68	Limit	14,68	30% <sup>(1)</sup>	4,40	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Amoksiklav®: tabl. powł. 625 mg - 14 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>18,71</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>17,14</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>10,14</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	18,71	Limit	17,14	50% <sup>(1)</sup>	10,14	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	14,68																						
Limit	14,68																						
30% <sup>(1)</sup>	4,40																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	18,71																						
Limit	17,14																						
50% <sup>(1)</sup>	10,14																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Amlodipine</i> ATC: C08CA01 wyk: B EAN ~ 147814 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Inpharm Sp. z o.o. Odpowiedniki: Almiden [X], Amlodipine Aurobindo [X], Finamlox [X], Amlodipine Aurovitas [11,03], Amlodipine Bluefish [11,72], Amlomyl [12,00], Normodipine® [13,58], Adipine [13,62], Amlonor® [14,55], Amlopin® - (IR) [14,68], <b>Amlopin® - (IR) [14,68]</b> , Amlopin® - (IR) [14,73], Cardiolipin [14,85], Agen® 10 [14,90], ApoAmlo 10 [14,98], Vilpin® [15,65], Aldan® [15,88], Alneta [15,88], Tenox® [15,88], Amlopin® [17,54], Amlozek® [20,26]		INN: <i>Amoxicillin + Clavulanic acid</i> ATC: J01CR02 wyk: B EAN ~ 081912 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Sandoz GmbH Odpowiedniki: Auglavin PPH [18,54], <b>Amoksiklav® [18,71]</b> , Augmentin® [19,92], Taromentin® [23,98]																					
<b>Amlopin® - (IR): tabl. 10 mg - 30 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>14,73</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>14,73</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>4,42</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	14,73	Limit	14,73	30% <sup>(1)</sup>	4,42	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Amoksiklav®: prosz. do przyg. zaw. doust. 457 mg/5 ml - 1 fl. 140 ml ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>35,71</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>35,54</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>17,94</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	35,71	Limit	35,54	50% <sup>(1)</sup>	17,94	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	14,73																						
Limit	14,73																						
30% <sup>(1)</sup>	4,42																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	35,71																						
Limit	35,54																						
50% <sup>(1)</sup>	17,94																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Amlodipine</i> ATC: C08CA01 wyk: B EAN ~ 146446 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Delfarma Sp. z o.o. Odpowiedniki: Almiden [X], Amlodipine Aurobindo [X], Finamlox [X], Amlodipine Aurovitas [11,03], Amlodipine Bluefish [11,72], Amlomyl [12,00], Normodipine® [13,58], Adipine [13,62], Amlonor® [14,55], Amlopin® - (IR) [14,68], <b>Amlopin® - (IR) [14,68]</b> , Amlopin® - (IR) [14,73], Cardiolipin [14,85], Agen® 10 [14,90], ApoAmlo 10 [14,98], Vilpin® [15,65], Aldan® [15,88], Alneta [15,88], Tenox® [15,88], Amlopin® [17,54], Amlozek® [20,26]		INN: <i>Amoxicillin + Clavulanic acid</i> ATC: J01CR02 wyk: B EAN ~ 894833 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Sandoz GmbH Odpowiedniki: Auglavin PPH [18,54], <b>Amoksiklav® [18,71]</b> , Augmentin® [19,92], Taromentin® [23,98]																					
<b>Amlopin® - (IR): tabl. 10 mg - 30 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>14,68</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>14,68</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>4,40</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	14,68	Limit	14,68	30% <sup>(1)</sup>	4,40	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Amoksiklav®: tabl. powł. 1 g - 14 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>31,35</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>29,99</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>16,36</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	31,35	Limit	29,99	50% <sup>(1)</sup>	16,36	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	14,68																						
Limit	14,68																						
30% <sup>(1)</sup>	4,40																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	31,35																						
Limit	29,99																						
50% <sup>(1)</sup>	16,36																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Amlodipine</i> ATC: C08CA01 wyk: B EAN ~ 151144 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Inpharm Sp. z o.o. Odpowiedniki: Almiden [X], Amlodipine Aurobindo [X], Finamlox [X], Amlodipine Aurovitas [11,03], Amlodipine Bluefish [11,72], Amlomyl [12,00], Normodipine® [13,58], Adipine [13,62], Amlonor® [14,55], Amlopin® - (IR) [14,68], <b>Amlopin® - (IR) [14,68]</b> , Amlopin® - (IR) [14,73], Cardiolipin [14,85], Agen® 10 [14,90], ApoAmlo 10 [14,98], Vilpin® [15,65], Aldan® [15,88], Alneta [15,88], Tenox® [15,88], Amlopin® [17,54], Amlozek® [20,26]		INN: <i>Amoxicillin + Clavulanic acid</i> ATC: J01CR02 wyk: B EAN ~ 411115 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Sandoz GmbH Odpowiedniki: Amoksiklav® - (IR) [X], Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas [25,22], Amoksiklav® - (IR) [26,86], Co-amoxiclav Bluefish [27,29], Penlac [27,29], Amoksiklav® - (IR) [27,45], Ramoclav [28,48], Augmentin® - (IR) [29,11], Augmentin® - (IR) [29,16], Augmentin® - (IR) [29,23], Auglavin PPH [31,00], Polamoklav [31,00], <b>Amoksiklav® [31,35]</b> , Augmentin® - (IR) [32,30], Augmentin® - (IR) [32,32], Augmentin® [34,92], Taromentin® [40,04]																					
<b>Amlopin® - (IR): tabl. 10 mg - 30 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>42,84</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>42,84</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>21,42</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	42,84	Limit	42,84	50% <sup>(1)</sup>	21,42	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Amoksiklav®: tabl. powł. 1 g - 20 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>42,84</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>42,84</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>21,42</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	42,84	Limit	42,84	50% <sup>(1)</sup>	21,42	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	42,84																						
Limit	42,84																						
50% <sup>(1)</sup>	21,42																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	42,84																						
Limit	42,84																						
50% <sup>(1)</sup>	21,42																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Amlodipine</i> ATC: C08CA01 wyk: B EAN ~ 151144 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Inpharm Sp. z o.o. Odpowiedniki: Almiden [X], Amlodipine Aurobindo [X], Finamlox [X], Amlodipine Aurovitas [11,03], Amlodipine Bluefish [11,72], Amlomyl [12,00], Normodipine® [13,58], Adipine [13,62], Amlonor® [14,55], Amlopin® - (IR) [14,68], <b>Amlopin® - (IR) [14,68]</b> , Amlopin® - (IR) [14,73], Cardiolipin [14,85], Agen® 10 [14,90], ApoAmlo 10 [14,98], Vilpin® [15,65], Aldan® [15,88], Alneta [15,88], Tenox® [15,88], Amlopin® [17,54], Amlozek® [20,26]		INN: <i>Amoxicillin + Clavulanic acid</i> ATC: J01CR02 wyk: B EAN ~ 012960 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Sandoz GmbH Odpowiedniki: Penlac [36,84], Augmentin® [42,29], <b>Amoksiklav® [42,84]</b>																					



Naszym wyborem

**enarenal**  
 enalapryli maleas

<b>Amoksyklav® - (IR):</b> tabl. powł. <b>1 g</b> - 14 szt. ◆	Rx	100% <b>27,45</b> Limit <b>27,45</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>13,73</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Amoxicillin + Clavulanic acid</b>   ATC: <b>J01CR02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>243319</b>		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Delfarma Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Amoksyklav® - (IR) [X], Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas [25,22], Amoksyklav® - (IR) [26,86], Co-amoxiclav Bluefish [27,29], Penlac [27,29], Amoksyklav® - (IR) [27,45], Ramoclav [28,48], Augmentin® - (IR) [29,11], Augmentin® - (IR) [29,16], Augmentin® - (IR) [29,23], Auglavin PPH [31,00], Polamoklav [31,00], Amoksyklav® [31,35], Augmentin® - (IR) [32,30], Augmentin® - (IR) [32,32], Augmentin® [34,92], Taromentin® [40,04]		
<b>Amoksyklav® - (IR):</b> tabl. powł. <b>1 g</b> - 14 szt. ◆	Rx	100% <b>26,86</b> Limit <b>26,86</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>13,43</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Amoxicillin + Clavulanic acid</b>   ATC: <b>J01CR02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>250324</b>		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Inpharm Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Amoksyklav® - (IR) [X], Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas [25,22], Amoksyklav® - (IR) [26,86], Co-amoxiclav Bluefish [27,29], Penlac [27,29], Amoksyklav® - (IR) [27,45], Ramoclav [28,48], Augmentin® - (IR) [29,11], Augmentin® - (IR) [29,16], Augmentin® - (IR) [29,23], Auglavin PPH [31,00], Polamoklav [31,00], Amoksyklav® [31,35], Augmentin® - (IR) [32,30], Augmentin® - (IR) [32,32], Augmentin® [34,92], Taromentin® [40,04]		
<b>Amoksyklav® ES:</b> prosz. do przyg. zaw. doust. <b>(600 mg+ 42,9 mg)/5 ml</b> - 1 but. 100 ml ◆	Rx	100% <b>37,18</b> Limit <b>37,18</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>18,59</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Amoxicillin + Clavulanic acid</b>   ATC: <b>J01CA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>104693</b>		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Sandoz GmbH		
Odpowiedniki: Auglavin PPH Extra [33,66], Amoksyklav® ES [37,18]		
<b>Amoksyklav® ES:</b> prosz. do przyg. zaw. doust. <b>(600 mg+ 42,9 mg)/5 ml</b> - 1 but. 50 ml ◆	Rx	100% <b>23,47</b> Limit <b>19,04</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>13,95</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Amoxicillin + Clavulanic acid</b>   ATC: <b>J01CA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>104694</b>		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Sandoz GmbH		
<b>Amoksyklav® Quicktab:</b> tabl. do przyg. zaw. doust./tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>625 mg</b> - 14 szt. ◆	Rx	100% <b>22,21</b> Limit <b>22,21</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>11,11</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Amoxicillin + Clavulanic acid</b>   ATC: <b>J01CR02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>646906</b>		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Sandoz GmbH		
<b>Amoksyklav® Quicktab:</b> tabl. do przyg. zaw. doust./tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>1 g</b> - 14 szt. ◆	Rx	100% <b>33,03</b> Limit <b>33,03</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>16,52</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Amoxicillin + Clavulanic acid</b>   ATC: <b>J01CR02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>649747</b>		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Sandoz GmbH		
<b>Amotaks®:</b> granulaty do przyg. zaw. <b>500 mg/5 ml</b> - 1 but. 60 ml	Rx	100% <b>26,16</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>5,52</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Amoxicillin</b>   ATC: <b>J01CA04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>794379</b>		
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA		
Odpowiedniki: Ospamox® [23,52], Amotaks® [26,16]		
<b>Amotaks®:</b> granulaty do przyg. zaw. <b>500 mg/5 ml</b> - 1 but. 100 ml	Rx	100% <b>38,72</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>2,88</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Amoxicillin</b>   ATC: <b>J01CA04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>298258</b>		
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA		
Odpowiedniki: Ospamox® [34,70], Amotaks® [38,72]		

<b>Amotaks®:</b> kaps. <b>500 mg</b> - 16 szt.	Rx	100% <b>14,21</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>6,22</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Amoxicillin</b>   ATC: <b>J01CA04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>691517</b>		
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA		
Odpowiedniki: Ospamox® [8,95], Hiconcil [9,40], Amotaks® Dis [14,21], Amotaks® [14,21]		
<b>Amotaks®:</b> kaps. <b>500 mg</b> - 20 szt.	Rx	100% <b>16,27</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>5,71</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Amoxicillin</b>   ATC: <b>J01CA04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>089108</b>		
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA		
Odpowiedniki: Ospamox® [10,86], Amotaks® Dis [16,27], Amotaks® [16,27]		
<b>Amotaks®:</b> tabl. <b>1 g</b> - 16 szt.	Rx	100% <b>23,65</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>5,27</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Amoxicillin</b>   ATC: <b>J01CA04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>691319</b>		
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA		
Odpowiedniki: Amotaks® Dis [23,65], Amotaks® [23,65]		
<b>Amotaks®:</b> tabl. <b>1 g</b> - 20 szt.	Rx	100% <b>26,25</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>2,88</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Amoxicillin</b>   ATC: <b>J01CA04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>089153</b>		
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA		
Odpowiedniki: Amotaks® Dis [26,25], Amotaks® [26,25]		
<b>Amotaks® Dis:</b> tabl. <b>500 mg</b> - 16 szt.	Rx	100% <b>14,21</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>6,22</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Amoxicillin</b>   ATC: <b>J01CA04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>043520</b>		
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA		
Odpowiedniki: Ospamox® [8,95], Hiconcil [9,40], Amotaks® [14,21], Amotaks® Dis [14,21]		
<b>Amotaks® Dis:</b> tabl. <b>500 mg</b> - 20 szt.	Rx	100% <b>16,27</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>5,71</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Amoxicillin</b>   ATC: <b>J01CA04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>089122</b>		
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA		
Odpowiedniki: Ospamox® [10,86], Amotaks® [16,27], Amotaks® Dis [16,27]		
<b>Amotaks® Dis:</b> tabl. <b>750 mg</b> - 16 szt.	Rx	100% <b>16,61</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,65</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Amoxicillin</b>   ATC: <b>J01CA04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>043629</b>		
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA		
Odpowiedniki: Ospamox® [12,60], Amotaks® Dis [16,61]		

<b>Amotaks® Dis: tabl. 750 mg - 20 szt.</b>	Rx	100%	19,70
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	2,89
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Amoxicillin</i>   ATC: J01CA04   wyk: B   EAN ~ 089139			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenie u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA			
Odpowiedniki: Ospamox® [15,39], Amotaks® Dis [19,70]			
<b>Amotaks® Dis: tabl. 1 g - 16 szt.</b>	Rx	100%	23,65
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,27
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Amoxicillin</i>   ATC: J01CA04   wyk: B   EAN ~ 043728			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenie u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA			
Odpowiedniki: Amotaks® [23,65], Amotaks® Dis [23,65]			
<b>Amotaks® Dis: tabl. 1 g - 20 szt.</b>	Rx	100%	26,25
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	2,88
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Amoxicillin</i>   ATC: J01CA04   wyk: B   EAN ~ 089146			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenie u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA			
Odpowiedniki: Amotaks® [26,25], Amotaks® Dis [26,25]			
<b>Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas: tabl. powł. 1 g - 14 szt. ◆</b>	Rx	100%	25,22
		Limit	25,22
		50% <sup>(1)</sup>	12,61
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Amoxicillin + Clavulanic acid</i>   ATC: J01CR02   wyk: B   EAN ~ 139575			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenie u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Amoksyklav® - (IR) [X], Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas [25,22], Amoksyklav® - (IR) [26,86], Co-amoxiclav Bluefish [27,29], Penlac [27,29], Amoksyklav® - (IR) [27,45], Ramoclav [28,48], Augmentin® - (IR) [29,11], Augmentin® - (IR) [29,16], Augmentin® - (IR) [29,23], Auglavin PPH [31,00], Polamoklav [31,00], Amoksyklav® [31,35], Augmentin® - (IR) [32,30], Augmentin® - (IR) [32,32], Augmentin® [34,92], Taromentin® [40,04]			
<b>Amoxicillin Aurovitas: tabl. do przyg. zaw. doust. 1000 mg - 16 szt.</b>	Rx	100%	15,94
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Amoxicillin</i>   ATC: J01CA04   wyk: B   EAN ~ 137313			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenie u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:B, T2:A, T3:B Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.			
<b>Ampril 5 mg: tabl. 5 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	9,87
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,40
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ramipril</i>   ATC: C09AA05   wyk: B   EAN ~ 571499			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroby nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Ampril 5 mg [9,87], Piramil 5 mg - (IR) [10,99], Piramil 5 mg - (IR) [10,99], Piramil 5 mg - (IR) [11,00], Piramil 5 mg - (IR) [11,00], Ramipril Aurovitas [11,27], Piramil 5 mg [11,38], Vivace [11,60], Axti® [11,74]			
<b>Ampril 5 mg: tabl. 5 mg - 60 szt. ◆</b>	Rx	100%	18,67
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	12,80
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ramipril</i>   ATC: C09AA05   wyk: B   EAN ~ 571505			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroby nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.			

<b>Ampril 10 mg: tabl. 10 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	18,35
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	12,80
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ramipril</i>   ATC: C09AA05   wyk: B   EAN ~ 571468			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroby nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Piramil 10 mg - (IR) [16,06], Piramil 10 mg - (IR) [16,06], Ampril 10 mg - (IR) [16,17], Piramil 10 mg - (IR) [16,17], Ampril 10 mg - (IR) [16,20], Piramil 10 mg - (IR) [16,98], Ampril 10 mg [18,35], Ramipril Aurovitas [21,33], Vivace [22,01], Axti® [22,39]			
<b>Ampril 10 mg: tabl. 10 mg - 60 szt. ◆</b>	Rx	100%	34,65
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	25,60
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ramipril</i>   ATC: C09AA05   wyk: B   EAN ~ 571475			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroby nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Piramil 10 mg [12,49], Ampril 10 mg [34,65]			
<b>Ampril 10 mg - (IR): tabl. 10 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	16,20
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	12,80
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ramipril</i>   ATC: C09AA05   wyk: B   EAN ~ 308971			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroby nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Delfarma Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Piramil 10 mg - (IR) [16,06], Piramil 10 mg - (IR) [16,06], Ampril 10 mg - (IR) [16,17], Piramil 10 mg - (IR) [16,17], Ampril 10 mg - (IR) [16,20], Piramil 10 mg - (IR) [16,98], Ampril 10 mg [18,35], Ramipril Aurovitas [21,33], Vivace [22,01], Axti® [22,39]			
<b>Ampril 10 mg - (IR): tabl. 10 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	16,17
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	12,80
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ramipril</i>   ATC: C09AA05   wyk: B   EAN ~ 340766			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroby nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Inpharm Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Piramil 10 mg - (IR) [16,06], Piramil 10 mg - (IR) [16,06], Piramil 10 mg - (IR) [16,17], Ampril 10 mg - (IR) [16,17], Ampril 10 mg - (IR) [16,20], Piramil 10 mg - (IR) [16,98], Ampril 10 mg [18,35], Ramipril Aurovitas [21,33], Vivace [22,01], Axti® [22,39]			
<b>Ampril HD: tabl. 5/25 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	15,18
		Limit	11,17
		R <sup>(1)</sup>	10,41
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ramipril + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09BA05   wyk: B   EAN ~ 573233			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.			
<b>Ampril HL: tabl. 2,5/12,5 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	10,44
		Limit	5,58
		R <sup>(1)</sup>	8,06
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ramipril + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09BA05   wyk: B   EAN ~ 573226			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.			
<b>Amylan: tabl. powł. 500 mg+ 125 mg - 14 szt. ◆</b>	Rx	100%	16,35
		Limit	16,35
		50% <sup>(1)</sup>	8,18
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Amoxicillin + Clavulanic acid</i>   ATC: J01CR02   wyk: B   EAN ~ 284220			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenie u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Mylan Ireland Limited			
Odpowiedniki: Hiconcil combi [X], Amylan [16,35]			



Amylan: tabl. powł. 875 mg+ 125 mg - 14 szt. ◆	Rx	100%	25,22
		Limit	25,22
		50% <sup>(1)</sup>	12,61
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Amoxicillin + Clavulanic acid* | ATC: J01CR02 | wyk: B | EAN ~ 284237  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B | Mylan Ireland Limited  
 Odpowiedniki: Amylan [25,22], Ramoclav - (IR) [28,14], Hiconcil combi [29,00]

Amylan ES: prosz. do sporz. zaw. doustnej (600 mg+ 42,9 mg)/5 ml - 1 but. 50 ml ◆	Rx	100%	17,18
		Limit	17,18
		50% <sup>(1)</sup>	8,59
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Amoxicillin + Clavulanic acid* | ATC: J01CR02 | wyk: B | EAN ~ 771110  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B | Viatris Healthcare Limited

Amylan ES: prosz. do sporz. zaw. doustnej (600 mg+ 42,9 mg)/5 ml - 1 but. 100 ml ◆	Rx	100%	32,13
		Limit	32,13
		50% <sup>(1)</sup>	16,07
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Amoxicillin + Clavulanic acid* | ATC: J01CR02 | wyk: B | EAN ~ 771111  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B | Viatris Healthcare Limited

Anafranil®: tabl. powł. 10 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	9,07
		Limit	4,82
		B <sup>(1)</sup>	4,25
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Clomipramine* | ATC: N06AA04 | wyk: B | EAN ~ 294916  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Anafranil®: tabl. powł. 25 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	15,11
		Limit	12,05
		B <sup>(1)</sup>	3,06
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Clomipramine* | ATC: N06AA04 | wyk: B | EAN ~ 295012  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Anafranil® SR 75: tabl. powł. o przedł. uwalnianiu 75 mg - 20 szt. ◆	Rx	100%	24,10
		Limit	24,10
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Clomipramine* | ATC: N06AA04 | wyk: B | EAN ~ 295111  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Anapran®: tabl. powł. 550 mg - 60 szt.	Rx	100%	42,46
		Limit	33,73
		50% <sup>(1)</sup>	23,04
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Naproxen* | ATC: M01AE02 | wyk: B | EAN ~ 948543  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Nalgessin Forte [41,25], Anapran® [42,46]

Anapran®: tabl. powł. 275 mg - 20 szt.	Rx	100%	9,84
		Limit	5,62
		50% <sup>(1)</sup>	6,33
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Naproxen* | ATC: M01AE02 | wyk: B | EAN ~ 615438  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Adamed Sp. z o.o.

Anapran®: tabl. powł. 275 mg - 60 szt.	Rx	100%	22,11
		Limit	16,86
		50% <sup>(1)</sup>	12,31
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Naproxen* | ATC: M01AE02 | wyk: B | EAN ~ 948536  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Adamed Sp. z o.o.

Anapran®: tabl. powł. 550 mg - 20 szt.	Rx	100%	19,07
		Limit	11,24
		50% <sup>(1)</sup>	12,11
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Naproxen* | ATC: M01AE02 | wyk: B | EAN ~ 624515  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Nalgessin Forte [14,59], Anapran® [19,07]

Anapran® EC: tabl. dojelitowe 250 mg - 60 szt.	Rx	100%	19,53
		Limit	15,33
		50% <sup>(1)</sup>	10,68
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Naproxen* | ATC: M01AE02 | wyk: B | EAN ~ 054991  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:B, T2:B, T3:D | Adamed Sp. z o.o.

Anapran® EC: tabl. dojelitowe 500 mg - 60 szt.	Rx	100%	37,82
		Limit	30,66
		50% <sup>(1)</sup>	20,24
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Naproxen* | ATC: M01AE02 | wyk: B | EAN ~ 055066  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:B, T2:B, T3:D | Adamed Sp. z o.o.

Anastrozol Bluefish: tabl. powł. 1 mg - 28 szt.	Rx	100%	52,36
		Limit	52,36
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Anastrozole* | ATC: L02BG03 | wyk: B | EAN ~ 802432  
 (1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii WP: Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X | Bluefish Pharmaceuticals

Odpowiedniki: Anastrozole Eugia [48,81], Anastrozol Bluefish [52,36], Atrozol [56,41], Anastrozol Teva [59,51], Apo-Nastrol [60,98], Egistrozol [61,00], Arimidex® [64,43]

Anastrozole Eugia: tabl. powł. 1 mg - 28 szt.	Rx	100%	48,81
		Limit	48,81
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Anastrozole* | ATC: L02BG03 | wyk: B | EAN ~ 145780  
 (1) Rak piersi w I rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii WP: Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X | Eugia Pharma (Malta) Ltd.

Odpowiedniki: Anastrozole Eugia [48,81], Anastrozol Bluefish [52,36], Atrozol [56,41], Anastrozol Teva [59,51], Apo-Nastrol [60,98], Egistrozol [61,00], Arimidex® [64,43]

Anastrozol Teva: tabl. powł. 1 mg - 28 szt.	Rx	100%	59,51
		Limit	52,94
		B <sup>(1)</sup>	6,57
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Anastrozole* | ATC: L02BG03 | wyk: B | EAN ~ 082162  
 (1) Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii, Rak piersi w II rzucie hormonoterapii WP: Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X | Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Anastrozole Eugia [48,81], Anastrozol Bluefish [52,36], Atrozol [56,41], Anastrozol Teva [59,51], Apo-Nastrol [60,98], Egistrozol [61,00], Arimidex® [64,43]

Andepin®: kaps. twarde 20 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	19,62
		Limit	14,11
		30% <sup>(1)</sup>	9,74
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Fluoxetine* | ATC: N06AB03 | wyk: B | EAN ~ 065515  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Synteza Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Fluxemed [14,87], Fluoxetine Aurovitas [15,01], Andepin® [19,62], Fluoxetin Polpharma [20,07], Bioxetin [20,27], Seronil® [25,77]

Androcure®: tabl. 50 mg - 20 szt.	Rx	100%	39,47
		Limit	36,68
		30% <sup>(1)</sup>	13,79
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Cyproterone acetate* | ATC: G03HA01 | wyk: B | EAN ~ 657476  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Transseksualizm (F64.0)(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X | Bayer Sp. z o.o.



Androcur®: tabl. 50 mg - 50 szt.	Rx	100%	91,69
		Limit	91,69
		30% <sup>(1)</sup>	27,51
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Cyproterone acetate* | ATC: G03HA01 | wyk: B | EAN ~ 657483  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Transseksualizm (F64.0) (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
 Bayer Sp. z o.o.

Androster: tabl. powł. 5 mg - 30 szt.	Rx	100%	30,02
		Limit	26,72
		R <sup>(1)</sup>	6,50
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Finasteride* | ATC: G04CB01 | wyk: B | EAN ~ 055470  
 (1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: N  
 Actavis Group PTC ehf.  
 Odpowiedniki: Finahit [X], Finaride [X], Finasteridum Bluefish [22,20], Finasterid Stada [24,01], Finamef - (IR) [26,17], Uronexyr [27,24], Finaran [28,33], Symasteride [28,38], Finpros [28,45], Penester® [29,58], Hyplafin [29,82], Antiprost [29,85], Adaster [29,86], Androster [30,02], Finamef [30,07], Apo-Fina [30,11], Finaster® [30,19]

Androster: tabl. powł. 5 mg - 90 szt.	Rx	100%	81,97
		Limit	80,15
		R <sup>(1)</sup>	11,42
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Finasteride* | ATC: G04CB01 | wyk: B | EAN ~ 906154  
 (1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
 Actavis Group PTC ehf.  
 Odpowiedniki: Finahit [X], Finasteridum Bluefish [58,50], Finasterid Stada [62,95], Symasteride [73,12], Penester® [79,74], Finaster® [80,15], Apo-Fina [80,81], Adaster [81,49], Androster [81,97], Finamef [82,11]

Anesteloc® 20: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	11,29
		Limit	6,22
		50% <sup>(1)</sup>	8,18
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
S <sup>(3)</sup>	bezpł.		

INN: *Pantoprazole* | ATC: A02BC02 | wyk: B | EAN ~ 621026  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Adamed Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Pamył 20 mg [6,32], Pantoprazole Genotim [6,80], Ozzion [6,91], Pantoprazole Bluefish [7,13], Panrazol [7,23], Gerdin 20 mg [7,36], Panprazol [8,05], Noacid [8,37], Ranloc [9,02], Nolpaza® 20 mg tabletki dojelitowe [9,07], Controloc® 20 [9,80], Panzol [10,03], IPP 20 [10,14], Contix [10,48], Anesteloc® 20 [11,29]

Anesteloc® 40: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	19,74
		Limit	12,43
		50% <sup>(1)</sup>	13,53
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
S <sup>(3)</sup>	bezpł.		

INN: *Pantoprazole* | ATC: A02BC02 | wyk: B | EAN ~ 621040  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Adamed Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [11,61], Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [11,63], Pamył 40 mg [12,71], Pantoprazole Genotim [12,71], Ozzion [12,93], Pantoprazole Bluefish [13,25], Gerdin 40 mg [13,46], Panrazol [13,71], Panprazol [15,37], Contix [15,47], Noacid [16,00], Ranloc [17,37], Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe [17,49], Controloc® 40 [17,52], Panzol [19,53], IPP 40 [19,66], Anesteloc® 40 [19,74]

Angeliq®: tabl. powł. 1 mg+ 2 mg - 28 szt.	Rx	100%	45,54
		Limit	16,23
		30% <sup>(1)</sup>	34,18
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Estradiol + Drospirenone* | ATC: G03FA17 | wyk: B | EAN ~ 221073  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
 Bayer Sp. z o.o.

▼ Anoro Ellipta: prosz. do inhal. 55/22 µg/dawkę - 1 inhal. (30 dawk)	Rx	100%	160,53
		Limit	134,31
		30% <sup>(1)</sup>	66,51
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Umeclidinium bromide + Vilanterol* | ATC: R03AL03 | wyk: B | EAN ~ 110898  
 (1) Przewłękła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Antiprost: tabl. powł. 5 mg - 30 szt.	Rx	100%	29,85
		Limit	26,72
		R <sup>(1)</sup>	6,33
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Finasteride* | ATC: G04CB01 | wyk: B | EAN ~ 067770  
 (1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: N  
 Orion Pharma Poland Sp. o.o.  
 Odpowiedniki: Finahit [X], Finaride [X], Finasteridum Bluefish [22,20], Finasterid Stada [24,01], Finamef - (IR) [26,17], Uronexyr [27,24], Finaran [28,33], Symasteride [28,38], Finpros [28,45], Penester® [29,58], Hyplafin [29,82], Antiprost [29,85], Adaster [29,86], Androster [30,02], Finamef [30,07], Apo-Fina [30,11], Finaster® [30,19]

Anvidis: tabl. 50 mg - 56 szt.	Rx	100%	41,07
		Limit	29,23
		30% <sup>(1)</sup>	20,61
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Vildagliptin* | ATC: A10BH02 | wyk: B | EAN ~ 216207  
 (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą; cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c  $\geq 7\%$  (przez co najmniej 3 miesiące) (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Vipharm SA  
 Odpowiedniki: Viglita [29,63], Kwikaton [30,32], Giptivil [41,07], Anvidis [41,07], Galvus® [133,92]

Anvidis Duo: tabl. powł. 50/850 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	32,71
		Limit	31,32
		30% <sup>(1)</sup>	10,79
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Vildagliptin + Metformin hydrochloride* | ATC: A10BD08 | wyk: B | EAN ~ 216240  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Vipharm SA  
 Odpowiedniki: Anvidis Duo [32,71], Vimetso [41,29]

Anvidis Duo: tabl. powł. 50/1000 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	32,71
		Limit	31,32
		30% <sup>(1)</sup>	10,79
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Vildagliptin + Metformin hydrochloride* | ATC: A10BD08 | wyk: B | EAN ~ 216243  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Vipharm SA  
 Odpowiedniki: Anvidis Duo [32,71], Vimetso [41,29]

Anzorin: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	39,05
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
S <sup>(3)</sup>	bezpł.		

INN: *Olanzapine* | ATC: N05AH03 | wyk: B | EAN ~ 806751  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Orion Pharma Poland Sp. o.o.  
 Odpowiedniki: Olanzapine Apotex [18,00], Olanzapine Bluefish [30,99], Anzorin [39,05], Zopridoxin [42,26], Olanzapina Mylan [42,83], Olazax Disperzi [44,55], Zalasta® [48,38], Zolaxa Rapid [48,40], Olanzapine Lekam [50,96], Zolafren® Swift [52,07]

Anzorin: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	72,80
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
S <sup>(3)</sup>	bezpł.		

INN: *Olanzapine* | ATC: N05AH03 | wyk: B | EAN ~ 806799  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Orion Pharma Poland Sp. o.o.  
 Odpowiedniki: Olanzapine Bluefish [56,65], Anzorin [72,80], Olanzaran [79,67], Zopridoxin [79,96], Olanzapina Mylan [80,36], Olazax Disperzi [83,79], Zalasta® [91,44], Olanzapine Apotex [93,71], Zolaxa Rapid [95,65], Olanzapine Lekam [96,61], Zolafren® Swift [98,85]

Anzorin: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	104,01
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	4,48
S <sup>(3)</sup>	bezpł.		

INN: *Olanzapine* | ATC: N05AH03 | wyk: B | EAN ~ 806843  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Orion Pharma Poland Sp. o.o.  
 Odpowiedniki: Olanzapine Bluefish [80,37], Anzorin [104,01], Olanzapina Mylan [106,65], Olazax Disperzi [121,07], Zopridoxin [125,21], Zalasta® [132,56], Olanzapine Lekam [140,30], Zolaxa Rapid [142,22], Zolafren® Swift [143,66]

Anzorin: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	135,18
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,97
S <sup>(3)</sup>	bezpł.		

INN: *Olanzapine* | ATC: N05AH03 | wyk: B | EAN ~ 806881  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Orion Pharma Poland Sp. o.o.  
 Odpowiedniki: Anzorin [135,18], Olanzapina Mylan [139,07], Zopridoxin [145,49], Olazax Disperzi [158,31], Zalasta® [173,61], Olanzapine Apotex [174,94], Olanzapine Lekam [183,96], Zolafren® Swift [188,43], Zolaxa Rapid [188,44]

Aparxon PR: tabl. o przedl. uwalnianiu 2 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	29,93
		Limit	29,27
		30% <sup>(1)</sup>	9,44
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Ropinirole* | ATC: N04BC04 | wyk: B | EAN ~ 877683  
 (1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Aparxon PR [29,93], Ceurolex SR [32,28], Aropilo SR [34,57], Repirol SR [37,31], Requip-Modutab [37,99], Rodopin [38,57], ApoRopin [39,72], Rolpryna SR [40,29], Nironovo SR [40,60], Polpix SR [40,63]

Aparxon PR: tabl. o przedl. uwalnianiu 4 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	56,36
		Limit	56,36
		30% <sup>(1)</sup>	16,91
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Ropinirole* | ATC: N04BC04 | wyk: B | EAN ~ 878000  
 (1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Rolpryna SR - (IR) [54,97], Aparxon PR [56,36], Aropilo SR [66,44], Ceurolex SR [70,22], Repirol SR [70,79], Requip-Modutab [72,65], Rodopin [73,30], ApoRopin [75,59], Rolpryna SR [76,74], Nironovo SR [77,35], Polpix SR [77,43]

## W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.

**Sumamigren**  
Sumatriptanum

<b>Apaxon PR:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu <b>8 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>111,19</b>
		Limit	<b>111,19</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>33,36</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Ropinirole** | ATC: **N04BC04** | wyk: **B** | EAN ~ **878086**  
 (1) Choroba i zespół Parkinsona(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** | Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Rolpryna SR - (IR) [103,59], Apaxon PR [111,19], Aropilo SR [123,10], Ceurolex SR [134,54], Repirol SR [136,03], Requip-Modutab [138,38], Ropodrin [140,27], ApoRopin [144,85], Rolpryna SR [147,14], Nironovo SR [148,37], Polpix SR [148,53]

<b>Apidra:</b> inj. [roztw.] <b>100 j.m./ml</b> - 5 wkł. 3 ml	Rx	100%	<b>127,61</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		C <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(3)</sup>	<b>30,83</b>

INN: **Insulin glulisine** | ATC: **A10AB06** | wyk: **B** | EAN ~ **008575**  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Cukrzyca(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **A** | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

<b>Apidra:</b> inj. [roztw.] <b>100 j.m./ml</b> - 1 fiol. 10 ml	Rx	100%	<b>85,57</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		C <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(3)</sup>	<b>21,58</b>

INN: **Insulin glulisine** | ATC: **A10AB06** | wyk: **B** | EAN ~ **008483**  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Cukrzyca(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **A** | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

<b>Apidra SoloStar:</b> inj. [roztw.] <b>100 j.m./ml</b> - 5 wstrzyk. 3 ml	Rx	100%	<b>128,18</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		C <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(3)</sup>	<b>31,40</b>

INN: **Insulin glulisine** | ATC: **A10AB06** | wyk: **B** | EAN ~ **617197**  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Cukrzyca(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **A** | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

<b>Apiprax:</b> tabl. <b>15 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>100,14</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Aripiprazole** | ATC: **N05AX12** | wyk: **B** | EAN ~ **127969**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** | Aristo Pharma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Aripiprazole Glenmark [X], Abilify® - (IR) [86,03], Abilify® - (IR) [86,05], Aripiprazole Orion [87,65], Aricogan [96,93], Arpixon [97,91], Apiprax [100,14], Aribit [100,98], Asduter [100,98], Abilify® [105,54], Anpilek [106,09], Explemed [106,21], Apra [109,87], Aripiprazole Aurovitas [120,09], Aryzalera [122,62], Aripiprazole Sandoz [125,84]

<b>Apo-Atorva:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>9,65</b>
		Limit	<b>4,21</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>6,70</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Atorvastatin** | ATC: **C10AA05** | wyk: **B** | EAN ~ **787586**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **X** | Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medreg [4,58], Atorvastatin Genoptim [5,28], Atorvastatin Bluefish AB [6,50], Stovas CRT [6,04], Lambrinex [7,12], Torvacard® 10 [8,79], Atorvox [9,06], Atrox® 10 [9,49], Atoxis® [9,56], Tulip® [9,60], Apo-Atorva [9,65], Atorvastatol® [9,81]

<b>Apo-Atorva:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>17,75</b>
		Limit	<b>8,43</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>11,85</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Atorvastatin** | ATC: **C10AA05** | wyk: **B** | EAN ~ **787609**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **X** | Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [8,20], Atorvastatin Medreg [8,26], Atorvastatin Aurovitas [8,89], Atorvastatin Bluefish AB [9,61], Atorvastatin Genoptim [9,88], Atorvagen [9,97], Stovas CRT [11,17], Lambrinex [11,67], Torvacard® 20 [12,94], Atoxis® [13,71], Atrox®20 [15,01], Atorvox [15,23], Tulip® [15,42], Apo-Atorva [17,75], Atorvastatol® [19,11]

<b>Apo-Atorva:</b> tabl. powł. <b>30 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>12,05</b>
		Limit	<b>12,05</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>3,62</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Atorvastatin** | ATC: **C10AA05** | wyk: **B** | EAN ~ **140391**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **X** | Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Stovas CRT [12,00], Apo-Atorva [12,05], Atorvastatin Bluefish AB [14,32], Atoxis® [19,02]

<b>Apo-Atorva:</b> tabl. powł. <b>30 mg</b> - 60 szt.	Rx	100%	<b>22,63</b>
		Limit	<b>22,63</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>6,79</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Atorvastatin** | ATC: **C10AA05** | wyk: **B** | EAN ~ **140393**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **X** | Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Apo-Atorva [22,63], Atoxis® [35,10]

<b>Apo-Atorva:</b> tabl. powł. <b>40 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>32,04</b>
		Limit	<b>16,86</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>20,24</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Atorvastatin** | ATC: **C10AA05** | wyk: **B** | EAN ~ **787647**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **X** | Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [15,27], Atorvastatin Medreg [15,38], Atorvastatin Aurovitas [16,06], Atorvastatin Bluefish AB [18,30], Atorvastatin Genoptim [18,81], Atorvagen [19,02], Stovas CRT [21,57], Lambrinex [22,63], Tulip® [23,91], Torvacard® 40 [24,03], Atoxis® [26,75], Atorvox [27,97], Atrox® 40 [29,46], Apo-Atorva [32,04], Atorvastatol® [37,58]

<b>Apo-Atorva:</b> tabl. powł. <b>60 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>22,63</b>
		Limit	<b>22,63</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>6,79</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Atorvastatin** | ATC: **C10AA05** | wyk: **B** | EAN ~ **140399**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **X** | Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Stovas CRT [22,51], Apo-Atorva [22,63], Atorvastatin Bluefish AB [22,65], Atoxis® [39,46]

<b>Apo-Doxan 1:</b> tabl. <b>1 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>12,75</b>
		Limit	<b>4,80</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>9,39</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(3)</sup>	<b>11,15</b>

INN: **Doxazosin** | ATC: **C02CA04, G04CA** | wyk: **B** | EAN ~ **969517**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż.; nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Przerost gruczołu krokowego(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** | Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Doxorion [7,14], Apo-Doxan 1 [12,75], Zoxon® 1 [12,77], Doxar [13,04], Doxanorm® [13,97]

<b>Apo-Doxan 2:</b> tabl. <b>2 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>17,73</b>
		Limit	<b>9,61</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>11,00</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(3)</sup>	<b>11,32</b>

INN: **Doxazosin** | ATC: **C02CA04, G04CA** | wyk: **B** | EAN ~ **969616**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż.; nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Przerost gruczołu krokowego(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** | Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Doxorion [X], Doxazosin Aurovitas [8,33], Adadox [9,01], Kamiren® [17,45], Doxonex® [17,60], Zoxon® 2 [17,61], Apo-Doxan 2 [17,73], Doxanorm® [18,45], Doxar [18,90]



# ZOLPIC

Daj owcom odpocząć.  
zolpidem



<b>Apo-Doxan 4: tabl. 4 mg - 30 szt. ◆</b>  INN: <i>Doxazosin</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przerost gruczołu krokowego (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.	Rx	100%	26,90
		Limit	19,21
		30% <sup>(1)</sup>	13,45
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	10,89
ATC: C02CA04, G04CA wyk: B EAN ~ 969715		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
<b>Apo-Doxan 4: tabl. 4 mg - 60 szt. ◆</b>  INN: <i>Doxazosin</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przerost gruczołu krokowego (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.	Rx	100%	45,87
Limit		38,42	
30% <sup>(1)</sup>		18,98	
DZ <sup>(2)</sup>		bezpł.	
R <sup>(3)</sup>		13,85	
ATC: C02CA04, G04CA wyk: B EAN ~ 271367		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
<b>Apo-Fina: tabl. powł. 5 mg - 30 szt.</b>  INN: <i>Finasteride</i> (1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce	Rx	100%	30,11
Limit		26,72	
R <sup>(1)</sup>		6,59	
S <sup>(2)</sup>		bezpł.	
ATC: G04CB01 wyk: B EAN ~ 048670			
<b>Apo-Fina: tabl. powł. 5 mg - 90 szt.</b>  INN: <i>Finasteride</i> (1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce	Rx	100%	80,81
Limit		80,15	
R <sup>(1)</sup>		10,26	
S <sup>(2)</sup>		bezpł.	
ATC: G04CB01 wyk: B EAN ~ 938797			
<b>Apo-Flutam: tabl. powł. 250 mg - 30 szt. ◆</b>  INN: <i>Flutamide</i> (1) Nowotwory złośliwe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce	Rx	100%	24,18
Limit		21,92	
B <sup>(1)</sup>		2,26	
DZ <sup>(2)</sup>		bezpł.	
S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
ATC: L02BB01 wyk: A EAN ~ 941612			
<b>Apo-Flutam: tabl. powł. 250 mg - 90 szt. ◆</b>  INN: <i>Flutamide</i> (1) Nowotwory złośliwe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce	Rx	100%	65,75
Limit		65,75	
B <sup>(1)</sup>		bezpł.	
DZ <sup>(2)</sup>		bezpł.	
S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
ATC: L02BB01 wyk: A EAN ~ 941629			
<b>Apo-Napro: tabl. 250 mg - 30 szt.</b>  INN: <i>Naproxen</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce	Rx	100%	10,64
Limit		7,67	
50% <sup>(1)</sup>		6,81	
DZ <sup>(2)</sup>		bezpł.	
S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
ATC: M01AE02 wyk: B EAN ~ 661404			
<b>Apo-Napro: tabl. 250 mg - 90 szt.</b>  INN: <i>Naproxen</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce	Rx	100%	29,22
Limit		23,00	
50% <sup>(1)</sup>		17,72	
DZ <sup>(2)</sup>		bezpł.	
S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
ATC: M01AE02 wyk: B EAN ~ 661435			
<b>Apo-Napro: tabl. 500 mg - 30 szt.</b>  INN: <i>Naproxen</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce	Rx	100%	20,72
Limit		15,33	
50% <sup>(1)</sup>		13,06	
DZ <sup>(2)</sup>		bezpł.	
S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
ATC: M01AE02 wyk: B EAN ~ 661442			
<b>ApoRopin: tabl. o przedl. uwalnianiu 2 mg - 28 szt. ◆</b>  INN: <i>Ropinirole</i> (1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce	Rx	100%	39,72
Limit		29,27	
30% <sup>(1)</sup>		19,23	
S <sup>(2)</sup>		bezpł.	
ATC: N04BC04 wyk: B EAN ~ 992607			
<b>ApoRopin: tabl. o przedl. uwalnianiu 4 mg - 28 szt. ◆</b>  INN: <i>Ropinirole</i> (1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce	Rx	100%	75,59
Limit		58,54	
30% <sup>(1)</sup>		34,61	
S <sup>(2)</sup>		bezpł.	
ATC: N04BC04 wyk: B EAN ~ 992683			
<b>ApoRopin: tabl. o przedl. uwalnianiu 8 mg - 28 szt. ◆</b>  INN: <i>Ropinirole</i> (1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce	Rx	100%	144,85
Limit		117,09	
30% <sup>(1)</sup>		62,89	
S <sup>(2)</sup>		bezpł.	
ATC: N04BC04 wyk: B EAN ~ 992775			
<b>Aporoza: tabl. powł. 5 mg - 28 szt.</b>  INN: <i>Rosuvastatin</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.	Rx	100%	4,80
Limit		3,93	
30% <sup>(1)</sup>		2,05	
DZ <sup>(2)</sup>		bezpł.	
S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
ATC: C10AA07 wyk: B EAN ~ 142287			
<b>Aporoza: tabl. powł. 10 mg - 28 szt.</b>  INN: <i>Rosuvastatin</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.	Rx	100%	8,72
Limit		7,87	
30% <sup>(1)</sup>		3,21	
DZ <sup>(2)</sup>		bezpł.	
S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
ATC: C10AA07 wyk: B EAN ~ 142588			
<b>Aporoza: tabl. powł. 20 mg - 28 szt.</b>  INN: <i>Rosuvastatin</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.	Rx	100%	16,47
Limit		15,74	
30% <sup>(1)</sup>		5,45	
DZ <sup>(2)</sup>		bezpł.	
S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
ATC: C10AA07 wyk: B EAN ~ 142590			
<b>Aporoza: tabl. powł. 40 mg - 28 szt.</b>  INN: <i>Rosuvastatin</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.	Rx	100%	31,15
Limit		31,15	
30% <sup>(1)</sup>		9,35	
DZ <sup>(2)</sup>		bezpł.	
S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
ATC: C10AA07 wyk: B EAN ~ 142592			

<b>ApoSerta/Sertraline Aurovitas:</b> tabl. powł. 50 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	11,80
		Limit	11,80
		30% <sup>(1)</sup>	3,54
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Sertraline* ATC: N06AB06 wyk: B EAN ~ 135565  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: ApoSerta/Sertraline Aurovitas [11,80], Sastium [11,92], Sertralina Krka [12,56], Miravil [13,64], Sertranom [13,73], Setalof [14,07], Asertin® 50 [15,07], Stimulon® [17,27]

<b>ApoSerta/Sertraline Aurovitas:</b> tabl. powł. 100 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	21,88
		Limit	21,88
		30% <sup>(1)</sup>	6,56
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Sertraline* ATC: N06AB06 wyk: B EAN ~ 135573  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: ApoSerta/Sertraline Aurovitas [21,88], Sastium [22,13], Sertralina Krka [23,49], Miravil [25,60], Sertranom [25,93], Setalof [28,22], Asertin® 100 [29,41]

<b>Apo-Simva 10:</b> tabl. powł. 10 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	7,59
		Limit	2,81
		30% <sup>(1)</sup>	5,62
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Simvastatin* ATC: C10AA01 wyk: B EAN ~ 618279  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
 Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce

Odpowiedniki: Simvastatinum Accord [X], Ximve [X], SimvaHEXAL 10 [7,21], Apo-Simva 10 [7,59]

<b>Apo-Simva 20:</b> tabl. powł. 20 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	13,33
		Limit	5,62
		30% <sup>(1)</sup>	9,40
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Simvastatin* ATC: C10AA01 wyk: B EAN ~ 618286  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
 Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce

Odpowiedniki: Simvastatinum Accord [X], Simvastatin Bluefish [7,12], Apo-Simva 20 [13,33], SimvaHEXAL 20 [13,67], Ximve [13,82]

<b>Apo-Simva 40 :</b> tabl. powł. 40 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	22,30
		Limit	11,24
		30% <sup>(1)</sup>	14,43
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Simvastatin* ATC: C10AA01 wyk: B EAN ~ 618293  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
 Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce

Odpowiedniki: Simvastatinum Accord [X], Apo-Simva 40 [22,30], Ximve [23,53], SimvaHEXAL 40 [24,36]

<b>ApoSuprid:</b> tabl. 200 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	59,84
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Amisulpride* ATC: N05AL05 wyk: B EAN ~ 134855  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:A, T2:B, T3:B  
 Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Amisan [56,96], Masultab [58,38], Amipryd [59,75], Symamis [59,75], ApoSuprid [59,84], Solian® [60,62]

<b>ApoSuprid:</b> tabl. powł. 400 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	113,37
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Amisulpride* ATC: N05AL05 wyk: B EAN ~ 134864  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Solian® - (IR) [110,34], Solian® - (IR) [110,34], Masultab [110,46], Solian® - (IR) [110,46], Amipryd [113,21], Symamis [113,21], ApoSuprid [113,37], Amisan [113,44], Solian® [114,92]

<b>Apo-Tamis:</b> kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde 0,4 mg - 30 szt.	Rx	100%	24,38
		Limit	19,21
		R <sup>(1)</sup>	8,37
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Tamsulosin hydrochloride* ATC: G04CA02 wyk: B EAN ~ 045006  
 (1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: N  
 Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce

Odpowiedniki: Omsal - (IR) [X], Urostat 0,4 mg [X], Urostat 0,4 mg - (IR) [X], Tamsiger [16,35], Urostat 0,4 mg - (IR) [16,35], Tamiron [16,49], Bazetham Retard [23,61], Omsal [23,81], Symlosin SR® [23,81], Tanyz® ERAS [23,90], Uprox XR [23,98], Adatam XR [23,99], Ranlosin [23,99], TamisPras [24,34], Apo-Tamis [24,38], Omnic Ocas® 0,4 [25,18]

<b>Apo-Tamis:</b> kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde 0,4 mg - 90 szt.	Rx	100%	68,02
		Limit	57,63
		R <sup>(1)</sup>	19,99
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Tamsulosin hydrochloride* ATC: G04CA02 wyk: B EAN ~ 900794  
 (1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: N  
 Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce

Odpowiedniki: Symlosin SR® [50,85], Bazetham Retard [65,74], Ranlosin [66,31], Uprox XR [66,83], Adatam XR [66,87], Apo-Tamis [68,02]

<b>ApoTiapina:</b> tabl. powł. 25 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	8,47
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,12
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Quetiapine* ATC: N05AH04 wyk: B EAN ~ 897780  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z otępieniem (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce

Odpowiedniki: Kefrenex [X], Kwetina [7,32], Kventiax® [7,82], Bonogren [8,15], Pinexet [8,25], Etiagen [8,36], Kettlept® [8,47], ApoTiapina [8,47], Kwetaplex [8,56], Ketrel [8,58], Setinin [8,90]

<b>ApoTiapina:</b> tabl. powł. 100 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	51,72
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	10,51
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Quetiapine* ATC: N05AH04 wyk: B EAN ~ 910762  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce

Odpowiedniki: Bonogren [44,28], Kefrenex [46,86], Etiagen [48,06], Kwetina [48,28], Setinin [48,66], Kventiax® [49,08], Kettlept® [50,16], Ketipinor® [51,37], Pinexet [51,71], ApoTiapina [51,72], Kwetaplex [52,86], Ketrel [54,46]

<b>ApoTiapina:</b> tabl. powł. 200 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	98,08
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	12,46
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Quetiapine* ATC: N05AH04 wyk: B EAN ~ 910779  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce

Odpowiedniki: Bonogren [84,34], Kefrenex [88,34], Etiagen [90,75], Kwetina [91,21], Setinin [91,97], Kventiax® [92,82], Kettlept® [93,83], Ketipinor® [95,21], Pinexet [96,92], ApoTiapina [98,08], Kwetaplex [100,36], Ketrel [102,65]

<b>Apra:</b> tabl. 10 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	76,71
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	12,86
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Aripiprazole* ATC: N05AX12 wyk: B EAN ~ 001068  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Arpinox [67,44], Aripilek [69,27], Asduter [70,92], Apra [76,71], Aryzalera [83,93], Aripiprazole Sandoz [84,73], Abilify® [523,63]

<b>Apra:</b> tabl. 10 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	145,97
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	15,84
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Aripiprazole* ATC: N05AX12 wyk: B EAN ~ 001730  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Arpinox [127,42], Abilify® [134,39], Aribit [134,39], Apra [145,97], Aryzalera [160,39], Aripiprazole Sandoz [163,14]





Naszym wyborem

enarenal  
enalaprilii maleas

<p><b>Apra: tabl. 10 mg - 84 szt. ◆</b></p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>212,78</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>17,59</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	212,78	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	17,59	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Apra-swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 28 szt. ◆</b></p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>109,87</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>12,49</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	109,87	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	12,49	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	212,78																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	17,59																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	109,87																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	12,49																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
<p>INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 001747            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C            Adamed Sp. z o.o.</p>		<p>INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 001037            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C            Adamed Sp. z o.o.</p>																					
<p><b>Apra: tabl. 15 mg - 28 szt. ◆</b></p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>109,87</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>12,49</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	109,87	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	12,49	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Apra-swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 56 szt. ◆</b></p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>201,22</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>6,03</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	201,22	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	6,03	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	109,87																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	12,49																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	201,22																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	6,03																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
<p>INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 001075            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C            Adamed Sp. z o.o.</p>		<p>INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 001662            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C            Adamed Sp. z o.o.</p>																					
<p><b>Apra: tabl. 15 mg - 56 szt. ◆</b></p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>201,22</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>6,03</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	201,22	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	6,03	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Apra-swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 84 szt. ◆</b></p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>310,72</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>17,94</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	310,72	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	17,94	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	201,22																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	6,03																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	310,72																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	17,94																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
<p>INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 001754            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C            Adamed Sp. z o.o.</p>		<p>INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 001679            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C            Adamed Sp. z o.o.</p>																					
<p><b>Apra: tabl. 15 mg - 84 szt. ◆</b></p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>310,72</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>17,94</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	310,72	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	17,94	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Apra-swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 30 mg - 28 szt. ◆</b></p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>204,32</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>9,13</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	204,32	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	9,13	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	310,72																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	17,94																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	204,32																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	9,13																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
<p>INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 001761            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C            Adamed Sp. z o.o.</p>		<p>INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 400104            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C            Adamed Sp. z o.o.</p>																					
<p><b>Apra: tabl. 30 mg - 28 szt. ◆</b></p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>204,32</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>9,13</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	204,32	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	9,13	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Apraprepitant Accord: kaps. twarde 125 mg+ 80 mg - 3 szt. (1 kaps. 125 mg+ 2 kaps. 80 mg)</b></p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>68,69</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>68,69</td></tr> <tr><td>B<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	68,69	Limit	68,69	B <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	204,32																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	9,13																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	68,69																						
Limit	68,69																						
B <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	3,20																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
<p>INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 400108            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C            Adamed Sp. z o.o.</p>		<p>INN: <i>Apraprepitant</i>   ATC: A04AD12   wyk: B   EAN ~ 140057            (1) Chemioterapia ICD10: C.0.12.(2) Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatin w dawce 70 mg/m<sup>2</sup>, dokсорubicyny i cyklofosfamidu – profilaktyka(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B            Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.</p>																					
<p><b>Apra-swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 28 szt. ◆</b></p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>76,71</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>12,86</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	76,71	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	12,86	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Apraprepitant Mylan: kaps. twarde 125 mg+ 80 mg - 3 szt. (1 kaps. 125 mg+ 2 kaps. 80 mg)</b></p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>68,69</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>68,69</td></tr> <tr><td>B<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	68,69	Limit	68,69	B <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	76,71																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	12,86																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	68,69																						
Limit	68,69																						
B <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	3,20																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
<p>INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 001020            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C            Adamed Sp. z o.o.</p>		<p>INN: <i>Apraprepitant</i>   ATC: A04AD12   wyk: B   EAN ~ 135254            (1) Chemioterapia ICD10: C.0.12.(2) Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatin w dawce 70 mg/m<sup>2</sup>, dokсорubicyny i cyklofosfamidu – profilaktyka(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B            Vitris Ltd</p>																					
<p><b>Apra-swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 56 szt. ◆</b></p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>145,97</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>15,84</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	145,97	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	15,84	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Apraprepitant Sandoz: kaps. twarde 125 mg+ 80 mg - 3 szt. (1 kaps. 125 mg+ 2 kaps. 80 mg)</b></p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>97,31</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>68,69</td></tr> <tr><td>B<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>31,82</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	97,31	Limit	68,69	B <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	31,82	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	145,97																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	15,84																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	97,31																						
Limit	68,69																						
B <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	31,82																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
<p>INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 001648            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C            Adamed Sp. z o.o.</p>		<p>INN: <i>Apraprepitant</i>   ATC: A04AD12   wyk: B   EAN ~ 136081            (1) Chemioterapia ICD10: C.0.12.(2) Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatin w dawce 70 mg/m<sup>2</sup>, dokсорubicyny i cyklofosfamidu – profilaktyka(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B            Sandoz GmbH</p>																					
<p><b>Apra-swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 84 szt. ◆</b></p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>212,78</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>17,59</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	212,78	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	17,59	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Apraprepitant Stada: kaps. twarde 125 mg + 80 mg - 3 szt. (1 kaps. 125 mg+ 2 kaps. 80 mg)</b></p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>62,96</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>62,96</td></tr> <tr><td>B<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	62,96	Limit	62,96	B <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	212,78																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	17,59																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	62,96																						
Limit	62,96																						
B <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	3,20																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
<p>INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 001655            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C            Adamed Sp. z o.o.</p>		<p>INN: <i>Apraprepitant</i>   ATC: A04AD12   wyk: B   EAN ~ 141271            (1) Chemioterapia ICD10: C.0.12.(2) Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatin w dawce 70 mg/m<sup>2</sup>, dokсорubicyny i cyklofosfamidu – profilaktyka(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B            STADA Poland Sp. z o.o.</p>																					
		<p>, Apraprepitant Sandoz [97,31]</p>																					

<b>Aquacel® Ag+ Extra:</b> opatrunek [wzmocniony w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra] <b>5x5 cm</b> - 1 szt.	WM 100% <b>7,05</b> Limit <b>5,68</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>3,07</b> B <sup>(2)</sup> <b>1,37</b>	<b>Aquacel® Ag Foam:</b> opatrunek leczniczy piankowy [przylepny w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra] <b>19,8x14 cm</b> - 1 szt.	WM 100% <b>64,98</b> Limit <b>62,99</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>20,89</b> B <sup>(2)</sup> <b>1,99</b>
INN: <i>Emplastris collagenosa</i> ATC: V20 (1)Przewlekle owrządzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	wyk: EAN ~ 132010 ConvaTec Polska Sp. z o.o.	INN: <i>Emplastris collagenosa</i> ATC: V20 (1)Przewlekle owrządzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	wyk: EAN ~ 123803 ConvaTec Polska Sp. z o.o.
<b>Aquacel® Ag+ Extra:</b> opatrunek [wzmocniony w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra] <b>10x10 cm</b> - 1 szt.	WM 100% <b>24,51</b> Limit <b>22,72</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>8,61</b> B <sup>(2)</sup> <b>1,79</b>	<b>Aquacel® Ag Foam:</b> opatrunek leczniczy piankowy [przylepny w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra] <b>20x16,9 cm</b> - 1 szt.	WM 100% <b>78,57</b> Limit <b>76,81</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>24,80</b> B <sup>(2)</sup> <b>1,76</b>
INN: <i>Emplastris collagenosa</i> ATC: V20 (1)Przewlekle owrządzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	wyk: EAN ~ 132027 ConvaTec Polska Sp. z o.o.	INN: <i>Emplastris collagenosa</i> ATC: V20 (1)Przewlekle owrządzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	wyk: EAN ~ 123810 ConvaTec Polska Sp. z o.o.
<b>Aquacel® Ag+ Extra:</b> opatrunek [wzmocniony w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra] <b>15x15 cm</b> - 1 szt.	WM 100% <b>51,13</b> Limit <b>51,13</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>15,34</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Aquacel® Ag Foam:</b> opatrunek leczniczy piankowy [przylepny w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra] <b>21x21 cm</b> - 1 szt.	WM 100% <b>100,43</b> Limit <b>100,21</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>30,28</b> B <sup>(2)</sup> <b>0,22</b>
INN: <i>Emplastris collagenosa</i> ATC: V20 (1)Przewlekle owrządzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	wyk: EAN ~ 132034 ConvaTec Polska Sp. z o.o.	INN: <i>Emplastris collagenosa</i> ATC: V20 (1)Przewlekle owrządzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	wyk: EAN ~ 123797 ConvaTec Polska Sp. z o.o.
<b>Aquacel® Ag+ Extra:</b> opatrunek [wzmocniony w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra] <b>20x30 cm</b> - 1 szt.	WM 100% <b>128,24</b> Limit <b>128,24</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>38,47</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Aquacel® Ag Foam:</b> opatrunek leczniczy piankowy [przylepny w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra] <b>25x30 cm</b> - 1 szt.	WM 100% <b>166,26</b> Limit <b>166,26</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>49,88</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Emplastris collagenosa</i> ATC: V20 (1)Przewlekle owrządzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	wyk: EAN ~ 132041 ConvaTec Polska Sp. z o.o.	INN: <i>Emplastris collagenosa</i> ATC: V20 (1)Przewlekle owrządzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	wyk: EAN ~ 129201 ConvaTec Polska Sp. z o.o.
<b>Aquacel® Ag Foam:</b> opatrunek leczniczy piankowy [nieprzylepny w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra] <b>10x10 cm</b> - 1 szt.	WM 100% <b>26,00</b> Limit <b>22,72</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>10,10</b> B <sup>(2)</sup> <b>3,28</b>	<b>Aquacel® Extra:</b> opatrunek hydrofibrer z dodatkiem włókien wzmacniających <b>5x5 cm</b> - 1 szt.	WM 100% <b>5,11</b> Limit <b>3,56</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>2,62</b> B <sup>(2)</sup> <b>1,55</b>
INN: <i>Emplastris collagenosa</i> ATC: V20 (1)Przewlekle owrządzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	wyk: EAN ~ 123889 ConvaTec Polska Sp. z o.o.	INN: <i>Emplastris microfibrericum cellulosa</i> ATC: V20 (1)Przewlekle owrządzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	wyk: EAN ~ 125586 ConvaTec Polska Sp. z o.o.
<b>Odpowiedniki:</b> Aquacel® Ag Foam [26,00], Aquacel® Ag Foam [26,00]			
<b>Aquacel® Ag Foam:</b> opatrunek leczniczy piankowy [nieprzylepny w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra] <b>15x15 cm</b> - 1 szt.	WM 100% <b>53,93</b> Limit <b>51,13</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>18,14</b> B <sup>(2)</sup> <b>2,80</b>	<b>Aquacel® Extra:</b> opatrunek hydrofibrer z dodatkiem włókien wzmacniających <b>10x10 cm</b> - 1 szt.	WM 100% <b>15,36</b> Limit <b>14,24</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,39</b> B <sup>(2)</sup> <b>1,12</b>
INN: <i>Emplastris collagenosa</i> ATC: V20 (1)Przewlekle owrządzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	wyk: EAN ~ 123896 ConvaTec Polska Sp. z o.o.	INN: <i>Emplastris microfibrericum cellulosa</i> ATC: V20 (1)Przewlekle owrządzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	wyk: EAN ~ 125616 ConvaTec Polska Sp. z o.o.
<b>Aquacel® Ag Foam:</b> opatrunek leczniczy piankowy [nieprzylepny w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra] <b>15x20 cm</b> - 1 szt.	WM 100% <b>70,31</b> Limit <b>68,17</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>22,59</b> B <sup>(2)</sup> <b>2,14</b>	<b>Odpowiedniki:</b> Kliniderm® Superabsorbent [12,48], UργοSuperSuperabsorber [12,89], Kliniderm Lite Foam Silicone Border [13,52], Kliniderm® Foam Border Silicone [13,52], Kliniderm® Foam Silicone [13,52], Kliniderm® Lite Foam Silicone [13,52], Mepilex Border Flex Lite [13,52], Aquacel® Foam [14,73], Aquacel® Extra [15,36]	
INN: <i>Emplastris collagenosa</i> ATC: V20 (1)Przewlekle owrządzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	wyk: EAN ~ 129164 ConvaTec Polska Sp. z o.o.	<b>Aquacel® Extra:</b> opatrunek hydrofibrer z dodatkiem włókien wzmacniających <b>15x15 cm</b> - 1 szt.	WM 100% <b>32,46</b> Limit <b>32,04</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>10,03</b> B <sup>(2)</sup> <b>0,42</b>
<b>Aquacel® Ag Foam:</b> opatrunek leczniczy piankowy [nieprzylepny w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra] <b>20x20 cm</b> - 1 szt.	WM 100% <b>91,62</b> Limit <b>90,90</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>27,99</b> B <sup>(2)</sup> <b>0,72</b>	INN: <i>Emplastris microfibrericum cellulosa</i> ATC: V20 (1)Przewlekle owrządzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	wyk: EAN ~ 125630 ConvaTec Polska Sp. z o.o.
INN: <i>Emplastris collagenosa</i> ATC: V20 (1)Przewlekle owrządzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	wyk: EAN ~ 123902 ConvaTec Polska Sp. z o.o.	<b>Odpowiedniki:</b> Mepilex Border Flex [28,41], Mepilex Border Flex Lite [28,84], Kliniderm Lite Foam Silicone Border [28,85], Kliniderm® Foam Border Silicone [28,85], Kliniderm® Foam Silicone [28,85], Kliniderm® Lite Foam Silicone [28,85], Aquacel® Foam [31,04], Aquacel® Extra [32,46]	
<b>Aquacel® Ag Foam:</b> opatrunek leczniczy piankowy [przylepny w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra] <b>10x10 cm</b> - 1 szt.	WM 100% <b>26,00</b> Limit <b>22,72</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>10,10</b> B <sup>(2)</sup> <b>3,28</b>	<b>Aquacel® Foam:</b> opatrunek leczniczy [nieprzylepny] <b>10x10 cm</b> - 1 szt.	WM 100% <b>14,73</b> Limit <b>14,24</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>4,76</b> B <sup>(2)</sup> <b>0,49</b>
INN: <i>Emplastris collagenosa</i> ATC: V20 (1)Przewlekle owrządzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	wyk: EAN ~ 127153 ConvaTec Polska Sp. z o.o.	INN: <i>Emplastris microfibrericum cellulosa</i> ATC: V20 (1)Przewlekle owrządzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	wyk: EAN ~ 123834 ConvaTec Polska Sp. z o.o.
<b>Odpowiedniki:</b> Kliniderm® Superabsorbent [12,48], UργοSuperSuperabsorber [12,89], Kliniderm Lite Foam Silicone Border [13,52], Kliniderm® Foam Border Silicone [13,52], Kliniderm® Foam Silicone [13,52], Kliniderm® Lite Foam Silicone [13,52], Mepilex Border Flex Lite [13,52], Aquacel® Foam [14,73], Aquacel® Extra [15,36]			
<b>Aquacel® Ag Foam:</b> opatrunek leczniczy piankowy [przylepny w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra] <b>12,5x12,5 cm</b> - 1 szt.	WM 100% <b>38,48</b> Limit <b>35,51</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>13,62</b> B <sup>(2)</sup> <b>2,97</b>	<b>Aquacel® Foam:</b> opatrunek leczniczy [nieprzylepny] <b>15x20 cm</b> - 1 szt.	WM 100% <b>40,28</b> Limit <b>40,28</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>12,08</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Emplastris collagenosa</i> ATC: V20 (1)Przewlekle owrządzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	wyk: EAN ~ 123773 ConvaTec Polska Sp. z o.o.	INN: <i>Emplastris microfibrericum cellulosa</i> ATC: V20 (1)Przewlekle owrządzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	wyk: EAN ~ 123865 ConvaTec Polska Sp. z o.o.
<b>Aquacel® Ag Foam:</b> opatrunek leczniczy piankowy [przylepny w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra] <b>17,5x17,5 cm</b> - 1 szt.	WM 100% <b>71,11</b> Limit <b>69,59</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>22,40</b> B <sup>(2)</sup> <b>1,52</b>	<b>Odpowiedniki:</b> Kliniderm® Foam Border Silicone [37,35], Aquacel® Foam [40,28], Mepilex Transfer [55,72]	
INN: <i>Emplastris collagenosa</i> ATC: V20 (1)Przewlekle owrządzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	wyk: EAN ~ 123780 ConvaTec Polska Sp. z o.o.	<b>Aquacel® Foam:</b> opatrunek leczniczy [nieprzylepny] <b>15x15 cm</b> - 1 szt.	WM 100% <b>31,04</b> Limit <b>31,04</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>9,31</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Emplastris microfibrericum cellulosa</i> ATC: V20 (1)Przewlekle owrządzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	wyk: EAN ~ 123841 ConvaTec Polska Sp. z o.o.	<b>Odpowiedniki:</b> Mepilex Border Flex [28,41], Mepilex Border Flex Lite [28,84], Kliniderm Lite Foam Silicone Border [28,85], Kliniderm® Foam Border Silicone [28,85], Kliniderm® Foam Silicone [28,85], Kliniderm® Lite Foam Silicone [28,85], Aquacel® Foam [31,04], Aquacel® Extra [32,46]	



ZAKODOWANY DO WALKI  
Z ZAKAŻENIEM

<b>Aquacel® Foam:</b> opatrunek leczniczy [nieprzylepny] <b>20x20 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>52,18</b> Limit <b>52,18</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>15,65</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>		<b>Aramlessa:</b> tabl. <b>5/5 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100% <b>12,29</b> Limit <b>5,58</b> R <sup>(1)</sup> <b>9,91</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Emplastri microfibrinum cellulosae</i> ATC: V20 wyk: EAN ~ 123858 (1)Przewłokle owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N ConvaTec Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Kliniderm® Superabsorbent [43,67], Kliniderm® Foam Silcone [48,68], <b>Aquacel® Foam</b> [52,18]				INN: <i>Perindopril arginine + Amlodipine</i> ATC: C09BB04 wyk: B EAN ~ 745523 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D <b>Krka Polska Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: <b>Aramlessa</b> [12,29], Co-Prestarium® [20,42]		
<b>Aquacel® Foam:</b> opatrunek leczniczy [przylepny] <b>10x10 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>14,73</b> Limit <b>14,24</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>4,76</b> B <sup>(2)</sup> <b>0,49</b>		<b>Aramlessa:</b> tabl. <b>10/10 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100% <b>24,23</b> Limit <b>11,17</b> R <sup>(1)</sup> <b>19,46</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Emplastri microfibrinum cellulosae</i> ATC: V20 wyk: EAN ~ 127115 (1)Przewłokle owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N ConvaTec Polska Sp. z o.o.				INN: <i>Perindopril arginine + Amlodipine</i> ATC: C09BB04 wyk: B EAN ~ 745554 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D <b>Krka Polska Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: <b>Aramlessa</b> [24,23], Co-Prestarium® [31,67]		
<b>Aquacel® Foam:</b> opatrunek leczniczy [przylepny] <b>12,5x12,5 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>22,25</b> Limit <b>22,25</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>6,68</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>		<b>Aramlessa:</b> tabl. <b>10/5 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100% <b>24,23</b> Limit <b>11,17</b> R <sup>(1)</sup> <b>19,46</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Emplastri microfibrinum cellulosae</i> ATC: V20 wyk: EAN ~ 123711 (1)Przewłokle owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N ConvaTec Polska Sp. z o.o.				INN: <i>Perindopril arginine + Amlodipine</i> ATC: C09BB04 wyk: B EAN ~ 745547 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D <b>Krka Polska Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: <b>Aramlessa</b> [24,23], Co-Prestarium® [31,67]		
<b>Aquacel® Foam:</b> opatrunek leczniczy [przylepny] <b>14x19,8 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>37,46</b> Limit <b>37,46</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>11,24</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>		<b>Arava® 10 mg:</b> tabl. <b>10 mg</b> - 30 szt.	Rx-z	100% <b>64,20</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>9,83</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Emplastri microfibrinum cellulosae</i> ATC: V20 wyk: EAN ~ 123759 (1)Przewłokle owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N ConvaTec Polska Sp. z o.o.				INN: <i>Leflunomide</i> ATC: L04AA13 wyk: B EAN ~ 977826 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów WP: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X <b>Sanofi-Aventis Deutschland GmbH</b> Odpowiedniki: Leflunomide Zentiva [X], Leflunomid Egis [59,04], Leflunomid Bluefish [59,62], Leflunomide medac [60,76], <b>Arava® 10 mg</b> [64,20]		
<b>Aquacel® Foam:</b> opatrunek leczniczy [przylepny] <b>16,9x20 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>44,96</b> Limit <b>44,96</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>13,49</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>		<b>Arava® 20 mg:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 30 szt.	Rx-z	100% <b>120,86</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>8,93</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Emplastri microfibrinum cellulosae</i> ATC: V20 wyk: EAN ~ 123766 (1)Przewłokle owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N ConvaTec Polska Sp. z o.o.				INN: <i>Leflunomide</i> ATC: L04AA13 wyk: B EAN ~ 977925 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów WP: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X <b>Sanofi-Aventis Deutschland GmbH</b> Odpowiedniki: Leflunomide Zentiva [X], Leflunomide Orion [102,53], <b>Arava® - (IR)</b> [109,37], <b>Arava® - (IR)</b> [109,41], Leflunomid Bluefish [109,41], Leflunomide medac [115,13], Leflunomide Sandoz [115,13], <b>Arava® 20 mg</b> [120,86]		
<b>Aquacel® Foam:</b> opatrunek leczniczy [przylepny] <b>17,5x17,5 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>41,05</b> Limit <b>41,05</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>12,32</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>		<b>Arava® - (IR):</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 30 szt.	Rx-z	100% <b>109,37</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Emplastri microfibrinum cellulosae</i> ATC: V20 wyk: EAN ~ 123728 (1)Przewłokle owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N ConvaTec Polska Sp. z o.o.				INN: <i>Leflunomide</i> ATC: L04AA13 wyk: B EAN ~ 600482 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów WP: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X <b>Delfarma Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: Leflunomide Zentiva [X], Leflunomide Orion [102,53], <b>Arava® - (IR)</b> [109,37], <b>Arava® - (IR)</b> [109,41], Leflunomid Bluefish [109,41], Leflunomide medac [115,13], Leflunomide Sandoz [115,13], <b>Arava® 20 mg</b> [120,86]		
<b>Aquacel® Foam:</b> opatrunek leczniczy [przylepny] <b>21x21 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>57,27</b> Limit <b>57,27</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>17,18</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>		<b>Arava® - (IR):</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 30 szt.	Rx-z	100% <b>109,37</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Emplastri microfibrinum cellulosae</i> ATC: V20 wyk: EAN ~ 123735 (1)Przewłokle owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N ConvaTec Polska Sp. z o.o.				INN: <i>Leflunomide</i> ATC: L04AA13 wyk: B EAN ~ 274339 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów WP: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X <b>Inpharm Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: Leflunomide Zentiva [X], Leflunomide Orion [102,53], <b>Arava® - (IR)</b> [109,37], Leflunomid Bluefish [109,41], <b>Arava® - (IR)</b> [109,41], Leflunomide medac [115,13], Leflunomide Sandoz [115,13], <b>Arava® 20 mg</b> [120,86]		
<b>Aquacel® Foam:</b> opatrunek leczniczy [przylepny] <b>25x30 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>93,64</b> Limit <b>93,64</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>28,09</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>		<b>Aqua-Gel®:</b> opatrunek leczniczy <b>6x12 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>10,92</b> Limit <b>9,57</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>4,22</b> B <sup>(2)</sup> <b>1,35</b>
INN: <i>Emplastri microfibrinum cellulosae</i> ATC: V20 wyk: EAN ~ 123742 (1)Przewłokle owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N ConvaTec Polska Sp. z o.o.				INN: <i>Emplastri hydrolymeryosa</i> ATC: V20 wyk: EAN ~ 000032 (1)Przewłokle owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N KIKGEL		
<b>Aqua-Gel®:</b> opatrunek leczniczy <b>10x12 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>7,65</b> Limit <b>5,74</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>3,63</b> B <sup>(2)</sup> <b>1,91</b>		<b>Aqua-Gel®:</b> opatrunek leczniczy <b>12x12 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>12,87</b> Limit <b>11,48</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>4,83</b> B <sup>(2)</sup> <b>1,39</b>
INN: <i>Emplastri hydrolymeryosa</i> ATC: V20 wyk: EAN ~ 000056 (1)Przewłokle owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N KIKGEL				INN: <i>Emplastri hydrolymeryosa</i> ATC: V20 wyk: EAN ~ 000063 (1)Przewłokle owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N KIKGEL		
<b>Aqua-Gel®:</b> opatrunek leczniczy <b>12x24 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>22,96</b> Limit <b>22,96</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>6,89</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>		<b>Aqua-Gel®:</b> opatrunek leczniczy <b>12x24 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>22,96</b> Limit <b>22,96</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>6,89</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Emplastri hydrolymeryosa</i> ATC: V20 wyk: EAN ~ 000070 (1)Przewłokle owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N KIKGEL						



<b>Arechin®:</b> tabl. 250 mg - 30 szt. (blistry) ◆	Rx	100% <b>20,18</b> Limit <b>20,18</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>6,05</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Chloroquine diphosphate</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; porfiria skórna późna(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Adamed Sp. z o.o.	ATC: P01BA01	wyk: B	EAN ~ 139582		
<b>Areplex®:</b> tabl. powł. 75 mg - 28 szt.	Rx	100% <b>34,83</b> Limit <b>26,33</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>14,76</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Clopidogrel</i> (1) Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania, Miażdżycza objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Adamed Sp. z o.o.	ATC: B01AC04	wyk: B	EAN ~ 167011		
Odpowiedniki: Clopidogrel Teva [X], Trombex [X], Clopidogrel Genoptim [14,40], Zyllt - (IR) [21,32], Zyllt® - (IR) [21,35], Clopidogrel Bluefish [21,75], Agrexex - (IR) [21,80], Agrexex - (IR) [22,36], Agrexex - (IR) [22,38], Grepid [22,95], Pegorel [22,95], Clopidogrel KRKA [23,52], Zyllt® [23,52], Clopidogrel Apotex [25,70], Clopidogrel Aurovit-as [25,76], Agrexex [25,80], Clopidix [26,33], Flavocorin® [27,08], <b>Areplex®</b> [34,83]					
<b>Argadopin:</b> tabl. 100 mg - 50 szt. ◆	Rx	100% <b>8,65</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Allopurinol</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sandoz GmbH	ATC: M04AA01	wyk: B	EAN ~ 706505		
Odpowiedniki: Dnor [8,64], <b>Argadopin</b> [8,65], Allupol® [8,81], Milurit® [9,02]					
<b>Argadopin:</b> tabl. 100 mg - 100 szt. ◆	Rx	100% <b>16,23</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Allopurinol</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sandoz GmbH	ATC: M04AA01	wyk: B	EAN ~ 706529		
<b>Argadopin:</b> tabl. 300 mg - 30 szt. ◆	Rx	100% <b>14,75</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Allopurinol</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sandoz GmbH	ATC: M04AA01	wyk: B	EAN ~ 706604		
Odpowiedniki: Dnor [14,74], <b>Argadopin</b> [14,75], Allupol® [15,46], Milurit® [15,57]					
<b>Argadopin:</b> tabl. 300 mg - 100 szt. ◆	Rx	100% <b>44,17</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>8,00</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Allopurinol</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sandoz GmbH	ATC: M04AA01	wyk: B	EAN ~ 706628		
<b>Aribit:</b> tabl. 10 mg - 56 szt. ◆	Rx	100% <b>134,39</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,62</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Aripiprazole</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA	ATC: N05AX12	wyk: B	EAN ~ 463284		
Odpowiedniki: Arpixor [127,42], Abilify® [134,39], <b>Aribit</b> [134,39], Apra [145,97], Aryzalera [160,39], Aripiprazole Sandoz [163,14]					
<b>Aribit:</b> tabl. 15 mg - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>100,98</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,06</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Aripiprazole</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA	ATC: N05AX12	wyk: B	EAN ~ 463314		
Odpowiedniki: Aripiprazole Glenmark [X], Abilify® - (IR) [86,03], Abilify® - (IR) [86,05], Aripiprazole Orion [87,65], Aricogan [96,93], Arpixor [97,91], Apiprax [100,14], Asduter [100,98], Abilify® [105,54], Aripilek [106,09], Explemed [106,21], Apra [109,87], Aripiprazole Aurovit-as [120,09], Aryzalera [122,62], Aripiprazole Sandoz [125,84]					
<b>Aribit:</b> tabl. 15 mg - 56 szt. ◆	Rx	100% <b>201,22</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>5,13</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Aripiprazole</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA	ATC: N05AX12	wyk: B	EAN ~ 463338		
Odpowiedniki: Abilify® - (IR) [162,19], Abilify® - (IR) [162,23], Arpixor [185,95], Abilify® [201,16], Apra [201,22], Aripilek [201,22], Explemed [201,22], <b>Aribit</b> [201,22], Aryzalera [235,37], Aripiprazole Sandoz [243,23]					
<b>Aribit:</b> tabl. 30 mg - 56 szt. ◆	Rx	100% <b>402,10</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>10,16</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Aripiprazole</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA	ATC: N05AX12	wyk: B	EAN ~ 463383		
Odpowiedniki: Arpixor [358,95], Abilify® [389,49], <b>Aribit</b> [402,10]					
<b>Aribit ODT:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>100,98</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,60</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Aripiprazole</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA	ATC: N05AX12	wyk: B	EAN ~ 251475		
Odpowiedniki: Aribit ODT [100,98], Apra-swift [109,87], Aripiprazole Aurovit-as [120,09]					
<b>Aricogan:</b> tabl. 15 mg - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>96,93</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Aripiprazole</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.	ATC: N05AX12	wyk: B	EAN ~ 265526		
Odpowiedniki: Aripiprazole Glenmark [X], Abilify® - (IR) [86,03], Abilify® - (IR) [86,05], Aripiprazole Orion [87,65], <b>Aricogan</b> [96,93], Arpixor [97,91], Apiprax [100,14], Aribit [100,98], Asduter [100,98], Abilify® [105,54], Aripilek [106,09], Explemed [106,21], Apra [109,87], Aripiprazole Aurovit-as [120,09], Aryzalera [122,62], Aripiprazole Sandoz [125,84]					
<b>Aridya:</b> tabl. powł. 2 mg - 28 szt.	Rx	100% <b>38,45</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>5,23</b>			
INN: <i>Dienogest</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Endometrioza   Kat. ciąży: X Aristo Pharma Sp. z o.o.	ATC: G03DB08	wyk: B	EAN ~ 143070		
Odpowiedniki: Diemono - (IR) [37,59], Diemono - (IR) [37,65], Zafrilla [37,76], <b>Aridya</b> [38,45], Symdieno [39,59], Endovelle [39,82], Probella [42,10], Diemono [42,11], Visanne® [62,37]					
<b>Arimidex®:</b> tabl. powł. 1 mg - 28 szt.	Rx	100% <b>64,43</b> Limit <b>52,94</b> B <sup>(1)</sup> <b>11,49</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Anastrozole</i> (1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii WP: Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.	ATC: L02BG03	wyk: B	EAN ~ 756711		
Odpowiedniki: Anastrozole Eugia [48,81], Anastrozole Bluefish [52,36], Atrozol [56,41], Anastrozole Teva [59,51], Apo-Nastrol [60,98], Egistrozol [61,00], <b>Arimidex®</b> [64,43]					
<b>Aripilek:</b> tabl. 10 mg - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>69,27</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>5,42</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Aripiprazole</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.	ATC: N05AX12	wyk: B	EAN ~ 232733		
Odpowiedniki: Arpixor [67,44], <b>Aripilek</b> [69,27], Asduter [70,92], Apra [76,71], Aryzalera [83,93], Aripiprazole Sandoz [84,73], Abilify® [523,63]					

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

<b>Aripilek: tabl. 15 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>106,09</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>8,71</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	106,09		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	8,71		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Aripiprazole Aurovitas: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 28 szt.</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>120,09</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>22,71</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	120,09		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	22,71		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx	100%	106,09																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	8,71																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	120,09																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	22,71																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
INN: <i>Aripiprazole</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Aryprazolol Glenmark [X], Abilify® - (IR) [86.03], Abilify® - (IR) [86.05], Aripiprazole Orion [87.65], Aricogan [96.93], Arpixon [97.91], Apiprax [100.14], Aribit [100.98], Asduter [100.98], Abilify® [105.54], Aripilek [106.09], Explemed [106.21], Apra [109.87], Aripiprazole Aurovitas [120.09], Aryzalera [122.62], Aripiprazole Sandoz [125.84]	ATC: N05AX12 wyk: B EAN ~ 232832 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.	INN: <i>Aripiprazole</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Aribit ODT [100.98], Apra-swift [109.87], Aripiprazole Aurovitas [120.09]	ATC: N05AX12 wyk: B EAN ~ 127022 Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.																														
<b>Aripilek: tabl. 15 mg - 30 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>113,17</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>8,61</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	113,17		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	8,61		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Aripiprazole Orion: tabl. 15 mg - 28 szt.</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>87,65</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	87,65		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	3,20		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx	100%	113,17																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	8,61																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	87,65																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	3,20																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
INN: <i>Aripiprazole</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Aripilek [113,17], Aripiprazole +pharma [116,15]	ATC: N05AX12 wyk: B EAN ~ 232849 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.	(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Aryprazolol Glenmark [X], Abilify® - (IR) [86.03], Abilify® - (IR) [86.05], Aripiprazole Orion [87.65], Aricogan [96.93], Arpixon [97.91], Apiprax [100.14], Aribit [100.98], Asduter [100.98], Abilify® [105.54], Aripilek [106.09], Explemed [106.21], Apra [109.87], Aripiprazole Aurovitas [120.09], Aryzalera [122.62], Aripiprazole Sandoz [125.84]	ATC: N05AX12 wyk: B EAN ~ 126385 Orion Pharma Poland Sp. o.o.																														
<b>Aripilek: tabl. 15 mg - 56 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>201,22</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>6,03</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	201,22		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	6,03		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Aripiprazole Sandoz: tabl. 10 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>84,73</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>20,88</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	84,73		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	20,88		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx	100%	201,22																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	6,03																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	84,73																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	20,88																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
INN: <i>Aripiprazole</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Abilify® - (IR) [162.19], Abilify® - (IR) [162.23], Arpixon [185.95], Abilify® [201.16], Apra [201.22], Aribit [201.22], Explemed [201.22], Aripilek [201.22], Aryzalera [235.37], Aripiprazole Sandoz [243.23]	ATC: N05AX12 wyk: B EAN ~ 232856 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.	(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Arpixon [67.44], Aripilek [69.27], Asduter [70.92], Apra [76.71], Aryzalera [83.93], Aripiprazole Sandoz [84.73], Abilify® [523.63]	ATC: N05AX12 wyk: B EAN ~ 705690 Sandoz GmbH																														
<b>Aripilek: tabl. 15 mg - 60 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>184,35</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>6,40</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	184,35		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	6,40		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Aripiprazole Sandoz: tabl. 10 mg - 56 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>163,14</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>33,01</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	163,14		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	33,01		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx	100%	184,35																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	6,40																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	163,14																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	33,01																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
INN: <i>Aripiprazole</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Aripiprazole Sandoz [163,14]	ATC: N05AX12 wyk: B EAN ~ 232863 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.	(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Arpixon [127.42], Abilify® [134.39], Aribit [134.39], Apra [145.97], Aryzalera [160.39], Aripiprazole Sandoz [163,14]	ATC: N05AX12 wyk: B EAN ~ 705713 Sandoz GmbH																														
<b>Aripilek: tabl. 15 mg - 90 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>323,19</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>9,60</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	323,19		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	9,60		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Aripiprazole Sandoz: tabl. 15 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>125,84</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>28,46</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	125,84		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	28,46		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx	100%	323,19																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	9,60																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	125,84																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	28,46																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
INN: <i>Aripiprazole</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: N05AX12 wyk: B EAN ~ 232887 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.	INN: <i>Aripiprazole</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: N05AX12 wyk: B EAN ~ 705836 Sandoz GmbH																														
<b>Aripilek: tabl. 30 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>201,22</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>6,03</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	201,22		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	6,03		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Aripiprazole Sandoz: tabl. 15 mg - 56 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>243,23</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>48,04</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	243,23		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	48,04		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx	100%	201,22																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	6,03																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	243,23																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	48,04																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
INN: <i>Aripiprazole</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Abilify® [X], Arpixon [185.95], Aripilek [201.22], Apra [204.32], Aryzalera [221.76]	ATC: N05AX12 wyk: B EAN ~ 232931 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.	(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Abilify® - (IR) [162.19], Abilify® - (IR) [162.23], Arpixon [185.95], Abilify® [201.16], Apra [201.22], Aribit [201.22], Aripilek [201.22], Explemed [201.22], Aryzalera [235.37], Aripiprazole Sandoz [243.23]	ATC: N05AX12 wyk: B EAN ~ 705850 Sandoz GmbH																														
<b>Aripiprazole +pharma: tabl. 15 mg - 30 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>116,15</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>11,59</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	116,15		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	11,59		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Aripiprazole Sandoz: tabl. 15 mg - 56 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>17,79</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>14,11</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>7,91</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	17,79		Limit	14,11		30% <sup>(1)</sup>	7,91		S <sup>(3)</sup>	bezpł.			
Rx	100%	116,15																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	11,59																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	17,79																															
	Limit	14,11																															
	30% <sup>(1)</sup>	7,91																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
INN: <i>Aripiprazole</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Aripilek [113,17], Aripiprazole +pharma [116,15]	ATC: N05AX12 wyk: B EAN ~ 014024 +pharma Polska Sp. z o.o.	<b>Arketis: tabl. 20 mg - 30 szt.</b>	ATC: N06AB05 wyk: B EAN ~ 047109 Vipharm SA																														
<b>Aripiprazole Aurovitas: tabl. 15 mg - 28 szt.</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>120,09</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>22,71</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	120,09		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	22,71		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Arketis: tabl. 20 mg - 30 szt.</b>	(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Paroxetine Aurovitas [13.55], Paroxinor [13.78], Xetanor 20 mg [16.36], Arketis [17.79], Parogen [19.16], Rextin® [19.39], Paxtin 20 [19.50]															
Rx	100%	120,09																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	22,71																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
INN: <i>Aripiprazole</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Aryprazolol Glenmark [X], Abilify® - (IR) [86.03], Abilify® - (IR) [86.05], Aripiprazole Orion [87.65], Aricogan [96.93], Arpixon [97.91], Apiprax [100.14], Aribit [100.98], Asduter [100.98], Abilify® [105.54], Aripilek [106.09], Explemed [106.21], Apra [109.87], Aripiprazole Aurovitas [120.09], Aryzalera [122.62], Aripiprazole Sandoz [125.84]	ATC: N05AX12 wyk: B EAN ~ 133995 Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.																																



<b>Aromek™</b> : tabl. powł. 2,5 mg - 30 szt.	Rx	100%	<b>56,72</b>
		Limit	<b>56,72</b>
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Letrozole** ATC: L02BG04 wyk: A EAN ~ 060718

(1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii WP: Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Celon Pharma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Letrozole Bluefish [55,81], Letrozole Aurovitas [56,61], Lametta® [56,72], Aromek™ [56,72], Clazrole [61,54], Etruzil [61,54]

<b>Aropilo</b> : tabl. powł. 0,25 mg - 210 szt. ◆	Rx	100%	<b>35,93</b>
		Limit	<b>27,44</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>16,72</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Ropinirole** ATC: N04BC04 wyk: B EAN ~ 731954

(1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Vipharm SA

Odpowiedniki: Aropilo [35,93], ReQuip™ [83,53]

<b>Aropilo</b> : tabl. powł. 0,5 mg - 21 szt. ◆	Rx	100%	<b>8,36</b>
		Limit	<b>5,49</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>4,52</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Ropinirole** ATC: N04BC04 wyk: B EAN ~ 731985

(1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Vipharm SA

Odpowiedniki: ReQuip™ [8,33], Aropilo [8,36]

<b>Aropilo</b> : tabl. powł. 1 mg - 21 szt. ◆	Rx	100%	<b>15,28</b>
		Limit	<b>10,98</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>7,59</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Ropinirole** ATC: N04BC04 wyk: B EAN ~ 732074

(1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Vipharm SA

Odpowiedniki: ReQuip™ [15,28], Aropilo [15,28]

<b>Aropilo</b> : tabl. powł. 2 mg - 21 szt. ◆	Rx	100%	<b>29,26</b>
		Limit	<b>21,95</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>13,90</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Ropinirole** ATC: N04BC04 wyk: B EAN ~ 732227

(1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Vipharm SA

Odpowiedniki: Aropilo [29,26], ReQuip™ [30,64]

<b>Aropilo</b> : tabl. powł. 5 mg - 21 szt. ◆	Rx	100%	<b>58,10</b>
		Limit	<b>54,89</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>19,68</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Ropinirole** ATC: N04BC04 wyk: B EAN ~ 732333

(1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Vipharm SA

Odpowiedniki: Aropilo [58,10], ReQuip™ [71,47]

<b>Aropilo SR</b> : tabl. o przedl. uwalnianiu 2 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>34,57</b>
		Limit	<b>29,27</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>14,08</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Ropinirole** ATC: N04BC04 wyk: B EAN ~ 998586

(1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Vipharm SA

Odpowiedniki: Aparxon PR [29,93], Ceurolex SR [32,28], Aropilo SR [34,57], Repirol SR [37,31], Requip-Modutab [37,99], Ropodrin [38,57], ApoRopin [39,72], Rolpryna SR [40,29], Nironovo SR [40,60], Polpix SR [40,63]

<b>Aropilo SR</b> : tabl. o przedl. uwalnianiu 4 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>66,44</b>
		Limit	<b>58,54</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>25,46</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Ropinirole** ATC: N04BC04 wyk: B EAN ~ 998982

(1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Vipharm SA

Odpowiedniki: Rolpryna SR - (IR) [54,97], Aparxon PR [56,36], Aropilo SR [66,44], Ceurolex SR [70,22], Repirol SR [70,79], Requip-Modutab [72,65], Ropodrin [73,30], ApoRopin [75,59], Rolpryna SR [76,74], Nironovo SR [77,35], Polpix SR [77,43]

<b>Aropilo SR</b> : tabl. o przedl. uwalnianiu 8 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>123,10</b>
		Limit	<b>117,09</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>41,14</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Ropinirole** ATC: N04BC04 wyk: B EAN ~ 999156

(1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Vipharm SA

Odpowiedniki: Rolpryna SR - (IR) [103,59], Aparxon PR [111,19], Aropilo SR [123,10], Ceurolex SR [134,54], Repirol SR [136,03], Requip-Modutab [138,38], Ropodrin [140,27], ApoRopin [144,85], Rolpryna SR [147,14], Nironovo SR [148,37], Polpix SR [148,53]

<b>Arpinox</b> : tabl. 5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>35,92</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>5,59</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Aripiprazole** ATC: N05AX12 wyk: B EAN ~ 140463

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Neuroxpharm Arzneimittel GmbH

<b>Arpinox</b> : tabl. 5 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	<b>67,44</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,59</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Aripiprazole** ATC: N05AX12 wyk: B EAN ~ 140464

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Neuroxpharm Arzneimittel GmbH

<b>Arpinox</b> : tabl. 10 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>67,44</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,59</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Aripiprazole** ATC: N05AX12 wyk: B EAN ~ 140465

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Neuroxpharm Arzneimittel GmbH

Odpowiedniki: Arpinox [67,44], Aripilek [69,27], Asduter [70,92], Apra [76,71], Aryzalera [83,93], Aripiprazole Sandoz [84,73], Abilify® [523,63]

<b>Arpinox</b> : tabl. 10 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	<b>127,42</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,98</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Aripiprazole** ATC: N05AX12 wyk: B EAN ~ 140466

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Neuroxpharm Arzneimittel GmbH

Odpowiedniki: Arpinox [127,42], Abilify® [134,39], Aribit [134,39], Apra [145,97], Aryzalera [160,39], Aripiprazole Sandoz [163,14]

<b>Arpinox</b> : tabl. 15 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>97,91</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Aripiprazole** ATC: N05AX12 wyk: B EAN ~ 140467

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Neuroxpharm Arzneimittel GmbH

Odpowiedniki: Aripiprazol Glenmark [X], Abilify® - (IR) [86,03], Abilify® - (IR) [86,05], Aripiprazole Orion [87,65], Aricoan [96,93], Arpinox [97,91], Apiprax [100,14], Aribit [100,98], Asduter [100,98], Abilify® [105,54], Aripilek [106,09], Explemed [106,21], Apra [109,87], Aripiprazole Aurovitas [120,09], Aryzalera [122,62], Aripiprazole Sandoz [125,84]

<b>Arpinox</b> : tabl. 15 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	<b>185,95</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>5,97</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Aripiprazole** ATC: N05AX12 wyk: B EAN ~ 140468

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Neuroxpharm Arzneimittel GmbH

Odpowiedniki: Abilify® - (IR) [162,19], Abilify® - (IR) [162,23], Arpinox [185,95], Abilify® [201,16], Apra [201,22], Aribit [201,22], Aripilek [201,22], Explemed [201,22], Aryzalera [235,37], Aripiprazole Sandoz [243,23]

<b>Arpinox</b> : tabl. 30 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>185,95</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>5,97</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Aripiprazole** ATC: N05AX12 wyk: B EAN ~ 140471

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Neuroxpharm Arzneimittel GmbH

Odpowiedniki: Abilify® [X], Arpinox [185,95], Aripilek [201,22], Apra [204,32], Aryzalera [221,76]

<b>Arpinox</b> : tabl. 30 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	<b>358,95</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>11,95</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Aripiprazole** ATC: N05AX12 wyk: B EAN ~ 140472

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Neuroxpharm Arzneimittel GmbH

Odpowiedniki: Arpinox [358,95], Abilify® [389,49], Aribit [402,10]

<b>Aryzalera: tabl. 10 mg - 28 szt. ♦</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>83,93</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>20,08</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	83,93	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	20,08	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Asamax 500: tabl. dojelitowe 500 mg - 100 szt.</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>78,96</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>7,61</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	78,96	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	7,61	S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
100%	83,93																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	20,08																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	78,96																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	7,61																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 205225 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Arpixon [67,44], Aripilek [69,27], Asduter [70,92], Apra [76,71], Aryzalera [83,93], Aripiprazole Sandoz [84,73], Abilify® [523,63]	Krka Polska Sp. z o.o.	INN: <i>Mesalazine</i>   ATC: A07EC02   wyk: B   EAN ~ 084110 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Odpowiedniki: Salaza [78,94], Asamax 500 [78,96]	Astellas Pharma Sp. z o.o.																						
<b>Aryzalera: tabl. 10 mg - 56 szt. ♦</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>160,39</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>30,26</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	160,39	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	30,26	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Asaris: prosz. do inhal. 100/50 µg/dawkę - 1 inhal. (60 dawek)</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>71,96</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>3,22</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	71,96	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	3,22	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	160,39																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	30,26																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	71,96																								
Limit	0,00																								
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	3,22																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 205256 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Arpixon [127,42], Abilify® [134,39], Aribit [134,39], Apra [145,97], Aryzalera [160,39], Aripiprazole Sandoz [163,14]	Krka Polska Sp. z o.o.	INN: <i>Fluticasone propionate + Salmeterol</i>   ATC: R03AK06   wyk: A   EAN ~ 034870 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Duexon Pro [71,85], Asaris [71,96]	Polfarmex S.A.																						
<b>Aryzalera: tabl. 15 mg - 28 szt. ♦</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>122,62</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>25,24</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	122,62	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	25,24	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Asaris: prosz. do inhal. 100/50 µg/dawkę - 3 inhal. (60 dawek)</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>199,27</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	199,27	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	3,20	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	122,62																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	25,24																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	199,27																								
Limit	0,00																								
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	3,20																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 205324 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Aripiprazol Glenmark [X], Abilify® - (IR) [86,03], Abilify® - (IR) [86,05], Aripiprazole Orion [87,65], Aricogan [96,93], Arpixon [97,91], Apiprax [100,14], Aribit [100,98], Asduter [100,98], Abilify® [105,54], Aripilek [106,09], Explemed [106,21], Apra [109,87], Aripiprazole Aurovitas [120,09], Aryzalera [122,62], Aripiprazole Sandoz [125,84]	Krka Polska Sp. z o.o.	INN: <i>Fluticasone propionate + Salmeterol</i>   ATC: R03AK06   wyk: A   EAN ~ 144852 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Duexon Pro [71,85], Salfumix Easyhaler [89,01], Asaris [90,16]	Polfarmex S.A.																						
<b>Aryzalera: tabl. 15 mg - 56 szt. ♦</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>235,37</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>40,18</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	235,37	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	40,18	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Asaris: prosz. do inhal. 250/50 µg/dawkę - 1 inhal. (60 dawek)</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>90,16</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>15,04</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	90,16	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	15,04	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	235,37																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	40,18																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	90,16																								
Limit	0,00																								
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	15,04																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 205355 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Abilify® - (IR) [162,19], Abilify® - (IR) [162,23], Arpixon [185,95], Abilify® [201,16], Apra [201,22], Aribit [201,22], Aripilek [201,22], Explemed [201,22], Aryzalera [235,37], Aripiprazole Sandoz [243,23]	Krka Polska Sp. z o.o.	INN: <i>Fluticasone propionate + Salmeterol</i>   ATC: R03AK06   wyk: A   EAN ~ 034887 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Duexon Pro [87,41], Salfumix Easyhaler [89,01], Asaris [90,16]	Polfarmex S.A.																						
<b>Aryzalera: tabl. 30 mg - 28 szt. ♦</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>221,76</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>26,57</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	221,76	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	26,57	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Asaris: prosz. do inhal. 250/50 µg/dawkę - 3 inhal. (60 dawek)</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>237,65</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>10,68</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	237,65	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	10,68	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	221,76																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	26,57																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	237,65																								
Limit	0,00																								
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	10,68																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 205423 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Abilify® [X], Arpixon [185,95], Aripilek [201,22], Apra [204,32], Aryzalera [221,76]	Krka Polska Sp. z o.o.	INN: <i>Fluticasone propionate + Salmeterol</i>   ATC: R03AK06   wyk: A   EAN ~ 144853 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Duexon Pro [103,97], Salfumix Easyhaler [106,83], Asaris [106,83]	Polfarmex S.A.																						
<b>Asamax 250: czopki 250 mg - 30 szt.</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>45,93</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>27,96</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	45,93	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	27,96	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Asaris: prosz. do inhal. 500/50 µg/dawkę - 1 inhal. (60 dawek)</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>106,83</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>16,04</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	106,83	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	16,04	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	45,93																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	27,96																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	106,83																								
Limit	0,00																								
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	16,04																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
INN: <i>Mesalazine</i>   ATC: A07EC02   wyk: B   EAN ~ 083816 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Odpowiedniki: Crohnax [29,90], Asamax 250 [45,93]	Astellas Pharma Sp. z o.o.	INN: <i>Fluticasone propionate + Salmeterol</i>   ATC: R03AK06   wyk: A   EAN ~ 034894 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Duexon Pro [103,97], Salfumix Easyhaler [106,83], Asaris [106,83]	Polfarmex S.A.																						
<b>Asamax 250: tabl. dojelitowe 250 mg - 100 szt.</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>49,45</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>15,19</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	49,45	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	15,19	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Asaris: prosz. do inhal. 500/50 µg/dawkę - 3 inhal. (60 dawek)</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>291,16</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>18,80</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	291,16	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	18,80	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	49,45																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	15,19																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	291,16																								
Limit	0,00																								
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	18,80																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
INN: <i>Mesalazine</i>   ATC: A07EC02   wyk: B   EAN ~ 084011 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Odpowiedniki: Salaza [44,82], Crohnax [49,40], Asamax 500 [88,90], Salofalk® 500 [90,99]	Astellas Pharma Sp. z o.o.	INN: <i>Fluticasone propionate + Salmeterol</i>   ATC: R03AK06   wyk: A   EAN ~ 144854 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Duexon Pro [103,97], Salfumix Easyhaler [106,83], Asaris [106,83]	Polfarmex S.A.																						
<b>Asamax 500: czopki 500 mg - 30 szt.</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>88,90</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>49,76</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	88,90	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	49,76	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Asduter: tabl. 10 mg - 28 szt. ♦</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>70,92</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>7,07</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	70,92	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	7,07	S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
100%	88,90																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	49,76																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	70,92																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	7,07																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
INN: <i>Mesalazine</i>   ATC: A07EC02   wyk: B   EAN ~ 083915 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Odpowiedniki: Salaza [44,82], Crohnax [49,40], Asamax 500 [88,90], Salofalk® 500 [90,99]	Astellas Pharma Sp. z o.o.	INN: <i>Aripiprazole</i>   ATC: N05AX12   wyk: B   EAN ~ 122969 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Arpixon [67,44], Aripilek [69,27], Asduter [70,92], Apra [76,71], Aryzalera [83,93], Aripiprazole Sandoz [84,73], Abilify® [523,63]	Vipharm SA																						



Naszym wyborem

**enarenal**  
 enalapryli maleas

Asduter: tabl. 15 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	100,98
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,60
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: *Aripiprazole* ATC: N05AX12 wyk: B EAN ~ 229733  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Odpowiedniki: Aripiprazol Glenmark [X], Abilify® - (IR) [86,03], Abilify® - (IR) [86,05], Aripiprazole Orion [87,65], Aricogan [96,93], Arpixon [97,91], Apiprax [100,14], Aribit [100,98], Asduter [100,98], Abilify® [105,54], Aripilek [106,09], Explemed [106,21], Apra [109,87], Aripiprazole Aurovitas [120,09], Aryzalera [122,62], Aripiprazole Sandoz [125,84]

Asentra®: tabl. powł. 50 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	14,50
		Limit	13,17
		30% <sup>(1)</sup>	5,28
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: *Sertraline* ATC: N06AB06 wyk: B EAN ~ 963218  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Odpowiedniki: Sastium [11,26], Sertagen [12,02], Asentra® [14,50], Zolof® [17,83], Zotal® [19,88]

Asentra®: tabl. powł. 100 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	27,61
		Limit	26,34
		30% <sup>(1)</sup>	9,17
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: *Sertraline* ATC: N06AB06 wyk: B EAN ~ 963317  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Odpowiedniki: Asentra® - (IR) [20,64], Sastium [20,90], Sertagen [22,53], Asentra® [27,61], Zolof® [32,02], Zotal® [36,12]

Asentra® - (IR): tabl. powł. 100 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	20,64
		Limit	20,64
		30% <sup>(1)</sup>	6,19
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: *Sertraline* ATC: N06AB06 wyk: B EAN ~ 148380  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Odpowiedniki: Asentra® - (IR) [20,64], Sastium [20,90], Sertagen [22,53], Asentra® [27,61], Zolof® [32,02], Zotal® [36,12]

Asertin® 50: tabl. powł. 50 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	15,07
		Limit	14,11
		30% <sup>(1)</sup>	5,19
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: *Sertraline* ATC: N06AB06 wyk: B EAN ~ 422692  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Odpowiedniki: ApoSerta/Sertraline Aurovitas [11,80], Sastium [11,92], Sertralina Krka [12,56], Miravil [13,64], Sertranom [13,73], Setalof [14,07], Asertin® 50 [15,07], Stimuloton® [17,27]

Asertin® 100: tabl. powł. 100 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	29,41
		Limit	28,22
		30% <sup>(1)</sup>	9,66
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: *Sertraline* ATC: N06AB06 wyk: B EAN ~ 422685  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Odpowiedniki: ApoSerta/Sertraline Aurovitas [21,88], Sastium [22,13], Sertralina Krka [23,49], Miravil [25,60], Sertranom [25,93], Setalof [28,22], Asertin® 100 [29,41]

Asmenol: tabl. powł. 10 mg - 28 szt.	Rx	100%	23,25
		Limit	23,25
		30% <sup>(1)</sup>	6,98
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.

 INN: *Montelukast* ATC: R03DC03 wyk: B EAN ~ 670758  
 (1) Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc(2) Kobiety w ciąży(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Montelukast Aurovitas [21,22], Montelukast Medreg [22,45], Montelukast Bluefish [23,07], Montelukast Sandoz [23,25], Asmenol [23,25], Romilast [23,42], Orilukast [25,65], Monkasta [26,01], Promonta 10 mg [26,34], Astmodil [27,02], Milukante [29,61]

Asmetic: prosz. do inhalacji 50 µg/dawkę - 1 inhal. 60 dawek	Rx	100%	62,36
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,40

 INN: *Salmeterol* ATC: R03AC12 wyk: A EAN ~ 151571  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Aspicam: tabl. 15 mg - 20 szt.	Rx	100%	12,87
		Limit	10,22
		50% <sup>(1)</sup>	7,76
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: *Meloxicam* ATC: M01AC06 wyk: B EAN ~ 997527  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:C, T3:D

Odpowiedniki: Remolexam [9,82], Meloxistad® [10,22], Aglan® 15 [11,55], Aspicam [12,87], Movalis® [13,79]

Aspicam: tabl. 15 mg - 60 szt.	Rx	100%	28,16
		Limit	28,16
		50% <sup>(1)</sup>	14,08
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: *Meloxicam* ATC: M01AC06 wyk: B EAN ~ 215168  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:C, T3:D

Aspirox: opatrunek w żelu 250 ml - 1 szt.	WM	100%	75,99
		Limit	75,99
		30% <sup>(1)</sup>	22,80
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: *Emplastri hydropolymerosa* ATC: V20 wyk: EAN ~ 571248  
 (1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N

Aspulmo: aerozol wziewny 100 µg/dawkę - 1 poj. (200 dawek)	Rx	100%	12,30
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	4,89

 INN: *Salbutamol* ATC: R03AC02 wyk: B EAN ~ 848065  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Odpowiedniki: Sabumalin [X], Ventolin® [10,61], Aspulmo [12,30]

Astmodil: tabl. do rozgr. i żucia 4 mg - 28 szt.	Rx	100%	15,46
		Limit	9,30
		30% <sup>(1)</sup>	8,95
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.

 INN: *Montelukast* ATC: R03DC03 wyk: B EAN ~ 881758  
 (1) Astma, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc(2) Kobiety w ciąży(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

Odpowiedniki: Montelukast Bluefish [X], Montelukast Aurovitas [9,18], Romilast [10,31], Orilukast [10,47], Monkasta [13,68], Montelukast Sandoz [13,68], Promonta 4 mg [13,68], Milukante [15,46], Astmodil [15,46]

Astmodil: tabl. do rozgr. i żucia 5 mg - 28 szt.	Rx	100%	18,82
		Limit	11,63
		30% <sup>(1)</sup>	10,68
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.

 INN: *Montelukast* ATC: R03DC03 wyk: B EAN ~ 881772  
 (1) Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli(2) Kobiety w ciąży(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

Odpowiedniki: Montelukast Bluefish [X], Montelukast Aurovitas [11,27], Romilast [12,62], Orilukast [12,64], Montelukast Sandoz [13,83], Promonta 5 mg [17,15], Monkasta [17,28], Astmodil [18,82], Milukante [19,27]

Astmodil: tabl. powł. 10 mg - 28 szt.	Rx	100%	27,02
		Limit	23,25
		30% <sup>(1)</sup>	10,75
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.

 INN: *Montelukast* ATC: R03DC03 wyk: B EAN ~ 881734  
 (1) Astma, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc(2) Kobiety w ciąży(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

Odpowiedniki: Montelukast Aurovitas [21,22], Montelukast Medreg [22,45], Montelukast Bluefish [23,07], Asmenol [23,25], Montelukast Sandoz [23,25], Romilast [23,42], Orilukast [25,65], Monkasta [26,01], Promonta 10 mg [26,34], Astmodil [27,02], Milukante [29,61]





<p><b>Astmodil:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 28 szt. (blister)</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>27,02</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>23,25</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>10,75</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>27,02</b>	Limit	<b>23,25</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>10,75</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p>INN: <i>Atomoxetine hydrochloride</i>   ATC: N06BA09   wyk: B   EAN ~ 141224            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży   Kat. ciąży: C  <b>Medice Germany</b>  <b>Opowiedniki:</b> Atomoksetyna Medice [102,58], Konaten [113,96], Auroxetyln [115,08]</p>
100%	<b>27,02</b>													
Limit	<b>23,25</b>													
30% <sup>(1)</sup>	<b>10,75</b>													
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.													
S <sup>(3)</sup>	bezpł.													
R <sup>(2)</sup>	bezpł.													
<p>INN: <i>Montelukast</i>   ATC: R03DC03   wyk: B   EAN ~ 142246            (1) Astma, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B  <b>Polfarmex S.A.</b></p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>9,56</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>4,21</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>6,61</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>9,56</b>	Limit	<b>4,21</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>6,61</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Atoris®:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 30 szt.</p>		
100%	<b>9,56</b>													
Limit	<b>4,21</b>													
30% <sup>(1)</sup>	<b>6,61</b>													
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.													
S <sup>(3)</sup>	bezpł.													
<p><b>Atecura Breezhaler:</b> prosz. do inhal. [kaps.] <b>125/62,5 µg/dawkę</b> - 30 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>86,63</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>86,63</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>25,99</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>86,63</b>	Limit	<b>86,63</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>25,99</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p>INN: <i>Atorvastatin</i>   ATC: C10AA05   wyk: B   EAN ~ 991815            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczykowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X  <b>Krka Polska Sp. z o.o.</b>  <b>Opowiedniki:</b> Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medreg [4,58], Atorvastatin Genoptim [5,28], Atorvastatin Bluefish AB [5,50], Stovas CRT [6,04], Lambrinex [7,12], Torvacard® 10 [8,79], Atorvox [9,06], Atrax® 10 [9,49], <b>Atoris®</b> [9,56], Tulip® [9,60], Apo-Atorva [9,65], Atorvastero® [9,81]</p>		
100%	<b>86,63</b>													
Limit	<b>86,63</b>													
30% <sup>(1)</sup>	<b>25,99</b>													
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.													
S <sup>(3)</sup>	bezpł.													
<p>INN: <i>Indacaterol + Mometason furoate</i>   ATC: R03AK14   wyk:   EAN ~ 104552            (1) Podtrzymujące leczenie astmy u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z niewystarczającą kontrolą astmy za pomocą wziewnych kortykosteroidów oraz wziewnych krótko działających β<sub>2</sub>-mimetyków (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C  <b>Novartis Europharm Limited</b></p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>120,00</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>93,99</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>54,21</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>120,00</b>	Limit	<b>93,99</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>54,21</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Atoris®:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 90 szt.</p>		
100%	<b>120,00</b>													
Limit	<b>93,99</b>													
30% <sup>(1)</sup>	<b>54,21</b>													
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.													
S <sup>(3)</sup>	bezpł.													
<p><b>Atecura Breezhaler:</b> prosz. do inhal. [kaps.] <b>125/260 µg/dawkę</b> - 30 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>118,85</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>93,99</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>53,06</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>118,85</b>	Limit	<b>93,99</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>53,06</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p>INN: <i>Atorvastatin</i>   ATC: C10AA05   wyk: B   EAN ~ 336647            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczykowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X  <b>Krka Polska Sp. z o.o.</b>  <b>Opowiedniki:</b> Lambrinex [14,49], Atrax® 10 [14,84], <b>Atoris®</b> [27,65], Tulip® [27,83]</p>		
100%	<b>118,85</b>													
Limit	<b>93,99</b>													
30% <sup>(1)</sup>	<b>53,06</b>													
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.													
S <sup>(3)</sup>	bezpł.													
<p>INN: <i>Indacaterol + Mometason furoate</i>   ATC: R03AK14   wyk:   EAN ~ 104554            (1) Podtrzymujące leczenie astmy u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z niewystarczającą kontrolą astmy za pomocą wziewnych kortykosteroidów oraz wziewnych krótko działających β<sub>2</sub>-mimetyków (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C  <b>Novartis Europharm Limited</b></p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>117,32</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>7,40</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>117,32</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>7,40</b>	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<p><b>Atoris®:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 30 szt.</p>
100%	<b>117,32</b>													
Limit	<b>0,00</b>													
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.													
S <sup>(3)</sup>	bezpł.													
R <sup>(2)</sup>	<b>7,40</b>													
S <sup>(4)</sup>	bezpł.													
<p><b>Atecura Breezhaler:</b> prosz. do inhal. [kaps.] <b>125/127,5 µg/dawkę</b> - 30 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>117,32</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>7,40</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>117,32</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>7,40</b>	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<p>INN: <i>Atorvastatin</i>   ATC: C10AA05   wyk: B   EAN ~ 991914            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczykowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X  <b>Krka Polska Sp. z o.o.</b>  <b>Opowiedniki:</b> Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [8,20], Atorvastatin Medreg [8,26], Atorvastatin Aurovitas [8,89], Atorvastatin Bluefish AB [9,61], Atorvastatin Genoptim [9,88], Atorvagen [9,97], Stovas CRT [11,17], Lambrinex [11,67], Torvacard® 20 [12,94], <b>Atoris®</b> [13,71], Atrax® 20 [15,01], Atorvox [15,23], Tulip® [15,42], Apo-Atorva [17,75], Atorvastero® [19,11]</p>
100%	<b>117,32</b>													
Limit	<b>0,00</b>													
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.													
S <sup>(3)</sup>	bezpł.													
R <sup>(2)</sup>	<b>7,40</b>													
S <sup>(4)</sup>	bezpł.													
<p>INN: <i>Indacaterol + Mometason furoate</i>   ATC: R03AK14   wyk:   EAN ~ 104553            (1) Podtrzymujące leczenie astmy u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z niewystarczającą kontrolą astmy za pomocą wziewnych kortykosteroidów oraz wziewnych krótko działających β<sub>2</sub>-mimetyków (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C  <b>Novartis Europharm Limited</b></p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>117,32</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>7,40</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>117,32</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>7,40</b>	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<p><b>Atoris®:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 60 szt.</p>
100%	<b>117,32</b>													
Limit	<b>0,00</b>													
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.													
S <sup>(3)</sup>	bezpł.													
R <sup>(2)</sup>	<b>7,40</b>													
S <sup>(4)</sup>	bezpł.													
<p><b>Atimos:</b> aerozol wziewny <b>12 µg/dawkę</b> - 1 poj. (120 dawek)</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>66,41</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>3,20</b></td></tr> </table>	100%	<b>66,41</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>	<p>INN: <i>Atorvastatin</i>   ATC: C10AA05   wyk: B   EAN ~ 991914            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczykowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X  <b>Krka Polska Sp. z o.o.</b>  <b>Opowiedniki:</b> Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [8,20], Atorvastatin Medreg [8,26], Atorvastatin Aurovitas [8,89], Atorvastatin Bluefish AB [9,61], Atorvastatin Genoptim [9,88], Atorvagen [9,97], Stovas CRT [11,17], Lambrinex [11,67], Torvacard® 20 [12,94], <b>Atoris®</b> [13,71], Atrax® 20 [15,01], Atorvox [15,23], Tulip® [15,42], Apo-Atorva [17,75], Atorvastero® [19,11]</p>		
100%	<b>66,41</b>													
Limit	<b>0,00</b>													
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.													
S <sup>(3)</sup>	bezpł.													
R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>													
<p>INN: <i>Formoterol</i>   ATC: R03AC13   wyk: A   EAN ~ 620777            (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Astma (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C  <b>Chiesi Poland Sp. z o.o.</b></p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>66,41</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>3,20</b></td></tr> </table>	100%	<b>66,41</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>	<p><b>Atoris®:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 60 szt.</p>		
100%	<b>66,41</b>													
Limit	<b>0,00</b>													
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.													
S <sup>(3)</sup>	bezpł.													
R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>													
<p><b>Atofab:</b> kaps. twarde <b>25 mg</b> - 28 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>102,63</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>3,20</b></td></tr> </table>	100%	<b>102,63</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>	<p>INN: <i>Atomoxetine</i>   ATC: N06BA09   wyk: B   EAN ~ 201222            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży   Kat. ciąży: C  <b>G.L. Pharma GmbH</b></p>		
100%	<b>102,63</b>													
Limit	<b>0,00</b>													
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.													
S <sup>(3)</sup>	bezpł.													
R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>													
<p><b>Atofab:</b> kaps. twarde <b>40 mg</b> - 28 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>102,63</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>3,20</b></td></tr> </table>	100%	<b>102,63</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>	<p>INN: <i>Atorvastatin</i>   ATC: C10AA05   wyk: B   EAN ~ 013806            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczykowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X  <b>Krka Polska Sp. z o.o.</b>  <b>Opowiedniki:</b> Atorvastatin Genoptim [17,29], Atrax® 20 [18,65], Lambrinex [18,91], <b>Atoris®</b> [25,28], Tulip® [28,43]</p>		
100%	<b>102,63</b>													
Limit	<b>0,00</b>													
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.													
S <sup>(3)</sup>	bezpł.													
R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>													
<p><b>Atomoksetyna Medice:</b> tabl. powł. <b>25 mg</b> - 28 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>66,42</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>3,20</b></td></tr> </table>	100%	<b>66,42</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>	<p><b>Atoris®:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 90 szt.</p>		
100%	<b>66,42</b>													
Limit	<b>0,00</b>													
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.													
S <sup>(3)</sup>	bezpł.													
R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>													
<p>INN: <i>Atomoxetine hydrochloride</i>   ATC: N06BA09   wyk: B   EAN ~ 141217            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży   Kat. ciąży: C  <b>Medice Germany</b>  <b>Opowiedniki:</b> Atomoksetyna Medice [66,42], Konaten [73,51], Auroxetyln [74,00]</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>102,58</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>3,20</b></td></tr> </table>	100%	<b>102,58</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>	<p>INN: <i>Atorvastatin</i>   ATC: C10AA05   wyk: B   EAN ~ 419173            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczykowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X  <b>Krka Polska Sp. z o.o.</b>  <b>Opowiedniki:</b> Atorvastatin Aurovitas [24,43], Atorvastatin Genoptim [25,27], Atrax® 20 [27,16], Lambrinex [27,27], <b>Atoris®</b> [39,46], Tulip® [41,80]</p>		
100%	<b>102,58</b>													
Limit	<b>0,00</b>													
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.													
S <sup>(3)</sup>	bezpł.													
R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>													
<p><b>Atomoksetyna Medice:</b> tabl. powł. <b>40 mg</b> - 28 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>102,58</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>3,20</b></td></tr> </table>	100%	<b>102,58</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>	<p><b>Atoris®:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 90 szt.</p>		
100%	<b>102,58</b>													
Limit	<b>0,00</b>													
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.													
S <sup>(3)</sup>	bezpł.													
R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>													


**ZAKODOWANY DO WALKI  
Z ZAKAŻENIEM**

Atoris®: tabl. powł. 30 mg - 30 szt.	Rx	100%	19,02
		Limit	12,64
		30% <sup>(1)</sup>	10,17
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** ATC: **C10AA05** wyk: **B** EAN ~ **885282**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **X**  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Storvas CRT [12,00], Apo-Atorva [12,05], Atorvastatin Bluefish AB [14,32], **Atoris® [19,02]**

Atoris®: tabl. powł. 30 mg - 60 szt.	Rx	100%	35,10
		Limit	25,29
		30% <sup>(1)</sup>	17,40
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** ATC: **C10AA05** wyk: **B** EAN ~ **885299**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **X**  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Apo-Atorva [22,63], **Atoris® [35,10]**

Atoris®: tabl. powł. 40 mg - 30 szt.	Rx	100%	26,75
		Limit	16,86
		30% <sup>(1)</sup>	14,95
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** ATC: **C10AA05** wyk: **B** EAN ~ **623464**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **X**  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [15,27], Atorvastatin Medreg [15,38], Atorvastatin Aurovitas [16,06], Atorvastatin Bluefish AB [18,30], Atorvastatin Genoptim [18,81], Atorvagen [19,02], Storvas CRT [21,57], Lambrinex [22,63], Tulip® [23,91], Torvacard® 40 [24,03], **Atoris® [26,75]**, Atorvox [27,97], Atrax® 40 [29,46], Apo-Atorva [32,04], Atorvastero® [37,58]

Atoris®: tabl. powł. 40 mg - 60 szt.	Rx	100%	48,61
		Limit	33,72
		30% <sup>(1)</sup>	25,01
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** ATC: **C10AA05** wyk: **B** EAN ~ **623471**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **X**  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Olvastim [12,00], Atorvastatin Genoptim [32,62], Atrax® 40 [34,02], Lambrinex [34,94], Tulip® [38,57], **Atoris® [48,61]**

Atoris®: tabl. powł. 40 mg - 90 szt.	Rx	100%	72,77
		Limit	50,58
		30% <sup>(1)</sup>	37,36
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** ATC: **C10AA05** wyk: **B** EAN ~ **623488**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **X**  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Atorvastatin Aurovitas [X], Atorvastatin Genoptim [47,25], Lambrinex [49,88], Atrax® 40 [50,68], Tulip® [55,59], Torvacard® 40 [68,07], **Atoris® [72,77]**

Atoris®: tabl. powł. 60 mg - 30 szt.	Rx	100%	39,46
		Limit	25,29
		30% <sup>(1)</sup>	21,76
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** ATC: **C10AA05** wyk: **B** EAN ~ **885336**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **X**  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Storvas CRT [22,51], Apo-Atorva [22,63], Atorvastatin Bluefish AB [22,65], **Atoris® [39,46]**

Atoris®: tabl. powł. 80 mg - 30 szt.	Rx	100%	51,54
		Limit	33,72
		30% <sup>(1)</sup>	27,94
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** ATC: **C10AA05** wyk: **B** EAN ~ **885374**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **X**  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Atorvastatin Medreg [28,80], Atorvastatin Bluefish AB [29,14], Atorvastatin Genoptim [32,49], Atorvastero® [37,24], Storvas CRT [40,48], Atrax® 80 [41,34], Torvacard® 80 [47,35], **Atoris® [51,54]**, Tulip® [52,79]

Atorvagen: tabl. powł. 20 mg - 30 szt.	Rx	100%	9,97
		Limit	8,43
		30% <sup>(1)</sup>	4,07
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** ATC: **C10AA05** wyk: **B** EAN ~ **938926**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **X**  
 Mylan Ireland Limited

Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [8,20], Atorvastatin Medreg [8,26], Atorvastatin Aurovitas [8,89], Atorvastatin Bluefish AB [9,61], Atorvastatin Genoptim [9,88], **Atorvagen [9,97]**, Storvas CRT [11,17], Lambrinex [11,67], Torvacard® 20 [12,94], Atoris® [13,71], Atrax®20 [15,01], Atorvox [15,23], Tulip® [15,42], Apo-Atorva [17,75], Atorvastero® [19,11]

Atorvagen: tabl. powł. 40 mg - 30 szt.	Rx	100%	19,02
		Limit	16,86
		30% <sup>(1)</sup>	7,22
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** ATC: **C10AA05** wyk: **B** EAN ~ **938995**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **X**  
 Mylan Ireland Limited

Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [15,27], Atorvastatin Medreg [15,38], Atorvastatin Aurovitas [16,06], Atorvastatin Bluefish AB [18,30], Atorvastatin Genoptim [18,81], **Atorvagen [19,02]**, Storvas CRT [21,57], Lambrinex [22,63], Tulip® [23,91], Torvacard® 40 [24,03], Atoris® [26,75], Atorvox [27,97], Atrax® 40 [29,46], Apo-Atorva [32,04], Atorvastero® [37,58]

Atorvastatin Aurovitas: tabl. powł. 20 mg - 30 szt.	Rx	100%	8,89
		Limit	8,43
		30% <sup>(1)</sup>	2,99
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** ATC: **C01AA05** wyk: **B** EAN ~ **132161**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **X**  
 Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [8,20], Atorvastatin Medreg [8,26], **Atorvastatin Aurovitas [8,89]**, Atorvastatin Bluefish AB [9,61], Atorvastatin Genoptim [9,88], Atorvagen [9,97], Storvas CRT [11,17], Lambrinex [11,67], Torvacard® 20 [12,94], Atoris® [13,71], Atrax®20 [15,01], Atorvox [15,23], Tulip® [15,42], Apo-Atorva [17,75], Atorvastero® [19,11]

Atorvastatin Aurovitas: tabl. powł. 20 mg - 90 szt.	Rx	100%	24,43
		Limit	24,43
		30% <sup>(1)</sup>	7,33
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** ATC: **C01AA05** wyk: **B** EAN ~ **132165**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **X**  
 Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Atorvastatin Aurovitas [24,43], Atorvastatin Genoptim [25,27], Atrax®20 [27,16], Lambrinex [27,27], Atoris® [39,46], Tulip® [41,80]



Atorvastatin Aurovitas: tabl. powł. 40 mg - 30 szt.	Rx	100%	16,06
		Limit	16,06
		30% <sup>(1)</sup>	4,82
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** | ATC: C01AA05 | wyk: B | EAN ~ 132171

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtorna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyreowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [15,27], Atorvastatin Medreg [15,38], Atorvastatin Aurovitas [16,06], Atorvastatin Bluefish AB [18,30], Atorvastatin Genoptim [18,81], Atorvagen [19,02], Storvas CRT [21,57], Lambrinex [22,63], Tulip® [23,91], Torvacard® 40 [24,03], Atoris® [26,75], Atorvox [27,97], Atox® 40 [29,46], Apo-Atorva [32,04], Atorvasterol® [37,58]

Atorvastatin Bluefish AB: tabl. powł. 10 mg - 30 szt.	Rx	100%	5,50
		Limit	4,21
		30% <sup>(1)</sup>	2,55
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** | ATC: C10AA05 | wyk: B | EAN ~ 382896

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtorna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyreowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
Bluefish Pharmaceuticals

Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medreg [4,58], Atorvastatin Genoptim [5,28], Atorvastatin Bluefish AB [5,50], Storvas CRT [6,04], Lambrinex [7,12], Torvacard® 10 [8,79], Atorvox [9,06], Atox® 10 [9,49], Atoris® [9,56], Tulip® [9,60], Apo-Atorva [9,65], Atorvasterol® [9,81]

Atorvastatin Bluefish AB: tabl. powł. 20 mg - 30 szt.	Rx	100%	9,61
		Limit	8,43
		30% <sup>(1)</sup>	3,71
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** | ATC: C10AA05 | wyk: B | EAN ~ 382902

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtorna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyreowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
Bluefish Pharmaceuticals

Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [8,20], Atorvastatin Medreg [8,26], Atorvastatin Aurovitas [8,89], Atorvastatin Bluefish AB [9,61], Atorvastatin Genoptim [9,88], Atorvagen [9,97], Storvas CRT [11,17], Lambrinex [11,67], Torvacard® 20 [12,94], Atoris® [13,71], Atox® 20 [15,01], Atorvox [15,23], Tulip® [15,42], Apo-Atorva [17,75], Atorvasterol® [19,11]

Atorvastatin Bluefish AB: tabl. powł. 30 mg - 30 szt.	Rx	100%	14,32
		Limit	12,64
		30% <sup>(1)</sup>	5,47
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** | ATC: C10AA05 | wyk: B | EAN ~ 138291

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtorna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyreowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
Bluefish Pharmaceuticals

Odpowiedniki: Storvas CRT [12,00], Apo-Atorva [12,05], Atorvastatin Bluefish AB [14,32], Atoris® [19,02]

Atorvastatin Bluefish AB: tabl. powł. 40 mg - 30 szt.	Rx	100%	18,30
		Limit	16,86
		30% <sup>(1)</sup>	6,50
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** | ATC: C10AA05 | wyk: B | EAN ~ 382926

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtorna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyreowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
Bluefish Pharmaceuticals

Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [15,27], Atorvastatin Medreg [15,38], Atorvastatin Aurovitas [16,06], Atorvastatin Bluefish AB [18,30], Atorvastatin Genoptim [18,81], Atorvagen [19,02], Storvas CRT [21,57], Lambrinex [22,63], Tulip® [23,91], Torvacard® 40 [24,03], Atoris® [26,75], Atorvox [27,97], Atox® 40 [29,46], Apo-Atorva [32,04], Atorvasterol® [37,58]

Atorvastatin Bluefish AB: tabl. powł. 60 mg - 30 szt.	Rx	100%	22,65
		Limit	22,65
		30% <sup>(1)</sup>	6,80
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** | ATC: C10AA05 | wyk: B | EAN ~ 138293

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtorna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyreowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
Bluefish Pharmaceuticals

Odpowiedniki: Storvas CRT [22,51], Apo-Atorva [22,63], Atorvastatin Bluefish AB [22,65], Atoris® [39,46]

Atorvastatin Bluefish AB: tabl. powł. 80 mg - 30 szt.	Rx	100%	29,14
		Limit	29,14
		30% <sup>(1)</sup>	8,74
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** | ATC: C10AA05 | wyk: B | EAN ~ 138294

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtorna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyreowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
Bluefish Pharmaceuticals

Odpowiedniki: Atorvastatin Medreg [28,80], Atorvastatin Bluefish AB [29,14], Atorvastatin Genoptim [32,49], Atorvasterol® [37,24], Storvas CRT [40,48], Atox® 80 [41,34], Torvacard® 80 [47,35], Atoris® [51,54], Tulip® [52,79]

Atorvastatin Genoptim: tabl. powł. 10 mg - 30 szt.	Rx	100%	5,28
		Limit	4,21
		30% <sup>(1)</sup>	2,33
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** | ATC: C10AA05 | wyk: B | EAN ~ 900053

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtorna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyreowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
Synopsis Pharma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medreg [4,58], Atorvastatin Genoptim [5,28], Atorvastatin Bluefish AB [5,50], Storvas CRT [6,04], Lambrinex [7,12], Torvacard® 10 [8,79], Atorvox [9,06], Atox® 10 [9,49], Atoris® [9,56], Tulip® [9,60], Apo-Atorva [9,65], Atorvasterol® [9,81]

Atorvastatin Genoptim: tabl. powł. 20 mg - 30 szt.	Rx	100%	9,88
		Limit	8,43
		30% <sup>(1)</sup>	3,98
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** | ATC: C10AA05 | wyk: B | EAN ~ 899920

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtorna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyreowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
Synopsis Pharma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [8,20], Atorvastatin Medreg [8,26], Atorvastatin Aurovitas [8,89], Atorvastatin Bluefish AB [9,61], Atorvastatin Genoptim [9,88], Atorvagen [9,97], Storvas CRT [11,17], Lambrinex [11,67], Torvacard® 20 [12,94], Atoris® [13,71], Atox® 20 [15,01], Atorvox [15,23], Tulip® [15,42], Apo-Atorva [17,75], Atorvasterol® [19,11]

Atorvastatin Genoptim: tabl. powł. 20 mg - 60 szt.	Rx	100%	17,29
		Limit	16,86
		30% <sup>(1)</sup>	5,49
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** | ATC: C10AA05 | wyk: B | EAN ~ 899951

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtorna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyreowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
Synopsis Pharma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Atorvastatin Genoptim [17,29], Atox® 20 [18,65], Lambrinex [18,91], Atoris® [25,28], Tulip® [28,43]

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

Atorvastatin Genoptim: tabl. powł. 20 mg - 90 szt.	Rx	100%	25,27
		Limit	25,27
		30% <sup>(1)</sup>	7,58
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 899975

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Synopsis Pharma Sp. z o.o.  
Odpowiedniki: Atorvastatin Aurovitas [24,43], Atorvastatin Genoptim [25,27], Atrox® 20 [27,16], Lambrinex [27,27], Atoris® [39,46], Tulip® [41,80]

Atorvastatin Genoptim: tabl. powł. 40 mg - 30 szt.	Rx	100%	18,81
		Limit	16,86
		30% <sup>(1)</sup>	7,01
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 900275

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Synopsis Pharma Sp. z o.o.  
Odpowiedniki: Attractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [15,27], Atorvastatin Medreg [15,38], Atorvastatin Aurovitas [16,06], Atorvastatin Bluefish AB [18,30], Atorvastatin Genoptim [18,81], Atorvagen [19,02], Storvas CRT [21,57], Lambrinex [22,63], Tulip® [23,91], Torvacard® 40 [24,03], Atoris® [26,75], Atorvox [27,97], Atrox® 40 [29,46], Apo-Atorva [32,04], Atorvastero® [37,58]

Atorvastatin Genoptim: tabl. powł. 40 mg - 60 szt.	Rx	100%	32,62
		Limit	32,62
		30% <sup>(1)</sup>	9,79
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 900305

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Synopsis Pharma Sp. z o.o.  
Odpowiedniki: Olvastim [12,00], Atorvastatin Genoptim [32,62], Atrox® 40 [34,02], Lambrinex [34,94], Tulip® [38,57], Atoris® [48,61]

Atorvastatin Genoptim: tabl. powł. 40 mg - 90 szt.	Rx	100%	47,25
		Limit	47,25
		30% <sup>(1)</sup>	14,18
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 900336

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Synopsis Pharma Sp. z o.o.  
Odpowiedniki: Atorvastatin Aurovitas [X], Atorvastatin Genoptim [47,25], Lambrinex [49,88], Atrox® 40 [50,68], Tulip® [55,59], Torvacard® 40 [68,07], Atoris® [72,77]

Atorvastatin Genoptim: tabl. powł. 80 mg - 30 szt.	Rx	100%	32,49
		Limit	32,49
		30% <sup>(1)</sup>	9,75
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 900459

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Synopsis Pharma Sp. z o.o.  
Odpowiedniki: Atorvastatin Medreg [28,80], Atorvastatin Bluefish AB [29,14], Atorvastatin Genoptim [32,49], Atorvastero® [37,24], Storvas CRT [40,48], Atrox® 80 [41,34], Torvacard® 80 [47,35], Atoris® [51,54], Tulip® [52,79]

Atorvastatin Medical Valley: tabl. powł. 20 mg - 30 szt.	Rx	100%	8,20
		Limit	8,20
		30% <sup>(1)</sup>	2,46
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 150165

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Medical Valley Invest AB  
Odpowiedniki: Attractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [8,20], Atorvastatin Medreg [8,26], Atorvastatin Aurovitas [8,89], Atorvastatin Bluefish AB [9,61], Atorvastatin Genoptim [9,88], Atorvagen [9,97], Storvas CRT [11,17], Lambrinex [11,67], Torvacard® 20 [12,94], Atoris® [13,71], Atrox® 20 [15,01], Atorvox [15,23], Tulip® [15,42], Apo-Atorva [17,75], Atorvastero® [19,11]

Atorvastatin Medical Valley: tabl. powł. 40 mg - 30 szt.	Rx	100%	15,27
		Limit	15,27
		30% <sup>(1)</sup>	4,58
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 150166

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Medical Valley Invest AB  
Odpowiedniki: Attractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [15,27], Atorvastatin Medreg [15,38], Atorvastatin Aurovitas [16,06], Atorvastatin Bluefish AB [18,30], Atorvastatin Genoptim [18,81], Atorvagen [19,02], Storvas CRT [21,57], Lambrinex [22,63], Tulip® [23,91], Torvacard® 40 [24,03], Atoris® [26,75], Atorvox [27,97], Atrox® 40 [29,46], Apo-Atorva [32,04], Atorvastero® [37,58]

Atorvastatin Medreg: tabl. powł. 10 mg - 30 szt.	Rx	100%	4,58
		Limit	4,21
		30% <sup>(1)</sup>	1,63
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 144468

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

MedReg sro  
Odpowiedniki: Attractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medreg [4,58], Atorvastatin Genoptim [5,28], Atorvastatin Bluefish AB [5,50], Storvas CRT [6,04], Lambrinex [7,12], Torvacard® 10 [8,79], Atorvox [9,06], Atrox® 10 [9,49], Atoris® [9,56], Tulip® [9,60], Apo-Atorva [9,65], Atorvastero® [9,81]

Atorvastatin Medreg: tabl. powł. 20 mg - 30 szt.	Rx	100%	8,26
		Limit	8,26
		30% <sup>(1)</sup>	2,48
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 144473

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

MedReg sro  
Odpowiedniki: Attractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [8,20], Atorvastatin Medreg [8,26], Atorvastatin Aurovitas [8,89], Atorvastatin Bluefish AB [9,61], Atorvastatin Genoptim [9,88], Atorvagen [9,97], Storvas CRT [11,17], Lambrinex [11,67], Torvacard® 20 [12,94], Atoris® [13,71], Atrox® 20 [15,01], Atorvox [15,23], Tulip® [15,42], Apo-Atorva [17,75], Atorvastero® [19,11]

Atorvastatin Medreg: tabl. powł. 40 mg - 30 szt.	Rx	100%	15,38
		Limit	15,38
		30% <sup>(1)</sup>	4,61
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 144479

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

MedReg sro  
Odpowiedniki: Attractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [15,27], Atorvastatin Medreg [15,38], Atorvastatin Aurovitas [16,06], Atorvastatin Bluefish AB [18,30], Atorvastatin Genoptim [18,81], Atorvagen [19,02], Storvas CRT [21,57], Lambrinex [22,63], Tulip® [23,91], Torvacard® 40 [24,03], Atoris® [26,75], Atorvox [27,97], Atrox® 40 [29,46], Apo-Atorva [32,04], Atorvastero® [37,58]



# ZOLPIC

Daj owcom odpocząć.

zolpidem



Atorvastatin Medreg: tabl. powł. 80 mg - 30 szt.	Rx	100%	28,80
		Limit	28,80
		30% <sup>(1)</sup>	8,64
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* | ATC: C10AA05 | wyk: B | EAN ~ 144485

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretr-wirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Odpowiedniki: Atorvastatin Medreg [28,80], Atorvastatin Bluefish AB [29,14], Atorvastatin Genoptim [32,49], Ato-vasterol® [37,24], Storvas CRT [40,48], Atox® 80 [41,34], Torvacard® 80 [47,35], Atoris® [51,54], Tulip® [52,79]

Atorvastatin®: tabl. powł. 10 mg - 30 szt.	Rx	100%	9,81
		Limit	4,21
		30% <sup>(1)</sup>	6,17
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* | ATC: C10AA05 | wyk: B | EAN ~ 077847

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretr-wirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medreg [4,58], Atorvastatin Genoptim [5,28], Atorvastatin Bluefish AB [5,50], Storvas CRT [6,04], Lambrinex [7,12], Torvacard® 10 [8,79], Atox® [9,06], Atox® 10 [9,49], Atoris® [9,56], Tulip® [9,60], Apo-Atorva [9,65], Ato-vasterol® [9,81]

Ato-vasterol®: tabl. powł. 20 mg - 30 szt.	Rx	100%	19,11
		Limit	8,43
		30% <sup>(1)</sup>	11,89
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* | ATC: C10AA05 | wyk: B | EAN ~ 077939

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretr-wirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [8,20], Atorvastatin Medreg [8,26], Atorvastatin Aurovitas [8,89], Atorvastatin Bluefish AB [9,61], Atorvastatin Genoptim [9,88], Ato-ravagen [9,97], Storvas CRT [11,17], Lambrinex [11,67], Torvacard® 20 [12,94], Atoris® [13,71], Atox® 20 [15,01], Ato-rvox [15,23], Tulip® [15,42], Apo-Atorva [17,75], Ato-vasterol® [19,11]

Ato-vasterol®: tabl. powł. 40 mg - 30 szt.	Rx	100%	37,58
		Limit	16,86
		30% <sup>(1)</sup>	23,20
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* | ATC: C10AA05 | wyk: B | EAN ~ 078028

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretr-wirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [15,27], Atorvastatin Medreg [15,38], Atorvastatin Aurovitas [16,06], Atorvastatin Bluefish AB [18,30], Atorvastatin Genoptim [18,81], Ato-ravagen [19,02], Storvas CRT [21,57], Lambrinex [22,63], Tulip® [23,91], Torvacard® 40 [24,03], Atoris® [26,75], Ato-rvox [27,97], Atox® 40 [29,46], Apo-Atorva [32,04], Ato-vasterol® [37,58]

Ato-vasterol®: tabl. powł. 80 mg - 30 szt.	Rx	100%	37,24
		Limit	33,72
		30% <sup>(1)</sup>	12,28
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* | ATC: C10AA05 | wyk: B | EAN ~ 041298

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretr-wirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Odpowiedniki: Atorvastatin Medreg [28,80], Atorvastatin Bluefish AB [29,14], Atorvastatin Genoptim [32,49], Ato-vasterol® [37,24], Storvas CRT [40,48], Atox® 80 [41,34], Torvacard® 80 [47,35], Atoris® [51,54], Tulip® [52,79]

Ato-rvox: tabl. powł. 10 mg - 30 szt.	Rx	100%	9,06
		Limit	4,21
		30% <sup>(1)</sup>	6,11
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* | ATC: C10AA05 | wyk: B | EAN ~ 573400

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretr-wirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medreg [4,58], Atorvastatin Genoptim [5,28], Ato-rvastatin Bluefish AB [5,50], Storvas CRT [6,04], Lambrinex [7,12], Torvacard® 10 [8,79], Ato-rvox [9,06], Atox® 10 [9,49], Atoris® [9,56], Tulip® [9,60], Apo-Atorva [9,65], Ato-vasterol® [9,81]

Ato-rvox: tabl. powł. 20 mg - 30 szt.	Rx	100%	15,23
		Limit	8,43
		30% <sup>(1)</sup>	9,33
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* | ATC: C10AA05 | wyk: B | EAN ~ 573530

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretr-wirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [8,20], Atorvastatin Medreg [8,26], Atorvastatin Aurovitas [8,89], Atorvastatin Bluefish AB [9,61], Atorvastatin Genoptim [9,88], Ato-rvagen [9,97], Storvas CRT [11,17], Lambrinex [11,67], Torvacard® 20 [12,94], Atoris® [13,71], Atox® 20 [15,01], Ato-rvox [15,23], Tulip® [15,42], Apo-Atorva [17,75], Ato-vasterol® [19,11]

Ato-rvox: tabl. powł. 40 mg - 30 szt.	Rx	100%	27,97
		Limit	16,86
		30% <sup>(1)</sup>	16,17
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* | ATC: C10AA05 | wyk: B | EAN ~ 573547

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretr-wirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [15,27], Atorvastatin Medreg [15,38], Atorvastatin Aurovitas [16,06], Atorvastatin Bluefish AB [18,30], Atorvastatin Genoptim [18,81], Ato-rvagen [19,02], Storvas CRT [21,57], Lambrinex [22,63], Tulip® [23,91], Torvacard® 40 [24,03], Atoris® [26,75], Ato-rvox [27,97], Atox® 40 [29,46], Apo-Atorva [32,04], Ato-vasterol® [37,58]

Ato-rvox - (IR): tabl. 40 mg - 28 szt.	Rx	100%	14,50
		Limit	14,50
		30% <sup>(1)</sup>	4,35
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* | ATC: C10AA05 | wyk: B | EAN ~ 147999

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretr-wirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Odpowiedniki: Olvastim [7,20], Ato-rvox - (IR) [14,50]

Ato-sa®: tabl. 8 mg - 10 szt.	Rx	100%	36,51
		Limit	36,51
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ondansetron hydrochloride* | ATC: A04AA01 | wyk: B | EAN ~ 744510

(1) Chemioterapia ICD10: C.0.09.(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Nowotwory żołądka(4) Pa-cjenci 65+ | Kat. ciąży: B

Odpowiedniki: Setronon® [36,51], Ato-sa® [36,51], Zofran® [52,54]

Ato-ram® 6,25 mg: tabl. 6,25 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	7,67
		Limit	2,17
		30% <sup>(1)</sup>	6,15
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Carvedilol* | ATC: C07AG02 | wyk: B | EAN ~ 570454

(1) Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II - NYHA IV WP: Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D

Odpowiedniki: Dilatrend® [X], Carvedilol-ratiopharm® 6,25 [7,64], Hypoten® [7,66], Ato-ram® 6,25 mg [7,67], Cory-ol® [8,06], Avedol [8,12], Carvetrend [8,12]

**ADRENALINA WZF**

Adrenalinum

Zawsze pod ręką!

**Refundacja** od lipca 2015  
Poziom odpłatności 50%

ADR-WZF/131/06-2015

Atram® 12,5 mg: tabl. 12,5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	9,64
		Limit	4,34
		30% <sup>(1)</sup>	6,60
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Carvedilol* ATC: C07AG02 wyk: B EAN ~ 570430  
 (1) Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV WP: Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Zentiva PL Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Atram® 12,5 mg [9,64], Carvedilol-ratiopharm® 12,5 [10,12], Hypoten® [10,53], Corylo® [10,74], Avedol [11,38], Carvetrend [11,39], Dilatrend® [24,19]

Atram® 25 mg: tabl. 25 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	13,44
		Limit	8,67
		30% <sup>(1)</sup>	7,37
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Carvedilol* ATC: C07AG02 wyk: B EAN ~ 570409  
 (1) Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV WP: Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Zentiva PL Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Dilatrend® [X], Atram® 25 mg [13,44], Carvedilol-ratiopharm® 25 [13,84], Corylo® [13,96], Hypoten® [14,26], Avedol [15,09], Carvetrend [15,10]

Atrauman Ag: opatrunek leczniczy 5x5 cm - 1 szt.	WM	100%	5,78
		Limit	3,71
		30% <sup>(1)</sup>	3,18
		B <sup>(2)</sup>	2,07

INN: *Emplastrum antimicrobium* ATC: V20 wyk: N EAN ~ 586412  
 (1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N  
 PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

Atrauman Ag: opatrunek leczniczy 10x10 cm - 1 szt.	WM	100%	15,66
		Limit	14,85
		30% <sup>(1)</sup>	5,27
		B <sup>(2)</sup>	0,81

INN: *Emplastrum antimicrobium* ATC: V20 wyk: N EAN ~ 586429  
 (1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N  
 PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Atrauman Ag [15,66], Allevyn® Ag Non Adhesive [16,10], Allevyn® Ag Adhesive [16,20], Acticoat® Flex 3 [19,77]

Atrauman Ag: opatrunek leczniczy 10x20 cm - 1 szt.	WM	100%	29,69
		Limit	29,69
		30% <sup>(1)</sup>	8,91
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Emplastrum antimicrobium* ATC: V20 wyk: N EAN ~ 586436  
 (1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N  
 PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Atrauman Ag [29,69], Acticoat® Flex 3 [32,97]

Atrodil: aerozol inhal. [roztw.] 20 µg/dawkę - 1 poj. 10 ml (200 dawek) ◆	Rx	100%	20,04
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,56

INN: *Ipratropium bromide* ATC: R03BB01 wyk: B EAN ~ 185879  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc WP: Mukowiscydoza; dysplazja oskrzelowo-płucna; dyskinetyka rzęsek(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:D, T2:C, T3:C  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA  
 Odpowiedniki: Atrodil [20,04], Atrovent® N [20,05]

Atropinum sulfuricum WZF 1%: krople do oczu [roztw.] 10 mg/ml - 1 but. 5 ml ◆	Rx	100%	20,88
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,27
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atropine sulphate* ATC: S01FA01 wyk: A EAN ~ 024311  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Polfa Warszawa SA

Atrovent®: płyn do inhal. z nebulizatora 250 µg/ml - 1 but. 20 ml ◆	Rx	100%	15,21
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	8,39

INN: *Ipratropium bromide* ATC: R03BB01 wyk: B EAN ~ 322114  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Astma WP: Mukowiscydoza; dysplazja oskrzelowo-płucna; dyskinetyka rzęsek(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Atrovent® N: aerozol wziewny 20 µg/dawkę - 1 poj. 10 ml (200 dawek) ◆	Rx	100%	20,05
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,57

INN: *Ipratropium bromide* ATC: R03BB01 wyk: B EAN ~ 999019  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Astma, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc WP: Mukowiscydoza; dysplazja oskrzelowo-płucna; dyskinetyka rzęsek(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Atrodil [20,04], Atrovent® N [20,05]

Atrox® 10: tabl. powł. 10 mg - 30 szt.	Rx	100%	9,49
		Limit	4,21
		30% <sup>(1)</sup>	6,54
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 124618  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
 Biofarm Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medreg [4,58], Atorvastatin Genoptim [5,28], Atorvastatin Bluefish AB [5,50], Storas CRT [6,04], Lambrinex [7,12], Torvacard® 10 [8,79], Atorvox [9,06], Atrox® 10 [9,49], Atoris® [9,56], Tulip® [9,60], Apo-Atorva [9,65], Atorvasterol® [9,81]

Atrox® 10: tabl. powł. 10 mg - 60 szt.	Rx	100%	10,69
		Limit	8,43
		30% <sup>(1)</sup>	4,79
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 215137  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
 Biofarm Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Lambrinex [9,98], Atrox® 10 [10,69], Tulip® [18,67]

Atrox® 10: tabl. powł. 10 mg - 90 szt.	Rx	100%	14,84
		Limit	12,64
		30% <sup>(1)</sup>	5,99
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 215359  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
 Biofarm Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Lambrinex [14,49], Atrox® 10 [14,84], Atoris® [27,65], Tulip® [27,83]

Atrox® 20: tabl. powł. 20 mg - 30 szt.	Rx	100%	15,01
		Limit	8,43
		30% <sup>(1)</sup>	9,11
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 124717  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
 Biofarm Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [8,20], Atorvastatin Medreg [8,26], Atorvastatin Aurovitas [8,89], Atorvastatin Bluefish AB [9,61], Atorvastatin Genoptim [9,88], Atorvagen [9,97], Storas CRT [11,17], Lambrinex [11,67], Torvacard® 20 [12,94], Atoris® [13,71], Atrox® 20 [15,01], Atorvox [15,23], Tulip® [15,42], Apo-Atorva [17,75], Atorvasterol® [19,11]

Atrox® 20: tabl. powł. 20 mg - 60 szt.	Rx	100%	18,65
		Limit	16,86
		30% <sup>(1)</sup>	6,85
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 215144  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
 Biofarm Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Atorvastatin Genoptim [17,29], Atrox® 20 [18,65], Lambrinex [18,91], Atoris® [25,28], Tulip® [28,43]



Naszym wyborem

**enarenal**  
 enalaprilii maleas

<b>Atroux® 20:</b> tabl. powł. 20 mg - 90 szt.	Rx	100%	27,16
		Limit	25,29
		30% <sup>(1)</sup>	9,46
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** | ATC: C10AA05 | wyk: B | EAN ~ 215366  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
**Biofarm Sp. z o.o.**  
 Odpowiedniki: Atorvastatin Aurovitas [24,43], Atorvastatin Genoptim [25,27], **Atroux® 20** [27,16], Lambrinex [27,27], Atroris® [39,46], Tulip® [41,80]

<b>Atroux® 40:</b> tabl. powł. 40 mg - 30 szt.	Rx	100%	29,46
		Limit	16,86
		30% <sup>(1)</sup>	17,66
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** | ATC: C10AA05 | wyk: B | EAN ~ 124816  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
**Biofarm Sp. z o.o.**  
 Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [15,27], Atorvastatin Medreg [15,38], Atorvastatin Aurovitas [16,06], Atorvastatin Bluefish AB [18,30], Atorvastatin Genoptim [18,81], Atorvagen [19,02], Storvas CRT [21,57], Lambrinex [22,63], Tulip® [23,91], Torvacard® 40 [24,03], Atroris® [26,75], Atorvox [27,97], **Atroux® 40** [29,46], Apo-Atorva [32,04], Atorvastero® [37,58]

<b>Atroux® 40:</b> tabl. powł. 40 mg - 60 szt.	Rx	100%	34,02
		Limit	33,72
		30% <sup>(1)</sup>	10,42
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** | ATC: C10AA05 | wyk: B | EAN ~ 215151  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
**Biofarm Sp. z o.o.**  
 Odpowiedniki: Olvastim [12,00], Atorvastatin Genoptim [32,62], **Atroux® 40** [34,02], Lambrinex [34,94], Tulip® [38,57], Atroris® [48,61]

<b>Atroux® 40:</b> tabl. powł. 40 mg - 90 szt.	Rx	100%	50,68
		Limit	50,58
		30% <sup>(1)</sup>	15,27
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** | ATC: C10AA05 | wyk: B | EAN ~ 215373  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
**Biofarm Sp. z o.o.**  
 Odpowiedniki: Atorvastatin Aurovitas [X], Atorvastatin Genoptim [47,25], Lambrinex [49,88], **Atroux® 40** [50,68], Tulip® [55,59], Torvacard® 40 [68,07], Atroris® [72,77]

<b>Atroux® 80:</b> tabl. powł. 80 mg - 30 szt.	Rx	100%	41,34
		Limit	33,72
		30% <sup>(1)</sup>	17,74
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** | ATC: C10AA05 | wyk: B | EAN ~ 011383  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
**Biofarm Sp. z o.o.**  
 Odpowiedniki: Atorvastatin Medreg [28,80], Atorvastatin Bluefish AB [29,14], Atorvastatin Genoptim [32,49], Atorvastero® [37,24], Storvas CRT [40,48], **Atroux® 80** [41,34], Torvacard® 80 [47,35], Atroris® [51,54], Tulip® [52,79]

<b>Atratozol:</b> tabl. powł. 1 mg - 28 szt.	Rx	100%	56,41
		Limit	52,94
		B <sup>(1)</sup>	3,47
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Anastrozole** | ATC: L02BG03 | wyk: B | EAN ~ 090029  
 (1) Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii, Rak piersi w II rzucie hormonoterapii WP: Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
**Vipharm SA**  
 Odpowiedniki: Anastrozole Eugia [48,81], Anastrozol Bluefish [52,36], **Atratozol** [56,41], Anastrozol Teva [59,51], Apo-Nastrol [60,98], Egistrozol [61,00], Animidex® [64,43]

<b>Auglavin PPH:</b> prosz. do przyg. zaw. doust. 457 mg/5 ml - 1 but. 140 ml ◆	Rx	100%	33,32
		Limit	33,32
		50% <sup>(1)</sup>	16,66
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amoxicillin + Clavulanic acid** | ATC: J01CR02 | wyk: B | EAN ~ 134326  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
**Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA**  
 Odpowiedniki: Auglavin PPH [33,32], Taromentin® [39,95]

<b>Auglavin PPH:</b> prosz. do przyg. zaw. doust. 457 mg/5 ml - 1 but. 70 ml ◆	Rx	100%	17,67
		Limit	17,67
		50% <sup>(1)</sup>	8,84
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amoxicillin + Clavulanic acid** | ATC: J01CR02 | wyk: B | EAN ~ 134325  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
**Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA**  
 Odpowiedniki: Auglavin PPH [17,67], Taromentin® [26,43]

<b>Auglavin PPH:</b> prosz. do przyg. zaw. doust. 1 g - 14 sasz. ◆	Rx	100%	33,03
		Limit	33,03
		50% <sup>(1)</sup>	16,52
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amoxicillin + Clavulanic acid** | ATC: J01CR02 | wyk: B | EAN ~ 061590  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
**Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA**

<b>Auglavin PPH:</b> tabl. powł. 625 mg - 14 szt. ◆	Rx	100%	18,54
		Limit	17,14
		50% <sup>(1)</sup>	9,97
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amoxicillin + Clavulanic acid** | ATC: J01CR02 | wyk: B | EAN ~ 061592  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
**Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA**  
 Odpowiedniki: Auglavin PPH [18,54], Amoksiklav® [18,71], Augmentin® [19,92], Taromentin® [23,98]

<b>Auglavin PPH:</b> tabl. powł. 1 g - 14 szt. ◆	Rx	100%	31,00
		Limit	29,99
		50% <sup>(1)</sup>	16,01
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amoxicillin + Clavulanic acid** | ATC: J01CR02 | wyk: B | EAN ~ 061595  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
**Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA**

Odpowiedniki: Amoksiklav® - (IR) [X], Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas [25,22], Amoksiklav® - (IR) [26,86], Co-amoxiclav Bluefish [27,29], Peniac [27,29], Amoksiklav® - (IR) [27,45], Ramoclav [28,48], Augmentin® - (IR) [29,11], Augmentin® - (IR) [29,16], Augmentin® - (IR) [29,23], Polamoklav [31,00], **Auglavin PPH** [31,00], Amoksiklav® [31,35], Augmentin® - (IR) [32,30], Augmentin® - (IR) [32,32], Augmentin® [34,92], Taromentin® [40,04]

<b>Auglavin PPH Extra:</b> prosz. do przyg. zaw. doust. (600 mg+ 42,9 mg)/5 ml - 1 but. 100 ml ◆	Rx	100%	33,66
		Limit	33,66
		50% <sup>(1)</sup>	16,83
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amoxicillin + Clavulanic acid** | ATC: J01CR02 | wyk: B | EAN ~ 134327  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
**Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA**  
 Odpowiedniki: Auglavin PPH Extra [33,66], Amoksiklav® ES [37,18]

<b>Augmentin®:</b> tabl. powł. 375 mg - 21 szt. ◆	Rx	100%	15,41
		Limit	12,85
		50% <sup>(1)</sup>	8,99
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amoxicillin + Clavulanic acid** | ATC: J01CR02 | wyk: B | EAN ~ 064120  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
**GlaxoSmithKline (Ireland) Limited**

**Loperamid WZF**  
Loperamidi hydrochloridum

Przerwij niekończące się wizyty

Nowe opakowanie:  
**2 mg x 15 tabl.**

<p><b>Augmentin®</b>: tabl. powł. <b>625 mg</b> - 14 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>19,92</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>17,14</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>11,35</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>19,92</b>	Limit	<b>17,14</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>11,35</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Augmentin® - (IR)</b>: tabl. powł. <b>1 g</b> - 14 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>32,30</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>29,99</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>17,31</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>32,30</b>	Limit	<b>29,99</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>17,31</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
100%	<b>19,92</b>																								
Limit	<b>17,14</b>																								
50% <sup>(1)</sup>	<b>11,35</b>																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	<b>32,30</b>																								
Limit	<b>29,99</b>																								
50% <sup>(1)</sup>	<b>17,31</b>																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
<p>INN: <b>Amoxicillin + Clavulanic acid</b> ATC: <b>J01CR02</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>368235</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Odpowiedniki: Auglavin PPH [18,54], Amoksilav® [18,71], <b>Augmentin®</b> [19,92], Taromentin® [23,98]</p>		<p>INN: <b>Amoxicillin + Clavulanic acid</b> ATC: <b>J01CR02</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>248949</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Delfarma Sp. z o.o. Odpowiedniki: Amoksilav® - (IR) [X], Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas [25,22], Amoksilav® - (IR) [26,86], Co-amoxiclav Bluefish [27,29], Penlac [27,29], Amoksilav® - (IR) [27,45], Ramoclav [28,48], Augmentin® - (IR) [29,11], Augmentin® - (IR) [29,16], Augmentin® - (IR) [29,23], Auglavin PPH [31,00], Polamoklav [31,00], Amoksilav® [31,35], <b>Augmentin® - (IR)</b> [32,30], Augmentin® - (IR) [32,32], Augmentin® [34,92], Taromentin® [40,04]</p>																							
<p><b>Augmentin®</b>: tabl. powł. <b>1 g</b> - 14 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>34,92</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>29,99</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>19,93</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>34,92</b>	Limit	<b>29,99</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>19,93</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Augmentin® ES</b>: prosz. do przyg. zaw. doust. <b>642,9 mg/5 ml</b> - 1 but. 50 ml ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>24,78</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>19,04</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>15,26</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>24,78</b>	Limit	<b>19,04</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>15,26</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
100%	<b>34,92</b>																								
Limit	<b>29,99</b>																								
50% <sup>(1)</sup>	<b>19,93</b>																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	<b>24,78</b>																								
Limit	<b>19,04</b>																								
50% <sup>(1)</sup>	<b>15,26</b>																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
<p>INN: <b>Amoxicillin + Clavulanic acid</b> ATC: <b>J01CR02</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>717521</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Odpowiedniki: Amoksilav® - (IR) [X], Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas [25,22], Amoksilav® - (IR) [26,86], Co-amoxiclav Bluefish [27,29], Penlac [27,29], Amoksilav® - (IR) [27,45], Ramoclav [28,48], Augmentin® - (IR) [29,11], Augmentin® - (IR) [29,16], Augmentin® - (IR) [29,23], Auglavin PPH [31,00], Polamoklav [31,00], Amoksilav® [31,35], <b>Augmentin® - (IR)</b> [32,30], Augmentin® - (IR) [32,32], <b>Augmentin®</b> [34,92], Taromentin® [40,04]</p>		<p>INN: <b>Amoxicillin + Clavulanic acid</b> ATC: <b>J01CR02</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>061428</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Odpowiedniki: Amoksilav® - (IR) [X], Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas [25,22], Amoksilav® - (IR) [26,86], Co-amoxiclav Bluefish [27,29], Penlac [27,29], Amoksilav® - (IR) [27,45], Ramoclav [28,48], Augmentin® - (IR) [29,11], Augmentin® - (IR) [29,16], Augmentin® - (IR) [29,23], Auglavin PPH [31,00], Polamoklav [31,00], Amoksilav® [31,35], <b>Augmentin® - (IR)</b> [32,30], Augmentin® - (IR) [32,32], <b>Augmentin®</b> [34,92], Taromentin® [40,04]</p>																							
<p><b>Augmentin®</b>: tabl. powł. <b>1 g</b> - 20 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>42,29</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>42,29</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>21,15</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>42,29</b>	Limit	<b>42,29</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>21,15</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Augmentin® ES</b>: prosz. do przyg. zaw. doust. <b>642,9 mg/5 ml</b> - 1 but. 100 ml ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>39,64</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>38,07</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>20,61</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>39,64</b>	Limit	<b>38,07</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>20,61</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
100%	<b>42,29</b>																								
Limit	<b>42,29</b>																								
50% <sup>(1)</sup>	<b>21,15</b>																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	<b>39,64</b>																								
Limit	<b>38,07</b>																								
50% <sup>(1)</sup>	<b>20,61</b>																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
<p>INN: <b>Amoxicillin + Clavulanic acid</b> ATC: <b>J01CR02</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>109399</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Odpowiedniki: Penlac [36,84], <b>Augmentin®</b> [42,29], Amoksilav® [42,84]</p>		<p>INN: <b>Amoxicillin + Clavulanic acid</b> ATC: <b>J01CR02</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>061431</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Odpowiedniki: Penlac [36,84], <b>Augmentin®</b> [42,29], Amoksilav® [42,84]</p>																							
<p><b>Augmentin® - (IR)</b>: tabl. powł. <b>1 g</b> - 14 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>29,23</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>29,23</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>14,62</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>29,23</b>	Limit	<b>29,23</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>14,62</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Aulin®</b>: granulaty do przyg. zaw. <b>100 mg</b> - 30 sasz. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>18,21</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>18,09</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>9,17</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>18,21</b>	Limit	<b>18,09</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>9,17</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
100%	<b>29,23</b>																								
Limit	<b>29,23</b>																								
50% <sup>(1)</sup>	<b>14,62</b>																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	<b>18,21</b>																								
Limit	<b>18,09</b>																								
50% <sup>(1)</sup>	<b>9,17</b>																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
<p>INN: <b>Amoxicillin + Clavulanic acid</b> ATC: <b>J01CR02</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>217345</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Delfarma Sp. z o.o. Odpowiedniki: Amoksilav® - (IR) [X], Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas [25,22], Amoksilav® - (IR) [26,86], Co-amoxiclav Bluefish [27,29], Penlac [27,29], Amoksilav® - (IR) [27,45], Ramoclav [28,48], Augmentin® - (IR) [29,11], Augmentin® - (IR) [29,16], <b>Augmentin® - (IR)</b> [29,23], Auglavin PPH [31,00], Polamoklav [31,00], Amoksilav® [31,35], <b>Augmentin® - (IR)</b> [32,30], Augmentin® - (IR) [32,32], Augmentin® [34,92], Taromentin® [40,04]</p>		<p>INN: <b>Nimesulide</b> ATC: <b>M01AX17</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>411436</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:D, T2:D, T3:X</b> Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Amoksilav® - (IR) [X], Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas [25,22], Amoksilav® - (IR) [26,86], Co-amoxiclav Bluefish [27,29], Penlac [27,29], Amoksilav® - (IR) [27,45], Ramoclav [28,48], Augmentin® - (IR) [29,11], Augmentin® - (IR) [29,16], Augmentin® - (IR) [29,23], Auglavin PPH [31,00], Polamoklav [31,00], Amoksilav® [31,35], <b>Augmentin® - (IR)</b> [32,30], Augmentin® - (IR) [32,32], Augmentin® [34,92], Taromentin® [40,04]</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>8,33</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>3,83</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>6,42</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>8,33</b>	Limit	<b>3,83</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>6,42</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.												
100%	<b>8,33</b>																								
Limit	<b>3,83</b>																								
50% <sup>(1)</sup>	<b>6,42</b>																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
<p><b>Augmentin® - (IR)</b>: tabl. powł. <b>1 g</b> - 14 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>29,11</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>29,11</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>14,56</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>29,11</b>	Limit	<b>29,11</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>14,56</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p>INN: <b>Nimesulide</b> ATC: <b>M01AX17</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>411320</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:D, T2:D, T3:X</b> Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Amoksilav® - (IR) [X], Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas [25,22], Amoksilav® - (IR) [26,86], Co-amoxiclav Bluefish [27,29], Penlac [27,29], Amoksilav® - (IR) [27,45], Ramoclav [28,48], Augmentin® - (IR) [29,11], Augmentin® - (IR) [29,16], Augmentin® - (IR) [29,23], Auglavin PPH [31,00], Polamoklav [31,00], Amoksilav® [31,35], <b>Augmentin® - (IR)</b> [32,30], Augmentin® - (IR) [32,32], Augmentin® [34,92], Taromentin® [40,04]</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>15,99</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>7,67</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>12,16</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>15,99</b>	Limit	<b>7,67</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>12,16</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
100%	<b>29,11</b>																								
Limit	<b>29,11</b>																								
50% <sup>(1)</sup>	<b>14,56</b>																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	<b>15,99</b>																								
Limit	<b>7,67</b>																								
50% <sup>(1)</sup>	<b>12,16</b>																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
<p>INN: <b>Amoxicillin + Clavulanic acid</b> ATC: <b>J01CR02</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>198385</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Inpharm Sp. z o.o. Odpowiedniki: Amoksilav® - (IR) [X], Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas [25,22], Amoksilav® - (IR) [26,86], Co-amoxiclav Bluefish [27,29], Penlac [27,29], Amoksilav® - (IR) [27,45], Ramoclav [28,48], <b>Augmentin® - (IR)</b> [29,11], Augmentin® - (IR) [29,16], Augmentin® - (IR) [29,23], Auglavin PPH [31,00], Polamoklav [31,00], Amoksilav® [31,35], <b>Augmentin® - (IR)</b> [32,30], Augmentin® - (IR) [32,32], Augmentin® [34,92], Taromentin® [40,04]</p>		<p><b>Aulin®</b>: tabl. <b>100 mg</b> - 30 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>103,95</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td><b>13,16</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>103,95</b>	Limit	<b>0,00</b>	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	<b>13,16</b>	S <sup>(4)</sup>	bezpł.										
100%	<b>103,95</b>																								
Limit	<b>0,00</b>																								
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	<b>13,16</b>																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
<p><b>Augmentin® - (IR)</b>: tabl. powł. <b>1 g</b> - 14 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>29,16</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>29,16</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>14,58</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>29,16</b>	Limit	<b>29,16</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>14,58</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p>INN: <b>Nimesulide</b> ATC: <b>M01AX17</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>411337</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:D, T2:D, T3:X</b> Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Amoksilav® - (IR) [X], Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas [25,22], Amoksilav® - (IR) [26,86], Co-amoxiclav Bluefish [27,29], Penlac [27,29], Amoksilav® - (IR) [27,45], Ramoclav [28,48], Augmentin® - (IR) [29,11], Augmentin® - (IR) [29,16], Augmentin® - (IR) [29,23], Auglavin PPH [31,00], Polamoklav [31,00], Amoksilav® [31,35], <b>Augmentin® - (IR)</b> [32,30], Augmentin® - (IR) [32,32], Augmentin® [34,92], Taromentin® [40,04]</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>103,95</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td><b>13,16</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>103,95</b>	Limit	<b>0,00</b>	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	<b>13,16</b>	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	<b>29,16</b>																								
Limit	<b>29,16</b>																								
50% <sup>(1)</sup>	<b>14,58</b>																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	<b>103,95</b>																								
Limit	<b>0,00</b>																								
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	<b>13,16</b>																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
<p>INN: <b>Amoxicillin + Clavulanic acid</b> ATC: <b>J01CR02</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>230542</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> PharmaVitea Sp. z o.o. sp. k. Odpowiedniki: Amoksilav® - (IR) [X], Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas [25,22], Amoksilav® - (IR) [26,86], Co-amoxiclav Bluefish [27,29], Penlac [27,29], Amoksilav® - (IR) [27,45], Ramoclav [28,48], Augmentin® - (IR) [29,11], Augmentin® - (IR) [29,16], Augmentin® - (IR) [29,23], Auglavin PPH [31,00], Polamoklav [31,00], Amoksilav® [31,35], <b>Augmentin® - (IR)</b> [32,30], Augmentin® - (IR) [32,32], Augmentin® [34,92], Taromentin® [40,04]</p>		<p>INN: <b>Fluticasone propionate + Salmeterol</b> ATC: <b>R03AK06</b> wyk: <b>A</b> EAN ~ <b>144763</b> (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Amoksilav® - (IR) [X], Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas [25,22], Amoksilav® - (IR) [26,86], Co-amoxiclav Bluefish [27,29], Penlac [27,29], Amoksilav® - (IR) [27,45], Ramoclav [28,48], Augmentin® - (IR) [29,11], Augmentin® - (IR) [29,16], Augmentin® - (IR) [29,23], Auglavin PPH [31,00], Polamoklav [31,00], Amoksilav® [31,35], <b>Augmentin® - (IR)</b> [32,30], Augmentin® - (IR) [32,32], Augmentin® [34,92], Taromentin® [40,04]</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>71,84</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td><b>3,20</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>71,84</b>	Limit	<b>0,00</b>	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	<b>3,20</b>	S <sup>(4)</sup>	bezpł.										
100%	<b>71,84</b>																								
Limit	<b>0,00</b>																								
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	<b>3,20</b>																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
<p><b>Augmentin® - (IR)</b>: tabl. powł. <b>1 g</b> - 14 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>32,32</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>29,99</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>17,33</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>32,32</b>	Limit	<b>29,99</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>17,33</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Aurodisc</b>: prosz. do inhal. <b>50/100 µg/dawkę</b> - 1 inhal. 60 dawek</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>71,84</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td><b>3,20</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>71,84</b>	Limit	<b>0,00</b>	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	<b>3,20</b>	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	<b>32,32</b>																								
Limit	<b>29,99</b>																								
50% <sup>(1)</sup>	<b>17,33</b>																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	<b>71,84</b>																								
Limit	<b>0,00</b>																								
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	<b>3,20</b>																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
<p>INN: <b>Amoxicillin + Clavulanic acid</b> ATC: <b>J01CR02</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>209483</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Inpharm Sp. z o.o. Odpowiedniki: Amoksilav® - (IR) [X], Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas [25,22], Amoksilav® - (IR) [26,86], Co-amoxiclav Bluefish [27,29], Penlac [27,29], Amoksilav® - (IR) [27,45], Ramoclav [28,48], Augmentin® - (IR) [29,11], Augmentin® - (IR) [29,16], Augmentin® - (IR) [29,23], Auglavin PPH [31,00], Polamoklav [31,00], Amoksilav® [31,35], <b>Augmentin® - (IR)</b> [32,30], <b>Augmentin® - (IR)</b> [32,32], Augmentin® [34,92], Taromentin® [40,04]</p>		<p>INN: <b>Fluticasone propionate + Salmeterol</b> ATC: <b>R03AK06</b> wyk: <b>A</b> EAN ~ <b>144755</b> (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Amoksilav® - (IR) [X], Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas [25,22], Amoksilav® - (IR) [26,86], Co-amoxiclav Bluefish [27,29], Penlac [27,29], Amoksilav® - (IR) [27,45], Ramoclav [28,48], Augmentin® - (IR) [29,11], Augmentin® - (IR) [29,16], Augmentin® - (IR) [29,23], Auglavin PPH [31,00], Polamoklav [31,00], Amoksilav® [31,35], <b>Augmentin® - (IR)</b> [32,30], <b>Augmentin® - (IR)</b> [32,32], Augmentin® [34,92], Taromentin® [40,04]</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>71,84</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td><b>3,20</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>71,84</b>	Limit	<b>0,00</b>	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	<b>3,20</b>	S <sup>(4)</sup>	bezpł.										
100%	<b>71,84</b>																								
Limit	<b>0,00</b>																								
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	<b>3,20</b>																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								





ZAKODOWANY DO WALKI  
Z ZAKAŻENIEM

Aurodisc: prosz. do inhal. 50/250 µg/dawkę - 1 inhal. 60 dawek	Rx	100%	85,27
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	10,15
INN: Fluticasono propionato + Salmeterol   ATC: R03AK06   wyk: A   EAN ~ 144759			
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.			
AuroDulox: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	15,10
		Limit	14,56
		30% <sup>(1)</sup>	4,91
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: Duloxetine   ATC: N06AX21   wyk: B   EAN ~ 143298			
(1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: AuroDulox [15,10], Duloxetine Zentiva [15,53], Dulxetenon [15,53], Dulofor [15,64], Duloxetine Mylan [15,98], Dulsevía [16,38], Dutilox [16,43], Depratal [21,20]			
AuroDulox: kaps. dojelitowe, twarde 60 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	28,44
		Limit	28,44
		30% <sup>(1)</sup>	8,53
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: Duloxetine   ATC: N06AX21   wyk: B   EAN ~ 143299			
(1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Dulsevía - (IR) [28,40], AuroDulox [28,44], Duloxetine Zentiva [29,28], Dulxetenon [29,28], Dulofor [29,51], Duloxetine Mylan [30,20], Dulsevía [31,00], Dutilox [31,12], Depratal [40,68]			
AuroFena: tabl. podpoliczkowe 100 µg - 28 szt. ◆	Rx-w	100%	485,73
		Limit	485,73
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: Fentanyl   ATC: N02AB03   wyk: N   EAN ~ 145596			
(1) Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: AuroFena [485,73], Effentora [568,16]			
AuroFena: tabl. podpoliczkowe 200 µg - 28 szt. ◆	Rx-w	100%	485,73
		Limit	485,73
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: Fentanyl   ATC: N02AB03   wyk: N   EAN ~ 145598			
(1) Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: AuroFena [485,73], Effentora [568,16]			
AuroFena: tabl. podpoliczkowe 400 µg - 28 szt. ◆	Rx-w	100%	485,73
		Limit	485,73
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: Fentanyl   ATC: N02AB03   wyk: N   EAN ~ 145600			
(1) Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: AuroFena [485,73], Effentora [568,16]			
Aurorix®: tabl. powł. 150 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	22,10
		Limit	16,38
		30% <sup>(1)</sup>	10,63
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: Moclobemide   ATC: N06AG02   wyk: B   EAN ~ 094813			
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Mylan Healthcare Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Moklar [16,38], Mobemid® [18,10], Aurorix® [22,10]			
Aurosolin: tabl. powł. 5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	18,55
		Limit	17,65
		30% <sup>(1)</sup>	6,20
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: Solifenacin succinate   ATC: G04BD08   wyk: B   EAN ~ 146131			
(1) Zespół pęcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Solifenacin Stada [X], Solifurin [X], Beloflow [15,41], Silamil [16,15], Soreca [18,54], Aurosolin [18,55], Solinco [18,85], Vesisol [20,21], Afenix [20,38], Zevesin [20,39], Uronorm [20,85], Vesoligo [20,85], Adabok [21,99]			

Aurosolin: tabl. powł. 10 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	34,97
		Limit	34,97
		30% <sup>(1)</sup>	10,49
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: Solifenacin succinate   ATC: G04BD08   wyk: B   EAN ~ 146139			
(1) Zespół pęcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Solifenacin Stada [X], Beloflow [28,70], Soreca [34,95], Aurosolin [34,97], Silamil [35,29], Solifenacin Medreg [35,29], Solinco [35,57], Solifurin [36,14], Vesisol [37,63], Afenix [38,65], Zevesin [38,66], Uronorm [39,57], Vesoligo [39,57], Adabok [41,86]			
AuroValsart: tabl. powł. 80 mg - 28 szt.	Rx	100%	9,61
		Limit	9,61
		30% <sup>(1)</sup>	2,88
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: Valsartan   ATC: C09CA03   wyk: B   EAN ~ 134578			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Apo-Valsart [X], Valsartan Medical Valley [9,61], AuroValsart [9,61], Valtap [9,75], Valzek [12,89], Tensart [13,46], Bespres [13,58], Valsacor® 80 mg tabletki powlekane [14,02], Avasart [14,15], Dipper-Mono [14,15], Vanatex® [14,15], Diovian® [22,42]			
AuroValsart: tabl. powł. 160 mg - 28 szt.	Rx	100%	17,89
		Limit	17,89
		30% <sup>(1)</sup>	5,37
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: Valsartan   ATC: C09CA03   wyk: B   EAN ~ 134581			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Apo-Valsart [X], Valsartan Medical Valley [17,89], AuroValsart [17,89], Valtap [18,18], Valzek [24,82], Tensart [25,22], Bespres [26,19], Avasart [26,77], Valsacor® 160 mg tabletki powlekane [27,09], Dipper-Mono [27,34], Vanatex® [27,34], Diovian® [33,54]			
AuroValsart HCT: tabl. powł. 80/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	9,75
		Limit	9,75
		30% <sup>(1)</sup>	2,93
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: Valsartan + Hydrochlorothiazide   ATC: C09DA03   wyk: B   EAN ~ 132378			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: AuroValsart HCT [9,75], Co-Valsacor [13,30], Co-Bespres [13,50], Vanatex® HCT [14,04], Co-Dipper [14,19]			
AuroValsart HCT: tabl. powł. 160/25 mg - 28 szt.	Rx	100%	18,18
		Limit	18,18
		30% <sup>(1)</sup>	5,45
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: Valsartan + Hydrochlorothiazide   ATC: C09DA03   wyk: B   EAN ~ 132387			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: AuroValsart HCT [18,18], Valtap HCT [18,30], Co-Bespres - (IR) [22,19], Tensart HCT [25,22], Co-Valsacor [27,09], Co-Dipper [27,40], Co-Bespres [27,46], Vanatex® HCT [28,20]			
AuroValsart HCT: tabl. powł. 160/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	18,18
		Limit	18,18
		30% <sup>(1)</sup>	5,45
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: Valsartan + Hydrochlorothiazide   ATC: C09DA03   wyk: B   EAN ~ 132383			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Valtap HCT [18,18], AuroValsart HCT [18,18], Tensart HCT [25,22], Co-Valsacor [27,09], Co-Bespres [27,34], Co-Dipper [27,40], Vanatex® HCT [28,20]			
Auroxetyn: kaps. twarde 10 mg - 28 szt.	Rx	100%	31,41
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	8,04
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: Atomoxetine hydrochloride   ATC: N06BA09   wyk: B   EAN ~ 139338			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży   Kat. ciąży: C   Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Auroxetyn [31,41], Konaten [31,73]			



Auroxetyn : kaps. twarde 18 mg - 28 szt.	Rx	100%	53,86
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	9,24
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atomoxetine hydrochloride* ATC: N06BA09 wyk: B EAN ~ 139360

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży | Kat. ciąży: C Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Auroxetyn [53,86], Konaten [54,43]

Auroxetyn : kaps. twarde 25 mg - 28 szt.	Rx	100%	74,00
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	10,78
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atomoxetine hydrochloride* ATC: N06BA09 wyk: B EAN ~ 139349

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży | Kat. ciąży: C Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Atomoksetyna Medice [66,42], Konaten [73,51], Auroxetyn [74,00]

Auroxetyn : kaps. twarde 40 mg - 28 szt.	Rx	100%	115,08
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	12,01
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atomoxetine hydrochloride* ATC: N06BA09 wyk: B EAN ~ 139371

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży | Kat. ciąży: C Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Atomoksetyna Medice [102,58], Konaten [113,96], Auroxetyn [115,08]

Auroxetyn - (IR) : kaps. twarde 40 mg - 30 szt.	Rx	100%	105,69
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Atomoxetine hydrochloride* ATC: N06BA09 wyk: B EAN ~ 150824

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży | Kat. ciąży: C Inpharm Sp. z o.o.

Avamina : tabl. powł. 500 mg - 30 szt.	Rx	100%	4,51
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,82
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Metformin hydrochloride* ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 765379

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B Bioton S.A.

Odpowiedniki: Metcrean [4,26], Metformin Bluefish [4,26], Zenofer [4,47], Avamina [4,51], Siofor® 500 [5,11], Formetic [5,13], Metformax® 500 [5,71], Glucophage® 500 mg [5,91], Metfogamma 500 [7,30]

Avamina : tabl. powł. 500 mg - 60 szt.	Rx	100%	7,66
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Metformin hydrochloride* ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 765386

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B Bioton S.A.

Odpowiedniki: Metcrean [7,66], Avamina [7,66], Zenofer [8,07], Siofor® 500 [8,55], Formetic [9,36], Etfom 500 [10,54], Metformax® 500 [10,54]

Avamina : tabl. powł. 500 mg - 90 szt.	Rx	100%	10,56
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Metformin hydrochloride* ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 661563

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B Bioton S.A.

Odpowiedniki: Avamina [10,56], Metcrean [11,03], Zenofer [11,65], Siofor® 500 [12,38], Formetic [12,55], Etfom 500 [15,50]

Avamina : tabl. powł. 850 mg - 30 szt.	Rx	100%	6,97
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,55
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Metformin hydrochloride* ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 765393

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B Bioton S.A.

Odpowiedniki: Metfogamma 850 [6,20], Metformin Bluefish [6,37], Metcrean [6,64], Avamina [6,97], Zenofer [6,99], Formetic [7,39], Siofor® 850 [7,40], Metformax® 850 [7,93], Glucophage® 850 mg [8,16]

Avamina : tabl. powł. 850 mg - 60 szt.	Rx	100%	12,50
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Metformin hydrochloride* ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 765409

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B Bioton S.A.

Odpowiedniki: Avamina [12,50], Zenofer [13,07], Siofor® 850 [13,88], Formetic [13,93], Glucophage® 850 mg [13,94], Etfom 850 [14,95], Metformax® 850 [14,95]

Avamina : tabl. powł. 850 mg - 90 szt.	Rx	100%	16,95
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	4,08
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Metformin hydrochloride* ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 661587

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B Bioton S.A.

Odpowiedniki: Avamina [16,95], Metcrean [17,79], Zenofer [18,91], Siofor® 850 [20,29], Formetic [20,57], Etfom 850 [21,76], Metformax® 850 [21,76]

Avamina : tabl. powł. 1000 mg - 30 szt.	Rx	100%	8,36
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,77
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Metformin hydrochloride* ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 765423

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B Bioton S.A.

Odpowiedniki: Metformin Bluefish [7,33], Metfogamma 1000 [7,93], Zenofer [8,07], Avamina [8,36], Siofor® 1000 [8,55], Formetic [8,61], Glucophage® 1000 mg [8,63], Metformax® 1000 [8,67]

Avamina : tabl. powł. 1000 mg - 60 szt.	Rx	100%	14,27
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Metformin hydrochloride* ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 765430

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B Bioton S.A.

Odpowiedniki: Glucophage® 1000 mg [X], Metcrean [14,27], Avamina [14,27], Metformax® 1000 - (IR) [15,07], Zenofer [15,13], Metformax® 1000 [16,16], Siofor® 1000 [16,16], Formetic [16,88], Etfom [17,36]

Avamina : tabl. powł. 1000 mg - 90 szt.	Rx	100%	19,69
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	4,80
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Metformin hydrochloride* ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 661600

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B Bioton S.A.

Odpowiedniki: Avamina [19,69], Zenofer [22,01], Metformax® 1000 - (IR) [22,10], Siofor® 1000 [23,56], Metformax® 1000 [23,63], Formetic [23,95]

Avamina SR : tabl. o przedł. uwalnianiu 500 mg - 30 szt.	Rx	100%	9,31
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	8,62
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Metformin hydrochloride* ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 139524

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B Bioton S.A.

Odpowiedniki: Zenofer SR [6,57], Etfom SR [6,76], Metcrean XR [6,86], Siofor® XR 500 mg [7,71], Symformin XR [7,81], Avamina SR [9,31], Glucophage® XR [9,32], Metformax® SR 500 [9,48]

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

Avamina SR: tabl. o przedl. uwalnianiu 500 mg - 60 szt.	Rx	100% 17,25 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 12,66 S <sup>(3)</sup> bezpl.		100% 14,15 Limit 10,70 30% <sup>(1)</sup> 6,66 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 395254 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Bioton S.A. Odpowiedniki: Diabufor XR [10,85], Ranmet XR [10,85], Zenofor SR [12,29], Etfom SR [12,68], Metcrean XR [12,89], Symformin XR [14,89], Avamina SR [17,25], Metformax® SR 500 [18,58], Glucophage® XR [18,87]			INN: <i>Valsartan</i> ATC: C09CA03 wyk: B EAN ~ 773695 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż.(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Polfarmex S.A. Odpowiedniki: Apo-Valsart [X], AuroValsart [9,61], Valsartan Medical Valley [9,61], Valtap [9,75], Valzek [12,89], Tensart [13,46], Bespres [13,58], Valsacor® 80 mg tabletki powlekane [14,02], Dipper-Mono [14,15], Vanatek® [14,15], Avasart [14,15], Diovan® [22,42]	
Avamina SR: tabl. o przedl. uwalnianiu 500 mg - 90 szt.	Rx	100% 22,91 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 14,43 S <sup>(3)</sup> bezpl.		100% 26,77 Limit 21,40 30% <sup>(1)</sup> 11,79 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 139526 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Bioton S.A. Odpowiedniki: Metcrean XR [19,14], Avamina SR [22,91], Metformax® SR 500 [27,69]			INN: <i>Valsartan</i> ATC: C09CA03 wyk: B EAN ~ 773763 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż.(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Polfarmex S.A. Odpowiedniki: Apo-Valsart [X], AuroValsart [17,89], Valsartan Medical Valley [17,89], Valtap [18,18], Valzek [24,82], Tensart [25,22], Bespres [26,19], Avasart [26,77], Valsacor® 160 mg tabletki powlekane [27,09], Dipper-Mono [27,34], Vanatex® [27,34], Diovan® [33,54]	
Avamina SR: tabl. o przedl. uwalnianiu 500 mg - 120 szt.	Rx	100% 30,07 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 17,70 S <sup>(3)</sup> bezpl.		100% 12,45 Limit 10,70 30% <sup>(1)</sup> 4,96 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 139527 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Bioton S.A. Odpowiedniki: Etfom SR [24,81], Siofor® XR 500 mg [29,07], Avamina SR [30,07]			INN: <i>Amlodipine + Valsartan</i> ATC: C09DB01 wyk: B EAN ~ 134274 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Polfarmex S.A. Odpowiedniki: Avasart Plus [12,45], Dipperam [12,61]	
Avamina SR: tabl. o przedl. uwalnianiu 750 mg - 30 szt.	Rx	100% 13,07 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 10,43 S <sup>(3)</sup> bezpl.		100% 24,25 Limit 21,40 30% <sup>(1)</sup> 9,27 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 139528 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Bioton S.A. Odpowiedniki: Zenofor SR [9,43], Etfom SR [9,69], Siofor® XR 750 mg [10,82], Symformin XR [11,26], Metformax® SR 750 [11,46], Avamina SR [13,07], Glucophage® XR [13,67]			INN: <i>Amlodipine + Valsartan</i> ATC: C09DB01 wyk: B EAN ~ 134283 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Polfarmex S.A. Odpowiedniki: Dipperam [24,25], Avasart Plus [24,25]	
Avamina SR: tabl. o przedl. uwalnianiu 750 mg - 60 szt.	Rx	100% 24,11 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 15,63 S <sup>(3)</sup> bezpl.		100% 24,25 Limit 21,40 30% <sup>(1)</sup> 9,27 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 139529 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Bioton S.A. Odpowiedniki: Diabufor XR [16,01], Ranmet XR [16,01], Zenofor SR [18,27], Etfom SR [18,84], Symformin XR [22,16], Metformax® SR 750 [22,57], Avamina SR [24,11], Glucophage® XR [28,12]			INN: <i>Amlodipine + Valsartan</i> ATC: C09DB01 wyk: B EAN ~ 134292 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Polfarmex S.A. Odpowiedniki: Dipperam [24,25], Avasart Plus [24,25]	
Avamina SR: tabl. o przedl. uwalnianiu 1000 mg - 30 szt.	Rx	100% 16,50 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 11,91 S <sup>(3)</sup> bezpl.		100% 8,12 Limit 2,17 30% <sup>(1)</sup> 5,94 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 139532 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Bioton S.A. Odpowiedniki: Glucophage® XR [X], Zenofor SR [12,29], Etfom SR [12,68], Siofor® XR 1000 mg [14,27], Metformax® SR 1000 [14,79], Symformin XR [14,86], Avamina SR [16,50]			INN: <i>Carvedilol</i> ATC: C07AG02 wyk: B EAN ~ 074051 (1) Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II - NYHA IV WP: Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA Odpowiedniki: Dilatrend® [X], Carvedilol-ratiopharm® 6,25 [7,64], Hypoten® [7,66], Atram® 6,25 mg [7,67], Coryol® [8,06], Carvetrend [8,12], Avedol [8,12]	
Avamina SR: tabl. o przedl. uwalnianiu 1000 mg - 60 szt.	Rx	100% 32,48 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 20,11 S <sup>(3)</sup> bezpl.		100% 11,38 Limit 4,34 30% <sup>(1)</sup> 7,51 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 139533 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1; T2:B, T3:B Bioton S.A. Odpowiedniki: Diabufor XR [21,05], Ranmet XR [21,05], Zenofor SR [24,04], Etfom SR [24,81], Metformax® SR 1000 [28,92], Symformin XR [29,21], Avamina SR [32,48], Glucophage® XR [37,21]			INN: <i>Carvedilol</i> ATC: C07AG02 wyk: B EAN ~ 074099 (1) Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II - NYHA IV WP: Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA Odpowiedniki: Atram® 12,5 mg [9,64], Carvedilol-ratiopharm® 12,5 [10,12], Hypoten® [10,53], Coryol® [10,74], Avedol [11,38], Carvetrend [11,39], Dilatrend® [24,19]	



# ZOLPIC

Daj owcom odpocząć.  
zolpidem



Avedol: tabl. powł. 25 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	15,09
		Limit	8,67
		30% <sup>(1)</sup>	8,12
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Carvedilol* ATC: C07AG02 wyk: B EAN ~ 074129  
 (1) Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV WP: Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA  
 Odpowiedniki: Dilatrend® [X], Atram® 25 mg [13,44], Carvedilol-ratiopharm® 25 [13,84], Coryol® [13,96], Hypoten® [14,26], Avedol [15,09], Carvetrend [15,10]

Axtil®: tabl. 2,5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	6,31
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,93
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril* ATC: C09AA05 wyk: B EAN ~ 337958  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroby nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Adamed Sp. z o.o.

Axtil®: tabl. 5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	11,74
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,97
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril* ATC: C09AA05 wyk: B EAN ~ 337972  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroby nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Adamed Sp. z o.o.

Axtil®: tabl. 10 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	22,39
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	12,85
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril* ATC: C09AA05 wyk: B EAN ~ 337989  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroby nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Piramil 10 mg - (IR) [16,06], Piramil 10 mg - (IR) [16,06], Ampril 10 mg - (IR) [16,17], Piramil 10 mg - (IR) [16,17], Ampril 10 mg - (IR) [16,20], Piramil 10 mg - (IR) [16,98], Ampril 10 mg [18,35], Ramipril Aurovitas [21,33], Vivace [22,01], Axtil® [22,39]

Axyven: tabl. o przedl. uwalnianiu 37,5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	13,37
		Limit	10,92
		30% <sup>(1)</sup>	5,73
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Venlafaxine* ATC: N06AX16 wyk: B EAN ~ 660636  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Aristo Pharma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Symfaksin ER® [10,37], Oriven [10,53], Faxigen XL [11,02], Efevelon SR [11,39], Lafactin [12,03], Velaxin® ER 37,5 [12,56], Venlectine [12,69], Alventa® [12,77], Venlafaxine Apotex [12,82], Faxelet ER [13,10], Axyven [13,37], Prefaxine [13,80]

Axyven: tabl. o przedl. uwalnianiu 75 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	25,04
		Limit	21,84
		30% <sup>(1)</sup>	9,75
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Venlafaxine* ATC: N06AX16 wyk: B EAN ~ 660643  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Aristo Pharma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Venlafaxine Bluefish XL [17,37], Alventa® - (IR) [17,75], Symfaksin ER® [19,46], Oriven [19,60], Faxigen XL [20,62], Lafactin [22,78], Alventa® [23,03], Efevelon SR [23,60], Velaxin® ER 75 [23,91], Venlectine [24,18], Venlafaxine Apotex [24,46], Faxelet ER [24,62], Axyven [25,04], Efectin® ER 75 [25,55], Prefaxine [26,50]

Axyven: tabl. o przedl. uwalnianiu 150 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	46,26
		Limit	43,68
		30% <sup>(1)</sup>	15,68
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Venlafaxine* ATC: N06AX16 wyk: B EAN ~ 660650  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Aristo Pharma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Venlafaxine Bluefish XL [31,86], Symfaksin ER® [32,21], Alventa® - (IR) [32,27], Oriven [32,80], Faxigen XL [38,30], Lafactin [42,60], Alventa® [43,10], Efevelon SR [44,25], Efectin® ER 150 [44,82], Velaxin® ER 150 [44,84], Venlectine [45,62], Axyven [46,26], Venlafaxine Apotex [46,77], Faxelet ER [47,11], Prefaxine [50,06]

Azathioprine VIS: tabl. 50 mg - 30 szt.	Rx	100%	19,21
		Limit	16,68
		B <sup>(1)</sup>	2,53
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	5,73

INN: *Azathioprine* ATC: L04AX01 wyk: B EAN ~ 232826  
 (1) Nowotwory złośliwe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nieswoiste zapalenie jelit inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 rż.; nefropatia IgA inna niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 rż.; zapalenie naczyń inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 rż.; choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanki lub komórek; sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; ziarniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
 Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne "VIS" Sp. z o.o.

Azathioprine VIS: tabl. 50 mg - 50 szt.	Rx	100%	30,13
		Limit	27,80
		B <sup>(1)</sup>	2,33
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	5,53

INN: *Azathioprine* ATC: L04AX01 wyk: B EAN ~ 232819  
 (1) Nowotwory złośliwe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nieswoiste zapalenie jelit inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 rż.; nefropatia IgA inna niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 rż.; zapalenie naczyń inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 rż.; choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanki lub komórek; sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; ziarniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
 Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne "VIS" Sp. z o.o.

Azibiot®: tabl. powł. 500 mg - 3 szt.	Rx	100%	19,75
		Limit	12,92
		50% <sup>(1)</sup>	13,29
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Azithromycin* ATC: J01FA10 wyk: B EAN ~ 054816  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Nobaxin [10,00], Azithromycin Genoptim [10,85], Azitroz 500 [14,64], AzitroLek - (IR) [15,22], Macromax [15,22], AzitroLek - (IR) [15,80], Azycyna [17,29], Azimycin® [19,31], Azibiot® [19,75], AzitroLek [19,81], Sumamed® [24,39]

Azimycin®: tabl. powł. 250 mg - 6 szt.	Rx	100%	30,18
		Limit	12,92
		50% <sup>(1)</sup>	21,35
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Azithromycin* ATC: J01FA10 wyk: B EAN ~ 034412  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA

Odpowiedniki: AzitroLek - (IR) [15,22], AzitroLek - (IR) [15,80], AzitroLek [22,67], Sumamed® [24,39], Azycyna [26,68], Azimycin® [30,18]

Azimycin®: tabl. powł. 500 mg - 3 szt.	Rx	100%	19,31
		Limit	12,92
		50% <sup>(1)</sup>	11,57
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Azithromycin* ATC: J01FA10 wyk: B EAN ~ 035518  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA

Odpowiedniki: Nobaxin [10,00], Azithromycin Genoptim [10,85], Azitroz 500 [14,64], AzitroLek - (IR) [15,22], Macromax [15,22], AzitroLek - (IR) [15,80], Azycyna [17,29], Azimycin® [19,31], Azibiot® [19,75], AzitroLek [19,81], Sumamed® [24,39]

<b>Azithromycin Genoptim:</b> tabl. powł. <b>500 mg</b> - 3 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>10,85</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>10,85</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>5,43</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>10,85</b>	Limit	<b>10,85</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>5,43</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<b>AzitroLek - (IR):</b> tabl. powł. <b>250 mg</b> - 6 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>15,22</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>12,92</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>8,76</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>15,22</b>	Limit	<b>12,92</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>8,76</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>10,85</b>																						
Limit	<b>10,85</b>																						
50% <sup>(1)</sup>	<b>5,43</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
100%	<b>15,22</b>																						
Limit	<b>12,92</b>																						
50% <sup>(1)</sup>	<b>8,76</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
INN: <b>Azithromycin</b>   ATC: <b>J01FA10</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>969876</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Synoptis Pharma Sp. z o.o.		INN: <b>Azithromycin</b>   ATC: <b>J01FA10</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>214023</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Delfarma Sp. z o.o.																					
<b>AzitroLek:</b> prosz. do przyg. zaw. doust. <b>100 mg/5 ml</b> - 1 but. 20 ml	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>16,93</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>7,86</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>13,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>16,93</b>	Limit	<b>7,86</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>13,00</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<b>AzitroLek - (IR):</b> tabl. powł. <b>250 mg</b> - 6 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>15,80</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>12,92</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>9,34</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>15,80</b>	Limit	<b>12,92</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>9,34</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>16,93</b>																						
Limit	<b>7,86</b>																						
50% <sup>(1)</sup>	<b>13,00</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
100%	<b>15,80</b>																						
Limit	<b>12,92</b>																						
50% <sup>(1)</sup>	<b>9,34</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
INN: <b>Azithromycin</b>   ATC: <b>J01FA10</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>635320</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Sandoz GmbH		(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Inpharm Sp. z o.o.																					
<b>AzitroLek:</b> prosz. do przyg. zaw. doust. <b>200 mg/5 ml</b> - 1 but. 37,5 ml	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>52,23</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>29,48</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>37,49</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>52,23</b>	Limit	<b>29,48</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>37,49</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<b>AzitroLek - (IR):</b> tabl. powł. <b>500 mg</b> - 3 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>15,80</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>12,92</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>9,34</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>15,80</b>	Limit	<b>12,92</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>9,34</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>52,23</b>																						
Limit	<b>29,48</b>																						
50% <sup>(1)</sup>	<b>37,49</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
100%	<b>15,80</b>																						
Limit	<b>12,92</b>																						
50% <sup>(1)</sup>	<b>9,34</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
INN: <b>Azithromycin</b>   ATC: <b>J01FA10</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>702682</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Sandoz GmbH		(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Inpharm Sp. z o.o.																					
<b>AzitroLek:</b> prosz. do przyg. zaw. doust. <b>200 mg/5 ml</b> - 1 but. 30 ml	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>42,40</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>23,58</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>30,61</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>42,40</b>	Limit	<b>23,58</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>30,61</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<b>AzitroLek - (IR):</b> tabl. powł. <b>500 mg</b> - 3 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>15,22</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>12,92</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>8,76</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>15,22</b>	Limit	<b>12,92</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>8,76</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>42,40</b>																						
Limit	<b>23,58</b>																						
50% <sup>(1)</sup>	<b>30,61</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
100%	<b>15,22</b>																						
Limit	<b>12,92</b>																						
50% <sup>(1)</sup>	<b>8,76</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
INN: <b>Azithromycin</b>   ATC: <b>J01FA10</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>635344</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Sandoz GmbH		(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Delfarma Sp. z o.o.																					
<b>AzitroLek:</b> prosz. do przyg. zaw. doust. <b>200 mg/5 ml</b> - 1 but. 20 ml	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>29,79</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>15,72</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>21,93</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>29,79</b>	Limit	<b>15,72</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>21,93</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<b>AzitroLek - (IR):</b> tabl. powł. <b>500 mg</b> - 3 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>15,22</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>12,92</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>8,76</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>15,22</b>	Limit	<b>12,92</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>8,76</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>29,79</b>																						
Limit	<b>15,72</b>																						
50% <sup>(1)</sup>	<b>21,93</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
100%	<b>15,22</b>																						
Limit	<b>12,92</b>																						
50% <sup>(1)</sup>	<b>8,76</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
INN: <b>Azithromycin</b>   ATC: <b>J01FA10</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>635337</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Sandoz GmbH		(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Delfarma Sp. z o.o.																					
<b>AzitroLek:</b> tabl. powł. <b>250 mg</b> - 6 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>22,67</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>12,92</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>16,21</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>22,67</b>	Limit	<b>12,92</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>16,21</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<b>Azitrox 500:</b> tabl. powł. <b>500 mg</b> - 3 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>14,64</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>12,92</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>8,18</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>14,64</b>	Limit	<b>12,92</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>8,18</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>22,67</b>																						
Limit	<b>12,92</b>																						
50% <sup>(1)</sup>	<b>16,21</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
100%	<b>14,64</b>																						
Limit	<b>12,92</b>																						
50% <sup>(1)</sup>	<b>8,18</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
INN: <b>Azithromycin</b>   ATC: <b>J01FA10</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>573738</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Sandoz GmbH		(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Zentiva PL Sp. z o.o.																					
<b>AzitroLek:</b> tabl. powł. <b>500 mg</b> - 3 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>19,81</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>12,92</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>13,35</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>19,81</b>	Limit	<b>12,92</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>13,35</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<b>Azopt:</b> krople do oczu [zaw.] <b>10 mg/ml</b> - 1 but. 5 ml ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>33,43</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>10,14</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>33,43</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>	R <sup>(2)</sup>	<b>10,14</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>19,81</b>																						
Limit	<b>12,92</b>																						
50% <sup>(1)</sup>	<b>13,35</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
100%	<b>33,43</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
R <sup>(2)</sup>	<b>10,14</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
INN: <b>Azithromycin</b>   ATC: <b>J01FA10</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>573752</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Sandoz GmbH		INN: <b>Brinzolamide</b>   ATC: <b>S01EC04</b>   wyk: <b>C</b>   EAN ~ <b>869114</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Novartis Europharm Limited																					
<b>AzitroLek:</b> tabl. powł. <b>250 mg</b> - 6 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>26,68</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>12,92</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>18,20</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>26,68</b>	Limit	<b>12,92</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>18,20</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<b>Azopt:</b> krople do oczu [zaw.] <b>10 mg/ml</b> - 1 but. 5 ml ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>26,68</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>12,92</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>18,20</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>26,68</b>	Limit	<b>12,92</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>18,20</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>26,68</b>																						
Limit	<b>12,92</b>																						
50% <sup>(1)</sup>	<b>18,20</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
100%	<b>26,68</b>																						
Limit	<b>12,92</b>																						
50% <sup>(1)</sup>	<b>18,20</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
INN: <b>Azithromycin</b>   ATC: <b>J01FA10</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>573752</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Sandoz GmbH		(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Adamed Sp. z o.o.																					



Azycyna: tabl. powł. 500 mg - 3 szt.	Rx	100%	17,29
		Limit	12,92
		50% <sup>(1)</sup>	9,75
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Azithromycin* ATC: J01FA10 wyk: B EAN ~ 098520  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Adamed Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Nobaxin [10,00], Azithromycin Genoptim [10,85], Azitrox 500 [14,64], AzitroLek - (IR) [15,22], Macromax [15,22], AzitroLek - (IR) [15,80], Azycyna [17,29], Azimycin® [19,31], Azibio® [19,75], AzitroLek [19,81], Sumamed® [24,39]

Azycyna: zaw. doust. [granulat] 200 mg/5 ml - 1 but. 30 ml	Rx	100%	27,17
		Limit	23,58
		50% <sup>(1)</sup>	15,38
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Azithromycin* ATC: J01FA10 wyk: B EAN ~ 073573  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Adamed Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Azycyna [27,17], AzitroLek [42,40], Sumamed® forte [42,40]

Azycyna: zaw. doust. [granulat] 200 mg/5 ml - 1 but. 20 ml	Rx	100%	22,26
		Limit	15,72
		50% <sup>(1)</sup>	14,40
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Azithromycin* ATC: J01FA10 wyk: B EAN ~ 073566  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Adamed Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Azycyna [22,26], AzitroLek [29,79], Sumamed® forte [29,79]

Bactrim®: syrop 240 mg/5 ml - 1 but. 100 ml	Rx	100%	23,53
		Limit	23,53
		50% <sup>(1)</sup>	11,77
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Co-trimoxazole* ATC: J01EE01 wyk: B EAN ~ 312610  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilaktyka; zakażenie *Pneumocystis jirovecii* u pacjentów z niedoborami odporności – profilaktyka; zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem – profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Roche Polska Sp. z o.o.

Bactrim®: tabl. 480 mg - 20 szt.	Rx	100%	21,99
		Limit	21,99
		50% <sup>(1)</sup>	11,00
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Co-trimoxazole* ATC: J01EE01 wyk: B EAN ~ 276219  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilaktyka; zakażenie *Pneumocystis jirovecii* u pacjentów z niedoborami odporności – profilaktyka; zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem – profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Roche Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Bactrim® - (IR) [11,26], Bactrim® - (IR) [13,90], Bactrim® [21,99], Bisepto® 480 [28,03]

Bactrim® forte: tabl. 960 mg - 10 szt.	Rx	100%	21,99
		Limit	21,99
		50% <sup>(1)</sup>	11,00
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Co-trimoxazole* ATC: J01EE01 wyk: B EAN ~ 312719  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilaktyka; zakażenie *Pneumocystis jirovecii* u pacjentów z niedoborami odporności – profilaktyka; zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem – profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Roche Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Bactrim® forte - (IR) [9,20], Bactrim® forte - (IR) [20,82], Bactrim® forte - (IR) [20,88], Bactrim® forte [21,99], Bisepto® 960 [28,03]

Bactrim® forte - (IR): tabl. 960 mg - 10 szt.	Rx	100%	20,82
		Limit	20,82
		50% <sup>(1)</sup>	10,41
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Co-trimoxazole* ATC: J01EE01 wyk: B EAN ~ 501304  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilaktyka; zakażenie *Pneumocystis jirovecii* u pacjentów z niedoborami odporności – profilaktyka; zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem – profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Delfarma Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Bactrim® forte - (IR) [9,20], Bactrim® forte - (IR) [20,82], Bactrim® forte - (IR) [20,88], Bactrim® forte [21,99], Bisepto® 960 [28,03]

Bactrim® forte - (IR): tabl. 960 mg - 10 szt.	Rx	100%	20,88
		Limit	20,88
		50% <sup>(1)</sup>	10,44
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Co-trimoxazole* ATC: J01EE01 wyk: B EAN ~ 147500  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilaktyka; zakażenie *Pneumocystis jirovecii* u pacjentów z niedoborami odporności – profilaktyka; zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem – profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Inpharm Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Bactrim® forte - (IR) [9,20], Bactrim® forte - (IR) [20,82], Bactrim® forte - (IR) [20,88], Bactrim® forte [21,99], Bisepto® 960 [28,03]

Bazetham Retard: tabl. o przedł. uwalnianiu 0,4 mg - 30 szt.	Rx	100%	23,61
		Limit	19,21
		R <sup>(1)</sup>	7,60
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Tamsulosin hydrochloride* ATC: G04CA02 wyk: B EAN ~ 894598  
 (1) Przerost gruczołu krokowego(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: N  
 Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Omsal - (IR) [X], Urostat 0,4 mg [X], Urostat 0,4 mg - (IR) [X], Tamsiger [16,35], Urostat 0,4 mg - (IR) [16,35], Tamiron [16,49], Bazetham Retard [23,61], Omsal [23,81], Symlosin SR® [23,81], Tanyz® ERAS [23,90], Uprox XR [23,98], Adatam XR [23,99], Ranlosin [23,99], TamisPras [24,34], Apo-Tamis [24,38], Omnic Ocas® 0,4 [25,18]

Bazetham Retard: tabl. o przedł. uwalnianiu 0,4 mg - 90 szt.	Rx	100%	65,74
		Limit	57,63
		R <sup>(1)</sup>	17,71
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Tamsulosin hydrochloride* ATC: G04CA02 wyk: B EAN ~ 894642  
 (1) Przerost gruczołu krokowego(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: N  
 Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Symlosin SR® [50,85], Bazetham Retard [65,74], Ranlosin [66,31], Uprox XR [66,83], Adatam XR [66,87], Apo-Tamis [68,02]

BD Micro-Fine Plus 0,25x5 mm (31G): igły do penów - 100 szt.	WM	100%	21,01
		Limit	18,89
		30% <sup>(1)</sup>	7,79

INN: Becton Dickinson ATC: wyk: EAN ~ 205189  
 (1) Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta | Kat. ciąży: B

BD Micro-Fine Plus 0,30x8 mm (30G): igły do penów - 100 szt.	WM	100%	21,01
		Limit	18,89
		30% <sup>(1)</sup>	7,79

INN: Becton Dickinson ATC: wyk: EAN ~ 205172  
 (1) Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta | Kat. ciąży: B

BDS N: zaw. do nebulizacji 0,25 mg/ml - 20 amp. 2 ml	Rx	100%	58,11
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Budesonide* ATC: R03BA02 wyk: B EAN ~ 306144  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Przewłękła obturacyjna choroba płuc, Astma. Eozynoflowe zapalenie oskrzeli(4) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(5) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce  
 Odpowiedniki: Nebbud [58,11], BDS N [58,11], Benodil [58,80]

BDS N: zaw. do nebulizacji 0,5 mg/ml - 20 amp. 2 ml	Rx	100%	81,76
		Limit	81,59
		30% <sup>(1)</sup>	24,65
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(4)</sup>	3,37

INN: *Budesonide* ATC: R03BA02 wyk: B EAN ~ 306151  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Kobiety w ciąży(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Przewłękła obturacyjna choroba płuc, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Astma(5) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce  
 Odpowiedniki: Nebbud [81,59], Benodil [81,66], BDS N [81,76]

Bebilon Pepti 1 Syneo: prosz. - 1 op. 400 g	Ś	100%	46,86
		Limit	25,89
		30% <sup>(1)</sup>	28,74

INN: *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* ATC: V06DF wyk: EAN ~ 033957  
 (1) Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe | Kat. ciąży: B  
 Nutricia Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Bebilon Pepti 1 Syneo [46,86], Bebilon Pepti 2 Syneo [53,12]

<b>Bebilon Pepti 2 Syneo:</b> prosz. - 1 op. 400 g	Ś	100% Limit 30% <sup>(1)</sup>	53,12 53,12 15,94
INN: <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>   ATC: V06DF   wyk: EAN ~ 033971 (1) Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe   Kat. ciąży: C Nutricia Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: <b>Bebilon Pepti 1 Syneo</b> [46,86], <b>Bebilon Pepti 2 Syneo</b> [53,12]			
<b>Bebilon pepti MCT:</b> prosz. do przyg. zaw. odżywczej <b>2155 kJ/100 g</b> - 1 puszk. 450 g	Ś	100% Limit 30% <sup>(1)</sup>	44,95 44,95 13,49
INN: <i>Dieta eliminacyjna z MCT</i>   ATC: V06DF   wyk: EAN ~ 600625 (1) Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe   Kat. ciąży: C Nutricia Polska Sp. z o.o.			
<b>Beloflow:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	15,41 15,41 4,62 bezpł.
INN: <i>Solifenacin succinate</i>   ATC: G04BD08   wyk: B   EAN ~ 140592 (1) Zespół pęcherza nadreaktywnego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Belupo s.r.o.			
Odpowiedniki: Solifenacin Stada [X], Solifurin [X], <b>Beloflow</b> [15,41], Silamil [16,15], Soreca [18,54], Aurosolin [18,55], Solinco [18,85], Vesisol [20,21], Atenix [20,38], Zevesin [20,39], Uronorm [20,85], Vesoligo [20,85], Adablock [21,99]			
<b>Beloflow:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 90 szt. ◆	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	41,29 41,29 12,39 bezpł.
INN: <i>Solifenacin succinate</i>   ATC: G04BD08   wyk: B   EAN ~ 140595 (1) Zespół pęcherza nadreaktywnego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Belupo s.r.o.			
<b>Beloflow:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	28,70 28,70 8,61 bezpł.
INN: <i>Solifenacin succinate</i>   ATC: G04BD08   wyk: B   EAN ~ 140596 (1) Zespół pęcherza nadreaktywnego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Belupo s.r.o.			
Odpowiedniki: Solifenacin Stada [X], <b>Beloflow</b> [28,70], Soreca [34,95], Aurosolin [34,97], Silamil [35,29], Solifenacin Medreg [35,29], Solinco [35,57], Solifurin [36,14], Vesisol [37,63], Atenix [38,65], Zevesin [38,66], Uronorm [39,57], Vesoligo [39,57], Adablock [41,86]			
<b>Beloflow:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 90 szt. ◆	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	77,06 77,06 23,12 bezpł.
INN: <i>Solifenacin succinate</i>   ATC: G04BD08   wyk: B   EAN ~ 140599 (1) Zespół pęcherza nadreaktywnego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Belupo s.r.o.			
<b>Belosalic:</b> płyn do stos. na skórę ( <b>0,5 mg+ 20 mg/g</b> ) - 1 but. 100 ml	Rx	100% Limit 50% <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	27,85 27,85 13,93 bezpł.
INN: <i>Betamethasone dipropionate + Salicylic acid</i>   ATC: D07XC01   wyk: B   EAN ~ 187682 (1) Leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Belupo s.r.o.			
▼ <b>Bemfola:</b> inj. podsk. [liof.] <b>150 j.m./0,25 ml</b> - 1 wstrzyk.	Rx-z	100% Limit R <sup>(1)</sup>	163,07 153,01 13,26
INN: <i>Follitropin alfa</i>   ATC: G03GA05   wyk: EAN ~ 308486 (1) Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli; Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) - refundacja do 3 cykli; Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH, FSH w skojarzeniu z hormonem lutinizującym LH - refundacja do 3 cykli   Kat. ciąży: C Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.			
▼ <b>Bemfola:</b> inj. podsk. [liof.] <b>225 j.m./0,375 ml</b> - 1 wstrzyk.	Rx-z	100% Limit R <sup>(1)</sup>	238,58 229,50 12,28
INN: <i>Follitropin alfa</i>   ATC: G03GA05   wyk: EAN ~ 308493 (1) Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli; Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) - refundacja do 3 cykli; Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH, FSH w skojarzeniu z hormonem lutinizującym LH - refundacja do 3 cykli   Kat. ciąży: C Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.			
▼ <b>Bemfola:</b> inj. podsk. [liof.] <b>300 j.m./0,50 ml</b> - 1 wstrzyk.	Rx-z	100% Limit R <sup>(1)</sup>	313,78 305,99 10,99
INN: <i>Follitropin alfa</i>   ATC: G03GA05   wyk: EAN ~ 308509 (1) Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli; Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) - refundacja do 3 cykli; Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH, FSH w skojarzeniu z hormonem lutinizującym LH - refundacja do 3 cykli   Kat. ciąży: C Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.			
<b>Benodil:</b> zaw. do nebulizacji <b>0,125 mg/ml</b> - 20 amp. 2 ml	Rx	100% Limit C <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> R <sup>(3)</sup> R <sup>(4)</sup> S <sup>(5)</sup>	66,26 0,00 bezpł. bezpł. 3,35 3,35 bezpł.
INN: <i>Budesonide</i>   ATC: R03BA02   wyk: B   EAN ~ 283629 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli(4) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, Przewlekła obturacyjna choroba płuc(5) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			
Odpowiedniki: BDS N [X], Nebbud [66,11], <b>Benodil</b> [66,26]			
<b>Benodil:</b> zaw. do nebulizacji <b>0,25 mg/ml</b> - 20 amp. 2 ml	Rx	100% Limit C <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> R <sup>(3)</sup> R <sup>(4)</sup> S <sup>(5)</sup>	58,80 0,00 bezpł. bezpł. 3,89 3,89 bezpł.
INN: <i>Budesonide</i>   ATC: R03BA02   wyk: B   EAN ~ 283650 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma(4) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, Przewlekła obturacyjna choroba płuc(5) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			
Odpowiedniki: BDS N [58,11], Nebbud [58,11], <b>Benodil</b> [58,80]			
<b>Benodil:</b> zaw. do nebulizacji <b>0,5 mg/ml</b> - 20 amp. 2 ml	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> C <sup>(2)</sup> DZ <sup>(3)</sup> R <sup>(4)</sup> S <sup>(5)</sup>	81,66 81,59 24,55 bezpł. bezpł. 3,27 bezpł.
INN: <i>Budesonide</i>   ATC: R03BA02   wyk: B   EAN ~ 283698 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Kobiety w ciąży(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma(5) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			
Odpowiedniki: Nebbud [81,59], <b>Benodil</b> [81,66], BDS N [81,76]			
<b>Beriner:</b> inf./inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] <b>500 j.m./ml</b> - 1 fiol. prosz.+ 1 fiol. rozp.+ 1 zest. do podawania	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	2397,12 0,00 bezpł. 93,38 bezpł.
INN: <i>C1-esterase inhibitor</i>   ATC: B06AC01   wyk: B   EAN ~ 713639 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Przerwanie ostrego, zagrażającego życiu ataku wrodzonego obrzęku naczynioruchowego obejmującego gardło, krtań lub jamę brzuszną; przedzabiegowe zapobieganie stanom ostrym wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (zabiegi stomatologiczne, zabiegi na twarzoczaszce, zabiegi chirurgiczne, zabiegi diagnostyczne z użyciem instrumentów, poród)(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C CSL Behring GmbH			







<b>Bicardef:</b> tabl. 10 mg - 60 szt. ◆	Rx	100% 23,83 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 6,40 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Bisoprolol fumarate</i>   ATC: C07AB07   wyk: B   EAN ~ 197049 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 rż.(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA			
Odpowiedniki: Corectin 10 [20,79], Coronal 10 <sup>®</sup> [21,69], Bicardef [23,83], Sobycor [25,72]			
<b>Bicardef:</b> tabl. 10 mg - 90 szt. ◆	Rx	100% 34,29 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 9,60 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Bisoprolol fumarate</i>   ATC: C07AB07   wyk: B   EAN ~ 197056 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 rż.(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA			
<b>Bimaroz Duo:</b> krople do oczu [roztw.] 0,3 mg/ml+ 5 mg/ml - 1 but. 3 ml ◆	Rx	100% 42,20 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 9,96 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Bimatoprost + Timolol</i>   ATC: S01ED51   wyk: B   EAN ~ 137677 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Adamed Sp. z o.o.			
<b>Bimaroz Duo:</b> krople do oczu [roztw.] 0,3 mg/ml+ 5 mg/ml - 3 but. 3 ml ◆	Rx	100% 116,66 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 19,29 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Bimatoprost + Timolol</i>   ATC: S01ED51   wyk: B   EAN ~ 137678 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Adamed Sp. z o.o.			
<b>Bimican:</b> krople do oczu [roztw.] 0,3 mg/ml - 1 but. 3 ml	Rx	100% 44,01 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 11,77 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Bimatoprost</i>   ATC: S01EE03   wyk: B   EAN ~ 097066 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Polfa Warszawa SA			
Odpowiedniki: Vizibim [39,73], Bimifree [39,95], Bimican [44,01]			
<b>Bimican:</b> krople do oczu [roztw.] 0,3 mg/ml - 3 but. 3 ml	Rx	100% 122,01 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 24,64 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Bimatoprost</i>   ATC: S01EE03   wyk: B   EAN ~ 097073 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Polfa Warszawa SA			
Odpowiedniki: Vizibim [109,20], Bimifree [109,88], Bimican [122,01]			
<b>Bimifree:</b> krople do oczu [roztw.] 0,3 mg/ml - 1 but. 3 ml	Rx	100% 39,95 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 7,71 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Bimatoprost</i>   ATC: S01EE03   wyk: B   EAN ~ 335663 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Polfa Warszawa SA			
Odpowiedniki: Vizibim [39,73], Bimifree [39,95], Bimican [44,01]			
<b>Bimifree:</b> krople do oczu [roztw.] 0,3 mg/ml - 3 but. 3 ml	Rx	100% 109,88 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 12,51 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Bimatoprost</i>   ATC: S01EE03   wyk: B   EAN ~ 335670 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Polfa Warszawa SA			
Odpowiedniki: Vizibim [109,20], Bimifree [109,88], Bimican [122,01]			
<b>Bimifree Combi:</b> krople do oczu [roztw.] (0,3 mg + 5 mg)/ml - 1 but. 3 ml ◆	Rx	100% 42,20 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 9,96 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Bimatoprost + Timolol</i>   ATC: S01ED51   wyk: B   EAN ~ 142235 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Polfa Warszawa SA			
<b>Bimifree Combi:</b> krople do oczu [roztw.] (0,3 mg + 5 mg)/ml - 3 but. 3 ml ◆	Rx	100% 116,66 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 19,29 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Bimatoprost + Timolol</i>   ATC: S01ED51   wyk: B   EAN ~ 142236 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Polfa Warszawa SA			
<b>Biofibrat<sup>®</sup>:</b> kaps. twarde 200 mg - 30 szt.	Rx	100% 21,15 Limit 19,00 30% <sup>(1)</sup> 7,85 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Fenofibrate</i>   ATC: C10AB05   wyk: B   EAN ~ 754496 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Biofarm Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Grofibrat <sup>®</sup> 200 [19,68], Biofibrat <sup>®</sup> [21,15], Lipanthyl <sup>®</sup> 200M [23,84]			
<b>Biofibrat<sup>®</sup>:</b> kaps. twarde 267 mg - 30 szt.	Rx	100% 27,77 Limit 25,36 30% <sup>(1)</sup> 10,02 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Fenofibrate</i>   ATC: C10AB05   wyk: B   EAN ~ 754526 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Biofarm Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Grofibrat <sup>®</sup> M [26,60], Biofibrat <sup>®</sup> [27,77], Fenardin <sup>®</sup> [27,96], Lipanthyl <sup>®</sup> 267M [32,02]			
<b>Biofuroksym<sup>®</sup>:</b> inj. dom./doż. [prosz. do przyg. zaw.] 250 mg - 1 fiol.	Rx	100% 5,91 Limit 3,12 50% <sup>(1)</sup> 3,92 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Cefuroxime</i>   ATC: J01DC02   wyk: B   EAN ~ 806812 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			
<b>Biofuroksym<sup>®</sup>:</b> inj. dom./doż. [prosz. do przyg. zaw.] 500 mg - 1 fiol.	Rx	100% 8,75 Limit 6,24 50% <sup>(1)</sup> 5,07 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Cefuroxime</i>   ATC: J01DC02   wyk: B   EAN ~ 806911 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			
<b>Biofuroksym<sup>®</sup>:</b> inj. dom./doż. [prosz. do przyg. zaw.] 750 mg - 1 fiol.	Rx	100% 10,45 Limit 9,37 50% <sup>(1)</sup> 5,19 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Cefuroxime</i>   ATC: J01DC02   wyk: B   EAN ~ 059416 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			
<b>Biofuroksym<sup>®</sup>:</b> inj. doż. [prosz. do przyg. roztw.] 1,5 g - 1 fiol.	Rx	100% 18,73 Limit 18,73 50% <sup>(1)</sup> 8,43 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Cefuroxime</i>   ATC: J01DC02   wyk: B   EAN ~ 059515 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			
<b>Bioprazol<sup>®</sup>:</b> kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 28 szt.	Rx	100% 26,94 Limit 24,87 50% <sup>(1)</sup> 14,51 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Omeprazole</i>   ATC: A02BC01   wyk: B   EAN ~ 140779 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 rż.(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Biofarm Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Prenoem [15,39], Prazol <sup>®</sup> [17,28], Heligen Neo [17,59], Omeprazole Genoptim [19,68], Bioprazol <sup>®</sup> [26,94], Helicid <sup>®</sup> Forte [28,53], Ultop [30,13], Polprazol <sup>®</sup> PPH [32,52]			
<b>Bioprazol<sup>®</sup>:</b> kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 56 szt.	Rx	100% 41,46 Limit 41,46 50% <sup>(1)</sup> 20,73 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Omeprazole</i>   ATC: A02BC01   wyk: B   EAN ~ 140809 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 rż.(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Biofarm Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Prazol <sup>®</sup> [32,34], Bioprazol <sup>®</sup> [41,46]			

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

Bioprazol®: kaps. twarde 20 mg - 28 szt.	Rx	100%	19,76
		Limit	12,43
		50% <sup>(1)</sup>	13,55
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Omeprazole** ATC: **A02BC01** wyk: **B** EAN ~ **880225**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** **Biofarm Sp. z o.o.**  
 Odpowiedniki: Premeon [9,47], Heligen Neo [9,66], Omeprazole Genoptim [10,75], Agastin® [11,85], Goprazol [12,39], Progestim [14,57], Ultop [16,26], Gasec®-20 Gastrocaps® [16,34], Helicid® 20 [18,49], Prazol® [19,18], Bioprazol® [19,76], Polprazol® [20,92]

Biorace®: tabl. powł. 250 mg - 10 szt. (2 blist. x 5) ◆	Rx	100%	30,74
		Limit	17,93
		50% <sup>(1)</sup>	19,60
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Cefuroxime axetil** ATC: **J01DC02** wyk: **B** EAN ~ **063840**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA**

Biorace®: tabl. powł. 250 mg - 14 szt. (2 blist. x 7) ◆	Rx	100%	39,37
		Limit	25,10
		50% <sup>(1)</sup>	24,14
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Cefuroxime axetil** ATC: **J01DC02** wyk: **B** EAN ~ **063857**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA**

Biorace®: tabl. powł. 500 mg - 10 szt. ◆	Rx	100%	42,57
		Limit	35,85
		50% <sup>(1)</sup>	22,19
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Cefuroxime axetil** ATC: **J01DC02** wyk: **B** EAN ~ **063697**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA**

Odpowiedniki: Cefuroxime Genoptim [33,13], Ceroxim® [33,42], Zinnat - (IR) [33,81], Zinnat - (IR) [34,01], Zinnat - (IR) [34,57], Zinnat - (IR) [34,62], Zinnat - (IR) [34,62], Zinnat - (IR) [35,20], Cefox [35,43], Zinox® [36,66], Zinnat® [37,48], Biorace® [42,57]

Biorace®: tabl. powł. 500 mg - 14 szt. ◆	Rx	100%	52,69
		Limit	50,19
		50% <sup>(1)</sup>	24,84
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Cefuroxime axetil** ATC: **J01DC02** wyk: **B** EAN ~ **063703**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA**

Odpowiedniki: Cefuroxime Genoptim [45,01], Zinnat - (IR) [45,94], Zinnat - (IR) [46,24], Zinox® [48,64], Ceroxim® [50,19], Cefox [50,25], Zinnat® [51,10], Biorace® [52,69]

Bioxetin: tabl. 20 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	20,27
		Limit	14,11
		30% <sup>(1)</sup>	10,39
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Fluoxetine** ATC: **N06AB03** wyk: **B** EAN ~ **372317**  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** **Neuroxpharm Arzneimittel GmbH**

Odpowiedniki: Fluoxemed [14,87], Fluoxetine Aurovitas [15,01], Andepin® [19,62], Fluoxetin Polpharma [20,07], Bioxetin [20,27], Seronil® [25,77]

Bi-Profenid®: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 150 mg - 20 szt.	Rx	100%	12,98
		Limit	10,22
		50% <sup>(1)</sup>	7,87
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Ketoprofen** ATC: **M01AE03** wyk: **B** EAN ~ **412112**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ból w przebiegu chorób nowotworowych - w przypadkach innych niż określone w ChPL (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:B, T2:B, T3:D** **Sanofi Winthrop Industrie**

Biprolast: krople do oczu [roztw.] 2 mg/ml - 1 but. 5 ml ◆	Rx	100%	29,84
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,55
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Brimonidine tartate** ATC: **S01EA05** wyk: **A** EAN ~ **874194**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Adamed Sp. z o.o.**  
 Odpowiedniki: Briglau Free [23,80], Luxfen [24,17], Alphagan® [26,47], Biprolast [29,84]

Biprolast: krople do oczu [roztw.] 2 mg/ml - 3 but. 5 ml ◆	Rx	100%	64,21
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	8,00
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Brimonidine tartate** ATC: **S01EA05** wyk: **A** EAN ~ **000900**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Adamed Sp. z o.o.**  
 Odpowiedniki: Briglau Free [63,71], Biprolast [64,21]

Biseptol®: zaw. doust. 240 mg/5 ml - 1 but. 100 ml	Rx	100%	15,25
		Limit	15,25
		50% <sup>(1)</sup>	6,87
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Co-trimoxazole** ATC: **J01EE01** wyk: **B** EAN ~ **117819**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów po przeszczepie szpiku - profilaktyka; zakażenie Pneumocystis jirovecii u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka; zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** **Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA**

Biseptol® 120: tabl. 120 mg - 20 szt.	Rx	100%	10,84
		Limit	5,50
		50% <sup>(1)</sup>	7,28
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Co-trimoxazole** ATC: **J01EE01** wyk: **B** EAN ~ **117529**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów po przeszczepie szpiku - profilaktyka; zakażenie Pneumocystis jirovecii u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka; zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** **Adamed Sp. z o.o.**

Biseptol® 480: tabl. 480 mg - 20 szt.	Rx	100%	28,03
		Limit	21,99
		50% <sup>(1)</sup>	15,34
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Co-trimoxazole** ATC: **J01EE01** wyk: **B** EAN ~ **117611**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów po przeszczepie szpiku - profilaktyka; zakażenie Pneumocystis jirovecii u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka; zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** **Adamed Sp. z o.o.**

Biseptol® 960: tabl. 960 mg - 10 szt.	Rx	100%	28,03
		Limit	21,99
		50% <sup>(1)</sup>	15,34
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Co-trimoxazole** ATC: **J01EE01** wyk: **B** EAN ~ **117710**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów po przeszczepie szpiku - profilaktyka; zakażenie Pneumocystis jirovecii u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka; zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** **Adamed Sp. z o.o.**

Odpowiedniki: Bactrim® - (IR) [11,26], Bactrim® - (IR) [13,90], Bactrim® [21,99], Biseptol® 480 [28,03]

Bisoprolol VP: tabl. 5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	5,97
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Bisoprolol fumarate** ATC: **C07AB07** wyk: **B** EAN ~ **151911**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D** **Bausch Health**

Odpowiedniki: Corectin 5 [X], Corsib [5,96], Bisoprolol VP [5,97], Coronal 5® [6,56], Sobycor [7,16], Bisoratio 5 [7,21], Bicardef [7,39]

Bisoprolol VP: tabl. 10 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	11,03
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Bisoprolol fumarate** ATC: **C07AB07** wyk: **B** EAN ~ **152017**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D** **Bausch Health**

Odpowiedniki: Corectin 10 [X], Corsib [11,02], Bisoprolol VP [11,03], Coronal 10® [11,14], Bicardef [11,46], Bisoratio 10 [11,84], Sobycor [13,46]



# ZOLPIC

Daj owcom odpocząć.  
zolpidem



Bisoratio 5: tabl. 5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	7,21
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,91
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Bisoprolol fumarate** | ATC: C07AB07 | wyk: B | EAN ~ 015015  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 r.ż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Teva B.V.  
 Odpowiedniki: Corectin 5 [X], Corsib [5,96], Bisoprolol VP [5,97], Coronol 5<sup>®</sup> [6,56], Sobycor [7,16], Bisoratio 5 [7,21], Bicardef [7,39]

Bisoratio 10: tabl. 10 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	11,84
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Bisoprolol fumarate** | ATC: C07AB07 | wyk: B | EAN ~ 015114  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 r.ż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Teva B.V.  
 Odpowiedniki: Corectin 10 [X], Corsib [11,02], Bisoprolol VP [11,03], Coronol 10<sup>®</sup> [11,14], Bicardef [11,46], Bisoratio 10 [11,84], Sobycor [13,46]

▼ Bixebra: tabl. 5 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	84,72
		Limit	70,31
		R <sup>(1)</sup>	17,61
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.

INN: **Ivabradine** | ATC: C01EB17 | wyk: B | EAN ~ 286613  
 (1) Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II-NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca  $\geq 75$  uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z  $\beta$ -adrenolitykiem lub gdy leczenie  $\beta$ -adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Krka Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Ivabradine Accord [X], Ivabradine Ranbaxy [68,69], Ivabradine Zentiva [68,69], Bixebra - (IR) [72,05], Raenom [72,12], Bixebra - (IR) [73,22], Bixebra - (IR) [73,25], Ivabradine Mylan [76,70], Ivabradine Ampharm - (IR) [77,85], Ivabradine Aurovitas [80,43], Ivohart [81,01], Ivabradine Genoptim [81,08], Ivabradine Ampharm [83,37], Bixebra [84,72]

▼ Bixebra: tabl. 7,5 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	123,83
		Limit	105,46
		R <sup>(1)</sup>	21,57
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.

INN: **Ivabradine** | ATC: C01EB17 | wyk: B | EAN ~ 286927  
 (1) Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II-NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca  $\geq 75$  uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z  $\beta$ -adrenolitykiem lub gdy leczenie  $\beta$ -adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Krka Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Ivabradine Accord [X], Ivabradine Aurovitas [X], Ivabradine Ranbaxy [99,79], Ivabradine Zentiva [99,79], Bixebra - (IR) [104,82], Bixebra - (IR) [104,94], Raenom [104,94], Bixebra - (IR) [105,46], Bixebra - (IR) [105,46], Ivabradine Mylan [111,81], Ivabradine Ampharm - (IR) [113,53], Ivohart [118,27], Ivabradine Genoptim [118,32], Ivabradine Ampharm [121,89], Bixebra [123,83]

▼ Bixebra - (IR): tabl. 5 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	72,05
		Limit	70,31
		R <sup>(1)</sup>	4,94
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.

INN: **Ivabradine** | ATC: C01EB17 | wyk: B | EAN ~ 142776  
 (1) Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II-NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca  $\geq 75$  uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z  $\beta$ -adrenolitykiem lub gdy leczenie  $\beta$ -adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Inpharm Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Ivabradine Accord [X], Ivabradine Ranbaxy [68,69], Ivabradine Zentiva [68,69], Bixebra - (IR) [72,05], Raenom [72,12], Bixebra - (IR) [73,22], Bixebra - (IR) [73,25], Ivabradine Mylan [76,70], Ivabradine Ampharm - (IR) [77,85], Ivabradine Aurovitas [80,43], Ivohart [81,01], Ivabradine Genoptim [81,08], Ivabradine Ampharm [83,37], Bixebra [84,72]

▼ Bixebra - (IR): tabl. 5 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	73,22
		Limit	70,31
		R <sup>(1)</sup>	6,11
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.

INN: **Ivabradine** | ATC: C01EB17 | wyk: B | EAN ~ 146537  
 (1) Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II-NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca  $\geq 75$  uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z  $\beta$ -adrenolitykiem lub gdy leczenie  $\beta$ -adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Inpharm Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Ivabradine Accord [X], Ivabradine Ranbaxy [68,69], Ivabradine Zentiva [68,69], Bixebra - (IR) [72,05], Raenom [72,12], Bixebra - (IR) [73,22], Bixebra - (IR) [73,25], Ivabradine Mylan [76,70], Ivabradine Ampharm - (IR) [77,85], Ivabradine Aurovitas [80,43], Ivohart [81,01], Ivabradine Genoptim [81,08], Ivabradine Ampharm [83,37], Bixebra [84,72]

▼ Bixebra - (IR): tabl. 7,5 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	104,82
		Limit	104,82
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.

INN: **Ivabradine** | ATC: C01EB17 | wyk: B | EAN ~ 142751  
 (1) Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II-NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca  $\geq 75$  uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z  $\beta$ -adrenolitykiem lub gdy leczenie  $\beta$ -adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Inpharm Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Ivabradine Accord [X], Ivabradine Aurovitas [X], Ivabradine Ranbaxy [99,79], Ivabradine Zentiva [99,79], Bixebra - (IR) [104,82], Bixebra - (IR) [104,94], Raenom [104,94], Bixebra - (IR) [105,46], Bixebra - (IR) [105,46], Ivabradine Mylan [111,81], Ivabradine Ampharm - (IR) [113,53], Ivohart [118,27], Ivabradine Genoptim [118,32], Ivabradine Ampharm [121,89], Bixebra [123,83]

▼ Bixebra - (IR): tabl. 7,5 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	104,94
		Limit	104,94
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.

INN: **Ivabradine** | ATC: C01EB17 | wyk: B | EAN ~ 146604  
 (1) Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II-NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca  $\geq 75$  uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z  $\beta$ -adrenolitykiem lub gdy leczenie  $\beta$ -adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Inpharm Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Ivabradine Accord [X], Ivabradine Aurovitas [X], Ivabradine Ranbaxy [99,79], Ivabradine Zentiva [99,79], Bixebra - (IR) [104,82], Raenom [104,94], Bixebra - (IR) [104,94], Bixebra - (IR) [105,46], Bixebra - (IR) [105,46], Ivabradine Mylan [111,81], Ivabradine Ampharm - (IR) [113,53], Ivohart [118,27], Ivabradine Genoptim [118,32], Ivabradine Ampharm [121,89], Bixebra [123,83]

▼ Bixebra - (IR): tabl. powł. 5 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	73,25
		Limit	70,31
		R <sup>(1)</sup>	6,14
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.

INN: **Ivabradine** | ATC: C01EB17 | wyk: B | EAN ~ 145227  
 (1) Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II-NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca  $\geq 75$  uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z  $\beta$ -adrenolitykiem lub gdy leczenie  $\beta$ -adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Delfarma Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Ivabradine Accord [X], Ivabradine Ranbaxy [68,69], Ivabradine Zentiva [68,69], Bixebra - (IR) [72,05], Raenom [72,12], Bixebra - (IR) [73,22], Bixebra - (IR) [73,25], Ivabradine Mylan [76,70], Ivabradine Ampharm - (IR) [77,85], Ivabradine Aurovitas [80,43], Ivohart [81,01], Ivabradine Genoptim [81,08], Ivabradine Ampharm [83,37], Bixebra [84,72]

▼ Bixebra - (IR): tabl. powł. 7,5 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	105,46
		Limit	105,46
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.

INN: **Ivabradine** | ATC: C01EB17 | wyk: B | EAN ~ 145228  
 (1) Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II-NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca  $\geq 75$  uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z  $\beta$ -adrenolitykiem lub gdy leczenie  $\beta$ -adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Delfarma Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Ivabradine Accord [X], Ivabradine Aurovitas [X], Ivabradine Ranbaxy [99,79], Ivabradine Zentiva [99,79], Bixebra - (IR) [104,82], Bixebra - (IR) [104,94], Raenom [104,94], Bixebra - (IR) [105,46], Bixebra - (IR) [105,46], Ivabradine Mylan [111,81], Ivabradine Ampharm - (IR) [113,53], Ivohart [118,27], Ivabradine Genoptim [118,32], Ivabradine Ampharm [121,89], Bixebra [123,83]

▼ Bixebra - (IR): tabl. powł. 7,5 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	105,46
		Limit	105,46
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.

INN: **Ivabradine** | ATC: C01EB17 | wyk: B | EAN ~ 351274  
 (1) Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II-NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca  $\geq 75$  uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z  $\beta$ -adrenolitykiem lub gdy leczenie  $\beta$ -adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Delfarma Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Ivabradine Accord [X], Ivabradine Aurovitas [X], Ivabradine Ranbaxy [99,79], Ivabradine Zentiva [99,79], Bixebra - (IR) [104,82], Bixebra - (IR) [104,94], Raenom [104,94], Bixebra - (IR) [105,46], Bixebra - (IR) [105,46], Ivabradine Mylan [111,81], Ivabradine Ampharm - (IR) [113,53], Ivohart [118,27], Ivabradine Genoptim [118,32], Ivabradine Ampharm [121,89], Bixebra [123,83]

Blemil plus Elemental: prosz. do przyg. roztw. doust. - op. 400 g	Sz	100%	108,57
		Limit	107,27
		R <sup>(1)</sup>	4,50

INN: **Dieta eliminacyjna mlekozastępcza** | ATC: V06DF | wyk: | EAN ~ 103521  
 (1) Stosowanie diety czysto w niemowląt od urodzenia i dzieci z ciężką postacią alergii na białko mleka krowiego oraz nietolerancja różnego rodzaju żywności, u których zastosowanie w postępowaniu dietetycznym hydrolyzatów o znacznym stopniu hydrolyzy nie przyniosło efektu, a także w alergii na białko soi w przypadkach, gdy wskazane jest zastosowanie mieszanki elementarnej zwyczajnej | Kat. ciąży: | Ordessa

<b>Bonogren:</b> tabl. powł. 25 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	8,15
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,80
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Quetiapine</i>	ATC: N05AH04	wyk: B	EAN ~ 719389
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z oświeceniem(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Vipham SA			
Odpowiedniki: Kefrenex [X], Kwetina [7,32], Kventiax® [7,82], Bonogren [8,15], Pinexet [8,25], Etiagen [8,36], ApoTiapina [8,47], Ketiapt® [8,47], Kwetaplex [8,56], Ketre [8,58], Setinin [8,90]			
<b>Bonogren:</b> tabl. powł. 100 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	44,28
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Quetiapine</i>	ATC: N05AH04	wyk: B	EAN ~ 719853
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Vipham SA			
Odpowiedniki: Bonogren [44,28], Kefrenex [46,86], Etiagen [48,06], Kwetina [48,28], Setinin [48,66], Kventiax® [49,08], Ketiapt® [50,16], Ketiapor® [51,37], Pinexet [51,71], ApoTiapina [51,72], Kwetaplex [52,86], Ketre [54,46]			
<b>Bonogren:</b> tabl. powł. 200 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	84,34
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Quetiapine</i>	ATC: N05AH04	wyk: B	EAN ~ 720163
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Vipham SA			
Odpowiedniki: Bonogren [84,34], Kefrenex [88,34], Etiagen [90,75], Kwetina [91,21], Setinin [91,97], Kventiax® [92,82], Ketiapt® [93,83], Ketiapor® [95,21], Pinexet [96,92], ApoTiapina [98,08], Kwetaplex [100,36], Ketre [102,65]			
<b>Bonogren:</b> tabl. powł. 300 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	121,83
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	4,80
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Quetiapine</i>	ATC: N05AH04	wyk: B	EAN ~ 720309
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Vipham SA			
Odpowiedniki: Bonogren [121,83], Kefrenex [127,84], Setinin [133,27], Ketiapor® [134,37], Kventiax® [134,55], Ketiapt® [135,73], Pinexet [140,25], Kwetaplex [145,87]			
<b>Bonogren SR:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu 200 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	85,48
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Quetiapine</i>	ATC: N05AH04	wyk: B	EAN ~ 326319
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Vipham SA			
Odpowiedniki: Bonogren SR [85,48], Symquel® XR [88,92], Kventiax® SR [92,35], Kvelux SR [92,58], Ketiapt® Retard [92,80], Kwetaplex XR [93,50]			
<b>Bonogren SR:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu 300 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	125,26
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	4,80
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Quetiapine</i>	ATC: N05AH04	wyk: B	EAN ~ 326371
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Vipham SA			
Odpowiedniki: Bonogren SR [125,26], Symquel® XR [128,70], Kventiax® SR [133,85], Kvelux SR [134,19], Ketiapt® Retard [134,54], Kwetaplex XR [135,56]			
<b>Bonogren SR:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu 400 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	166,18
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,40
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Quetiapine</i>	ATC: N05AH04	wyk: B	EAN ~ 326432
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Vipham SA			
Odpowiedniki: Symquel® XR [X], Bonogren SR [166,18], Kventiax® SR [168,47], Kvelux SR [175,80], Ketiapt® Retard [176,26], Kwetaplex XR [177,63]			
<b>Bordered Granuflex®:</b> obramowany opatrunek hydrokoloidowy 10x10 cm - 1 szt.	WM	100%	8,86
		Limit	7,07
		30% <sup>(1)</sup>	3,91
		B <sup>(2)</sup>	1,79
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Emplastri hydrocolloidosa</i>	ATC: V20	wyk:	EAN ~ 515094
(1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: C			
ConvaTec Polska Sp. z o.o.			

<b>Bordered Granuflex®:</b> obramowany opatrunek hydrokoloidowy 15x15 cm - 1 szt.	WM	100%	16,23
		Limit	15,90
		30% <sup>(1)</sup>	5,10
		B <sup>(2)</sup>	0,33
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Emplastri hydrocolloidosa</i>	ATC: V20	wyk:	EAN ~ 515089
(1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: C			
ConvaTec Polska Sp. z o.o.			
<b>Braltus®:</b> prosz. do inhal. [kaps. twarde] 10 µg/dawkę - 30 szt. ◆	Rx	100%	104,30
		Limit	104,30
		30% <sup>(1)</sup>	31,29
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tiotropium</i>	ATC: R03BB04	wyk:	EAN ~ 299545
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV <sub>1</sub> <50% oraz ujemną próbą rozkurczową(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.			
<b>Briglau Free:</b> krople do oczu [roztw.] 2 mg/ml - 1 but. 5 ml ◆	Rx	100%	23,80
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Brimonidine tartate</i>	ATC: S01EA05	wyk: A	EAN ~ 137948
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Polfa Warszawa SA			
Odpowiedniki: Briglau Free [23,80], Luxfen [24,17], Alphagan® [26,47], Biprolast [29,84]			
<b>Briglau Free:</b> krople do oczu [roztw.] 2 mg/ml - 3 but. 5 ml ◆	Rx	100%	63,71
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	8,00
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Brimonidine tartate</i>	ATC: S01EA05	wyk: A	EAN ~ 137949
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Polfa Warszawa SA			
Odpowiedniki: Briglau Free [63,71], Biprolast [64,21]			
<b>Briglau PPH:</b> krople do oczu 2 mg/ml - 1 op. 5 ml ◆	Rx	100%	30,41
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,12
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Brimonidine tartate</i>	ATC: S01EA05	wyk: A	EAN ~ 974641
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			
<b>▼Brintellix:</b> tabl. powł. 5 mg - 56 szt.	Rx	100%	93,20
		Limit	88,52
		30% <sup>(1)</sup>	31,24
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Vortioxetine</i>	ATC: N06AX26	wyk: B	EAN ~ 015514
(1) Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwyty serotoniny lub z grupy inhibitorów wychwyty zwrotnego serotoniny i noradrenaliny(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Lundbeck Poland Sp. z o.o.			
<b>▼Brintellix:</b> tabl. powł. 10 mg - 56 szt.	Rx	100%	177,04
		Limit	177,04
		30% <sup>(1)</sup>	53,11
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Vortioxetine</i>	ATC: N06AX26	wyk: B	EAN ~ 015515
(1) Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwyty serotoniny lub z grupy inhibitorów wychwyty zwrotnego serotoniny i noradrenaliny(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Lundbeck Poland Sp. z o.o.			
<b>Brinzolamide Genoptim:</b> krople do oczu [roztw.] 10 mg/ml - 1 but. 5 ml ◆	Rx	100%	29,04
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,75
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Brinzolamide</i>	ATC: S01EC04	wyk:	EAN ~ 250386
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Synoptis Pharma Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Brinzolamide Genoptim [29,04], Optilamid [30,41], Azopt [33,43]			



Naszym wyborem

**enarenal**  
 enalaprilii maleas

▼Briviact: roztw. doust. 10 mg/ml - 1 but. 300 ml ◆	Rx	100%	386,53
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Brivacetam</i>	ATC: N03AX23	wyk: B	EAN ~ 272234
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana po co najmniej trzech nieudanych próbach leczenia u dzieci powyżej 4 rż. i młodzieży poniżej 16. roku życia z encefalopatiami padaczkowymi pod postacią zespołu Lennox-Gastaut, zespołu Dravet, zespołu Westa i innych rzadkich genetycznie uwarunkowanych encefalopatii padaczkowych(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
UCB Pharma Sp. z o.o.			
▼Briviact: tabl. powł. 50 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	361,63
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Brivacetam</i>	ATC: N03AX23	wyk: B	EAN ~ 127233
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana po co najmniej trzech nieudanych próbach leczenia u dzieci powyżej 4 rż. i młodzieży poniżej 16. roku życia z encefalopatiami padaczkowymi pod postacią zespołu Lennox-Gastaut, zespołu Dravet, zespołu Westa i innych rzadkich genetycznie uwarunkowanych encefalopatii padaczkowych(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
UCB Pharma Sp. z o.o.			
Bromocorn®: tabl. 2,5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	18,80
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Bromocriptine mesylate</i>	ATC: G02CB01, N04BC01	wyk: B	EAN ~ 211913
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "FILOFARM"			
● Buccolam: roztw. do stos. w j. ustnej 2,5 mg/0,5 ml - 4 amp.-strzyk. 0,5 ml ◆	Rx-z	100%	432,08
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	160,61
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Midazolam</i>	ATC: N05CD08	wyk: B	EAN ~ 144956
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Przedłużone, ostre napady drgawkowe u niemowląt, dzieci i młodzieży (od 6 miesięcy do 18 lat)   Kat. ciąży: D			
Neuraxpharm Arzneimittel GmbH			
● Buccolam: roztw. do stos. w j. ustnej 5 mg/ml - 4 amp.-strzyk. 1 ml ◆	Rx	100%	432,08
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	160,61
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Midazolam</i>	ATC: N05CD08	wyk: B	EAN ~ 144957
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Przedłużone, ostre napady drgawkowe u niemowląt, dzieci i młodzieży (od 6 miesięcy do 18 lat)   Kat. ciąży: D			
Neuraxpharm Arzneimittel GmbH			
● Buccolam: roztw. do stos. w j. ustnej 7,5 mg/1,5 ml - 4 amp.-strzyk. 1,5 ml ◆	Rx	100%	432,08
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	160,61
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Midazolam</i>	ATC: N05CD08	wyk: B	EAN ~ 144958
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Przedłużone, ostre napady drgawkowe u niemowląt, dzieci i młodzieży (od 6 miesięcy do 18 lat)   Kat. ciąży: D			
Neuraxpharm Arzneimittel GmbH			
● Buccolam: roztw. do stos. w j. ustnej 10 mg/2 ml - 4 amp.-strzyk. 2 ml ◆	Rx	100%	432,08
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	160,61
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Midazolam</i>	ATC: N05CD08	wyk: B	EAN ~ 144959
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Przedłużone, ostre napady drgawkowe u niemowląt, dzieci i młodzieży (od 6 miesięcy do 18 lat)   Kat. ciąży: D			
Neuraxpharm Arzneimittel GmbH			
Budesonide Easyhaler 100: prosz. do inhal. 100 µg/dawkę - 1 inhal. (200 dawek - zestaw startowy)	Rx	100%	51,96
		Limit	30,50
		30% <sup>(1)</sup>	30,61
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		R <sup>(4)</sup>	24,66
INN: <i>Budesonide</i>	ATC: R03BA02	wyk: B	EAN ~ 337354
(1) Tylko we wskazaniach pozarejestrowanych WP: Wirusowe zapalenie krtań u dzieci do 18 rż.(2) Kobiety w ciąży(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma(5) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Orion Pharma Poland Sp. o.o.			

Budesonide Easyhaler 200: prosz. do inhal. 200 µg/dawkę - 1 inhal. (200 dawek - zestaw startowy)	Rx	100%	77,81
		Limit	61,00
		30% <sup>(1)</sup>	35,11
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		R <sup>(4)</sup>	22,14
INN: <i>Budesonide</i>	ATC: R03BA02	wyk: B	EAN ~ 337323
(1) Tylko we wskazaniach pozarejestrowanych WP: Wirusowe zapalenie krtań u dzieci do 18 rż.(2) Kobiety w ciąży(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli(5) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Orion Pharma Poland Sp. o.o.			
Budesonide Easyhaler 400: prosz. do inhal. 400 µg/dawkę - 1 inhal. (100 dawek - zestaw startowy)	Rx	100%	65,74
		Limit	61,00
		30% <sup>(1)</sup>	23,04
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		R <sup>(4)</sup>	10,07
INN: <i>Budesonide</i>	ATC: R03BA02	wyk: B	EAN ~ 337286
(1) Tylko we wskazaniach pozarejestrowanych WP: Wirusowe zapalenie krtań u dzieci do 18 rż.(2) Kobiety w ciąży(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli(5) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Orion Pharma Poland Sp. o.o.			
Budezonid LEK-AM: prosz. do inhal. [kaps. twarde] 200 µg/dawkę - 60 szt.	Rx	100%	26,28
		Limit	18,30
		30% <sup>(1)</sup>	13,47
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		R <sup>(4)</sup>	11,18
INN: <i>Budesonide</i>	ATC: R03BA02	wyk: B	EAN ~ 204082
(1) Tylko we wskazaniach pozarejestrowanych WP: Wirusowe zapalenie krtań u dzieci do 18 rż.(2) Kobiety w ciąży(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc(5) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.			
Budezonid LEK-AM: prosz. do inhal. [kaps. twarde] 200 µg/dawkę - 120 szt.	Rx	100%	49,95
		Limit	36,60
		30% <sup>(1)</sup>	24,33
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		R <sup>(4)</sup>	16,55
INN: <i>Budesonide</i>	ATC: R03BA02	wyk: B	EAN ~ 223793
(1) Tylko we wskazaniach pozarejestrowanych WP: Wirusowe zapalenie krtań u dzieci do 18 rż.(2) Kobiety w ciąży(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc(5) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.			
Budezonid LEK-AM: prosz. do inhal. [kaps. twarde] 400 µg/dawkę - 60 szt.	Rx	100%	49,95
		Limit	36,60
		30% <sup>(1)</sup>	24,33
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		R <sup>(4)</sup>	16,55
INN: <i>Budesonide</i>	ATC: R03BA02	wyk: B	EAN ~ 203986
(1) Tylko we wskazaniach pozarejestrowanych WP: Wirusowe zapalenie krtań u dzieci do 18 rż.(2) Kobiety w ciąży(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma(5) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.			
Budezonid LEK-AM: prosz. do inhal. [kaps. twarde] 400 µg/dawkę - 120 szt.	Rx	100%	93,30
		Limit	73,20
		30% <sup>(1)</sup>	42,06
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		R <sup>(4)</sup>	26,50
INN: <i>Budesonide</i>	ATC: R03BA02	wyk: B	EAN ~ 223809
(1) Tylko we wskazaniach pozarejestrowanych WP: Wirusowe zapalenie krtań u dzieci do 18 rż.(2) Kobiety w ciąży(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma(5) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.			

**Loperamid WZF**  
Loperamidi hydrochloridum

Przerwij niekończące się wizyty

Nowe opakowanie:  
**2 mg x 15 tabl.**

Budiair: aerosol wziewny <b>200 µg/dawkę</b> - 1 poj. (200 dawek + inhal.)	Rx	100%	<b>65,74</b>
		Limit	<b>61,00</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>23,04</b>
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		R <sup>(4)</sup>	<b>10,07</b>
		S <sup>(5)</sup>	bezpł.

INN: **Budesonide** ATC: **R03BA02** wyk: **B** EAN ~ **335169**  
(1) Tylko we wskazaniach pozarejestrowanych WP: Wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 rż. (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma (5) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
Chiesi Poland Sp. z o.o.  
Odpowiedniki: Ribuspir [X], Budiair [65,74]

Budiair: aerosol wziewny <b>200 µg/dawkę</b> - 1 poj. (200 dawek + inhal. Jet)	Rx	100%	<b>65,74</b>
		Limit	<b>61,00</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>23,04</b>
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		R <sup>(4)</sup>	<b>10,07</b>
		S <sup>(5)</sup>	bezpł.

INN: **Budesonide** ATC: **R03BA02** wyk: **B** EAN ~ **335176**  
(1) Tylko we wskazaniach pozarejestrowanych WP: Wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 rż. (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (5) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
Chiesi Poland Sp. z o.o.  
Odpowiedniki: Ribuspir [X], Budiair [65,74]

Budixon Neb: zaw. do nebulizacji <b>0,25 mg/ml</b> - 20 poj. 2 ml	Rx	100%	<b>58,23</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	<b>3,32</b>
		R <sup>(4)</sup>	<b>3,32</b>
		S <sup>(5)</sup>	bezpł.

INN: **Budesonide** ATC: **R03BA02** wyk: **B** EAN ~ **002522**  
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (4) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (5) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
Adamed Sp. z o.o.

Budixon Neb: zaw. do nebulizacji <b>0,5 mg/ml</b> - 20 poj. 2 ml	Rx	100%	<b>82,11</b>
		Limit	<b>81,59</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>25,00</b>
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		R <sup>(4)</sup>	<b>3,72</b>
		S <sup>(5)</sup>	bezpł.

INN: **Budesonide** ATC: **R03BA02** wyk: **B** EAN ~ **002539**  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma (5) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
Adamed Sp. z o.o.  
Odpowiedniki: Pulmicort - (IR) [80,91], Budixon Neb [82,11]

Bufomix Easyhaler: prosz. do inhal. <b>160/4,5 µg/dawkę</b> - 1 inhal. (120 dawek)	Rx	100%	<b>127,96</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	<b>37,17</b>
		R <sup>(4)</sup>	<b>37,17</b>
		S <sup>(5)</sup>	bezpł.

INN: **Budesonide + Formoterol** ATC: **R03AK07** wyk: **A** EAN ~ **137458**  
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Orion Pharma Poland Sp. o.o.  
Odpowiedniki: DuoResp Spiromax [121,20], Bufomix Easyhaler [127,96]

Bufomix Easyhaler: prosz. do inhal. <b>320/9 µg/dawkę</b> - 1 inhal. (60 dawek)	Rx	100%	<b>113,27</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	<b>22,48</b>
		R <sup>(4)</sup>	<b>22,48</b>
		S <sup>(5)</sup>	bezpł.

INN: **Budesonide + Formoterol** ATC: **R03AK07** wyk: **A** EAN ~ **137625**  
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Orion Pharma Poland Sp. o.o.  
Odpowiedniki: Airbufo Forspiro [110,84], DuoResp Spiromax [111,10], Bufomix Easyhaler [113,27]

● <b>Bunodol</b> <sup>®</sup> : tabl. podjęzykowe <b>0,2 mg</b> - 60 szt. (blister) ◆	Rx	100%	<b>41,32</b>
		Limit	<b>41,32</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>11,16</b>
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Buprenorphine hydrochloride** ATC: **N02AE01** wyk: **B** EAN ~ **235635**  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Polfa Warszawa SA

● <b>Bunodol</b> <sup>®</sup> : tabl. podjęzykowe <b>0,4 mg</b> - 30 szt. (1 blister) ◆	Rx	100%	<b>41,32</b>
		Limit	<b>41,32</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>11,16</b>
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Buprenorphine hydrochloride** ATC: **N02AE01** wyk: **B** EAN ~ **235642**  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Polfa Warszawa SA

<b>Buventol</b> <sup>®</sup> Easyhaler <sup>®</sup> : prosz. do inhal. <b>100 µg/dawkę</b> - 1 inhal. prosz. (200 dawek + poj. ochronny)	Rx	100%	<b>26,48</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	<b>19,07</b>
		R <sup>(4)</sup>	<b>19,07</b>
		S <sup>(5)</sup>	bezpł.

INN: **Salbutamol** ATC: **R03AC02** wyk: **B** EAN ~ **106928**  
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Orion Pharma Poland Sp. o.o.

<b>Buventol</b> <sup>®</sup> Easyhaler <sup>®</sup> : prosz. do inhal. <b>200 µg/dawkę</b> - 1 inhal. prosz. (200 dawek + poj. ochronny)	Rx	100%	<b>44,57</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	<b>28,68</b>
		R <sup>(4)</sup>	<b>28,68</b>
		S <sup>(5)</sup>	bezpł.

INN: **Salbutamol** ATC: **R03AC02** wyk: **B** EAN ~ **107826**  
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Orion Pharma Poland Sp. o.o.

<b>Cachexan</b> <sup>®</sup> : zaw. doust. <b>40 mg/ml</b> - 1 but. 240 ml	Rx	100%	<b>144,89</b>	
		Limit	<b>139,17</b>	
		R <sup>(1)</sup>	<b>12,12</b>	
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	

INN: **Megestrol acetate** ATC: **L02AB01** wyk: **B** EAN ~ **614608**  
(1) Nowotwory złośliwe (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **X**  
Polfarmex S.A.  
Odpowiedniki: Megace<sup>®</sup> [139,17], Megalia<sup>®</sup> [139,17], Cachexan<sup>®</sup> [144,89]

● <b>Camlocor</b> : tabl. <b>8/5 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>12,77</b>	
		Limit	<b>10,70</b>	
		30% <sup>(1)</sup>	<b>5,28</b>	
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	

INN: **Candesartan cilexetil + Amlodipine** ATC: **C09DB07** wyk: **B** EAN ~ **136751**  
(1) Leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**  
Krka Polska Sp. z o.o.  
Odpowiedniki: Caramlo [12,13], Camlocor [12,77]

● <b>Camlocor</b> : tabl. <b>16/5 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>24,59</b>	
		Limit	<b>21,40</b>	
		30% <sup>(1)</sup>	<b>9,61</b>	
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	

INN: **Candesartan cilexetil + Amlodipine** ATC: **C09DB07** wyk: **B** EAN ~ **136773**  
(1) Leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**  
Krka Polska Sp. z o.o.  
Odpowiedniki: Caramlo [23,24], Camlocor [24,59]

● <b>Camlocor</b> : tabl. <b>16/10 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>24,59</b>	
		Limit	<b>21,40</b>	
		30% <sup>(1)</sup>	<b>9,61</b>	
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	

INN: **Candesartan cilexetil + Amlodipine** ATC: **C09DB07** wyk: **B** EAN ~ **972054**  
(1) Leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**  
Krka Polska Sp. z o.o.  
Odpowiedniki: Caramlo [23,24], Camlocor [24,59]



METRONIDAZOL  
METRONIDAZOL  
METRONIDAZOL



**METRONIDAZOL**  
Polpharma  
Metronidazolium

**ZAKODOWANY DO WALKI  
Z ZAKAŻENIEM**

<p><b>Candepres: tabl. 8 mg - 28 szt.</b></p>	<p>Rx</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>13,46</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>10,70</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>5,97</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	13,46	Limit	10,70	30% <sup>(1)</sup>	5,97	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Candepres HCT: tabl. 8/12,5 mg - 28 szt.</b></p>	<p>Rx</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>13,46</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>10,70</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>5,97</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	13,46	Limit	10,70	30% <sup>(1)</sup>	5,97	S <sup>(2)</sup>	bezpł.
100%	13,46																						
Limit	10,70																						
30% <sup>(1)</sup>	5,97																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	13,46																						
Limit	10,70																						
30% <sup>(1)</sup>	5,97																						
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
<p>INN: <i>Candesartan cilexetil</i>   ATC: C09CA06   wyk: B   EAN ~ 739592</p> <p>(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D   Sandoz GmbH</p> <p>Odpowiedniki: Kandesar [13,24], Carzap [13,46], Candepres [13,46], Atacand<sup>®</sup> [14,18], Ranacand [14,44], Karbis [14,61]</p>		<p>INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09DA06   wyk: B   EAN ~ 800360</p> <p>(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Sandoz GmbH</p> <p>Odpowiedniki: Candepres HCT [13,46], Karbicombi [13,64], Carzap HCT [13,86]</p>																					
<p><b>Candepres: tabl. 16 mg - 28 szt.</b></p>	<p>Rx</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>25,97</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>21,40</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>10,99</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	25,97	Limit	21,40	30% <sup>(1)</sup>	10,99	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Candepres HCT: tabl. 16/12,5 mg - 28 szt.</b></p>	<p>Rx</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>26,79</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>21,40</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>11,81</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	26,79	Limit	21,40	30% <sup>(1)</sup>	11,81	S <sup>(2)</sup>	bezpł.
100%	25,97																						
Limit	21,40																						
30% <sup>(1)</sup>	10,99																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	26,79																						
Limit	21,40																						
30% <sup>(1)</sup>	11,81																						
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
<p>INN: <i>Candesartan cilexetil</i>   ATC: C09CA06   wyk: B   EAN ~ 739653</p> <p>(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D   Sandoz GmbH</p> <p>Odpowiedniki: Carzap - (IR) [21,33], Carzap - (IR) [21,37], Carzap - (IR) [21,37], Candepres - (IR) [21,39], Kandesar [25,51], Carzap [25,97], Candepres [25,97], Ranacand [27,91], Karbis [28,26], Atacand<sup>®</sup> [28,88]</p>		<p>INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09DA06   wyk: B   EAN ~ 800629</p> <p>(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Sandoz GmbH</p> <p>Odpowiedniki: Karbicombi - (IR) [23,45], Carzap HCT - (IR) [23,56], Carzap HCT [26,77], Candepres HCT [26,79], Karbicombi [28,25]</p>																					
<p><b>Candepres: tabl. 32 mg - 28 szt.</b></p>	<p>Rx</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>44,11</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>42,80</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>14,15</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	44,11	Limit	42,80	30% <sup>(1)</sup>	14,15	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Candepres HCT: tabl. 32/25 mg - 28 szt.</b></p>	<p>Rx</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>48,80</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>42,80</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>18,84</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	48,80	Limit	42,80	30% <sup>(1)</sup>	18,84	S <sup>(2)</sup>	bezpł.
100%	44,11																						
Limit	42,80																						
30% <sup>(1)</sup>	14,15																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	48,80																						
Limit	42,80																						
30% <sup>(1)</sup>	18,84																						
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
<p>INN: <i>Candesartan cilexetil</i>   ATC: C09CA06   wyk: B   EAN ~ 739707</p> <p>(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D   Sandoz GmbH</p> <p>Odpowiedniki: Candepres - (IR) [39,87], Carzap - (IR) [40,10], Carzap - (IR) [40,17], Carzap - (IR) [40,17], Candepres [44,11], Carzap [49,37], Karbis [51,44]</p>		<p>INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09DA06   wyk: B   EAN ~ 064051</p> <p>(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Sandoz GmbH</p> <p>Odpowiedniki: Karbicombi - (IR) [39,46], Carzap HCT [48,71], Candepres HCT [48,80], Karbicombi [53,03]</p>																					
<p><b>Candepres - (IR): tabl. 16 mg - 28 szt.</b></p>	<p>Rx</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>21,39</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>21,39</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>6,42</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	21,39	Limit	21,39	30% <sup>(1)</sup>	6,42	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Candepres HCT: tabl. 32/12,5 mg - 28 szt.</b></p>	<p>Rx</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>48,80</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>42,80</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>18,84</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	48,80	Limit	42,80	30% <sup>(1)</sup>	18,84	S <sup>(2)</sup>	bezpł.
100%	21,39																						
Limit	21,39																						
30% <sup>(1)</sup>	6,42																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	48,80																						
Limit	42,80																						
30% <sup>(1)</sup>	18,84																						
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
<p>INN: <i>Candesartan cilexetil</i>   ATC: C09CA06   wyk: B   EAN ~ 143310</p> <p>(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D   Delfarma Sp. z o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Carzap - (IR) [21,33], Carzap - (IR) [21,37], Carzap - (IR) [21,37], Candepres - (IR) [21,39], Kandesar [25,51], Candepres [25,97], Carzap [25,97], Ranacand [27,91], Karbis [28,26], Atacand<sup>®</sup> [28,88]</p>		<p>INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09DA06   wyk: B   EAN ~ 063702</p> <p>(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Sandoz GmbH</p> <p>Odpowiedniki: Karbicombi - (IR) [39,46], Karbicombi - (IR) [44,34], Candepres HCT [48,80]</p>																					
<p><b>Candepres - (IR): tabl. 32 mg - 28 szt.</b></p>	<p>Rx</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>39,87</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>39,87</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>11,96</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	39,87	Limit	39,87	30% <sup>(1)</sup>	11,96	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Candepres HCT - (IR): tabl. 16/12,5 mg - 30 szt.</b></p>	<p>Rx</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>23,62</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>22,93</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>7,57</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	23,62	Limit	22,93	30% <sup>(1)</sup>	7,57	S <sup>(2)</sup>	bezpł.
100%	39,87																						
Limit	39,87																						
30% <sup>(1)</sup>	11,96																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	23,62																						
Limit	22,93																						
30% <sup>(1)</sup>	7,57																						
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
<p>INN: <i>Candesartan cilexetil</i>   ATC: C09CA06   wyk: B   EAN ~ 146660</p> <p>(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D   Delfarma Sp. z o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Candepres - (IR) [39,87], Carzap - (IR) [40,10], Carzap - (IR) [40,17], Carzap - (IR) [40,17], Candepres [44,11], Carzap [49,37], Karbis [51,44]</p>		<p>INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09DA06   wyk: B   EAN ~ 145001</p> <p>(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Delfarma Sp. z o.o.</p>																					
<p><b>Candepres - (IR): tabl. 32 mg - 30 szt.</b></p>	<p>Rx</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>41,71</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>41,71</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>12,51</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	41,71	Limit	41,71	30% <sup>(1)</sup>	12,51	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Candepres HCT - (IR): tabl. 32/12,5 mg - 30 szt.</b></p>	<p>Rx</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>41,71</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>41,71</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>12,51</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	41,71	Limit	41,71	30% <sup>(1)</sup>	12,51	S <sup>(2)</sup>	bezpł.
100%	41,71																						
Limit	41,71																						
30% <sup>(1)</sup>	12,51																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	41,71																						
Limit	41,71																						
30% <sup>(1)</sup>	12,51																						
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
<p>INN: <i>Candesartan cilexetil</i>   ATC: C09CA06   wyk: B   EAN ~ 149965</p> <p>(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D   Delfarma Sp. z o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Candepres - (IR) [41,71], Karbis - (IR) [42,28], Karbis - (IR) [42,28], Carzap - (IR) [42,74], Candepres - (IR) [42,84], Carzap - (IR) [43,34]</p>		<p>INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09DA06   wyk: B   EAN ~ 150639</p> <p>(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Delfarma Sp. z o.o.</p>																					
<p><b>Candepres - (IR): tabl. 32 mg - 30 szt.</b></p>	<p>Rx</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>42,84</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>42,84</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>12,85</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	42,84	Limit	42,84	30% <sup>(1)</sup>	12,85	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Candepres HCT - (IR): tabl. 32/25 mg - 30 szt.</b></p>	<p>Rx</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>41,71</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>41,71</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>12,51</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	41,71	Limit	41,71	30% <sup>(1)</sup>	12,51	S <sup>(2)</sup>	bezpł.
100%	42,84																						
Limit	42,84																						
30% <sup>(1)</sup>	12,85																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	41,71																						
Limit	41,71																						
30% <sup>(1)</sup>	12,51																						
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
<p>INN: <i>Candesartan cilexetil</i>   ATC: C09CA06   wyk: B   EAN ~ 145339</p> <p>(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:D, T2:D, T3:   Delfarma Sp. z o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Candepres - (IR) [41,71], Karbis - (IR) [42,28], Karbis - (IR) [42,28], Carzap - (IR) [42,74], Candepres - (IR) [42,84], Carzap - (IR) [43,34]</p>		<p>INN: <i>Candesartan cilexetil + Amlodipine</i>   ATC: C09DB07   wyk: B   EAN ~ 001969</p> <p>(1) Leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, w których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie candesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D   Adamed Sp. z o.o.</p>																					
<p><b>Candezek Combi: kaps. twarde 8/5 mg - 30 szt. ◆</b></p>		<p><b>Candezek Combi: kaps. twarde 8/5 mg - 30 szt. ◆</b></p>		<p>Rx</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>17,30</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>11,46</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>8,35</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	17,30	Limit	11,46	30% <sup>(1)</sup>	8,35	S <sup>(2)</sup>	bezpł.										
100%	17,30																						
Limit	11,46																						
30% <sup>(1)</sup>	8,35																						
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																						



Skuteczny przepływ

pentoxifyline  
**polfilin**  
 prolongatum

400 mg x 20 tabl. ♥ 400 mg x 60 tabl.

<b>Candezek Combi: kaps. twarde 8/5 mg - 90 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>49,01</b>
		Limit	<b>34,39</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>22,45</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Candesartan cilexetil + Amlodipine* ATC: C09DB07 wyk: B EAN ~ 001990  
 (1) Leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach  
 WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
 Adamed Sp. z o.o.

<b>Candezek Combi: kaps. twarde 8/10 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>17,30</b>
		Limit	<b>11,46</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>8,35</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Candesartan cilexetil + Amlodipine* ATC: C09DB07 wyk: B EAN ~ 002027  
 (1) Leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach  
 WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
 Adamed Sp. z o.o.

<b>Candezek Combi: kaps. twarde 8/10 mg - 90 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>49,01</b>
		Limit	<b>34,39</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>22,45</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Candesartan cilexetil + Amlodipine* ATC: C09DB07 wyk: B EAN ~ 002058  
 (1) Leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach  
 WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
 Adamed Sp. z o.o.

<b>Candezek Combi: kaps. twarde 16/5 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>33,52</b>
		Limit	<b>22,93</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>15,72</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Candesartan cilexetil + Amlodipine* ATC: C09DB07 wyk: B EAN ~ 002089  
 (1) Leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach  
 WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
 Adamed Sp. z o.o.

<b>Candezek Combi: kaps. twarde 16/5 mg - 90 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>94,08</b>
		Limit	<b>68,79</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>41,34</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Candesartan cilexetil + Amlodipine* ATC: C09DB07 wyk: B EAN ~ 002119  
 (1) Leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach  
 WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
 Adamed Sp. z o.o.

<b>Candezek Combi: kaps. twarde 16/10 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>33,52</b>
		Limit	<b>22,93</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>15,72</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Candesartan cilexetil + Amlodipine* ATC: C09DB07 wyk: B EAN ~ 002140  
 (1) Leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach  
 WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
 Adamed Sp. z o.o.

<b>Candezek Combi: kaps. twarde 16/10 mg - 90 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>94,08</b>
		Limit	<b>68,79</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>41,34</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Candesartan cilexetil + Amlodipine* ATC: C09DB07 wyk: B EAN ~ 002171  
 (1) Leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach  
 WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
 Adamed Sp. z o.o.

<b>Candifluc (Fluconazolium Aflofarm): syrop 5 mg/ml - 1 but. 150 ml</b>	Rx	100%	<b>27,74</b>
		Limit	<b>27,74</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>13,87</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Fluconazole* ATC: J02AC01 wyk: B EAN ~ 257804  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
 Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Candifluc (Fluconazolium Aflofarm) [27,74], Fluconazin [32,32], Fluconazole Hasco [32,32], Fluconazole Polfarmex [32,32]

<b>Caramlo: tabl. 8/5 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>12,13</b>
		Limit	<b>10,70</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>4,64</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Candesartan cilexetil + Amlodipine* ATC: C09DB07 wyk: B EAN ~ 191764  
 (1) Leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach  
 WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Zentiva PL Sp. z o.o.

<b>Caramlo: tabl. 16/5 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>23,24</b>
		Limit	<b>21,40</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>8,26</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Candesartan cilexetil + Amlodipine* ATC: C09DB07 wyk: B EAN ~ 141807  
 (1) Leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach  
 WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Zentiva PL Sp. z o.o.

<b>Caramlo: tabl. 16/10 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>23,24</b>
		Limit	<b>21,40</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>8,26</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Candesartan cilexetil + Amlodipine* ATC: C09DB07 wyk: B EAN ~ 191832  
 (1) Leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach  
 WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Zentiva PL Sp. z o.o.

<b>Caramlo: tabl. 16/10 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>23,24</b>
		Limit	<b>21,40</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>8,26</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Candesartan cilexetil + Amlodipine* ATC: C09DB07 wyk: B EAN ~ 191832  
 (1) Leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach  
 WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Zentiva PL Sp. z o.o.

<b>Cardilopin: tabl. 2,5 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>6,11</b>
		Limit	<b>4,33</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>3,08</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Amlodipine* ATC: C08CA01 wyk: B EAN ~ 907311  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 PROTĘRAPIA Sp. z o.o.

<b>Cardilopin: tabl. 5 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>7,99</b>
		Limit	<b>7,99</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>2,40</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Amlodipine* ATC: C08CA01 wyk: B EAN ~ 907410  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 PROTĘRAPIA Sp. z o.o.

<b>Cardilopin: tabl. 10 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>14,85</b>
		Limit	<b>14,85</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>4,46</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Amlodipine* ATC: C08CA01 wyk: B EAN ~ 907519  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 PROTĘRAPIA Sp. z o.o.

<b>Cardura® XL: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 4 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>25,53</b>
		Limit	<b>19,21</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>12,08</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(3)</sup>	<b>9,52</b>
		S <sup>(4)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Doxazosin* ATC: C02CA04, G04CA wyk: B EAN ~ 431410  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przerost gruczołu krokowego (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Upjohn EESV

Odpowiedniki: Kamiren® XL [24,73], Cardura® XL [25,53]



## W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

Cardura® XL: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 8 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	51,90
		Limit	38,42
		30% <sup>(1)</sup>	25,01
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	19,88

INN: *Doxazosin* | ATC: C02CA04, G04CA | wyk: B | EAN ~ 431519

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Upjohn EESV

Carvedilol-ratiopharm® 6,25: tabl. powł. 6,25 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	7,64
		Limit	2,17
		30% <sup>(1)</sup>	6,12
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Carvedilol* | ATC: C07AG02 | wyk: B | EAN ~ 727100

(1) Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV WP: Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Ratiopharm GmbH

Odpowiedniki: Dilatrend® [X], Carvedilol-ratiopharm® 6,25 [7,64], Hypoten® [7,66], Atram® 6,25 mg [7,67], Coryol® [8,06], Avedol [8,12], Carvetrend [8,12]

Carvedilol-ratiopharm® 12,5: tabl. powł. 12,5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	10,12
		Limit	4,34
		30% <sup>(1)</sup>	7,08
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Carvedilol* | ATC: C07AG02 | wyk: B | EAN ~ 727148

(1) Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV WP: Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Ratiopharm GmbH

Odpowiedniki: Atram® 12,5 mg [9,64], Carvedilol-ratiopharm® 12,5 [10,12], Hypoten® [10,53], Coryol® [10,74], Avedol [11,38], Carvetrend [11,39], Dilatrend® [24,19]

Carvedilol-ratiopharm® 25: tabl. powł. 25 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	13,84
		Limit	8,67
		30% <sup>(1)</sup>	7,77
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Carvedilol* | ATC: C07AG02 | wyk: B | EAN ~ 727193

(1) Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV WP: Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Ratiopharm GmbH

Odpowiedniki: Dilatrend® [X], Atram® 25 mg [13,44], Carvedilol-ratiopharm® 25 [13,84], Coryol® [13,96], Hypoten® [14,26], Avedol [15,09], Carvetrend [15,10]

Carvetrend: tabl. 3,125 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	8,37
		Limit	1,08
		30% <sup>(1)</sup>	7,61
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Carvedilol* | ATC: C07AG02 | wyk: B | EAN ~ 016814

(1) Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV WP: Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Coryol® [7,91], Carvetrend [8,37]

Carvetrend: tabl. 6,25 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	8,12
		Limit	2,17
		30% <sup>(1)</sup>	6,60
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Carvedilol* | ATC: C07AG02 | wyk: B | EAN ~ 016913

(1) Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV WP: Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Dilatrend® [X], Carvedilol-ratiopharm® 6,25 [7,64], Hypoten® [7,66], Atram® 6,25 mg [7,67], Coryol® [8,06], Avedol [8,12], Carvetrend [8,12]

Carvetrend: tabl. 12,5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	11,39
		Limit	4,34
		30% <sup>(1)</sup>	8,35
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Carvedilol* | ATC: C07AG02 | wyk: B | EAN ~ 017019

(1) Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV WP: Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Atram® 12,5 mg [9,64], Carvedilol-ratiopharm® 12,5 [10,12], Hypoten® [10,53], Coryol® [10,74], Avedol [11,38], Carvetrend [11,39], Dilatrend® [24,19]

Carvetrend: tabl. 25 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	15,10
		Limit	8,67
		30% <sup>(1)</sup>	9,03
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Carvedilol* | ATC: C07AG02 | wyk: B | EAN ~ 017118

(1) Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV WP: Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Dilatrend® [X], Atram® 25 mg [13,44], Carvedilol-ratiopharm® 25 [13,84], Coryol® [13,96], Hypoten® [14,26], Avedol [15,09], Carvetrend [15,10]

Carzap: tabl. 8 mg - 28 szt.	Rx	100%	13,46
		Limit	10,70
		30% <sup>(1)</sup>	5,97
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Candesartan cilexetil* | ATC: C09CA06 | wyk: B | EAN ~ 937080

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Zentiva PL Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Kandesar [13,24], Candepres [13,46], Carzap [13,46], Atacand® [14,18], Ranacand [14,44], Karbis [14,61]

Carzap: tabl. 8 mg - 56 szt.	Rx	100%	25,97
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	10,99
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Candesartan cilexetil* | ATC: C09CA06 | wyk: B | EAN ~ 937103

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Zentiva PL Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Carzap [25,97], Karbis [26,99]

Carzap: tabl. 16 mg - 28 szt.	Rx	100%	25,97
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	10,99
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Candesartan cilexetil* | ATC: C09CA06 | wyk: B | EAN ~ 937172

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Zentiva PL Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Carzap - (IR) [21,33], Carzap - (IR) [21,37], Candepres - (IR) [21,39], Kandesar [25,51], Candepres [25,97], Carzap [25,97], Ranacand [27,91], Karbis [28,26], Atacand® [28,88]

Carzap: tabl. 16 mg - 56 szt.	Rx	100%	49,37
		Limit	42,80
		30% <sup>(1)</sup>	19,41
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Candesartan cilexetil* | ATC: C09CA06 | wyk: B | EAN ~ 937196

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Zentiva PL Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Carzap - (IR) [40,10], Carzap - (IR) [40,17], Carzap - (IR) [40,17], Carzap [49,37], Karbis [51,44]

Carzap: tabl. 32 mg - 28 szt.	Rx	100%	49,37
		Limit	42,80
		30% <sup>(1)</sup>	19,41
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Candesartan cilexetil* | ATC: C09CA06 | wyk: B | EAN ~ 937264

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Zentiva PL Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Candepres - (IR) [39,87], Carzap - (IR) [40,10], Carzap - (IR) [40,17], Carzap - (IR) [40,17], Candepres [44,11], Carzap [49,37], Karbis [51,44]

Carzap - (IR): tabl. 16 mg - 28 szt.	Rx	100%	21,37
		Limit	21,37
		30% <sup>(1)</sup>	6,41
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Candesartan cilexetil* | ATC: C09CA06 | wyk: B | EAN ~ 145505

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Carzap - (IR) [21,33], Carzap - (IR) [21,37], Carzap - (IR) [21,37], Candepres - (IR) [21,39], Kandesar [25,51], Candepres [25,97], Carzap [25,97], Ranacand [27,91], Karbis [28,26], Atacand® [28,88]



Carzap - (IR): tabl. 16 mg - 28 szt.	Rx	100%	21,37
		Limit	21,37
		30% <sup>(1)</sup>	6,41
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Candesartan cilexetil* ATC: C09CA06 wyk: B EAN ~ 145332  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Carzap - (IR) [21,33], Carzap - (IR) [21,37], Carzap - (IR) [21,37], Candepres - (IR) [21,39], Kandesar [25,51], Candepres [25,97], Carzap [25,97], Ranacand [27,91], Karbis [28,26], Atacad® [28,88]

Carzap - (IR): tabl. 16 mg - 28 szt.	Rx	100%	21,33
		Limit	21,33
		30% <sup>(1)</sup>	6,40
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Candesartan cilexetil* ATC: C09CA06 wyk: B EAN ~ 145488  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Inpharm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Carzap - (IR) [21,33], Carzap - (IR) [21,37], Carzap - (IR) [21,37], Candepres - (IR) [21,39], Kandesar [25,51], Candepres [25,97], Carzap [25,97], Ranacand [27,91], Karbis [28,26], Atacad® [28,88]

Carzap - (IR): tabl. 16 mg - 30 szt.	Rx	100%	22,25
		Limit	22,25
		30% <sup>(1)</sup>	6,68
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Candesartan cilexetil* ATC: C09CA06 wyk: B EAN ~ 149645  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Inpharm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Carzap - (IR) [22,25], Karbis - (IR) [22,60]

Carzap - (IR): tabl. 16 mg - 56 szt.	Rx	100%	40,17
		Limit	40,17
		30% <sup>(1)</sup>	12,05
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Candesartan cilexetil* ATC: C09CA06 wyk: B EAN ~ 145506  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Carzap - (IR) [40,10], Carzap - (IR) [40,17], Carzap - (IR) [40,17], Carzap [49,37], Karbis [51,44]

Carzap - (IR): tabl. 16 mg - 56 szt.	Rx	100%	40,10
		Limit	40,10
		30% <sup>(1)</sup>	12,03
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Candesartan cilexetil* ATC: C09CA06 wyk: B EAN ~ 145489  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Inpharm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Carzap - (IR) [40,10], Carzap - (IR) [40,17], Carzap - (IR) [40,17], Carzap [49,37], Karbis [51,44]

Carzap - (IR): tabl. 16 mg - 56 szt.	Rx	100%	40,17
		Limit	40,17
		30% <sup>(1)</sup>	12,05
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Candesartan cilexetil* ATC: C09CA06 wyk: B EAN ~ 145333  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Carzap - (IR) [40,10], Carzap - (IR) [40,17], Carzap - (IR) [40,17], Carzap [49,37], Karbis [51,44]

Carzap - (IR): tabl. 16 mg - 60 szt.	Rx	100%	41,71
		Limit	41,71
		30% <sup>(1)</sup>	12,51
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Candesartan cilexetil* ATC: C09CA06 wyk: B EAN ~ 149646  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Inpharm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Carzap - (IR) [41,71], Karbis - (IR) [42,40]

Carzap - (IR): tabl. 32 mg - 28 szt.	Rx	100%	40,17
		Limit	40,17
		30% <sup>(1)</sup>	12,05
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Candesartan cilexetil* ATC: C09CA06 wyk: B EAN ~ 145336  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Candepres - (IR) [39,87], Carzap - (IR) [40,10], Carzap - (IR) [40,17], Carzap - (IR) [40,17], Candepres [44,11], Carzap [49,37], Karbis [51,44]

Carzap - (IR): tabl. 32 mg - 28 szt.	Rx	100%	40,10
		Limit	40,10
		30% <sup>(1)</sup>	12,03
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Candesartan cilexetil* ATC: C09CA06 wyk: B EAN ~ 145477  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Inpharm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Candepres - (IR) [39,87], Carzap - (IR) [40,10], Carzap - (IR) [40,17], Carzap - (IR) [40,17], Candepres [44,11], Carzap [49,37], Karbis [51,44]

Carzap - (IR): tabl. 32 mg - 28 szt.	Rx	100%	40,17
		Limit	40,17
		30% <sup>(1)</sup>	12,05
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Candesartan cilexetil* ATC: C09CA06 wyk: B EAN ~ 145511  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Candepres - (IR) [39,87], Carzap - (IR) [40,10], Carzap - (IR) [40,17], Carzap - (IR) [40,17], Candepres [44,11], Carzap [49,37], Karbis [51,44]

Carzap - (IR): tabl. 32 mg - 30 szt.	Rx	100%	43,34
		Limit	43,34
		30% <sup>(1)</sup>	13,00
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Candesartan cilexetil* ATC: C09CA06 wyk: B EAN ~ 143887  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Candepres - (IR) [41,71], Karbis - (IR) [42,28], Karbis - (IR) [42,28], Carzap - (IR) [42,74], Candepres - (IR) [42,84], Carzap - (IR) [43,34]

Carzap - (IR): tabl. 32 mg - 30 szt.	Rx	100%	42,74
		Limit	42,74
		30% <sup>(1)</sup>	12,82
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Candesartan cilexetil* ATC: C09CA06 wyk: B EAN ~ 144891  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Inpharm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Candepres - (IR) [41,71], Karbis - (IR) [42,28], Karbis - (IR) [42,28], Carzap - (IR) [42,74], Candepres - (IR) [42,84], Carzap - (IR) [43,34]

Carzap HCT: tabl. 8/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	13,86
		Limit	10,70
		30% <sup>(1)</sup>	6,37
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide* ATC: C09DA06 wyk: B EAN ~ 957170  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Zentiva PL Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Candepres HCT [13,46], Karbicombi [13,64], Carzap HCT [13,86]

Carzap HCT: tabl. 8/12,5 mg - 56 szt.	Rx	100%	25,97
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	10,99
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide* ATC: C09DA06 wyk: B EAN ~ 957194  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Zentiva PL Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Carzap HCT [25,97], Karbicombi [27,80]

Carzap HCT: tabl. 16/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	26,77
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	11,79
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09DA06   wyk: B   EAN ~ 957255	
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Zentiva PL Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Karbicombi - (IR) [23,45], Carzap HCT - (IR) [23,56], Carzap HCT [26,77], Candepres HCT [26,79], Karbicombi [28,25]			
Carzap HCT: tabl. 16/12,5 mg - 56 szt.	Rx	100%	49,37
		Limit	42,80
		30% <sup>(1)</sup>	19,41
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09DA06   wyk: B   EAN ~ 957279	
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Zentiva PL Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Carzap HCT [49,37], Karbicombi [53,03]			
Carzap HCT: tabl. 32/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	48,71
		Limit	42,80
		30% <sup>(1)</sup>	18,75
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09DA06   wyk: B   EAN ~ 057596	
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Zentiva PL Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Carzap HCT [48,71], Karbicombi [53,03]			
Carzap HCT: tabl. 32/25 mg - 28 szt.	Rx	100%	48,71
		Limit	42,80
		30% <sup>(1)</sup>	18,75
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09DA06   wyk: B   EAN ~ 058609	
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Zentiva PL Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Karbicombi - (IR) [39,46], Carzap HCT [48,71], Candepres HCT [48,80], Karbicombi [53,03]			
Carzap HCT - (IR): tabl. 16/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	23,56
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	8,58
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09DA06   wyk: B   EAN ~ 141590	
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Delfarma Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Karbicombi - (IR) [23,45], Carzap HCT - (IR) [23,56], Carzap HCT [26,77], Candepres HCT [26,79], Karbicombi [28,25]			
Cazaprol: tabl. powł. 1 mg - 30 szt.	Rx	100%	9,18
		Limit	2,23
		R <sup>(1)</sup>	9,18
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		INN: <i>Cilazapril</i>   ATC: C09AA08   wyk: B   EAN ~ 678648	
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:C, T3:D   Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Cazaprol [9,18], Cilan® [11,82]			
Cazaprol: tabl. powł. 2,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	14,37
		Limit	5,21
		R <sup>(1)</sup>	12,36
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		INN: <i>Cilazapril</i>   ATC: C09AA08   wyk: B   EAN ~ 678655	
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:C, T3:D   Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Cazaprol [14,37], Cilan® [11,82]			
Cazaprol: tabl. powł. 5 mg - 28 szt.	Rx	100%	23,60
		Limit	10,43
		R <sup>(1)</sup>	19,14
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		INN: <i>Cilazapril</i>   ATC: C09AA08   wyk: B   EAN ~ 678679	
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:C, T3:D   Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Cazaprol [23,60], Cilan® [11,82]			
Cecilor®: granulaty do przyg. zaw. 125 mg/5 ml - 1 but. 75 ml	Rx	100%	21,04
		Limit	15,49
		50% <sup>(1)</sup>	13,30
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Cefaclor</i>   ATC: J01DC04   wyk: B   EAN ~ 137411			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.			

Cecilor®: granulaty do przyg. zaw. 125 mg/5 ml - 1 but. 100 ml	Rx	100%	26,66
		Limit	20,65
		50% <sup>(1)</sup>	16,34
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Cefaclor</i>   ATC: J01DC04   wyk: B   EAN ~ 137428			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.			
Cecilor®: granulaty do przyg. zaw. 250 mg/5 ml - 1 but. 75 ml	Rx	100%	40,26
		Limit	30,98
		50% <sup>(1)</sup>	24,77
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Cefaclor</i>   ATC: J01DC04   wyk: B   EAN ~ 137510			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.			
Cecilor®: granulaty do przyg. zaw. 250 mg/5 ml - 1 but. 100 ml	Rx	100%	47,57
		Limit	41,30
		50% <sup>(1)</sup>	26,92
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Cefaclor</i>   ATC: J01DC04   wyk: B   EAN ~ 137527			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.			
Cecilor®: granulaty do przyg. zaw. 375 mg/5 ml - 1 but. 75 ml	Rx	100%	50,13
		Limit	46,46
		50% <sup>(1)</sup>	26,90
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Cefaclor</i>   ATC: J01DC04   wyk: B   EAN ~ 775910			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.			
Cecilor®: granulaty do przyg. zaw. 375 mg/5 ml - 1 but. 100 ml	Rx	100%	59,53
		Limit	59,53
		50% <sup>(1)</sup>	29,77
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Cefaclor</i>   ATC: J01DC04   wyk: B   EAN ~ 775910			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.			
Cecilor® MR: tabl. powł. o przedl. uwalnianiu 375 mg - 10 szt.	Rx	100%	24,44
		Limit	13,44
		50% <sup>(1)</sup>	17,72
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Cefaclor</i>   ATC: J01DC04   wyk: B   EAN ~ 676514			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.			
Cecilor® MR: tabl. powł. o przedl. uwalnianiu 500 mg - 10 szt.	Rx	100%	32,12
		Limit	17,93
		50% <sup>(1)</sup>	23,16
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Cefaclor</i>   ATC: J01DC04   wyk: B   EAN ~ 676613			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.			
Cecilor® MR: tabl. powł. o przedl. uwalnianiu 500 mg - 14 szt.	Rx	100%	44,39
		Limit	25,10
		50% <sup>(1)</sup>	31,84
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Cefaclor</i>   ATC: J01DC04   wyk: B   EAN ~ 676620			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.			
Cecilor® MR: tabl. powł. o przedl. uwalnianiu 750 mg - 10 szt.	Rx	100%	47,32
		Limit	26,89
		50% <sup>(1)</sup>	33,88
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Cefaclor</i>   ATC: J01DC04   wyk: B   EAN ~ 676712			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.			



Naszym wyborem

**enarenal**  
 enalapryli maleas

Cefox: tabl. powł. 250 mg - 10 szt. ◆	Rx	100%	19,65
		Limit	17,93
		50% <sup>(1)</sup>	10,69
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Cefuroxime axetil* ATC: J01DC02 wyk: B EAN ~ 255145  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

Odpowiedniki: Zinnat - (IR) [X], Cerxim® [18,21], Cefox [19,65], Zinnox® [19,73], Zinnat® [20,44]

Cefox: tabl. powł. 250 mg - 14 szt. ◆	Rx	100%	26,90
		Limit	25,10
		50% <sup>(1)</sup>	14,35
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Cefuroxime axetil* ATC: J01DC02 wyk: B EAN ~ 255152  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

Odpowiedniki: Cerxim® [25,99], Cefox [26,90]

Cefox: tabl. powł. 500 mg - 10 szt. ◆	Rx	100%	35,43
		Limit	35,43
		50% <sup>(1)</sup>	17,72
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Cefuroxime axetil* ATC: J01DC02 wyk: B EAN ~ 255183  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

Odpowiedniki: Cefuroxime Genoptim [33,13], Cerxim® [33,42], Zinnat - (IR) [33,81], Zinnat - (IR) [34,01], Zinnat - (IR) [34,57], Zinnat - (IR) [34,62], Zinnat - (IR) [34,62], Zinnat - (IR) [35,20], Cefox [35,43], Zinnox® [36,66], Zinnat® [37,48], Biorace® [42,57]

Cefox: tabl. powł. 500 mg - 14 szt. ◆	Rx	100%	50,25
		Limit	50,19
		50% <sup>(1)</sup>	25,16
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Cefuroxime axetil* ATC: J01DC02 wyk: B EAN ~ 255190  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

Odpowiedniki: Cefuroxime Genoptim [45,01], Zinnat - (IR) [45,94], Zinnat - (IR) [46,24], Zinnox® [48,64], Cerxim® [50,19], Cefox [50,25], Zinnat® [51,10], Biorace® [52,69]

Cefuroxime Axetil Aurovitas: tabl. powł. 500 mg - 10 szt. ◆	Rx	100%	33,92
		Limit	33,92
		50% <sup>(1)</sup>	16,96
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Cefuroxime* ATC: J01DC02 wyk: B EAN ~ 131283  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

Odpowiedniki: Cefuroxime Axetil Aurovitas [33,92], Furocef [35,20], Xorimax® 500 - (IR) [35,52], Zamur 500 [37,48], Xorimax® 500 [38,51]

Cefuroxime Axetil Aurovitas: tabl. powł. 500 mg - 14 szt. ◆	Rx	100%	46,12
		Limit	46,12
		50% <sup>(1)</sup>	23,06
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Cefuroxime* ATC: J01DC02 wyk: B EAN ~ 131285  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

Odpowiedniki: Cefuroxime Axetil Aurovitas [46,12], Furocef [47,90], Xorimax® 500 [49,27], Zamur 500 [51,10]

Cefuroxime Genoptim: tabl. powł. 500 mg - 10 szt. ◆	Rx	100%	33,13
		Limit	33,13
		50% <sup>(1)</sup>	16,57
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Cefuroxime axetil* ATC: J01DC02 wyk: B EAN ~ 353483  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

Odpowiedniki: Cefuroxime Genoptim [33,13], Cerxim® [33,42], Zinnat - (IR) [33,81], Zinnat - (IR) [34,01], Zinnat - (IR) [34,57], Zinnat - (IR) [34,62], Zinnat - (IR) [34,62], Zinnat - (IR) [35,20], Cefox [35,43], Zinnox® [36,66], Zinnat® [37,48], Biorace® [42,57]

Cefuroxime Genoptim: tabl. powł. 500 mg - 14 szt. ◆	Rx	100%	45,01
		Limit	45,01
		50% <sup>(1)</sup>	22,51
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Cefuroxime axetil* ATC: J01DC02 wyk: B EAN ~ 353490  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

Odpowiedniki: Cefuroxime Genoptim [45,01], Zinnat - (IR) [45,94], Zinnat - (IR) [46,24], Zinnox® [48,64], Cerxim® [50,19], Cefox [50,25], Zinnat® [51,10], Biorace® [52,69]

CellCept®: kaps. 250 mg - 100 szt.	Rx-z	100%	126,18
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	50,36
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Mycophenolate mofetil* ATC: L04AA06 wyk: B EAN ~ 707614  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku

WP: Steroidozależny zespół nerczycowy; cyklosporynozależny zespół nerczycowy; nefropatia toczniowa; zapalenie naczyń; toczeń rumieniowaty układowy; twardzina układowa; stan po przeszczepie kończyny, rógówki, tkanek lub komórek; neuropatia zapalna; miopatia zapalna; steroidooporny zespół nerczycowy; nefropatia IgA; choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D

Roche Registration GmbH

Odpowiedniki: Mycophenolate mofetil Sandoz 250 mg kapsułki twarde [78,45], Mycofit/Mycophenolate Mofetil Accord [79,02], Myfenax [82,85], CellCept® [126,18]

CellCept®: tabl. powł. 500 mg - 50 szt.	Rx-z	100%	126,18
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	50,36
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Mycophenolate mofetil* ATC: L04AA06 wyk: B EAN ~ 707515

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Steroidozależny zespół nerczycowy; cyklosporynozależny zespół nerczycowy; nefropatia toczniowa; zapalenie naczyń; toczeń rumieniowaty układowy; twardzina układowa; stan po przeszczepie kończyny, rógówki, tkanek lub komórek; neuropatia zapalna; miopatia zapalna; steroidooporny zespół nerczycowy; nefropatia IgA; choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D

Roche Registration GmbH

Odpowiedniki: Mycofit/Mycophenolate Mofetil Accord [79,02], Myfenax [82,85], Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane [86,46], CellCept® [126,18]

CellCept®: prosz. do przyg. zaw. doust. 1 g/5 ml - 1 but. 110 g	Rx-z	100%	235,83
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	128,40
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Mycophenolate mofetil* ATC: L04AA06 wyk: B EAN ~ 980918

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Steroidozależny zespół nerczycowy; cyklosporynozależny zespół nerczycowy; nefropatia toczniowa; zapalenie naczyń; toczeń rumieniowaty układowy; twardzina układowa; stan po przeszczepie kończyny, rógówki, tkanek lub komórek; neuropatia zapalna; miopatia zapalna; steroidooporny zespół nerczycowy; nefropatia IgA; choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D

Roche Registration GmbH

Cera-Chek 1 Code: test paskowy - 50 szt.	WM	100%	38,33
		Limit	38,33
		30% <sup>(1)</sup>	11,50
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Glukoza we krwi* ATC: V07AD wyk: B EAN ~ 521845

(1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | Kat. ciąży: N

DIATHER

Odpowiedniki: DIAVUE ToGo [35,43], OKmeter Core [35,43], Wellion SymPhar [36,63], G-BIO [37,55], Multisure GK [37,66], Everchek [37,77], Examedin® Fast [38,12], GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A [38,23], VivaChek Ino [38,33], VivaChek Ino [38,33], Cera-Chek 1 Code [38,33], One Touch Select Plus [38,35], Glucocard 01 Sensor [38,66], Glucosense® [38,77], EverCare [38,80], GensuCare [38,80], Optium Xido [38,86], Contour Plus [39,09], Contour TS [39,09], iXell® [39,15], Abra [39,27], Accu-Chek® Performa [39,27], Diagnostic Gold Strip [39,49], Glucomaxx® [39,55]

Cerxim®: prosz. do przyg. zaw. doust. 125 mg/5 ml - 1 op. 50 ml	Rx	100%	20,79
		Limit	20,65
		50% <sup>(1)</sup>	10,47
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Cefuroxime axetil* ATC: J01DC02 wyk: B EAN ~ 009212

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.

Ceroxim®: prosz. do przyg. zaw. doust. <b>125 mg/5 ml</b> - 1 op. 100 ml ◆	Rx	100% <b>36,90</b> Limit <b>36,90</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>18,45</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>		
INN: <i>Cefuroxime axetil</i>   ATC: J01DC02   wyk: B   EAN ~ 009229 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B				Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
Ceroxim®: prosz. do przyg. zaw. doust. <b>250 mg/5 ml</b> - 1 op. 50 ml ◆	Rx	100% <b>36,90</b> Limit <b>36,90</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>18,45</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>		
INN: <i>Cefuroxime axetil</i>   ATC: J01DC02   wyk: B   EAN ~ 009113 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B				Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
Ceroxim®: prosz. do przyg. zaw. doust. <b>250 mg/5 ml</b> - 1 op. 100 ml ◆	Rx	100% <b>69,15</b> Limit <b>69,15</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>34,58</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>		
INN: <i>Cefuroxime axetil</i>   ATC: J01DC02   wyk: B   EAN ~ 009120 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B				Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
Ceroxim®: tabl. powł. <b>250 mg</b> - 10 szt. ◆	Rx	100% <b>18,21</b> Limit <b>17,93</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>9,25</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>		
INN: <i>Cefuroxime axetil</i>   ATC: J01DC02   wyk: B   EAN ~ 263331 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B				Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
Odpowiedniki: Zinnat - (IR) [X], Ceroxim® [18,21], Cefox [19,65], Zinox® [19,73], Zinnat® [20,44]				
Ceroxim®: tabl. powł. <b>250 mg</b> - 14 szt. ◆	Rx	100% <b>25,99</b> Limit <b>25,10</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>13,44</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>		
INN: <i>Cefuroxime axetil</i>   ATC: J01DC02   wyk: B   EAN ~ 263355 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B				Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
Odpowiedniki: Ceroxim® [25,99], Cefox [26,90]				
Ceroxim®: tabl. powł. <b>250 mg</b> - 20 szt. ◆	Rx	100% <b>34,28</b> Limit <b>34,28</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>17,14</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>		
INN: <i>Cefuroxime axetil</i>   ATC: J01DC02   wyk: B   EAN ~ 263362 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B				Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
Ceroxim®: tabl. powł. <b>500 mg</b> - 10 szt. ◆	Rx	100% <b>33,42</b> Limit <b>33,42</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>16,71</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>		
INN: <i>Cefuroxime axetil</i>   ATC: J01DC02   wyk: B   EAN ~ 263386 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B				Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
Odpowiedniki: Cefuroxime Genoptim [33,13], Ceroxim® [33,42], Zinnat - (IR) [33,81], Zinnat - (IR) [34,01], Zinnat - (IR) [34,57], Zinnat - (IR) [34,62], Zinnat - (IR) [34,62], Zinnat - (IR) [35,20], Cefox [35,43], Zinox® [36,66], Zinnat® [37,48], Bioracef® [42,57]				
Ceroxim®: tabl. powł. <b>500 mg</b> - 14 szt. ◆	Rx	100% <b>50,19</b> Limit <b>50,19</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>25,10</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>		
INN: <i>Cefuroxime axetil</i>   ATC: J01DC02   wyk: B   EAN ~ 263409 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B				Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
Odpowiedniki: Cefuroxime Genoptim [45,01], Zinnat - (IR) [45,94], Zinnat - (IR) [46,24], Zinox® [48,64], Ceroxim® [50,19], Cefox [50,25], Zinnat® [51,10], Bioracef® [52,69]				
Ceroxim®: tabl. powł. <b>500 mg</b> - 20 szt. ◆	Rx	100% <b>63,83</b> Limit <b>63,83</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>31,92</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>		
INN: <i>Cefuroxime axetil</i>   ATC: J01DC02   wyk: B   EAN ~ 263416 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B				Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
Certican®: tabl. <b>0,5 mg</b> - 60 szt.	Rx	100% <b>894,68</b> Limit <b>894,68</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>		
INN: <i>Everolimus</i>   ATC: L04AA18   wyk: B   EAN ~ 211357 (1) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D				Novartis Poland Sp. z o.o.
Certican®: tabl. <b>0,75 mg</b> - 60 szt.	Rx	100% <b>1339,57</b> Limit <b>1339,57</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>		
INN: <i>Everolimus</i>   ATC: L04AA18   wyk: B   EAN ~ 211845 (1) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D				Novartis Poland Sp. z o.o.
Certican tabletki : tabl. <b>0,25 mg</b> - 60 szt.	Rx	100% <b>439,40</b> Limit <b>439,40</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>		
INN: <i>Everolimus</i>   ATC: L04AA18   wyk: B   EAN ~ 021165 (1) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D				Novartis Poland Sp. z o.o.
Cervarix®: inj. [zaw.] <b>20 µg+ 20 µg</b> - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml	Rx	100% <b>278,78</b> Limit <b>278,78</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>139,39</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>		
INN: <i>Papillomavirus vaccines</i>   ATC: J07BM02   wyk: B   EAN ~ 064748 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia   Kat. ciąży: C				GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA
Cetrotide®: inj. [iof.+ rozp.] <b>0,25 mg/ml</b> - 1 zest.	Rx	100% <b>104,42</b> Limit <b>97,10</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>55,87</b>		
INN: <i>Cetrorelix</i>   ATC: H01CC02   wyk: B   EAN ~ 488926 (1) Zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, poddawanych kontrolowanej hiperstimulacji jajników w programach wspomaganego rozrodu – refundacja do 3 cykli   Kat. ciąży: X				Merck Sp. z o.o.
Ceurolex SR®: tabl. o przedł. uwalnianiu <b>2 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>32,28</b> Limit <b>29,27</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>11,79</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>		
INN: <i>Ropinirole</i>   ATC: N04BC04   wyk: B   EAN ~ 049294 (1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C				Orion Pharma Poland Sp. o.o.
Odpowiedniki: Aparxon PR [29,93], Ceurolex SR [32,28], Aropilo SR [34,57], Repirol SR [37,31], Requip-Modutab [37,99], Ropodrin [38,57], ApoRopin [39,72], Rolpryna SR [40,29], Nironovo SR [40,60], Polpix SR [40,63]				
Ceurolex SR®: tabl. o przedł. uwalnianiu <b>4 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>70,22</b> Limit <b>58,54</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>29,24</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>		
INN: <i>Ropinirole</i>   ATC: N04BC04   wyk: B   EAN ~ 049355 (1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C				Orion Pharma Poland Sp. o.o.
Odpowiedniki: Rolpryna SR - (IR) [54,97], Aparxon PR [56,36], Aropilo SR [66,44], Ceurolex SR [70,22], Repirol SR [70,79], Requip-Modutab [72,65], Ropodrin [73,30], ApoRopin [75,59], Rolpryna SR [76,74], Nironovo SR [77,35], Polpix SR [77,43]				
Ceurolex SR®: tabl. o przedł. uwalnianiu <b>8 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>134,54</b> Limit <b>117,09</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>52,58</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>		
INN: <i>Ropinirole</i>   ATC: N04BC04   wyk: B   EAN ~ 049393 (1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C				Orion Pharma Poland Sp. o.o.
Odpowiedniki: Rolpryna SR - (IR) [103,59], Aparxon PR [111,19], Aropilo SR [123,10], Ceurolex SR [134,54], Repirol SR [136,03], Requip-Modutab [138,38], Ropodrin [140,27], ApoRopin [144,85], Rolpryna SR [147,14], Nironovo SR [148,37], Polpix SR [148,53]				



Skuteczny przepływ

pentoxifyline  
**polfilin**  
 prolongatum

400 mg x 20 tabl. ♥ 400 mg x 60 tabl.

Cezarius: roztw. doust. 100 mg/ml - 1 but. 300 ml ◆	Rx	100%	74,42
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Levetiracetam* ATC: N03AX14 wyk: B EAN ~ 928149  
 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA

Odpowiedniki: Trund [X], Levetiracetam NeuroPharma [71,16], Vetira [74,42], Cezarius [74,42], Keppra® [108,89]

Cezarius: tabl. powł. 250 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	19,72
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	10,73
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Levetiracetam* ATC: N03AX14 wyk: B EAN ~ 928200  
 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA

Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam NeuroPharma [X], Levetiracetam Aurovitas [14,36], Levetiracetam Accord [14,46], Polkepral [14,46], Normeg [15,94], Trund [16,85], Cezarius [19,72], Vetira [19,95], Keppra® [47,97]

Cezarius: tabl. powł. 500 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	32,26
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	11,09
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Levetiracetam* ATC: N03AX14 wyk: B EAN ~ 928224  
 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA

Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam Aurovitas [27,30], Polkepral [27,47], Levetiracetam Accord [27,48], Normeg [30,42], Levebon [31,07], Levetiracetam NeuroPharma [32,26], Trund [32,26], Cezarius [32,26], Vetira [38,47], Keppra® [94,41]

Cezarius: tabl. powł. 750 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	55,30
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	21,94
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Levetiracetam* ATC: N03AX14 wyk: B EAN ~ 928231  
 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA

Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam Aurovitas [39,27], Levetiracetam Accord [39,53], Polkepral [39,53], Normeg [43,96], Levetiracetam NeuroPharma [46,71], Trund [46,71], Cezarius [55,30], Vetira [56,01], Keppra® [140,37]

Cezarius: tabl. powł. 1000 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	61,07
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	15,89
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Levetiracetam* ATC: N03AX14 wyk: B EAN ~ 928248  
 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA

Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam Aurovitas [51,15], Levetiracetam Accord [51,52], Polkepral [51,52], Normeg [57,40], Levebon [58,70], Levetiracetam NeuroPharma [61,07], Trund [61,07], Cezarius [61,07], Vetira [73,46]

Cezera: tabl. powł. 5 mg - 20 szt.	Rx	100%	13,73
		Limit	8,97
		30% <sup>(1)</sup>	7,45
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Levocetirizine dihydrochloride* ATC: R06AE09 wyk: B EAN ~ 656929  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke'o - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Cezera: tabl. powł. 5 mg - 28 szt.	Rx	100%	18,58
		Limit	12,56
		30% <sup>(1)</sup>	9,79
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Levocetirizine dihydrochloride* ATC: R06AE09 wyk: B EAN ~ 656936  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke'o - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Lirra [14,06], Nossin [14,09], Zenaro [15,56], Cezera [18,58], Zyx® [19,10], Contrahist [19,45], Xyzal® [31,87]

Cezera: tabl. powł. 5 mg - 30 szt.	Rx	100%	20,39
		Limit	13,46
		30% <sup>(1)</sup>	10,97
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Levocetirizine dihydrochloride* ATC: R06AE09 wyk: B EAN ~ 656943  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke'o - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Alergimed [14,94], Cezera [20,39]

Cezera: tabl. powł. 5 mg - 90 szt.	Rx	100%	46,83
		Limit	40,37
		30% <sup>(1)</sup>	18,57
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Levocetirizine dihydrochloride* ATC: R06AE09 wyk: B EAN ~ 192600  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke'o - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Cezera - (R) [41,07], Cezera - (R) [41,11], Cezera [46,83]

Cezera - (R): tabl. 5 mg - 90 szt.	Rx	100%	41,07
		Limit	40,37
		30% <sup>(1)</sup>	12,81
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Levocetirizine dihydrochloride* ATC: R06AE09 wyk: B EAN ~ 146247  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke'o - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Cezera - (R) [41,07], Cezera - (R) [41,11], Cezera [46,83]

Cezera - (R): tabl. powł. 5 mg - 90 szt.	Rx	100%	41,11
		Limit	40,37
		30% <sup>(1)</sup>	12,85
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Levocetirizine dihydrochloride* ATC: R06AE09 wyk: B EAN ~ 144918  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke'o - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Inpharm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Cezera - (R) [41,07], Cezera - (R) [41,11], Cezera [46,83]

Chlorprothixen® Hasco: tabl. powł. 15 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	9,86
		Limit	6,24
		30% <sup>(1)</sup>	5,49
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	6,82
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Chlorprothixene hydrochloride* ATC: N05AF03 wyk: B EAN ~ 147440  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA

Odpowiedniki: Chlorprothixen® Hasco [9,86], Chlorprothixen® Zentiva [10,68]

Chlorprothixen® Hasco: tabl. powł. 50 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	20,81
		Limit	20,81
		30% <sup>(1)</sup>	6,24
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Chlorprothixene hydrochloride* ATC: N05AF03 wyk: B EAN ~ 147441  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA

Odpowiedniki: Chlorprothixen® Hasco [20,81], Chlorprothixen® Zentiva [22,42]

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

Chlorprothixen® Zentiva: tabl. powł. 15 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	10,68
		Limit	6,24
		30% <sup>(1)</sup>	6,31
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	7,64
INN: <i>Chlorprothixene hydrochloride</i>   ATC: N05AF03		wyk: B	EAN ~ 203017
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Zentiva PL Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Chlorprothixen® Hasco [9,86], Chlorprothixen® Zentiva [10,68]			
Chlorprothixen® Zentiva: tabl. powł. 50 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	22,42
		Limit	20,81
		30% <sup>(1)</sup>	7,85
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	4,81
INN: <i>Chlorprothixene hydrochloride</i>   ATC: N05AF03		wyk: B	EAN ~ 203116
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Zentiva PL Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Chlorprothixen® Hasco [20,81], Chlorprothixen® Zentiva [22,42]			
Cidimus: kaps. twarde 0,5 mg - 30 szt.	Rx	100%	46,03
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tacrolimus</i>   ATC: L04AA05		wyk: B	EAN ~ 078348
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: Cidimus [46,03], Prograf [57,92]			
Cidimus: kaps. twarde 1 mg - 30 szt.	Rx	100%	85,70
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tacrolimus</i>   ATC: L04AA05		wyk: B	EAN ~ 078357
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: Cidimus [85,70], Prograf [114,58]			
Cidimus: kaps. twarde 5 mg - 30 szt.	Rx	100%	383,48
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tacrolimus</i>   ATC: L04AA05		wyk: B	EAN ~ 078353
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: Cidimus [383,48], Prograf [570,70]			
Cilan®: tabl. powł. 1 mg - 30 szt.	Rx	100%	11,82
		Limit	2,23
		R <sup>(1)</sup>	11,82
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		INN: <i>Cilazapril</i>   ATC: C09AA08	
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Polfarmex S.A.			
Odpowiedniki: Cazaprol [9,18], Cilan® [11,82]			
Cilan®: tabl. powł. 2,5 mg - 30 szt.	Rx	100%	16,47
		Limit	5,58
		R <sup>(1)</sup>	14,09
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		INN: <i>Cilazapril</i>   ATC: C09AA08	
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Polfarmex S.A.			
Cilan®: tabl. powł. 5 mg - 30 szt.	Rx	100%	26,62
		Limit	11,17
		R <sup>(1)</sup>	21,85
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		INN: <i>Cilazapril</i>   ATC: C09AA08	
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Polfarmex S.A.			

CIPHIN® 500: tabl. powł. 500 mg - 10 szt.	Rx	100%	11,42
		Limit	11,42
		50% <sup>(1)</sup>	5,71
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ciprofloxacin</i>   ATC: J01MA02		wyk: B	EAN ~ 499113
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Zentiva PL Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: CIPHIN® 500 [11,42], Proxacin 500 [11,64], Ciprinol [11,69], Cipronex® [11,80], Cipropol® [11,96]			
Ciprinol: tabl. 250 mg - 10 szt.	Rx	100%	7,73
		Limit	5,90
		50% <sup>(1)</sup>	4,78
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ciprofloxacin</i>   ATC: J01MA02		wyk: B	EAN ~ 066414
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Proxacin 250 [7,23], Ciprinol [7,73], Cipronex® [7,76]			
Ciprinol: tabl. 500 mg - 10 szt.	Rx	100%	11,69
		Limit	11,69
		50% <sup>(1)</sup>	5,85
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ciprofloxacin</i>   ATC: J01MA02		wyk: B	EAN ~ 066216
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: CIPHIN® 500 [11,42], Proxacin 500 [11,64], Ciprinol [11,69], Cipronex® [11,80], Cipropol® [11,96]			
Cipronex®: tabl. powł. 250 mg - 10 szt.	Rx	100%	7,76
		Limit	5,90
		50% <sup>(1)</sup>	4,33
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ciprofloxacin</i>   ATC: J01MA02		wyk: B	EAN ~ 066216
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: CIPHIN® 500 [11,42], Proxacin 500 [11,64], Ciprinol [11,69], Cipronex® [11,80], Cipropol® [11,96]			
Cipronex®: tabl. powł. 500 mg - 10 szt.	Rx	100%	11,80
		Limit	11,80
		50% <sup>(1)</sup>	5,31
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ciprofloxacin</i>   ATC: J01MA02		wyk: B	EAN ~ 308514
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			
Odpowiedniki: Proxacin 250 [7,23], Ciprinol [7,73], Cipronex® [7,76]			
Cipronex®: tabl. powł. 500 mg - 10 szt.	Rx	100%	11,80
		Limit	11,80
		50% <sup>(1)</sup>	5,31
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ciprofloxacin</i>   ATC: J01MA02		wyk: B	EAN ~ 334964
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			
Odpowiedniki: CIPHIN® 500 [11,42], Proxacin 500 [11,64], Ciprinol [11,69], Cipronex® [11,80], Cipropol® [11,96]			
Cipropol®: tabl. powł. 500 mg - 10 szt.	Rx	100%	11,96
		Limit	11,80
		50% <sup>(1)</sup>	6,06
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ciprofloxacin</i>   ATC: J01MA02		wyk: B	EAN ~ 729012
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: CIPHIN® 500 [11,42], Proxacin 500 [11,64], Ciprinol [11,69], Cipronex® [11,80], Cipropol® [11,96]			
Citrolyt®: granulát do przyg. roztw. doust. (14,5 g + 46,4 g + 39,1 g)/100 g - 1 poj. 220 g	Rx	100%	70,83
		Limit	70,83
		30% <sup>(1)</sup>	21,25
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Citric acid + Potassium citrate + Sodium citrate</i>   ATC: G04BC, M04AC		wyk:	EAN ~ 210817
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Farmaceutyczne Spółdzielnia Pracy "FILOFARM"			
Clarzole: tabl. powł. 2,5 mg - 30 szt.	Rx	100%	61,54
		Limit	56,72
		B <sup>(1)</sup>	4,82
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		INN: <i>Letrozole</i>   ATC: L02BG04	
(1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii WP: Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D			
Actavis Group PTC ehf.			
Odpowiedniki: Letrozole Bluefish [55,81], Letrozole Aurovitas [56,61], Aromek™ [56,72], Lametta® [56,72], Etruzil [61,54], Clarzole [61,54]			



# ZOLPIC

Daj owcom odpocząć.

zolpidem



<b>Clazicon:</b> tabl. o zmodyf. uwalnianiu <b>30 mg</b> - 60 szt.	Rx	100%	<b>12,09</b>
		Limit	<b>9,83</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>5,46</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <i>Gliclazide</i>	ATC: A10BB09	wyk: B	EAN ~ 267155
(1) Cukrzyca(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Synoptis Pharma Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Symazide MR [X], Clazicon [12,09], Symazide MR 30 [12,20], Gliclada® [15,62], Diaprel® MR [24,95]			

<b>Clazicon:</b> tabl. o zmodyf. uwalnianiu <b>60 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>12,09</b>
		Limit	<b>9,83</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>5,46</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <i>Gliclazide</i>	ATC: A10BB09	wyk: B	EAN ~ 267162
(1) Cukrzyca(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Synoptis Pharma Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Gliclazide Zentiva [X], Diagen [12,09], Clazicon [12,09], Salsion [12,36], Symazide MR [13,05], Gliclada® [15,50], Oziclude MR [15,62], Diaprel® MR [23,50]			

<b>Clean WND:</b> opatrunek specjalistyczny <b>15x20 cm</b> - 1 szt.	WM	100%	<b>21,31</b>
		Limit	<b>21,31</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>6,39</b>
		B <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <i>Emplastris conlativi</i>	ATC: V20AA	wyk:	EAN ~ 103939
(1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N			
Duollife Sp. z o.o.			

<b>Clexane®:</b> inj. [roztw.] <b>20 mg/0,2 ml</b> - 10 amp.-strzyk. 0,2 ml	Rx	100%	<b>63,83</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		C <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(3)</sup>	<b>32,67</b>
			<b>bezpł.</b>
INN: <i>Enoxaparin sodium</i>	ATC: B01AB05	wyk: B	EAN ~ 048328
(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciężarnych po wszczęciu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Sanofi Winthrop Industrie			
Odpowiedniki: Neoparin [126,04], Clexane® [166,45]			

<b>Clexane®:</b> inj. [roztw.] <b>40 mg/0,4 ml</b> - 10 amp.-strzyk. 0,4 ml	Rx	100%	<b>121,73</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		C <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(3)</sup>	<b>56,21</b>
			<b>bezpł.</b>
INN: <i>Enoxaparin sodium</i>	ATC: B01AB05	wyk: B	EAN ~ 048427
(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 rż. - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciężarnych po wszczęciu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Sanofi Winthrop Industrie			
Odpowiedniki: Neoparin [42,61], Clexane® [63,83]			

<b>Clexane®:</b> inj. [roztw.] <b>100 mg/ml</b> - 10 amp.-strzyk.	Rx	100%	<b>308,08</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		C <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(3)</sup>	<b>141,61</b>
			<b>bezpł.</b>
INN: <i>Enoxaparin sodium</i>	ATC: B01AB05	wyk: B	EAN ~ 774920
(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 rż. - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciężarnych po wszczęciu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Sanofi Winthrop Industrie			
Odpowiedniki: Neoparin [164,38], Clexane® [211,82]			

<b>Clexane®:</b> inj. [roztw.] <b>80 mg/0,8 ml</b> - 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	Rx	100%	<b>211,82</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		C <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(3)</sup>	<b>78,65</b>
			<b>bezpł.</b>
INN: <i>Enoxaparin sodium</i>	ATC: B01AB05	wyk: B	EAN ~ 775026
(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 rż. - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciężarnych po wszczęciu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Sanofi Winthrop Industrie			
Odpowiedniki: Neoparin [126,04], Clexane® [166,45]			

<b>Clexane®:</b> inj. [roztw.] <b>60 mg/0,6 ml</b> - 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	Rx	100%	<b>166,45</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		C <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(3)</sup>	<b>66,57</b>
			<b>bezpł.</b>
INN: <i>Enoxaparin sodium</i>	ATC: B01AB05	wyk: B	EAN ~ 774821
(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 rż. - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciężarnych po wszczęciu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Sanofi Winthrop Industrie			
Odpowiedniki: Neoparin [126,04], Clexane® [166,45]			

<b>Clexane®:</b> inj. [roztw.] <b>100 mg/ml</b> - 10 amp.-strzyk.	Rx	100%	<b>308,08</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		C <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(3)</sup>	<b>141,61</b>
			<b>bezpł.</b>
INN: <i>Enoxaparin sodium</i>	ATC: B01AB05	wyk: B	EAN ~ 774920
(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 rż. - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciężarnych po wszczęciu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Sanofi Winthrop Industrie			
Odpowiedniki: Losmina [181,24], Clexane® [308,08]			



Clexane® forte: inj. [roztw.] 120 mg/0,8 ml - 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	Rx	100%	339,42
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	139,66
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

 INN: **Enoxaparin sodium** | ATC: **B01AB05** | wyk: **B** | EAN ~ **891429**

(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 rż. - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub orlezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**

Sanofi Winthrop Industrie

Clexane® forte: inj. [roztw.] 150 mg/ml - 10 amp.-strzyk. 1 ml	Rx	100%	400,63
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	150,93
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

 INN: **Enoxaparin sodium** | ATC: **B01AB05** | wyk: **B** | EAN ~ **891528**

(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 rż. - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub orlezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**

Sanofi Winthrop Industrie

Clindamycin-MIP 300: tabl. powł. 300 mg - 16 szt.	Rx	100%	21,48
		Limit	20,70
		50% <sup>(1)</sup>	11,13
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: **Clindamycin** | ATC: **J01FF01** | wyk: **B** | EAN ~ **001438**

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**

Odpowiedniki: Klimicin® [19,11], Dalacin® C [21,48], Clindamycin-MIP 300 [21,48]

Clindamycin-MIP 600: tabl. powł. 600 mg - 12 szt.	Rx	100%	31,14
		Limit	31,05
		50% <sup>(1)</sup>	15,62
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: **Clindamycin** | ATC: **J01FF01** | wyk: **B** | EAN ~ **001520**

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**

Odpowiedniki: Clindanea [31,05], Clindamycin-MIP 600 [31,14]

Clindamycin-MIP 600: tabl. powł. 600 mg - 16 szt.	Rx	100%	40,29
		Limit	40,29
		50% <sup>(1)</sup>	20,15
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: **Clindamycin** | ATC: **J01FF01** | wyk: **B** | EAN ~ **100153**

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.

Clindamycin-MIP 600: tabl. powł. 600 mg - 30 szt.	Rx	100%	71,82
		Limit	71,82
		50% <sup>(1)</sup>	35,91
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: **Clindamycin** | ATC: **J01FF01** | wyk: **B** | EAN ~ **001544**

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**

Odpowiedniki: Clindanea [31,05], Clindamycin-MIP 600 [31,14]

Clindanea: tabl. powł. 600 mg - 12 szt.	Rx	100%	31,05
		Limit	31,05
		50% <sup>(1)</sup>	15,53
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: **Clindamycin** | ATC: **J01FF01** | wyk: **B** | EAN ~ **141420**

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**

Odpowiedniki: Clindanea [31,05], Clindamycin-MIP 600 [31,14]

Cliovelle®: tabl. 1 mg+ 0,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	23,56
		Limit	16,23
		30% <sup>(1)</sup>	12,20
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

 INN: **Estradiol + Norethisterone (stałe dawki)** | ATC: **G03FA01** | wyk: **B** | EAN ~ **067794**

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **X**

Odpowiedniki: Cliovelle® [23,56], Activelle® [27,00]

Clonazepamum TZF: tabl. 0,5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	8,57
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,07
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: **Clonazepam** | ATC: **N03AE01** | wyk: **B** | EAN ~ **135615**

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Padaczka (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **D**

Odpowiedniki: Clonazepamum TZF [23,56], Clonazepamum TZF [23,56]

Clonazepamum TZF: tabl. 2 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	18,53
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	2,72
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: **Clonazepam** | ATC: **N03AE01** | wyk: **B** | EAN ~ **135516**

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Padaczka (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **D**

Odpowiedniki: Clonazepamum TZF [23,56], Clonazepamum TZF [23,56]

Clopamid VP: tabl. 20 mg - 20 szt.	Rx	100%	9,41
		Limit	9,41
		30% <sup>(1)</sup>	2,82
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

 INN: **Clopidamide** | ATC: **C03BA03** | wyk: **B** | EAN ~ **141012**

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**

Odpowiedniki: Clopidamide [14,40], Clopidamide [14,40]

Clodioxid: tabl. powł. 75 mg - 28 szt.	Rx	100%	26,33
		Limit	26,33
		30% <sup>(1)</sup>	7,90
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

 INN: **Clopidogrel** | ATC: **B01AC04** | wyk: **B** | EAN ~ **625826**

(1) Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania, Miążdżca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**

Odpowiedniki: Clopidogrel Teva [X], Trombex [X], Clopidogrel Genoptim [14,40], Zyllit - (IR) [21,32], Zyllit® - (IR) [21,35], Clopidogrel Bluefish [21,75], Agrexex - (IR) [21,80], Agrexex - (IR) [22,36], Agrexex - (IR) [22,38], Grepid [22,95], Pegorel [22,95], Clopidogrel KRKA [23,52], Zyllit® [23,52], Clopidogrel Apotex [25,70], Clopidogrel Aurovitas [25,76], Agrexex [25,80], Clopidix [26,33], Plavacorin® [27,08], Areplex® [34,83]

Clodioxid: tabl. powł. 75 mg - 28 szt.	Rx	100%	25,76
		Limit	25,76
		30% <sup>(1)</sup>	7,73
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

 INN: **Clopidogrel** | ATC: **B01AC04** | wyk: **B** | EAN ~ **149220**

(1) Miążdżca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**

Odpowiedniki: Clopidogrel Teva [X], Trombex [X], Clopidogrel Genoptim [14,40], Zyllit - (IR) [21,32], Zyllit® - (IR) [21,35], Clopidogrel Bluefish [21,75], Agrexex - (IR) [21,80], Agrexex - (IR) [22,36], Agrexex - (IR) [22,38], Grepid [22,95], Pegorel [22,95], Clopidogrel KRKA [23,52], Zyllit® [23,52], Clopidogrel Apotex [25,70], Clopidogrel Aurovitas [25,76], Agrexex [25,80], Clopidix [26,33], Plavacorin® [27,08], Areplex® [34,83]

Clodioxid: tabl. powł. 75 mg - 28 szt.	Rx	100%	25,76
		Limit	25,76
		30% <sup>(1)</sup>	7,73
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

 INN: **Clopidogrel** | ATC: **B01AC04** | wyk: **B** | EAN ~ **149220**

(1) Miążdżca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**

Odpowiedniki: Clopidogrel Teva [X], Trombex [X], Clopidogrel Genoptim [14,40], Zyllit - (IR) [21,32], Zyllit® - (IR) [21,35], Clopidogrel Bluefish [21,75], Agrexex - (IR) [21,80], Agrexex - (IR) [22,36], Agrexex - (IR) [22,38], Grepid [22,95], Pegorel [22,95], Clopidogrel KRKA [23,52], Zyllit® [23,52], Clopidogrel Apotex [25,70], Clopidogrel Aurovitas [25,76], Agrexex [25,80], Clopidix [26,33], Plavacorin® [27,08], Areplex® [34,83]



Clopidogrel Bluefish: tabl. powł. 75 mg - 28 szt.	Rx	100%	21,75
		Limit	21,75
		30% <sup>(1)</sup>	6,53
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Clopidogrel* ATC: B01AC04 wyk: B EAN ~ 768141

(1) Miazdżycza objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
Bluefish Pharmaceuticals

**Odpowiedniki:** Clopidogrel Teva [X], Trombex [X], Clopidogrel Genoptim [14,40], Zyllt - (IR) [21,32], Zyllt® - (IR) [21,35], Clopidogrel Bluefish [21,75], Agregec - (IR) [21,80], Agregec - (IR) [22,36], Agregec - (IR) [22,38], Grepid [22,95], Pegorel [22,95], Clopidogrel KRKA [23,52], Zyllt® [23,52], Clopidogrel Apotex [25,70], Clopidogrel Aurovitas [25,76], Agregec [25,80], Clopidix [26,33], Plavocorin® [27,08], Areplex® [34,83]

Clopidogrel KRKA: tabl. powł. 75 mg - 28 szt.	Rx	100%	23,52
		Limit	23,52
		30% <sup>(1)</sup>	7,06
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Clopidogrel* ATC: B01AC04 wyk: B EAN ~ 029388

(1) Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Miazdżycza objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
Krka Polska Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** Clopidogrel Teva [X], Trombex [X], Clopidogrel Genoptim [14,40], Zyllt - (IR) [21,32], Zyllt® - (IR) [21,35], Clopidogrel Bluefish [21,75], Agregec - (IR) [21,80], Agregec - (IR) [22,36], Agregec - (IR) [22,38], Grepid [22,95], Pegorel [22,95], Zyllt® [23,52], Clopidogrel KRKA [23,52], Clopidogrel Apotex [25,70], Clopidogrel Aurovitas [25,76], Agregec [25,80], Clopidix [26,33], Plavocorin® [27,08], Areplex® [34,83]

Clopixol®: tabl. powł. 10 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	34,55
		Limit	22,29
		B <sup>(1)</sup>	12,26
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Zuclophenoxol dihydrochloride* ATC: N05AF05 wyk: B EAN ~ 126729

(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Lundbeck Poland Sp. z o.o.

Clopixol®: tabl. powł. 25 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	55,72
		Limit	55,72
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Zuclophenoxol dihydrochloride* ATC: N05AF05 wyk: B EAN ~ 126828

(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Lundbeck Poland Sp. z o.o.

Clopixol® Depot: inj. [roztw. olejowy] 200 mg/ml - 1 amp. ◆	Rx	100%	20,23
		Limit	15,36
		B <sup>(1)</sup>	4,87
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Zuclophenoxol decanate* ATC: N05AF05 wyk: B EAN ~ 189212

(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Lundbeck Poland Sp. z o.o.

Clopixol® Depot: inj. [roztw. olejowy] 200 mg/ml - 10 amp. ◆	Rx	100%	153,60
		Limit	153,60
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Zuclophenoxol decanate* ATC: N05AF05 wyk: B EAN ~ 189229

(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Lundbeck Poland Sp. z o.o.

Clopizam: tabl. 25 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	7,04
		Limit	5,27
		B <sup>(1)</sup>	1,77
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Clozapine* ATC: N05AH02 wyk: B EAN ~ 327606

(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** Symcloza [6,92], Clopizam [7,04], Klozapol® [9,22]

Clopizam: tabl. 100 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	25,63
		Limit	21,07
		B <sup>(1)</sup>	4,56
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Clozapine* ATC: N05AH02 wyk: B EAN ~ 327705

(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** Symcloza [25,12], Clopizam [25,63], Klozapol® [31,44]

Clopizam: tabl. 100 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	47,93
		Limit	42,13
		B <sup>(1)</sup>	5,80
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Clozapine* ATC: N05AH02 wyk: B EAN ~ 132773

(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Co-amoxiclav Bluefish: tabl. powł. 1 g - 14 szt. ◆	Rx	100%	27,29
		Limit	27,29
		50% <sup>(1)</sup>	13,65
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Amoxicillin + Clavulanic acid* ATC: J01CR02 wyk: B EAN ~ 744848

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
Bluefish Pharmaceuticals

**Odpowiedniki:** Amoksyklav® - (IR) [X], Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas [25,22], Amoksyklav® - (IR) [26,86], Penlac [27,29], Co-amoxiclav Bluefish [27,29], Amoksyklav® - (IR) [27,45], Ramoclav [28,48], Augmentin® - (IR) [29,11], Augmentin® - (IR) [29,16], Augmentin® - (IR) [29,23], Auglavin PPH [31,00], Polamoklav [31,00], Amoksyklav® [31,35], Augmentin® - (IR) [32,30], Augmentin® - (IR) [32,32], Augmentin® [34,92], Taromentin® [40,04]

Coaxil®: tabl. powł. 12,5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	21,03
		Limit	10,40
		30% <sup>(1)</sup>	13,75
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Tianeptine sodium* ATC: N06AX14 wyk: B EAN ~ 370214

(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Les Laboratoires Servier

Coaxil® - (IR): tabl. draż. 12,5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	14,23
		Limit	10,40
		30% <sup>(1)</sup>	6,95
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Tianeptine sodium* ATC: N06AX14 wyk: B EAN ~ 129001

(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Delfarma Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** Coaxil® - (IR) [14,23], Coaxil® - (IR) [15,89], Atinepte [20,47], Tiansesal [20,48], Coaxil® [21,03]

Coaxil® - (IR): tabl. draż. 12,5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	15,89
		Limit	10,40
		30% <sup>(1)</sup>	8,61
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Tianeptine sodium* ATC: N06AX14 wyk: B EAN ~ 267131

(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Inpharm Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** Coaxil® - (IR) [14,23], Coaxil® - (IR) [15,89], Atinepte [20,47], Tiansesal [20,48], Coaxil® [21,03]

Co-Bespres: tabl. powł. 80/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	13,50
		Limit	10,70
		30% <sup>(1)</sup>	6,01
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Valsartan + Hydrochlorothiazide* ATC: C09DA03 wyk: B EAN ~ 740833

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** AuroValsart HCT [9,75], Co-Valsacor [13,30], Co-Bespres [13,50], Vanatex® HCT [14,04], Co-Dipper [14,19]

Co-Bespres: tabl. powł. 160/25 mg - 28 szt.	Rx	100%	27,46
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	12,48
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Valsartan + Hydrochlorothiazide* ATC: C09DA03 wyk: B EAN ~ 740864

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** AuroValsart HCT [18,18], Valtap HCT [18,30], Co-Bespres - (IR) [22,19], Tensart HCT [25,22], Co-Valsacor [27,09], Co-Dipper [27,40], Co-Bespres [27,46], Vanatex® HCT [28,20]

Co-Bespres: tabl. powł. 160/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	27,34
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	12,36
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Valsartan + Hydrochlorothiazide* ATC: C09DA03 wyk: B EAN ~ 874255

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** AuroValsart HCT [18,18], Valtap HCT [18,18], Tensart HCT [25,22], Co-Valsacor [27,09], Co-Bespres [27,34], Co-Dipper [27,40], Vanatex® HCT [28,20]

<b>Co-Bespres - (IR):</b> tabl. powł. 160/25 mg - 28 szt.	Rx	100%	22,19
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	7,21
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Valsartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA03   wyk: B   EAN ~ 130594			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Inpharm Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: AuroValsart HCT [18,18], Valtap HCT [18,30], Co-Bespres - (IR) [22,19], Tensart HCT [25,22], Co-Valsacor [27,09], Co-Dipper [27,40], Co-Bespres [27,46], Vanatex® HCT [28,20]			
<b>Co-Dipper:</b> tabl. powł. 80/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	14,19
		Limit	10,70
		30% <sup>(1)</sup>	6,70
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Valsartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA03   wyk: B   EAN ~ 829927			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: AuroValsart HCT [9,75], Co-Valsacor [13,30], Co-Bespres [13,50], Vanatex® HCT [14,04], Co-Dipper [14,19]			
<b>Co-Dipper:</b> tabl. powł. 80/12,5 mg - 56 szt.	Rx	100%	23,68
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	8,70
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Valsartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA03   wyk: B   EAN ~ 829941			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: Co-Dipper [23,68], Co-Valsacor [25,63]			
<b>Co-Dipper:</b> tabl. powł. 160/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	27,40
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	12,42
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Valsartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA03   wyk: B   EAN ~ 829989			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: AuroValsart HCT [18,18], Valtap HCT [18,18], Tensart HCT [25,22], Co-Valsacor [27,09], Co-Bespres [27,34], Co-Dipper [27,40], Vanatex® HCT [28,20]			
<b>Co-Dipper:</b> tabl. powł. 160/12,5 mg - 56 szt.	Rx	100%	41,02
		Limit	41,02
		30% <sup>(1)</sup>	12,31
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Valsartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA03   wyk: B   EAN ~ 830008			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: Co-Dipper [41,02], Co-Valsacor [48,72]			
<b>Co-Dipper:</b> tabl. powł. 160/25 mg - 28 szt.	Rx	100%	27,40
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	12,42
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Valsartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA03   wyk: B   EAN ~ 830107			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: AuroValsart HCT [18,18], Valtap HCT [18,30], Co-Bespres - (IR) [22,19], Tensart HCT [25,22], Co-Valsacor [27,09], Co-Dipper [27,40], Co-Bespres [27,46], Vanatex® HCT [28,20]			
<b>Co-Dipper:</b> tabl. powł. 160/25 mg - 56 szt.	Rx	100%	44,79
		Limit	42,80
		30% <sup>(1)</sup>	14,83
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Valsartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA03   wyk: B   EAN ~ 830138			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: Co-Dipper [44,79], Co-Valsacor [48,72]			
<b>Co-Dipper:</b> tabl. powł. 320/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	48,23
		Limit	42,80
		30% <sup>(1)</sup>	18,27
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Valsartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA03   wyk: B   EAN ~ 830176			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: Co-Dipper [48,23], Co-Valsacor [51,62]			
<b>Co-Dipper:</b> tabl. powł. 320/25 mg - 28 szt.	Rx	100%	48,23
		Limit	42,80
		30% <sup>(1)</sup>	18,27
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Valsartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA03   wyk: B   EAN ~ 830244			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: Co-Dipper [48,23], Co-Valsacor [51,62]			

<b>CoFlex TLC Calamine Standard:</b> opatrunek 7,62x550 cm - 1 szt.	WM	100%	90,92
		Limit	88,80
		30% <sup>(1)</sup>	28,76
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Emplastrum polyurethanum spumatum</b>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 461986			
(1) Przewlekłe owrzodzenia   Kat. ciąży: N   Aspirion Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: CoFlex TLC Zinc Standard [90,92], CoFlex TLC Calamine Standard [90,92], CoFlex TLC Zinc Lite [90,93]			
<b>CoFlex TLC Calamine Standard:</b> opatrunek 10x550 cm - 1 szt.	WM	100%	116,53
		Limit	116,53
		30% <sup>(1)</sup>	34,96
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Emplastrum polyurethanum spumatum</b>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 619883			
(1) Przewlekłe owrzodzenia   Kat. ciąży: N   Aspirion Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: CoFlex TLC Zinc Standard [116,53], CoFlex TLC Calamine Standard [116,53], CoFlex TLC Zinc Lite [116,54]			
<b>CoFlex TLC Zinc Lite:</b> opatrunek 7,62x550 cm - 1 szt.	WM	100%	90,93
		Limit	88,80
		30% <sup>(1)</sup>	28,77
		S <sup>(2)</sup>	2,13
INN: <b>Emplastrum polyurethanum spumatum</b>   ATC: V20   wyk: EAN ~ 611856			
(1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N   Andover Healthcare			
Odpowiedniki: CoFlex TLC Calamine Standard [90,92], CoFlex TLC Zinc Standard [90,92], CoFlex TLC Zinc Lite [90,93]			
<b>CoFlex TLC Zinc Lite:</b> opatrunek 10x550 cm - 1 szt.	WM	100%	116,54
		Limit	116,54
		30% <sup>(1)</sup>	34,96
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Emplastrum polyurethanum spumatum</b>   ATC: V20   wyk: EAN ~ 611870			
(1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N   Andover Healthcare			
Odpowiedniki: CoFlex TLC Calamine Standard [116,53], CoFlex TLC Zinc Standard [116,53], CoFlex TLC Zinc Lite [116,54]			
<b>CoFlex TLC Zinc Standard:</b> opatrunek 7,62x550 cm - 1 szt.	WM	100%	90,92
		Limit	88,80
		30% <sup>(1)</sup>	28,76
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Emplastrum polyurethanum spumatum</b>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 619876			
(1) Przewlekłe owrzodzenia   Kat. ciąży: N   Aspirion Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: CoFlex TLC Calamine Standard [90,92], CoFlex TLC Zinc Standard [90,92], CoFlex TLC Zinc Lite [90,93]			
<b>CoFlex TLC Zinc Standard:</b> opatrunek 10x550 cm - 1 szt.	WM	100%	116,53
		Limit	116,53
		30% <sup>(1)</sup>	34,96
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Emplastrum polyurethanum spumatum</b>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 619890			
(1) Przewlekłe owrzodzenia   Kat. ciąży: N   Aspirion Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: CoFlex TLC Calamine Standard [116,53], CoFlex TLC Zinc Standard [116,53], CoFlex TLC Zinc Lite [116,54]			
<b>Cogiton® 5:</b> tabl. powł. 5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	25,68
		Limit	18,79
		30% <sup>(1)</sup>	12,53
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Donepezil hydrochloride</b>   ATC: N06DA02   wyk: B   EAN ~ 024314			
(1) Choroba Alzheimera WP: Otepienie z ciałami Lewy'ego; otepienie w przebiegu choroby Parkinsona (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Biofarm Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Apo-Doperil [X], Donecetil [X], Donepestan [X], Donepezil Polfarmex [X], Memorin [18,46], Pamigen [19,76], Donepezil Bluefish [19,83], Doneprion [20,33], Donecept [20,64], Donesyn [20,82], Donepex [22,17], Yasnal® [25,41], Cogiton® 5 [25,68]			
<b>Cogiton® 10:</b> tabl. powł. 10 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	43,87
		Limit	37,57
		30% <sup>(1)</sup>	17,57
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Donepezil hydrochloride</b>   ATC: N06DA02   wyk: B   EAN ~ 024413			
(1) Choroba Alzheimera WP: Otepienie z ciałami Lewy'ego; otepienie w przebiegu choroby Parkinsona (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Biofarm Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Apo-Doperil [X], Donepestan [X], Donepezil Polfarmex [X], Donepezil Bluefish [32,71], Memorin [34,02], Doneprion [35,27], Donecetil [37,35], Donecept - (IR) [37,52], Pamigen [37,54], Donepex [37,57], Donesyn [38,15], Donecept [38,95], Yasnal® [39,29], Cogiton® 10 [43,87]			
<b>Cogiton® 10:</b> tabl. powł. 10 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	72,84
		Limit	72,84
		30% <sup>(1)</sup>	21,85
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Donepezil hydrochloride</b>   ATC: N06DA02   wyk: B   EAN ~ 024420			
(1) Choroba Alzheimera WP: Otepienie z ciałami Lewy'ego; otepienie w przebiegu choroby Parkinsona (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Biofarm Sp. z o.o.			



<b>Cogiton® 10:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 84 szt. ◆	Rx	100%	<b>106,54</b>
		Limit	<b>106,54</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>31,96</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Donepezil hydrochloride** | ATC: **N06DA02** | wyk: **B** | EAN ~ **215380**  
 (1) Choroba Alzheimera **WP:** Ołpienie z ciałami Lewy'ego; ołpienie w przebiegu choroby Parkinsona  
 (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Biofarm Sp. z o.o.

<b>Colistin TZF:</b> inj. [liof.] <b>1 000 000 j.m.</b> - 20 fiol.	Rx	100%	<b>401,12</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>2,72</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Colistimethate sodium** | ATC: **J01XB01** | wyk: **B** | EAN ~ **366514**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Mukowiscydoza **WP:** Pierwotna dyskineza rzęsek; Zakażenia dolnych dróg oddechowych - leczenie wspomagające w skojarzeniu z antybiotykoterapią dożylną u osób po przeszczepie płuc w przebiegu chorób innych niż mukowiscydoza (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA

<b>Combigan®:</b> krople do oczu [roztw.] ( <b>2 mg+ 5 mg/ml</b> ) - 1 but. 5 ml	Rx	100%	<b>31,63</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>8,34</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Brimonidine tartate + Timolol** | ATC: **S01ED51** | wyk: **A** | EAN ~ **570546**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**  
 Allergan Sp. o.o.

<b>Combodiab:</b> tabl. powł. <b>50/1000 mg</b> - 56 szt.	Rx	100%	<b>39,85</b>
		Limit	<b>29,23</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>19,39</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Sitagliptin + Metformin hydrochloride** | ATC: **A10BD07** | wyk: **B** | EAN ~ **266227**  
 (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą; cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c  $\geq 7\%$  (przez co najmniej 3 miesiące) (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
 Bioton S.A.  
 Odpowiedniki: Symetlip [30,73], Metsigletic [30,75], Maymetsi [38,76], **Combodiab** [39,85], Eprocliv [43,94], Jami-si® [46,80]

<b>Comboterol:</b> aerozol inhal. [zaw.] <b>125/25 µg/dawkę</b> - 1 poj. (120 dawek)	Rx	100%	<b>96,94</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		C <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(3)</sup>	<b>21,82</b>
S <sup>(4)</sup>	<b>bezpł.</b>		

INN: **Fluticasone propionate + Salmeterol** | ATC: **R03AK06** | wyk: **A** | EAN ~ **534670**  
 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

<b>Comboterol:</b> aerozol inhal. [zaw.] <b>250/25 µg/dawkę</b> - 1 poj. (120 dawek)	Rx	100%	<b>115,46</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		C <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(3)</sup>	<b>24,67</b>
S <sup>(4)</sup>	<b>bezpł.</b>		

INN: **Fluticasone propionate + Salmeterol** | ATC: **R03AK06** | wyk: **A** | EAN ~ **534687**  
 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

● <b>Concerta®:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu <b>18 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx-w	100%	<b>47,99</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Methylphenidate hydrochloride** | ATC: **N06BA04** | wyk: **B** | EAN ~ **655021**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia | Kat. ciąży: **C**  
 Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

● <b>Concerta®:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu <b>36 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx-w	100%	<b>86,24</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,84</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Methylphenidate hydrochloride** | ATC: **N06BA04** | wyk: **B** | EAN ~ **655038**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia | Kat. ciąży: **C**  
 Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

<b>Contix:</b> tabl. dojelitowe <b>20 mg</b> - 14 szt. ◆	Rx	100%	<b>5,20</b>
		Limit	<b>3,11</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>3,65</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Pantoprazole** | ATC: **A02BC02** | wyk: **B** | EAN ~ **128814**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP:** Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

<b>Contix:</b> tabl. dojelitowe <b>20 mg</b> - 112 szt. ◆	Rx	100%	<b>24,75</b>
		Limit	<b>24,75</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>12,38</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Pantoprazole** | ATC: **A02BC02** | wyk: **B** | EAN ~ **246525**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP:** Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

<b>Contix:</b> tabl. dojelitowe <b>40 mg</b> - 14 szt. ◆	Rx	100%	<b>9,36</b>
		Limit	<b>6,22</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>6,25</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Pantoprazole** | ATC: **A02BC02** | wyk: **B** | EAN ~ **128418**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP:** Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

<b>Contix:</b> tabl. dojelitowe <b>40 mg</b> - 112 szt. ◆	Rx	100%	<b>46,27</b>
		Limit	<b>46,27</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>23,14</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Pantoprazole** | ATC: **A02BC02** | wyk: **B** | EAN ~ **246532**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP:** Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

<b>Contour Plus:</b> test paskowy - 50 szt.	WM	100%	<b>39,09</b>
		Limit	<b>39,09</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>11,73</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Glukoza we krwi** | ATC: **V07AD** | wyk: **N** | EAN ~ **763403**  
 (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | Kat. ciąży: **N**  
 Bayer Diabetes Care

Odpowiedniki: DIAVUE ToGo [35,43], OKmeter Core [35,43], Wellion SymPhar [36,63], G-BIO [37,55], Multisure GK [37,66], Everchek [37,77], Examedin® Fast [38,12], GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A [38,23], Cera-Chek 1 Code [38,33], VivaChek Ino [38,33], VivaChek Ino [38,33], One Touch Select Plus [38,35], GlucoCard 01 Sensor [38,66], Glucosense® [38,77], EverCare [38,80], GensuCare [38,80], Optium Xido [38,88], Contour TS [39,09], **Contour Plus** [39,09], iXell® [39,15], Abra [39,27], Accu-Chek® Performa [39,27], Diagnostic Gold Strip [39,49], Glucomaxx® [39,55]

<b>Contour TS:</b> test diagnostyczny do szybkich oznaczeń - 50 szt.	WM	100%	<b>39,09</b>
		Limit	<b>39,09</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>11,73</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Glukoza we krwi** | ATC: **V07AD** | wyk: **N** | EAN ~ **183904**  
 (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | Kat. ciąży: **N**  
 Bayer Diabetes Care

Odpowiedniki: DIAVUE ToGo [35,43], OKmeter Core [35,43], Wellion SymPhar [36,63], G-BIO [37,55], Multisure GK [37,66], Everchek [37,77], Examedin® Fast [38,12], GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A [38,23], Cera-Chek 1 Code [38,33], VivaChek Ino [38,33], VivaChek Ino [38,33], One Touch Select Plus [38,35], GlucoCard 01 Sensor [38,66], Glucosense® [38,77], EverCare [38,80], GensuCare [38,80], Optium Xido [38,88], Contour Plus [39,09], **Contour TS** [39,09], iXell® [39,15], Abra [39,27], Accu-Chek® Performa [39,27], Diagnostic Gold Strip [39,49], Glucomaxx® [39,55]

<b>Contrahist:</b> roztw. doust. <b>0,5 mg/ml</b> - 1 but. 200 ml	Rx	100%	<b>24,44</b>
		Limit	<b>22,78</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>7,64</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Levocetirizine dihydrochloride** | ATC: **R06AE09** | wyk: **B** | EAN ~ **904099**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP:** Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke'go - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
 Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Lirra [22,82], Xyzal® - (IR) [23,04], **Contrahist** [24,44], Xyzal® [26,00]



Skuteczny przepływ

pentoxifylline  
**polfilin**  
 prolongatum

400 mg x 20 tabl. ♥ 400 mg x 60 tabl.

<b>Contrahist:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	19,45	INN: <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>   ATC: R06AE09   wyk: B   EAN ~ 904129 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke'o - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Adamed Sp. z o.o. Odpowiedniki: Lirra [14,06], Nossin [14,09], Zenaro [15,56], Cezera [18,58], Zyx® [19,10], Contrahist [19,45], Xyza® [31,87]	100%	26,25	<b>ConvaMax Superabsorber:</b> opatrunek nieprzylepny <b>10x20 cm</b> - 1 szt. INN: <i>Emplastrum microfibrificum cellulosae</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 106362 (1) Przewlekłe owrzodzenia   Kat. ciąży: N ConvaTec Polska Sp. z o.o.
		Limit	12,56		Limit	23,70	
		30% <sup>(1)</sup>	9,59		30% <sup>(1)</sup>	9,66	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
<b>Contrahist:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 56 szt.	Rx	100%	27,38	INN: <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>   ATC: R06AE09   wyk: B   EAN ~ 000726 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke'o - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Adamed Sp. z o.o. Odpowiedniki: Lirra [26,86], Contrahist [27,38], Zyx® [34,18]	100%	29,11	<b>ConvaMax Superabsorber:</b> opatrunek nieprzylepny <b>15x15 cm</b> - 1 szt. INN: <i>Emplastrum microfibrificum cellulosae</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 106331 (1) Przewlekłe owrzodzenia   Kat. ciąży: N ConvaTec Polska Sp. z o.o.
		Limit	25,12		Limit	26,66	
		30% <sup>(1)</sup>	8,82		30% <sup>(1)</sup>	10,45	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
<b>Contrahist:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 84 szt.	Rx	100%	39,53	INN: <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>   ATC: R06AE09   wyk: B   EAN ~ 000733 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke'o - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Adamed Sp. z o.o. Odpowiedniki: Lirra [38,68], Contrahist [27,38], Zyx® [34,18]	100%	49,17	<b>ConvaMax Superabsorber:</b> opatrunek nieprzylepny <b>20x20 cm</b> - 1 szt. INN: <i>Emplastrum microfibrificum cellulosae</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 106485 (1) Przewlekłe owrzodzenia   Kat. ciąży: N ConvaTec Polska Sp. z o.o.
		Limit	37,67		Limit	47,39	
		30% <sup>(1)</sup>	11,84		30% <sup>(1)</sup>	16,00	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
<b>Contrahist:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 84 szt.	Rx	100%	5,35	INN: <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>   ATC: R06AE09   wyk: B   EAN ~ 000733 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke'o - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Adamed Sp. z o.o. Odpowiedniki: Lirra [38,68], Zyx® [39,42], Contrahist [39,53]	100%	93,00	<b>ConvaMax Superabsorber:</b> opatrunek nieprzylepny <b>20x40 cm</b> - 1 szt. INN: <i>Emplastrum microfibrificum cellulosae</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 106546 (1) Przewlekłe owrzodzenia   Kat. ciąży: N ConvaTec Polska Sp. z o.o.
		Limit	3,11		Limit	93,00	
		50% <sup>(1)</sup>	3,80		30% <sup>(1)</sup>	27,90	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
<b>Controloc® 20:</b> tabl. dojelitowe <b>20 mg</b> - 14 szt. ♦	Rx	100%	5,35	INN: <i>Pantoprazole</i>   ATC: A02BC02   wyk: B   EAN ~ 478767 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 rż.(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Takeda Pharma Sp. z o.o. Odpowiedniki: Contix [5,20], Controloc® 20 [5,35]	100%	13,72	<b>ConvaMax Superabsorber:</b> opatrunek przylepny <b>10x10 cm</b> - 1 szt. INN: <i>Emplastrum microfibrificum cellulosae</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 106607 (1) Przewlekłe owrzodzenia   Kat. ciąży: N ConvaTec Polska Sp. z o.o.
		Limit	3,11		Limit	13,03	
		50% <sup>(1)</sup>	3,80		30% <sup>(1)</sup>	4,60	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
<b>Controloc® 20:</b> tabl. dojelitowe <b>20 mg</b> - 28 szt. ♦	Rx	100%	9,80	INN: <i>Pantoprazole</i>   ATC: A02BC02   wyk: B   EAN ~ 478774 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 rż.(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Takeda Pharma Sp. z o.o. Odpowiedniki: Pamył 20 mg [6,32], Pantoprazole Genoptim [6,80], Ozzion [6,91], Pantoprazole Bluefish [7,13], Panrazol [7,23], Gerdin 20 mg [7,36], Panprazox [8,05], Noacid [8,37], Ranloc [9,02], Nolpaza® 20 mg tabletki dojelitowe [9,07], Controloc® 20 [9,80], Panzol [10,03], IPP 20 [10,14], Contix [10,48], Anesteloc® 20 [11,29]	100%	49,03	<b>ConvaMax Superabsorber:</b> opatrunek przylepny <b>15x15 cm</b> - 1 szt. INN: <i>Emplastrum microfibrificum cellulosae</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 106690 (1) Przewlekłe owrzodzenia   Kat. ciąży: N ConvaTec Polska Sp. z o.o.
		Limit	6,22		Limit	49,03	
		50% <sup>(1)</sup>	6,69		30% <sup>(1)</sup>	14,71	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
<b>Controloc® 20:</b> tabl. dojelitowe <b>20 mg</b> - 28 szt. ♦	Rx	100%	9,09	INN: <i>Pantoprazole</i>   ATC: A02BC02   wyk: B   EAN ~ 478774 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 rż.(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Takeda Pharma Sp. z o.o. Odpowiedniki: Pamył 20 mg [6,32], Pantoprazole Genoptim [6,80], Ozzion [6,91], Pantoprazole Bluefish [7,13], Panrazol [7,23], Gerdin 20 mg [7,36], Panprazox [8,05], Noacid [8,37], Ranloc [9,02], Nolpaza® 20 mg tabletki dojelitowe [9,07], Controloc® 20 [9,80], Panzol [10,03], IPP 20 [10,14], Contix [10,48], Anesteloc® 20 [11,29]	100%	34,82	<b>▼ Convival Chrono:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>500 mg</b> - 50 szt. (poj. polietylenowy) ♦
		Limit	6,22		Limit	34,82	
		50% <sup>(1)</sup>	5,98		B <sup>(1)</sup>	bezpł.	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	3,20	
<b>Controloc® 40:</b> tabl. dojelitowe <b>40 mg</b> - 14 szt. ♦	Rx	100%	9,09	INN: <i>Valproic acid</i>   ATC: N03AG01   wyk: B   EAN ~ 093016 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.	100%	10,56	<b>▼ Convulex®:</b> syrop <b>50 mg/ml</b> - 1 but. 100 ml ♦
		Limit	6,22		Limit	0,00	
		50% <sup>(1)</sup>	5,98		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	9,19	
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
<b>Controloc® 40:</b> tabl. dojelitowe <b>40 mg</b> - 14 szt. ♦	Rx	100%	17,52	INN: <i>Valproic acid</i>   ATC: N03AG01   wyk: B   EAN ~ 023912 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.	100%	15,17	<b>▼ Convulex® 150:</b> kaps. miękkie <b>150 mg</b> - 100 szt. ♦
		Limit	12,43		Limit	13,72	
		50% <sup>(1)</sup>	11,31		B <sup>(1)</sup>	1,45	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	4,65	
<b>Controloc® 40:</b> tabl. dojelitowe <b>40 mg</b> - 28 szt. ♦	Rx	100%	17,52	INN: <i>Valproic acid</i>   ATC: N03AG01   wyk: B   EAN ~ 244317 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.	100%	15,17	<b>▼ Convulex® 150:</b> kaps. miękkie <b>150 mg</b> - 100 szt. ♦
		Limit	12,43		Limit	13,72	
		50% <sup>(1)</sup>	11,31		B <sup>(1)</sup>	1,45	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	4,65	
<b>Controloc® 40:</b> tabl. dojelitowe <b>40 mg</b> - 28 szt. ♦	Rx	100%	17,52	INN: <i>Valproic acid</i>   ATC: N03AG01   wyk: B   EAN ~ 244317 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.	100%	15,17	<b>▼ Convulex® 150:</b> kaps. miękkie <b>150 mg</b> - 100 szt. ♦
		Limit	12,43		Limit	13,72	
		50% <sup>(1)</sup>	11,31		B <sup>(1)</sup>	1,45	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	4,65	

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

<p>▼Convulex® 300: kaps. miękkie 300 mg - 100 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Valproic acid</i> ATC: N03AG01 wyk: B EAN ~ 244416 (1)Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(4)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>28,86</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>27,44</td></tr> <tr><td>B<sup>(1)</sup></td><td>1,42</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>4,62</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	28,86	Limit	27,44	B <sup>(1)</sup>	1,42	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	4,62	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<p>Corectin 10: tabl. powł. 10 mg - 60 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Bisoprolol fumarate</i> ATC: C07AB07 wyk: B EAN ~ 066529 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 r.ż.(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Biofarm Sp. z o.o. Odpowiedniki: Corectin 10 [20,79], Coronal 10® [21,69], Bicardef [23,83], Sobycor [25,72]</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>20,79</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>6,40</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	20,79	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	6,40	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	28,86																								
Limit	27,44																								
B <sup>(1)</sup>	1,42																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	4,62																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
100%	20,79																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	6,40																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
<p>▼Convulex® 500: kaps. miękkie 500 mg - 100 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Valproic acid</i> ATC: N03AG01 wyk: B EAN ~ 023813 (1)Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(4)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>45,74</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>45,74</td></tr> <tr><td>B<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>3,56</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	45,74	Limit	45,74	B <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	3,56	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<p>Coronal 5®: tabl. powł. 5 mg - 30 szt.</p> <p>INN: <i>Bisoprolol fumarate</i> ATC: C07AB07 wyk: B EAN ~ 633791 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 r.ż.(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Zentiva PL Sp. z o.o. Odpowiedniki: Corectin 5 [X], Corsib [5,96], Bisoprolol VP [5,97], Coronal 5® [6,56], Sobycor [7,16], Bisoratio 5 [7,21], Bicardef [7,39]</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>6,56</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,26</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	6,56	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,26	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	45,74																								
Limit	45,74																								
B <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	3,56																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
100%	6,56																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	3,26																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
<p>Co-Prenessa®: tabl. 4/1,25 mg - 30 szt. (1 blister)</p> <p>INN: <i>Perindopril erbumine + Indapamide</i> ATC: C09BA04 wyk: B EAN ~ 746569 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>15,89</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>5,58</td></tr> <tr><td>R<sup>(1)</sup></td><td>13,51</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	15,89	Limit	5,58	R <sup>(1)</sup>	13,51	S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p>Coronal 5®: tabl. powł. 5 mg - 60 szt.</p> <p>INN: <i>Bisoprolol fumarate</i> ATC: C07AB07 wyk: B EAN ~ 633807 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 r.ż.(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Zentiva PL Sp. z o.o. Odpowiedniki: Corectin 5 [11,11], Coronal 5® [11,54], Bicardef [12,54], Sobycor [13,46]</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>11,54</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	11,54	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.				
100%	15,89																								
Limit	5,58																								
R <sup>(1)</sup>	13,51																								
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
100%	11,54																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	3,20																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
<p>Co-Prenessa®: tabl. 8/2,5 mg - 30 szt.</p> <p>INN: <i>Perindopril erbumine + Indapamide</i> ATC: C09BA04 wyk: B EAN ~ 850167 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>26,17</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>11,17</td></tr> <tr><td>R<sup>(1)</sup></td><td>21,40</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	26,17	Limit	11,17	R <sup>(1)</sup>	21,40	S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p>Coronal 10®: tabl. powł. 10 mg - 30 szt.</p> <p>INN: <i>Bisoprolol fumarate</i> ATC: C07AB07 wyk: B EAN ~ 633852 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 r.ż.(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Zentiva PL Sp. z o.o. Odpowiedniki: Corectin 10 [X], Corsib [11,02], Bisoprolol VP [11,03], Coronal 10® [11,14], Bicardef [11,46], Bisoratio 10 [11,84], Sobycor [13,46]</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>11,14</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	11,14	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.				
100%	26,17																								
Limit	11,17																								
R <sup>(1)</sup>	21,40																								
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
100%	11,14																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	3,20																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
<p>Co-Prestarium®: tabl. 5/5 mg - 30 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Perindopril arginine + Amlodipine</i> ATC: C09BB04 wyk: B EAN ~ 669301 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Servier Polska Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>20,42</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>5,58</td></tr> <tr><td>R<sup>(1)</sup></td><td>18,04</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	20,42	Limit	5,58	R <sup>(1)</sup>	18,04	S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p>Coronal 10®: tabl. powł. 10 mg - 60 szt.</p> <p>INN: <i>Bisoprolol fumarate</i> ATC: C07AB07 wyk: B EAN ~ 633869 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 r.ż.(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Zentiva PL Sp. z o.o. Odpowiedniki: Corectin 10 [20,79], Coronal 10® [21,69], Bicardef [23,83], Sobycor [25,72]</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>21,69</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>6,40</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	21,69	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	6,40	S <sup>(3)</sup>	bezpł.				
100%	20,42																								
Limit	5,58																								
R <sup>(1)</sup>	18,04																								
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
100%	21,69																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	6,40																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
<p>Odpowiedniki: Aramlessa [12,29], Co-Prestarium® [20,42]</p> <p>Co-Prestarium®: tabl. 5/10 mg - 30 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Perindopril arginine + Amlodipine</i> ATC: C09BB04 wyk: B EAN ~ 669387 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Servier Polska Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>31,67</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>11,17</td></tr> <tr><td>R<sup>(1)</sup></td><td>26,90</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	31,67	Limit	11,17	R <sup>(1)</sup>	26,90	S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p>Coroswera: tabl. powł. 10/10 mg - 90 szt.</p> <p>INN: <i>Rosuvastatin + Ezetimibe</i> ATC: C10BA06 wyk: B EAN ~ 139760 (1)Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Krka Polska Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>65,80</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>42,69</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>35,92</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	65,80	Limit	42,69	30% <sup>(1)</sup>	35,92	S <sup>(2)</sup>	bezpł.						
100%	31,67																								
Limit	11,17																								
R <sup>(1)</sup>	26,90																								
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
100%	65,80																								
Limit	42,69																								
30% <sup>(1)</sup>	35,92																								
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
<p>Co-Prestarium®: tabl. 10/5 mg - 30 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Perindopril arginine + Amlodipine</i> ATC: C09BB04 wyk: B EAN ~ 669332 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Servier Polska Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>31,67</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>11,17</td></tr> <tr><td>R<sup>(1)</sup></td><td>26,90</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	31,67	Limit	11,17	R <sup>(1)</sup>	26,90	S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p>Coroswera: tabl. powł. 5/10 mg - 30 szt.</p> <p>INN: <i>Rosuvastatin + Ezetimibe</i> ATC: C10BA06 wyk: B EAN ~ 139745 (1)Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Krka Polska Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>23,85</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>14,23</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>13,89</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	23,85	Limit	14,23	30% <sup>(1)</sup>	13,89	S <sup>(2)</sup>	bezpł.						
100%	31,67																								
Limit	11,17																								
R <sup>(1)</sup>	26,90																								
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
100%	23,85																								
Limit	14,23																								
30% <sup>(1)</sup>	13,89																								
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
<p>Odpowiedniki: Aramlessa [24,23], Co-Prestarium® [31,67]</p> <p>Co-Prestarium®: tabl. 10/10 mg - 30 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Perindopril arginine + Amlodipine</i> ATC: C09BB04 wyk: B EAN ~ 669400 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Servier Polska Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>11,11</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	11,11	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p>Coroswera: tabl. powł. 5/10 mg - 90 szt.</p> <p>INN: <i>Rosuvastatin + Ezetimibe</i> ATC: C10BA06 wyk: B EAN ~ 139749 (1)Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Krka Polska Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>65,80</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>42,69</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>35,92</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	65,80	Limit	42,69	30% <sup>(1)</sup>	35,92	S <sup>(2)</sup>	bezpł.				
100%	11,11																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	3,20																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	65,80																								
Limit	42,69																								
30% <sup>(1)</sup>	35,92																								
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
<p>Odpowiedniki: Aramlessa [24,23], Co-Prestarium® [31,67]</p> <p>Corectin 5: tabl. powł. 5 mg - 60 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Bisoprolol fumarate</i> ATC: C07AB07 wyk: B EAN ~ 066420 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 r.ż.(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Biofarm Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>11,11</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	11,11	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p>Odpowiedniki: Corectin 5 [11,11], Coronal 5® [11,54], Bicardef [12,54], Sobycor [13,46]</p>													
100%	11,11																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	3,20																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								



# ZOLPIC

zolidem

Daj owcom odpocząć.




<p><b>Coroswera:</b> tabl. powł. 10/10 mg - 30 szt.</p> <p>INN: <i>Rosuvastatin + Ezetimibe</i>   ATC: C10BA06   wyk: B   EAN ~ 970705 (1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Odpowiedniki: Rozesta [23,74], Coroswera [24,19], Suvadrio Plus [24,46]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>24,19</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>14,23</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>14,23</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	24,19		Limit	14,23		30% <sup>(1)</sup>	14,23		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Cortiment MMX:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu 9 mg - 30 szt.</p> <p>INN: <i>Budesonide</i>   ATC: A07EA06   wyk: B   EAN ~ 205966 (1) Indukcja remisji u pacjentów z aktywnym mikroskopowym zapaleniem jelita grubego (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Indukcja remisji u dorosłych pacjentów z łagodną do umiarkowanej, aktywnej postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające WP: Postać jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi; indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywnej postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające; indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywnej postacią choroby Leśniowskiego-Crohna z zajęciem jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>407,01</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>407,01</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>122,10</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	407,01		Limit	407,01		30% <sup>(1)</sup>	122,10		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	3,20		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
Rx	100%	24,19																															
	Limit	14,23																															
	30% <sup>(1)</sup>	14,23																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	407,01																															
	Limit	407,01																															
	30% <sup>(1)</sup>	122,10																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	3,20																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
<p><b>Coroswera:</b> tabl. powł. 15/10 mg - 30 szt.</p> <p>INN: <i>Rosuvastatin + Ezetimibe</i>   ATC: C10BA06   wyk: B   EAN ~ 139762 (1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>23,85</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>14,23</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>13,89</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	23,85		Limit	14,23		30% <sup>(1)</sup>	13,89		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Cortineff:</b> tabl. 100 µg - 20 szt. (blister)</p> <p>INN: <i>Fludrocortisone acetate</i>   ATC: H02AA02   wyk: B   EAN ~ 400788 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Adamed Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>15,16</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>2,88</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	15,16		Limit	0,00		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	2,88		S <sup>(2)</sup>	bezpł.			
Rx	100%	23,85																															
	Limit	14,23																															
	30% <sup>(1)</sup>	13,89																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	15,16																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	2,88																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
<p><b>Coroswera:</b> tabl. powł. 15/10 mg - 90 szt.</p> <p>INN: <i>Rosuvastatin + Ezetimibe</i>   ATC: C10BA06   wyk: B   EAN ~ 139766 (1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>65,80</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>42,69</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>35,92</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	65,80		Limit	42,69		30% <sup>(1)</sup>	35,92		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Coryol®:</b> tabl. 3,125 mg - 30 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Carvedilol</i>   ATC: C07AG02   wyk: B   EAN ~ 216604 (1) Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV WP: Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Odpowiedniki: Coryol® [7,91], Carvetrend [8,37] Krka Polska Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>7,91</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>1,08</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>7,15</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	7,91		Limit	1,08		30% <sup>(1)</sup>	7,15		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(2)</sup>	bezpł.			
Rx	100%	65,80																															
	Limit	42,69																															
	30% <sup>(1)</sup>	35,92																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	7,91																															
	Limit	1,08																															
	30% <sup>(1)</sup>	7,15																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
<p><b>Coroswera:</b> tabl. powł. 20/10 mg - 30 szt.</p> <p>INN: <i>Rosuvastatin + Ezetimibe</i>   ATC: C10BA06   wyk: B   EAN ~ 970706 (1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>24,19</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>14,23</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>14,23</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	24,19		Limit	14,23		30% <sup>(1)</sup>	14,23		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Coryol®:</b> tabl. 6,25 mg - 30 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Carvedilol</i>   ATC: C07AG02   wyk: B   EAN ~ 216604 (1) Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV WP: Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Odpowiedniki: Dilatrend® [X], Carvedilol-ratiopharm® 6,25 [7,64], Hypoten® [7,66], Atram® 6,25 mg [7,67], Coryol® [8,06], Avedol [8,12], Carvetrend [8,12] Krka Polska Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>8,06</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>2,17</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>6,54</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	8,06		Limit	2,17		30% <sup>(1)</sup>	6,54		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(2)</sup>	bezpł.			
Rx	100%	24,19																															
	Limit	14,23																															
	30% <sup>(1)</sup>	14,23																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	8,06																															
	Limit	2,17																															
	30% <sup>(1)</sup>	6,54																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
<p><b>Coroswera:</b> tabl. powł. 20/10 mg - 90 szt.</p> <p>INN: <i>Rosuvastatin + Ezetimibe</i>   ATC: C10BA06   wyk: B   EAN ~ 139771 (1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>65,80</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>42,69</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>35,92</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	65,80		Limit	42,69		30% <sup>(1)</sup>	35,92		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Coryol®:</b> tabl. 12,5 mg - 30 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Carvedilol</i>   ATC: C07AG02   wyk: B   EAN ~ 216505 (1) Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV WP: Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Odpowiedniki: Dilatrend® [X], Carvedilol-ratiopharm® 12,5 [10,12], Hypoten® [10,53], Coryol® [10,74], Avedol [11,38], Carvetrend [11,39], Dilatrend® [24,19] Krka Polska Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>10,74</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>4,34</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>7,70</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	10,74		Limit	4,34		30% <sup>(1)</sup>	7,70		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(2)</sup>	bezpł.			
Rx	100%	65,80																															
	Limit	42,69																															
	30% <sup>(1)</sup>	35,92																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	10,74																															
	Limit	4,34																															
	30% <sup>(1)</sup>	7,70																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
<p><b>Coroswera:</b> tabl. powł. 40/10 mg - 30 szt.</p> <p>INN: <i>Rosuvastatin + Ezetimibe</i>   ATC: C10BA06   wyk: B   EAN ~ 139773 (1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>23,20</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>14,23</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>13,24</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	23,20		Limit	14,23		30% <sup>(1)</sup>	13,24		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Coryol®:</b> tabl. 25 mg - 30 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Carvedilol</i>   ATC: C07AG02   wyk: B   EAN ~ 216567 (1) Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV WP: Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Odpowiedniki: Dilatrend® [X], Atram® 25 mg [13,44], Carvedilol-ratiopharm® 25 [13,84], Coryol® [13,96], Hypoten® [14,26], Avedol [15,09], Carvetrend [15,10] Krka Polska Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>13,96</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>8,67</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>7,89</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	13,96		Limit	8,67		30% <sup>(1)</sup>	7,89		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(2)</sup>	bezpł.			
Rx	100%	23,20																															
	Limit	14,23																															
	30% <sup>(1)</sup>	13,24																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	13,96																															
	Limit	8,67																															
	30% <sup>(1)</sup>	7,89																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
<p><b>Coroswera:</b> tabl. powł. 40/10 mg - 90 szt.</p> <p>INN: <i>Rosuvastatin + Ezetimibe</i>   ATC: C10BA06   wyk: B   EAN ~ 139777 (1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>65,80</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>42,69</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>35,92</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	65,80		Limit	42,69		30% <sup>(1)</sup>	35,92		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Corsib:</b> tabl. 5 mg - 30 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Bisoprolol fumarate</i>   ATC: C07AB07   wyk: B   EAN ~ 149960 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 r. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D MedReg sro</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>5,96</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	5,96		Limit	0,00		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	3,20		S <sup>(2)</sup>	bezpł.			
Rx	100%	65,80																															
	Limit	42,69																															
	30% <sup>(1)</sup>	35,92																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	5,96																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	3,20																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
<p><b>Coroswera:</b> tabl. powł. 40/10 mg - 90 szt.</p> <p>INN: <i>Rosuvastatin + Ezetimibe</i>   ATC: C10BA06   wyk: B   EAN ~ 139777 (1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>65,80</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>42,69</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>35,92</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	65,80		Limit	42,69		30% <sup>(1)</sup>	35,92		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Corsib:</b> tabl. 10 mg - 30 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Bisoprolol fumarate</i>   ATC: C07AB07   wyk: B   EAN ~ 149950 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 r. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D MedReg sro</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>11,02</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	11,02		Limit	0,00		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	3,20		S <sup>(2)</sup>	bezpł.			
Rx	100%	65,80																															
	Limit	42,69																															
	30% <sup>(1)</sup>	35,92																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	11,02																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	3,20																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
<p><b>Coroswera:</b> tabl. powł. 10/10 mg - 30 szt.</p> <p>INN: <i>Rosuvastatin + Ezetimibe</i>   ATC: C10BA06   wyk: B   EAN ~ 970705 (1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>24,19</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>14,23</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>14,23</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	24,19		Limit	14,23		30% <sup>(1)</sup>	14,23		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Cosopt®:</b> krople do oczu [roztw.] (20 mg+ 5 mg/ml) - 1 but. 5 ml ◆</p> <p>INN: <i>Dorzolamide + Timolol</i>   ATC: S01ED51   wyk: B   EAN ~ 442423 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Saniten Oy SA Przedstawicielstwo w Polsce</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>32,35</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>9,06</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	32,35		Limit	0,00		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	9,06		S <sup>(2)</sup>	bezpł.			
Rx	100%	24,19																															
	Limit	14,23																															
	30% <sup>(1)</sup>	14,23																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	32,35																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	9,06																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
<p><b>Coroswera:</b> tabl. powł. 15/10 mg - 30 szt.</p> <p>INN: <i>Rosuvastatin + Ezetimibe</i>   ATC: C10BA06   wyk: B   EAN ~ 139762 (1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>23,85</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>14,23</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>13,89</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	23,85		Limit	14,23		30% <sup>(1)</sup>	13,89		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p>Odpowiedniki: Ofitidorix [26,39], Nodofree Combi [26,49], Nodom Combi [30,41], Rozacom [30,98], Cosopt® [32,35]</p>																			
Rx	100%	23,85																															
	Limit	14,23																															
	30% <sup>(1)</sup>	13,89																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															

<b>Co-Valsacor:</b> tabl. powł. 80/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100% <b>13,30</b> Limit <b>10,70</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,81</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Valsartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA03   wyk: B   EAN ~ 740192 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: AuroValsart HCT [9,75], Co-Valsacor [13,30], Co-Bespres [13,50], Vanatex® HCT [14,04], Co-Dipper [14,19]		
<b>Co-Valsacor:</b> tabl. powł. 160/25 mg - 28 szt.	Rx	100% <b>27,09</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>12,11</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Valsartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA03   wyk: B   EAN ~ 740277 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: AuroValsart HCT [18,18], Valtap HCT [18,30], Co-Bespres - (IR) [22,19], Tensart HCT [25,22], Co-Valsacor [27,09], Co-Dipper [27,40], Co-Bespres [27,46], Vanatex® HCT [28,20]		
<b>Co-Valsacor:</b> tabl. powł. 80/12,5 mg - 56 szt.	Rx	100% <b>25,63</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>10,65</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Valsartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA03   wyk: B   EAN ~ 740208 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Co-Dipper [23,68], Co-Valsacor [25,63]		
<b>Co-Valsacor:</b> tabl. powł. 160/25 mg - 56 szt.	Rx	100% <b>48,72</b> Limit <b>42,80</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>18,76</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Valsartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA03   wyk: B   EAN ~ 740284 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Co-Dipper [44,79], Co-Valsacor [48,72]		
<b>Co-Valsacor:</b> tabl. powł. 80/12,5 mg - 98 szt.	Rx	100% <b>43,05</b> Limit <b>37,45</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>16,84</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Valsartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA03   wyk: B   EAN ~ 740239 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.		
<b>Co-Valsacor:</b> tabl. powł. 160/25 mg - 98 szt.	Rx	100% <b>81,94</b> Limit <b>74,90</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>29,51</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Valsartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA03   wyk: B   EAN ~ 740291 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.		
<b>Co-Valsacor:</b> tabl. powł. 160/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100% <b>27,09</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>12,11</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Valsartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA03   wyk: B   EAN ~ 740246 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: AuroValsart HCT [18,18], Valtap HCT [18,18], Tensart HCT [25,22], Co-Valsacor [27,09], Co-Bespres [27,34], Co-Dipper [27,40], Vanatex® HCT [28,20]		
<b>Co-Valsacor:</b> tabl. powł. 320/25 mg - 28 szt.	Rx	100% <b>51,62</b> Limit <b>42,80</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>21,66</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Valsartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA03   wyk: B   EAN ~ 847501 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Co-Dipper [48,23], Co-Valsacor [51,62]		
<b>Co-Valsacor:</b> tabl. powł. 160/12,5 mg - 56 szt.	Rx	100% <b>48,72</b> Limit <b>42,80</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>18,76</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Valsartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA03   wyk: B   EAN ~ 740253 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Co-Dipper [41,02], Co-Valsacor [48,72]		

<b>Co-Valsacor:</b> tabl. powł. 320/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100% <b>51,62</b> Limit <b>42,80</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>21,66</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Valsartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA03   wyk: B   EAN ~ 847464 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Co-Dipper [48,23], Co-Valsacor [51,62]		
<b>Co-Valsacor:</b> tabl. powł. 160/12,5 mg - 98 szt.	Rx	100% <b>81,94</b> Limit <b>74,90</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>29,51</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Valsartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA03   wyk: B   EAN ~ 740260 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.		
<b>Cozaar®:</b> tabl. powł. 50 mg - 28 szt.	Rx	100% <b>14,61</b> Limit <b>10,70</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>7,12</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Losartan potassium</b>   ATC: C09CA01   wyk: B   EAN ~ 674411 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D MSD Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Losartan Genoptim [9,05], Lorista® [13,79], Losartic® [13,98], Cozaar® [14,61]		
<b>Cozaar®:</b> tabl. powł. 100 mg - 28 szt.	Rx	100% <b>28,26</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>13,28</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Losartan potassium</b>   ATC: C09CA01   wyk: B   EAN ~ 073428 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D MSD Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Lorista® [26,61], Cozaar® [28,26]		
<b>Crohnax:</b> czopki doodbytnicze 250 mg - 30 szt.	Rx	100% <b>29,90</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>11,93</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Mesalazine</b>   ATC: A07EC02   wyk: B   EAN ~ 074012 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Farmina Sp. z o.o. Odpowiedniki: Crohnax [29,90], Asamax 250 [45,93]		
<b>Crohnax:</b> czopki doodbytnicze 500 mg - 30 szt.	Rx	100% <b>49,40</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>10,26</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Mesalazine</b>   ATC: A07EC02   wyk: B   EAN ~ 109809 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Farmina Sp. z o.o. Odpowiedniki: Salaza [44,82], Crohnax [49,40], Asamax 500 [88,90], Salofalk® 500 [90,99]		
<b>Crohnax:</b> czopki doodbytnicze 1000 mg - 14 szt.	Rx	100% <b>48,87</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>12,55</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Mesalazine</b>   ATC: A07EC02   wyk: B   EAN ~ 910990 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Farmina Sp. z o.o.		
<b>Crohnax:</b> czopki doodbytnicze 1000 mg - 15 szt.	Rx	100% <b>44,97</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>5,83</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Mesalazine</b>   ATC: A07EC02   wyk: B   EAN ~ 110003 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Farmina Sp. z o.o.		





Naszym wyborem

enarenal  
enalaprilii maleas

<b>Crohnax:</b> czopki doodbytnicze <b>1000 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>86,84</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>11,01</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Mesalazine</i>   ATC: A07EC02   wyk: B   EAN ~ 911001 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Farmina Sp. z o.o.	<b>Cyclaid:</b> kaps. miękkie <b>50 mg</b> - 50 szt. ◆	Rx	100% <b>135,93</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Ciclosporin</i>   ATC: L04AD01   wyk: A   EAN ~ 787357 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; zespół Alporta z białkomoczem u dzieci do 18 r.; anemia aplastyczna u dzieci do 18 r.; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 r.; aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granulanych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kośćczyny, rogówki, tkanek lub komórek (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce
<b>Crohnax:</b> czopki doodbytnicze <b>1000 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>84,97</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,49</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Mesalazine</i>   ATC: A07EC02   wyk: B   EAN ~ 110027 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Farmina Sp. z o.o.	<b>Cyclaid:</b> kaps. miękkie <b>100 mg</b> - 50 szt. ◆	Rx	100% <b>271,44</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Ciclosporin</i>   ATC: L04AD01   wyk: A   EAN ~ 787463 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; zespół Alporta z białkomoczem u dzieci do 18 r.; anemia aplastyczna u dzieci do 18 r.; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 r.; aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granulanych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kośćczyny, rogówki, tkanek lub komórek (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce
<b>Crosuvo:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>8,73</b> Limit <b>7,87</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>3,22</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Rosuvastatin</i>   ATC: C10AA07   wyk: B   EAN ~ 021184 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Bausch Health	<b>Cyclogest:</b> globulki dopochwowe <b>400 mg</b> - 15 szt.	Rx	100% <b>69,46</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>7,11</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Progesterone</i>   ATC: G03DA04   wyk: B   EAN ~ 403252 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Profilaktyka i wspomaganie leczenia ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.
<b>Crosuvo:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>18,03</b> Limit <b>15,74</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>7,01</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Rosuvastatin</i>   ATC: C10AA07   wyk: B   EAN ~ 021337 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Bausch Health	<b>Cyclo-Progynova®:</b> tabl. powł. <b>2 mg + 0,5 mg</b> - 21 szt.	Rx	100% <b>10,05</b> Limit <b>10,05</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>3,02</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Estradiol + Norgestrel</i>   ATC: G03FB01   wyk: B   EAN ~ 304219 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Bayer Sp. z o.o.
<b>Crosuvo:</b> tabl. powł. <b>40 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>31,19</b> Limit <b>31,19</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>9,36</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Rosuvastatin</i>   ATC: C10AA07   wyk: B   EAN ~ 021375 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Bausch Health	<b>▼ Cyprodiol®:</b> tabl. powł. <b>2 mg + 0,035 mg</b> - 21 szt.	Rx	100% <b>10,77</b> Limit <b>7,60</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,45</b>	INN: <i>Ethinylestradiol + Cyproterone acetate</i>   ATC: G03HB01   wyk: B   EAN ~ 039486 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach   Kat. ciąży: X Sun-Farm Sp. z o.o.
<b>Cuprenil®:</b> tabl. powł. <b>250 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>80,91</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Penicillamine</i>   ATC: M01CC01   wyk: B   EAN ~ 126217 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba Wilsona (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	<b>Dailiport:</b> kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde <b>0,5 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx-z	100% <b>49,86</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Tacrolimus</i>   ATC: L04AD02   wyk: B   EAN ~ 103702 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kośćczyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sandoz GmbH
<b>Cusimolol® 0,5%:</b> krople do oczu <b>5 mg/ml</b> - 1 but. 5 ml ◆	Rx	100% <b>6,54</b> Limit <b>5,51</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>2,68</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Timolol</i>   ATC: S01ED01   wyk: B   EAN ~ 187713 (1) Jaskra (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Immedica Pharma AB	<b>Dailiport:</b> kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde <b>1 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx-z	100% <b>93,35</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Tacrolimus</i>   ATC: L04AD02   wyk: B   EAN ~ 103700 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kośćczyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sandoz GmbH
<b>Cyclaid:</b> kaps. miękkie <b>25 mg</b> - 50 szt. ◆	Rx	100% <b>68,57</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,80</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Ciclosporin</i>   ATC: L04AD01   wyk: A   EAN ~ 787289 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; zespół Alporta z białkomoczem u dzieci do 18 r.; anemia aplastyczna u dzieci do 18 r.; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 r.; aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granulanych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kośćczyny, rogówki, tkanek lub komórek (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce	<b>Dailiport:</b> kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde <b>1 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx-z	100% <b>93,35</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Tacrolimus</i>   ATC: L04AD02   wyk: B   EAN ~ 103700 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kośćczyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sandoz GmbH
<b>Cusimolol® 0,5%:</b> krople do oczu <b>5 mg/ml</b> - 1 but. 5 ml ◆	Rx	100% <b>6,54</b> Limit <b>5,51</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>2,68</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Timolol</i>   ATC: S01ED01   wyk: B   EAN ~ 187713 (1) Jaskra (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Immedica Pharma AB	<b>Dailiport:</b> kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde <b>1 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx-z	100% <b>93,35</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Tacrolimus</i>   ATC: L04AD02   wyk: B   EAN ~ 103700 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kośćczyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sandoz GmbH
<b>Cusimolol® 0,5%:</b> krople do oczu <b>5 mg/ml</b> - 1 but. 5 ml ◆	Rx	100% <b>6,54</b> Limit <b>5,51</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>2,68</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Timolol</i>   ATC: S01ED01   wyk: B   EAN ~ 187713 (1) Jaskra (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Immedica Pharma AB	<b>Dailiport:</b> kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde <b>1 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx-z	100% <b>93,35</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Tacrolimus</i>   ATC: L04AD02   wyk: B   EAN ~ 103700 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kośćczyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sandoz GmbH

**Loperamid WZF**  
Loperamidi hydrochloridum

Przerwij niekończące się wizyty

Nowe opakowanie:

2 mg x 15 tabl.

Dailiport: kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde 2 mg - 30 szt. ◆	Rx-z	100%	176,44
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Tacrolimus* | ATC: L04AD02 | wyk: B | EAN ~ 103704

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Sandoz GmbH

Dailiport: kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde 3 mg - 30 szt. ◆	Rx-z	100%	258,19
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Tacrolimus* | ATC: L04AD02 | wyk: B | EAN ~ 103703

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Sandoz GmbH

Odpowiedniki: Dailiport [258,19], Advagraf [344,67]

Dailiport: kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde 5 mg - 30 szt. ◆	Rx-z	100%	421,69
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Tacrolimus* | ATC: L04AD02 | wyk: B | EAN ~ 103701

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Sandoz GmbH

Odpowiedniki: Dailiport [421,69], Advagraf [570,70]

Daivobet®: maść (0,05 mg+ 0,5 mg)/g - 1 tuba 30 g	Rx	100%	61,07
		Limit	52,80
		DZ <sup>(1)</sup>	24,11
		R <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Betamethasone + Calcipotriol* | ATC: D05AX52 | wyk: B | EAN ~ 979738

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

LEO Pharma

Daivobet®: żel (0,05 mg+ 0,5 mg)/g - 1 but. 30 g	Rx	100%	67,19
		Limit	52,80
		30% <sup>(1)</sup>	30,23
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Betamethasone + Calcipotriol* | ATC: D05AX52 | wyk: B | EAN ~ 948376

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:D, T2:C, T3:C

LEO Pharma

Daivobet®: żel (0,05 mg+ 0,5 mg)/g - 1 but. 60 g	Rx	100%	128,71
		Limit	105,60
		30% <sup>(1)</sup>	54,79
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Betamethasone + Calcipotriol* | ATC: D05AX52 | wyk: B | EAN ~ 948383

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:D, T2:C, T3:C

LEO Pharma

Dalacin® C: kaps. 75 mg - 16 szt.	Rx	100%	9,16
		Limit	5,18
		50% <sup>(1)</sup>	6,57
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Clindamycin* | ATC: J01FF01 | wyk: B | EAN ~ 071111

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Dalacin® C: kaps. 150 mg - 16 szt.	Rx	100%	11,30
		Limit	10,35
		50% <sup>(1)</sup>	6,13
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Clindamycin* | ATC: J01FF01 | wyk: B | EAN ~ 071210

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Dalacin® C: kaps. 300 mg - 16 szt.	Rx	100%	21,48
		Limit	20,70
		50% <sup>(1)</sup>	11,13
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Clindamycin* | ATC: J01FF01 | wyk: B | EAN ~ 306435

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Klimicin® [19,11], Clindamycin-MIP 300 [21,48], Dalacin® C [21,48]

Dalfaz® SR 5: tabl. powl. o przedl. uwalnianiu 5 mg - 20 szt. ◆	Rx	100%	12,25
		Limit	8,54
		R <sup>(1)</sup>	6,91
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Alfuzosin* | ATC: G04CA01 | wyk: B | EAN ~ 812714

(1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: N

Sanofi Winthrop Industrie

Dalfaz® Uno: tabl. o przedl. uwalnianiu 10 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	31,87
		Limit	25,61
		R <sup>(1)</sup>	10,53
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Alfuzosin* | ATC: G04CA01 | wyk: B | EAN ~ 837816

(1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: N

Sanofi Winthrop Industrie

Danazol Polfarmex: tabl. 200 mg - 100 szt.	Rx	100%	236,44
		Limit	236,44
		R <sup>(1)</sup>	3,56
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Danazol* | ATC: G03XA01 | wyk: B | EAN ~ 925339

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Małopłytkowość autoimmunizacyjna oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Polfarmex S.A.

Daneb: tabl. 5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	14,21
		Limit	12,14
		R <sup>(1)</sup>	5,27
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Nebivolol* | ATC: C07AB12 | wyk: B | EAN ~ 750290

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D

S Lab Sp. z o.o.

Dasselta: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.	Rx	100%	15,70
		Limit	13,46
		30% <sup>(1)</sup>	6,28
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Desloratadine* | ATC: R06AX27 | wyk: B | EAN ~ 032838

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Krka Polska Sp. z o.o.

Dasselta: tabl. powl. 5 mg - 90 szt.	Rx	100%	43,32
		Limit	40,37
		30% <sup>(1)</sup>	15,06
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Desloratadine* | ATC: R06AX27 | wyk: B | EAN ~ 032852

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Krka Polska Sp. z o.o.

Daxanlo: kaps. twarde 110 mg - 30 szt.	Rx	100%	47,76
		Limit	47,76
		30% <sup>(1)</sup>	14,33
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Dabigatran etexilate* | ATC: B01AE07 | wyk: B | EAN ~ 976178

(1) Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płuca oraz prewencja nawrotów zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych (2) Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Daxanlo [47,76], Telexer [54,45], Pradaxa® [131,73]



ZAKODOWANY DO WALKI  
Z ZAKAŻENIEM

Daxanlo: kaps. twarde 110 mg - 60 szt.	Rx	100%	89,71
		Limit	89,71
		30% <sup>(1)</sup>	26,91
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Dabigatran etexilate* | ATC: B01AE07 | wyk: B | EAN ~ 976184  
 (1)Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płuca oraz prewencja nawrotów zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych(2)Żylna powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna(3)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Krka Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Pradaxa® [X], Daxanlo [89,71], Telexer [103,08]

Daxanlo: kaps. twarde 150 mg - 30 szt.	Rx	100%	63,18
		Limit	63,18
		30% <sup>(1)</sup>	18,95
		R <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Dabigatran etexilate* | ATC: B01AE07 | wyk: B | EAN ~ 976180  
 (1)Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płuca oraz prewencja nawrotów zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych(2)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Krka Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Daxanlo [63,18], Telexer [72,31], Pradaxa® [133,36]

Daxanlo: kaps. twarde 150 mg - 60 szt.	Rx	100%	118,93
		Limit	118,93
		30% <sup>(1)</sup>	35,68
		R <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Dabigatran etexilate* | ATC: B01AE07 | wyk: B | EAN ~ 976185  
 (1)Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płuca oraz prewencja nawrotów zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych(2)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Krka Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Daxanlo [118,93], Telexer [137,18], Pradaxa® [385,20]

Decaldol®: inj. dom. [roztw.] 50 mg/ml - 5 amp. 1 ml ◆	Rx	100%	42,47
		Limit	42,47
		30% <sup>(1)</sup>	11,47
		R <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Haloperidol decanoate* | ATC: N05AD01 | wyk: B | EAN ~ 077311  
 (1)Tylko we wskazaniach pozarejestacyjnych WP: Choroba Huntingtona(2)Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(3)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Polfa Warszawa SA

Defur: kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde 4 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	24,11
		Limit	16,47
		30% <sup>(1)</sup>	12,58
		R <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Tolterodine tartrate* | ATC: G04BD07 | wyk: B | EAN ~ 055271  
 (1)Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym(2)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Defur [24,11], Tolzurin [24,46], Titlodine [29,18]

Defur: kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde 4 mg - 90 szt. ◆	Rx	100%	73,63
		Limit	52,94
		30% <sup>(1)</sup>	36,57
		R <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Tolterodine tartrate* | ATC: G04BD07 | wyk: B | EAN ~ 139520  
 (1)Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym(2)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Delmuno 2,5: tabl. powl. 2,5/2,5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	13,69
		Limit	5,21
		R <sup>(1)</sup>	11,68
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril + Felodipine* | ATC: C09BB05 | wyk: B | EAN ~ 973118  
 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciskiwanie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Delmuno 5: tabl. powl. 5/5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	18,42
		Limit	10,43
		R <sup>(1)</sup>	13,96
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril + Felodipine* | ATC: C09BB05 | wyk: B | EAN ~ 973217  
 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciskiwanie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Delortan: roztw. doust. 0,5 mg/ml - 1 but. 120 ml	Rx	100%	13,67
		Limit	13,67
		30% <sup>(1)</sup>	4,10
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Desloratadine* | ATC: R06AX27 | wyk: B | EAN ~ 096936  
 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Polfa Warszawa SA

Delortan: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.	Rx	100%	14,14
		Limit	13,46
		30% <sup>(1)</sup>	4,72
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Desloratadine* | ATC: R06AX27 | wyk: B | EAN ~ 969654  
 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Polfa Warszawa SA  
 Odpowiedniki: Desloratadine Aurovitas [12,01], Delortan [14,14], Dynid [14,16], Deslodyna [15,48], Dasselita [15,70], Jovesto [21,39]

Delortan: tabl. powl. 5 mg - 90 szt.	Rx	100%	37,10
		Limit	37,10
		30% <sup>(1)</sup>	11,13
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Desloratadine* | ATC: R06AX27 | wyk: B | EAN ~ 969678  
 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Polfa Warszawa SA  
 Odpowiedniki: Desloratadine Aurovitas [32,63], Delortan [37,10], Jovesto - (IR) [37,15], Jovesto - (IR) [37,38], Jovesto [37,44], Dasselita [43,32]

Demezon: tabl. 1 mg - 40 szt. ◆	Rx	100%	31,98
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Dexamethasone* | ATC: H02AB02 | wyk: B | EAN ~ 138917  
 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające - w przypadkach innych niż określone w ChPL(3)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D | Sun-Farm Sp. z o.o.

Demezon: tabl. 4 mg - 20 szt. ◆	Rx	100%	59,94
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,69
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Dexamethasone* | ATC: H02AB02 | wyk: B | EAN ~ 138920  
 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające - w przypadkach innych niż określone w ChPL(3)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D | Sun-Farm Sp. z o.o.

Denofix: tabl. powl. 80 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	35,40
		Limit	20,20
		30% <sup>(1)</sup>	21,26
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Febuxostat* | ATC: M04AA03 | wyk: B | EAN ~ 139152  
 (1)Leczenie przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złogów moczanowych, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych(2)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Febuxostat Aurovitas [33,86], Prohinda [33,86], Febuxostat Krka [35,36], Denofix [35,40], Adenuric® [46,68]

Denofix: tabl. powl. 120 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	52,25
		Limit	30,31
		30% <sup>(1)</sup>	31,03
		50% <sup>(2)</sup>	37,10
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Febuxostat* | ATC: M04AA03 | wyk: B | EAN ~ 139160  
 (1)Leczenie przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złogów moczanowych, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych(2)Zapobieganie i leczenie przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych(3)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Febuxostat Aurovitas [49,94], Adenuric® [51,11], Febuxostat Krka [52,22], Denofix [52,25]

▼Depakine Chrono 500 - (IR): tabl. powl. o przedl. uwalnianiu 500 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	22,35
		Limit	22,35
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20

INN: *Valproate sodium + Valproic acid* | ATC: N03AG01 | wyk: B | EAN ~ 210328  
 (1)Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(4)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D | Delfarma Sp. z o.o.



Skuteczny przepływ

pentoxifylline  
**polfilin**  
 prolongatum

400 mg x 20 tabl. ♥ 400 mg x 60 tabl.

Depakine®: syrop 288,2 mg/5 ml - 1 but. 150 ml ◆	Rx	100% 16,19 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 11,48 S <sup>(4)</sup> bezpl.	Depesit Met: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 50/500 mg - 56 szt.	Rx	100% 60,08 Limit 29,23 30% <sup>(1)</sup> 35,66 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: Valproate sodium (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	ATC: N03AG01	wyk: B EAN ~ 307418	INN: Sitagliptin + Metformin hydrochloride	ATC: A10BD07	wyk: B EAN ~ 002998
Sanofi Winthrop Industrie			(1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c ≥ 7% (przez co najmniej 3 miesiące)(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Adamed Sp. z o.o.		
▼Depakine® Chrono 300: tabl. powł. o przedł. uwalnianiu 300 mg - 30 szt. ◆	Rx	100% 17,01 Limit 14,16 B <sup>(1)</sup> 2,85 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. R <sup>(3)</sup> 6,05 S <sup>(4)</sup> bezpl.	Depesit Met: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 50/1000 mg - 56 szt.	Rx	100% 60,08 Limit 29,23 30% <sup>(1)</sup> 35,66 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: Valproate sodium + Valproic acid (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	ATC: N03AG01	wyk: B EAN ~ 694327	INN: Sitagliptin + Metformin hydrochloride	ATC: A10BD07	wyk: B EAN ~ 003551
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.			(1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c ≥ 7% (przez co najmniej 3 miesiące)(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Adamed Sp. z o.o.		
▼Depakine® Chrono 500: tabl. powł. o przedł. uwalnianiu 500 mg - 30 szt. ◆	Rx	100% 23,60 Limit 23,60 B <sup>(1)</sup> bezpl. DZ <sup>(2)</sup> bezpl. R <sup>(3)</sup> 3,20 S <sup>(4)</sup> bezpl.	Depesit Met: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 100/1000 mg - 28 szt.	Rx	100% 60,08 Limit 29,23 30% <sup>(1)</sup> 35,66 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: Valproate sodium + Valproic acid (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	ATC: N03AG01	wyk: B EAN ~ 694426	INN: Sitagliptin + Metformin hydrochloride	ATC: A10BD07	wyk: B EAN ~ 004657
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.			(1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c ≥ 7% (przez co najmniej 3 miesiące)(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Adamed Sp. z o.o.		
Depakine® Chronosphere 100: granulaty o przedł. uwalnianiu 100 mg - 30 sasz. ◆	Rx	100% 8,17 Limit 4,72 B <sup>(1)</sup> 3,45 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. R <sup>(3)</sup> 6,65 S <sup>(4)</sup> bezpl.	Depo-Medrol®: inj. 40 mg/ml - 1 fiol. 1 ml	Rx	100% 15,23 Limit 15,23 50% <sup>(1)</sup> 7,62 C <sup>(2)</sup> bezpl. DZ <sup>(3)</sup> bezpl. S <sup>(4)</sup> bezpl.
INN: Valproate sodium + Valproic acid (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	ATC: N03AG01	wyk: B EAN ~ 425693	INN: Methylprednisolone acetate	ATC: H02AB04	wyk: B EAN ~ 154814
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.			(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Kobiety w ciąży(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Pfizer Polska Sp. z o.o.		
Depakine® Chronosphere 250: granulaty o przedł. uwalnianiu 250 mg - 30 sasz. ◆	Rx	100% 18,11 Limit 11,80 B <sup>(1)</sup> 6,31 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. R <sup>(3)</sup> 9,51 S <sup>(4)</sup> bezpl.	Depo-Medrol® z lidokainą: inj. [zaw.] (40 mg+ 10 mg/ml) - 1 fiol.+ 1% r. lidokainy ◆	Rx	100% 15,58 Limit 15,23 50% <sup>(1)</sup> 7,97 C <sup>(2)</sup> bezpl. DZ <sup>(3)</sup> bezpl. S <sup>(4)</sup> bezpl.
INN: Valproate sodium + Valproic acid (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	ATC: N03AG01	wyk: B EAN ~ 425709	INN: Lidocaine hydrochloride + Methylprednisolone acetate	ATC: H02AB04	wyk: B EAN ~ 236312
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.			(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Kobiety w ciąży(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Pfizer Polska Sp. z o.o.		
Depakine® Chronosphere 500: granulaty o przedł. uwalnianiu 500 mg - 30 sasz. ◆	Rx	100% 30,41 Limit 23,60 B <sup>(1)</sup> 6,81 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. R <sup>(3)</sup> 10,01 S <sup>(4)</sup> bezpl.	Depratal: tabl. dojelitowe 30 mg - 28 szt.	Rx	100% 21,20 Limit 14,56 30% <sup>(1)</sup> 11,01 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: Valproate sodium + Valproic acid (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	ATC: N03AG01	wyk: B EAN ~ 425730	INN: Duloxetine	ATC: N06AX21	wyk: EAN ~ 324551
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.			(1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10)(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Adamed Sp. z o.o.		
Depakine® Chronosphere 750: granulaty o przedł. uwalnianiu 750 mg - 30 sasz. ◆	Rx	100% 44,20 Limit 35,40 B <sup>(1)</sup> 8,80 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. R <sup>(3)</sup> 12,00 S <sup>(4)</sup> bezpl.	Odpowiedniki: AuroDulox [15,10], Duloxetine Zentiva [15,53], Dulxetenon [15,53], Dulofox [15,64], Duloxetine Mylan [15,98], Dulsevia [16,38], Dutilox [16,43], Depratal [21,20]		
INN: Valproate sodium + Valproic acid (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	ATC: N03AG01	wyk: B EAN ~ 425747	Depo-Medrol® z lidokainą: inj. [zaw.] (40 mg+ 10 mg/ml) - 1 fiol.+ 1% r. lidokainy ◆	Rx	100% 40,68 Limit 29,12 30% <sup>(1)</sup> 20,30 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.			INN: Duloxetine	ATC: N06AX21	wyk: EAN ~ 003185
			(1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10)(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Adamed Sp. z o.o.		
Depakine® Chronosphere 1000: granulaty o przedł. uwalnianiu 1000 mg - 30 sasz. ◆	Rx	100% 57,93 Limit 47,20 B <sup>(1)</sup> 10,73 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. R <sup>(3)</sup> 13,93 S <sup>(4)</sup> bezpl.	Depratal: tabl. dojelitowe 30 mg - 56 szt.	Rx	100% 40,68 Limit 29,12 30% <sup>(1)</sup> 20,30 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: Valproate sodium + Valproic acid (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	ATC: N03AG01	wyk: B EAN ~ 425754	INN: Duloxetine	ATC: N06AX21	wyk: EAN ~ 324537
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.			(1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10)(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Adamed Sp. z o.o.		
			Odpowiedniki: Dulsevia - (R) [28,40], AuroDulox [28,44], Duloxetine Zentiva [29,28], Dulxetenon [29,28], Dulofox [29,51], Duloxetine Mylan [30,20], Dulsevia [31,00], Dutilox [31,12], Depratal [40,68]		

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

Depratal: tabl. dojelitowe <b>60 mg</b> - 56 szt.	Rx	100%	77,64	Limit	58,24	30% <sup>(1)</sup>	36,87	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Duloxetine</i>	ATC: N06AX21	wyk: B	EAN ~ 003192	(1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C							
Odpowiedniki: Dulsevía - (IR) [52,97], Duloxetine Zentiva [53,66], Dulsevía [58,24], Dutilox [58,88], Depratal [77,64]											
Deprexolet®: tabl. powł. <b>10 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	9,81	Limit	9,81	30% <sup>(1)</sup>	2,65	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Mianserin</i>	ATC: N06AX03	wyk: B	EAN ~ 120948	(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C							
Odpowiedniki: Miansec [9,73], Miansegen [9,73], Deprexolet® [9,81], Lerivon® [10,39]											
Deprexolet®: tabl. powł. <b>10 mg</b> - 90 szt. ◆	Rx	100%	27,07	Limit	27,07	30% <sup>(1)</sup>	7,31	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Mianserin</i>	ATC: N06AX03	wyk: B	EAN ~ 120962	(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C							
Odpowiedniki: Miansegen [25,95], Miansec [26,76], Deprexolet® [27,07]											
Deprexolet®: tabl. powł. <b>30 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	29,22	Limit	29,22	30% <sup>(1)</sup>	7,89	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Mianserin</i>	ATC: N06AX03	wyk: B	EAN ~ 121051	(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C							
Odpowiedniki: Miansegen [26,80], Miansec 30 [27,62], Lerivon® [28,77], Deprexolet® [29,22]											
Deprexolet®: tabl. powł. <b>60 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	49,75	Limit	49,75	30% <sup>(1)</sup>	13,44	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Mianserin</i>	ATC: N06AX03	wyk: B	EAN ~ 137939	(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C							
Odpowiedniki: Miansegen [49,46], Deprexolet® [49,75]											
Dermovate®: roztw. na skórę <b>0,5 mg/ml</b> - 1 but. 50 ml	Rx	100%	22,24	Limit	16,66	50% <sup>(1)</sup>	13,91	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Clobetasol propionate</i>	ATC: D07AD01	wyk: B	EAN ~ 369928	(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C							
Odpowiedniki: Dermovate® - (IR) [18,20], Dermovate® - (IR) [18,21], Dermovate® [22,24]											
Dermovate® - (IR): roztw. na skórę <b>0,5 mg/ml</b> - 1 but. 50 ml	Rx	100%	18,21	Limit	16,66	50% <sup>(1)</sup>	9,88	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Clobetasol propionate</i>	ATC: D07AD01	wyk: B	EAN ~ 196497	(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C							
Odpowiedniki: Dermovate® - (IR) [18,20], Dermovate® - (IR) [18,21], Dermovate® [22,24]											
Dermovate® - (IR): roztw. na skórę <b>0,5 mg/ml</b> - 1 but. 50 ml	Rx	100%	18,20	Limit	16,66	50% <sup>(1)</sup>	9,87	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Clobetasol propionate</i>	ATC: D07AD01	wyk: B	EAN ~ 013800	(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C							
Odpowiedniki: Dermovate® - (IR) [18,20], Dermovate® - (IR) [18,21], Dermovate® [22,24]											
Deslodyna: roztw. doust. <b>0,5 mg/ml</b> - 1 but. 150 ml ◆	Rx	100%	18,39	Limit	17,09	30% <sup>(1)</sup>	6,43	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Desloratadine</i>	ATC: R06AX27	wyk: B	EAN ~ 964574	(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C							
Odpowiedniki: Jovesto [X], Dynid [16,79], Deslodyna [18,39], Hitaxa [20,46]											
Deslodyna: tabl. powł. <b>5 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	15,48	Limit	13,46	30% <sup>(1)</sup>	6,06	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Desloratadine</i>	ATC: R06AX27	wyk: B	EAN ~ 964611	(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C							
Odpowiedniki: Desloratadine Aurovitas [12,01], Delortan [14,14], Dynid [14,16], Deslodyna [15,48], Dasselta [15,70], Jovesto [21,39]											
Desloratadine Aurovitas: tabl. powł. <b>5 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	12,01	Limit	12,01	30% <sup>(1)</sup>	3,60	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Desloratadine</i>	ATC: R06AX27	wyk: B	EAN ~ 135945	(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C							
Odpowiedniki: Desloratadine Aurovitas [12,01], Delortan [14,14], Dynid [14,16], Deslodyna [15,48], Dasselta [15,70], Jovesto [21,39]											
Desloratadine Aurovitas: tabl. powł. <b>5 mg</b> - 60 szt.	Rx	100%	22,88	Limit	22,88	30% <sup>(1)</sup>	6,86	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Desloratadine</i>	ATC: R06AX27	wyk: B	EAN ~ 503542	(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C							
Odpowiedniki: Desloratadine Aurovitas [22,88], Dynid [25,31], Jovesto - (IR) [25,88], Jovesto - (IR) [26,05], Jovesto [26,91]											
Desloratadine Aurovitas: tabl. powł. <b>5 mg</b> - 90 szt.	Rx	100%	32,63	Limit	32,63	30% <sup>(1)</sup>	9,79	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Desloratadine</i>	ATC: R06AX27	wyk: B	EAN ~ 135947	(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C							
Odpowiedniki: Desloratadine Aurovitas [32,63], Delortan [37,10], Jovesto - (IR) [37,15], Jovesto - (IR) [37,38], Jovesto [37,44], Dasselta [43,32]											
Detriol: kaps. miękkie <b>0,25 µg</b> - 90 szt.	Rx	100%	50,68	Limit	47,95	30% <sup>(1)</sup>	17,12	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Calcitriol</i>	ATC: A11CC04	wyk: B	EAN ~ 442081	(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C							
Odpowiedniki: Sun-Farm Sp. z o.o.											
Detriol: kaps. miękkie <b>0,5 µg</b> - 90 szt.	Rx	100%	95,90	Limit	95,90	30% <sup>(1)</sup>	28,77	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Calcitriol</i>	ATC: A11CC04	wyk: B	EAN ~ 442082	(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C							
Odpowiedniki: Sun-Farm Sp. z o.o.											
Dexamethasone Krka: tabl. <b>4 mg</b> - 20 szt. ◆	Rx	100%	64,27	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	5,69	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Dexamethasone</i>	ATC: H02AB02	wyk: B	EAN ~ 297480	(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające - w przypadkach innych niż określone w ChPL; nowotwory złośliwe - premedykacja - w przypadkach innych niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C							
Odpowiedniki: Demezon [59,94], Dexamethasone Krka [64,27], Pabi-Dexamethason [64,28]											



# ZOLPIC

zolidem

Daj owcom odpocząć.



Dexamethasone Krka: tabl. 8 mg - 20 szt. ◆		Rx	100% 121,82 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 11,38 S <sup>(3)</sup> bezpl.	Diabrezide: tabl. 80 mg - 40 szt.		Rx	100% 11,19 Limit 6,55 R <sup>(1)</sup> 7,84 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Dexamethasone</i> ATC: H02AB02 wyk: EAN ~ 297633 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające - w przypadkach innych niż określone w ChPL: nowotwory złośliwe - premedykacja - w przypadkach innych niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.		Odpowiedniki: Dexamethasone Krka - (IR) [121,06], Dexamethasone Krka [121,82], Pabi-Dexamethason [121,84]		INN: <i>Gliclazide</i> ATC: A10BB09 wyk: B EAN ~ 359912 (1) Cukrzyca(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o.		Odpowiedniki: Gliclazide Zentiva [X], Clazicon [12,09], Diagen [12,09], Salson [12,36], Symazide MR [13,05], Gliclada® [15,50], Oziclide MR [15,62], Diaprel® MR [23,50]	
Dexamethasone Krka: tabl. 20 mg - 20 szt. (blister) ◆		Rx	100% 288,11 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 28,44 S <sup>(3)</sup> bezpl.	Diabufor XR: tabl. o przedl. uwalnianiu 500 mg - 60 szt.		Rx	100% 10,85 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 6,26 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Dexamethasone</i> ATC: H02AB02 wyk: EAN ~ 297763 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające - w przypadkach innych niż określone w ChPL: nowotwory złośliwe - premedykacja - w przypadkach innych niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.		Odpowiedniki: Ranmet XR [10,85], Diabufor XR [10,85], Zenofer SR [12,29], Etfom SR [12,68], Metcrean XR [12,89], Symformin XR [14,89], Avamina SR [17,25], Metformax® SR 500 [18,58], Glucophage® XR [18,87]		INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 145465 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B FARMAK Sp. z o.o.		Odpowiedniki: Ranmet XR [16,01], Diabufor XR [16,01], Zenofer SR [18,27], Etfom SR [18,84], Symformin XR [22,16], Metformax® SR 750 [22,57], Avamina SR [24,11], Glucophage® XR [28,12]	
Dexamethasone Krka: tabl. 40 mg - 20 szt. (blister) ◆		Rx	100% 559,97 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 56,89 S <sup>(3)</sup> bezpl.	Diabufor XR: tabl. o przedl. uwalnianiu 750 mg - 60 szt.		Rx	100% 16,01 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 7,53 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Dexamethasone</i> ATC: H02AB02 wyk: EAN ~ 297879 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające - w przypadkach innych niż określone w ChPL: nowotwory złośliwe - premedykacja - w przypadkach innych niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.		Odpowiedniki: Ranmet XR [16,01], Diabufor XR [16,01], Zenofer SR [18,27], Etfom SR [18,84], Symformin XR [22,16], Metformax® SR 750 [22,57], Avamina SR [24,11], Glucophage® XR [28,12]		INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 145470 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B FARMAK Sp. z o.o.		Odpowiedniki: Ranmet XR [21,05], Diabufor XR [21,05], Zenofer SR [24,04], Etfom SR [24,81], Metformax® SR 1000 [28,92], Symformin XR [29,21], Avamina SR [32,48], Glucophage® XR [37,21]	
Dexamethasone Krka - (IR): tabl. 8 mg - 20 szt. ◆		Rx	100% 121,06 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 11,38 S <sup>(3)</sup> bezpl.	Diabufor XR: tabl. o przedl. uwalnianiu 1000 mg - 60 szt.		Rx	100% 21,05 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 8,68 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Dexamethasone</i> ATC: H02AB02 wyk: EAN ~ 147260 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające - w przypadkach innych niż określone w ChPL: nowotwory złośliwe - premedykacja - w przypadkach innych niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Inpharm Sp. z o.o.		Odpowiedniki: Dexamethasone Krka - (IR) [121,06], Dexamethasone Krka [121,82], Pabi-Dexamethason [121,84]		INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 145472 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B FARMAK Sp. z o.o.		Odpowiedniki: Ranmet XR [21,05], Diabufor XR [21,05], Zenofer SR [24,04], Etfom SR [24,81], Metformax® SR 1000 [28,92], Symformin XR [29,21], Avamina SR [32,48], Glucophage® XR [37,21]	
Dexamethasone Krka - (IR): tabl. 20 mg - 20 szt. ◆		Rx	100% 285,68 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 28,44 S <sup>(3)</sup> bezpl.	▼ Diacomit: kaps. twarde 250 mg - 60 szt.		Rx-z	100% 747,56 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 12,07
INN: <i>Dexamethasone</i> ATC: H02AB02 wyk: EAN ~ 148472 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające - w przypadkach innych niż określone w ChPL: nowotwory złośliwe - premedykacja - w przypadkach innych niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Delfarma Sp. z o.o.		Odpowiedniki: Dexamethasone Krka - (IR) [285,68], Pabi-Dexamethason [288,13]		INN: <i>Stiripentol</i> ATC: N03AX16 wyk: EAN ~ 017232 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Terapia wspomagająca (w skojarzeniu z klobazamem i walproinianem) u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie klobazamem i walproinianem   Kat. ciąży: C Biocodex		Odpowiedniki: Ranmet XR [21,05], Diabufor XR [21,05], Zenofer SR [24,04], Etfom SR [24,81], Metformax® SR 1000 [28,92], Symformin XR [29,21], Avamina SR [32,48], Glucophage® XR [37,21]	
DHC Continus®: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 60 mg - 60 szt. ◆		Rx	100% 44,43 Limit 44,43 30% <sup>(1)</sup> 13,33 B <sup>(2)</sup> bezpl. DZ <sup>(3)</sup> bezpl. S <sup>(4)</sup> bezpl.	▼ Diacomit: kaps. twarde 500 mg - 60 szt.		Rx-z	100% 1477,37 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 3,20
INN: <i>Dihydrocodeine tartrate</i> ATC: N02AA08 wyk: B EAN ~ 217045 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Mundipharma Polska Sp. z o.o.		Odpowiedniki: Dexamethasone Krka - (IR) [285,68], Pabi-Dexamethason [288,13]		INN: <i>Stiripentol</i> ATC: N03AX16 wyk: EAN ~ 017263 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Terapia wspomagająca (w skojarzeniu z klobazamem i walproinianem) u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie klobazamem i walproinianem   Kat. ciąży: C Biocodex		Odpowiedniki: Ranmet XR [21,05], Diabufor XR [21,05], Zenofer SR [24,04], Etfom SR [24,81], Metformax® SR 1000 [28,92], Symformin XR [29,21], Avamina SR [32,48], Glucophage® XR [37,21]	
DHC Continus®: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 90 mg - 60 szt. ◆		Rx	100% 65,29 Limit 65,29 30% <sup>(1)</sup> 19,59 B <sup>(2)</sup> bezpl. DZ <sup>(3)</sup> bezpl. S <sup>(4)</sup> bezpl.	▼ Diacomit: prosz. do przyg. zaw. doust. 250 mg - 60 sasz.		Rx-z	100% 747,56 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 12,07
INN: <i>Dihydrocodeine tartrate</i> ATC: N02AA08 wyk: B EAN ~ 217069 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Mundipharma Polska Sp. z o.o.		Odpowiedniki: Dexamethasone Krka - (IR) [285,68], Pabi-Dexamethason [288,13]		INN: <i>Stiripentol</i> ATC: N03AX16 wyk: EAN ~ 017294 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Terapia wspomagająca (w skojarzeniu z klobazamem i walproinianem) u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie klobazamem i walproinianem   Kat. ciąży: C Biocodex		Odpowiedniki: Ranmet XR [21,05], Diabufor XR [21,05], Zenofer SR [24,04], Etfom SR [24,81], Metformax® SR 1000 [28,92], Symformin XR [29,21], Avamina SR [32,48], Glucophage® XR [37,21]	
DHC Continus®: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 60 mg - 30 szt.		Rx	100% 12,09 Limit 9,83 R <sup>(1)</sup> 5,46 S <sup>(2)</sup> bezpl.	Diagen: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 60 mg - 30 szt.		Rx	100% 12,09 Limit 9,83 R <sup>(1)</sup> 5,46 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Gliclazide</i> ATC: A10BB09 wyk: B EAN ~ 121602 (1) Cukrzyca(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Mylan Ireland Limited		Odpowiedniki: Gliclazide Zentiva [X], Clazicon [12,09], Diagen [12,09], Salson [12,36], Symazide MR [13,05], Gliclada® [15,50], Oziclide MR [15,62], Diaprel® MR [23,50]		INN: <i>Stiripentol</i> ATC: N03AX16 wyk: EAN ~ 017331 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Terapia wspomagająca (w skojarzeniu z klobazamem i walproinianem) u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie klobazamem i walproinianem   Kat. ciąży: C Biocodex		Odpowiedniki: Ranmet XR [21,05], Diabufor XR [21,05], Zenofer SR [24,04], Etfom SR [24,81], Metformax® SR 1000 [28,92], Symformin XR [29,21], Avamina SR [32,48], Glucophage® XR [37,21]	

<b>Diagnostic Gold Strip:</b> test diagnostyczny do szybkich oznaczeń - 50 szt.	WM	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup>	<b>39,49</b> <b>39,09</b> <b>12,13</b> <b>3,60</b>	<b>Diazidan®:</b> tabl. 80 mg - 60 szt.	Rx	100% Limit R <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	<b>16,94</b> <b>9,83</b> <b>10,31</b> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Glukoza we krwi</i>   ATC: V07AD   wyk: EAN ~ 862681 (1) Cukrzyca(2) Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej   Kat. ciąży: N   <b>Diagnosis Sp z o.o.</b>				INN: <i>Gliclazide</i>   ATC: A10BB09   wyk: B   EAN ~ 911127 (1) Cukrzyca(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   <b>Bausch Health</b>			
Odpowiedniki: DIAVUE ToGo [35,43], OKmeter Core [35,43], Wellion SymPhar [36,63], G-BIO [37,55], Multisure GK [37,66], Everchek [37,77], Examedin® Fast [38,12], GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A [38,23], Cera-Chek 1 Code [38,33], VivaChek Ino [38,33], VivaChek Ino [38,33], One Touch Select Plus [38,35], Glucocard 01 Sensor [38,66], Glucosense® [38,77], EverCare [38,80], GensuCare [38,80], Optium Xido [38,88], Contour Plus [39,09], Contour TS [39,09], iXell® [39,15], Abra [39,27], Accu-Chek® Performa [39,27], <b>Diagnostic Gold Strip [39,49]</b> , Glucomaxx® [39,55]				<b>Dibucell Active:</b> opatrunek biopolimerowy [jałowy] 10x10 cm - 1 szt.	WM	100% Limit 30% <sup>(1)</sup>	<b>26,38</b> <b>26,38</b> <b>7,91</b>
▼ <b>Diane-35:</b> tabl. powł. 2 mg+ 0,035 mg - 21 szt.	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup>	<b>11,53</b> <b>7,60</b> <b>6,21</b>	INN: <i>Dibutyrylochityna</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 556088 (1) Przewlekłe owrzodzenia   Kat. ciąży: N   <b>Celther Polska Sp. z o.o.</b>			
INN: <i>Ethinylestradiol + Cyproterone acetate</i>   ATC: G03HB01   wyk: B   EAN ~ 222216 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach   Kat. ciąży: X   <b>Bayer Sp. z o.o.</b>				<b>Diclac®:</b> inj. dom. [roztw.] 25 mg/ml (75 mg/3 ml) - 5 amp. 3 ml	Rx	100% Limit 50% <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	<b>8,80</b> <b>8,80</b> <b>4,40</b> <b>bezpł.</b>
Odpowiedniki: Cyprodol® [10,77], Syndi-35® [11,53], <b>Diane-35 [11,53]</b>				INN: <i>Diclofenac sodium</i>   ATC: M01AB05   wyk: B   EAN ~ 753017 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:B, T2:B, T3:D   <b>Sandoz GmbH</b>			
▼ <b>Diane-35:</b> tabl. powł. 2 mg+ 0,035 mg - 63 szt.	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup>	<b>33,12</b> <b>22,81</b> <b>17,15</b>	<b>Diclac®:</b> inj. dom. [roztw.] 25 mg/ml (75 mg/3 ml) - 10 amp. 3 ml	Rx	100% Limit 50% <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	<b>16,62</b> <b>16,62</b> <b>8,31</b> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Ethinylestradiol + Cyproterone acetate</i>   ATC: G03HB01   wyk: B   EAN ~ 222230 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach   Kat. ciąży: X   <b>Bayer Sp. z o.o.</b>				INN: <i>Diclofenac sodium</i>   ATC: M01AB05   wyk: B   EAN ~ 753024 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:B, T2:B, T3:D   <b>Sandoz GmbH</b>			
Odpowiedniki: Syndi-35® [33,12], <b>Diane-35 [33,12]</b>				<b>Dicloabak®:</b> krople do oczu [roztw.] 1 mg/ml - 1 but. 10 ml	Rx	100% Limit R <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	<b>21,39</b> <b>21,39</b> <b>3,20</b> <b>bezpł.</b>
<b>Diaprel® MR:</b> tabl. o zmodyf. uwalnianiu 30 mg - 60 szt.	Rx	100% Limit R <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	<b>24,95</b> <b>9,83</b> <b>18,32</b> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Diclofenac sodium</i>   ATC: S01BC03   wyk: B   EAN ~ 074044 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:B, T2:B, T3:D   <b>Thea Polska Sp. z o.o.</b>			
INN: <i>Gliclazide</i>   ATC: A10BB09   wyk: B   EAN ~ 443017 (1) Cukrzyca(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   <b>Servier Polska Sp. z o.o.</b>				<b>DicloDuo:</b> kaps. o zmod. uwalnianiu 75 mg - 30 szt.	Rx	100% Limit 50% <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	<b>15,37</b> <b>11,50</b> <b>9,62</b> <b>bezpł.</b>
Odpowiedniki: Symazide MR [X], Clazicon [12,09], Symazide MR 30 [12,20], Gliclada® [15,62], <b>Diaprel® MR [24,95]</b>				INN: <i>Diclofenac sodium</i>   ATC: M01AB05   wyk: B   EAN ~ 752010 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:B, T2:B, T3:D   <b>Bausch Health</b>			
<b>Diaril®:</b> tabl. 1 mg - 30 szt.	Rx	100% Limit R <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	<b>6,00</b> <b>4,91</b> <b>4,29</b> <b>bezpł.</b>	<b>Diemono:</b> tabl. powł. 2 mg - 28 szt.	Rx	100% Limit R <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup>	<b>42,11</b> <b>0,00</b> <b>bezpł.</b> <b>8,89</b>
INN: <i>Glimepiride</i>   ATC: A10BB12   wyk: B   EAN ~ 566082 (1) Cukrzyca(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   <b>Biofarm Sp. z o.o.</b>				INN: <i>Dienogest</i>   ATC: G03DB08   wyk: B   EAN ~ 140512 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Endometriozia   Kat. ciąży: X   <b>Sun-Farm Sp. z o.o.</b>			
Odpowiedniki: Glitoprel [X], Symglic® [4,89], GlimeHEXAL 1 [5,14], <b>Diaril® [6,00]</b> , Glibetic 1 mg [6,05], Amaryl® 1 [6,63]				Odpowiedniki: Diemono - (IR) [37,59], <b>Diemono - (IR) [37,65]</b> , Zafrilla [37,76], Aridya [38,45], Symdieno [39,59], Endovelle [39,82], Probella [42,10], <b>Diemono [42,11]</b> , Visanne® [62,37]			
<b>Diaril®:</b> tabl. 2 mg - 30 szt.	Rx	100% Limit R <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	<b>10,09</b> <b>9,83</b> <b>3,46</b> <b>bezpł.</b>	<b>Diemono - (IR):</b> tabl. powł. 2 mg - 28 szt.	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup>	<b>37,65</b> <b>0,00</b> <b>bezpł.</b> <b>4,43</b>
INN: <i>Glimepiride</i>   ATC: A10BB12   wyk: B   EAN ~ 566105 (1) Cukrzyca(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   <b>Biofarm Sp. z o.o.</b>				INN: <i>Dienogest</i>   ATC: G03DB08   wyk: B   EAN ~ 148727 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Endometriozia   Kat. ciąży: X   <b>Delfarma Sp. z o.o.</b>			
Odpowiedniki: Glimepiride Aurovitas [X], Glitoprel [X], Symglic® [9,02], GlimeHEXAL 2 [9,39], <b>Diaril® [10,09]</b> , Amaryl® 2 [11,23], Glibetic 2 mg [11,30]				Odpowiedniki: Diemono - (IR) [37,59], <b>Diemono - (IR) [37,65]</b> , Zafrilla [37,76], Aridya [38,45], Symdieno [39,59], Endovelle [39,82], Probella [42,10], <b>Diemono [42,11]</b> , Visanne® [62,37]			
<b>Diaril®:</b> tabl. 3 mg - 30 szt.	Rx	100% Limit R <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	<b>14,14</b> <b>14,14</b> <b>4,80</b> <b>bezpł.</b>	<b>Diemono - (IR):</b> tabl. powł. 2 mg - 28 szt.	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup>	<b>37,59</b> <b>0,00</b> <b>bezpł.</b> <b>4,37</b>
INN: <i>Glimepiride</i>   ATC: A10BB12   wyk: B   EAN ~ 566129 (1) Cukrzyca(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   <b>Biofarm Sp. z o.o.</b>				INN: <i>Dienogest</i>   ATC: G03DB08   wyk: B   EAN ~ 147334 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Endometriozia   Kat. ciąży: X   <b>Inpharm Sp. z o.o.</b>			
Odpowiedniki: Glimepiride Aurovitas [X], Glitoprel [X], Symglic® [12,32], GlimeHEXAL 3 [13,55], <b>Diaril® [14,14]</b> , Glibetic 3 mg [16,34], Amaryl® 3 [17,61]				Odpowiedniki: Diemono - (IR) [37,59], <b>Diemono - (IR) [37,65]</b> , Zafrilla [37,76], Aridya [38,45], Symdieno [39,59], Endovelle [39,82], Probella [42,10], <b>Diemono [42,11]</b> , Visanne® [62,37]			
<b>Diaril®:</b> tabl. 4 mg - 30 szt.	Rx	100% Limit R <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	<b>17,55</b> <b>17,55</b> <b>6,40</b> <b>bezpł.</b>	<b>Difadol® 0,1%:</b> krople do oczu 1 mg/ml - 1 but. 5 ml	Rx	100% Limit R <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	<b>12,23</b> <b>10,70</b> <b>4,73</b> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Glimepiride</i>   ATC: A10BB12   wyk: B   EAN ~ 566143 (1) Cukrzyca(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   <b>Biofarm Sp. z o.o.</b>				INN: <i>Diclofenac sodium</i>   ATC: S01BC03   wyk: B   EAN ~ 026516 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:B, T2:B, T3:D   <b>Pofa Warszawa SA</b>			
Odpowiedniki: Glimepiride Aurovitas [X], Glitoprel [X], Symglic® [16,46], GlimeHEXAL 4 [17,55], <b>Diaril® [17,55]</b> , Amaryl® 4 [17,60], Glibetic 4 mg [19,65]				Odpowiedniki: Naclfo® [11,21], <b>Difadol® 0,1% [12,23]</b>			
<b>DIAVUE ToGo:</b> test paskowy - 50 szt.	WM	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup>	<b>35,43</b> <b>35,43</b> <b>10,63</b> <b>3,20</b>				
INN: <i>Glukoza we krwi</i>   ATC: V07AD   wyk: EAN ~ 053035 (1) Cukrzyca(2) Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej   Kat. ciąży: N   <b>DIATHER</b>							
Odpowiedniki: OKmeter Core [35,43], <b>DIAVUE ToGo [35,43]</b> , Wellion SymPhar [36,63], G-BIO [37,55], Multisure GK [37,66], Everchek [37,77], Examedin® Fast [38,12], GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A [38,23], Cera-Chek 1 Code [38,33], VivaChek Ino [38,33], VivaChek Ino [38,33], One Touch Select Plus [38,35], Glucocard 01 Sensor [38,66], Glucosense® [38,77], EverCare [38,80], GensuCare [38,80], Optium Xido [38,88], Contour Plus [39,09], Contour TS [39,09], iXell® [39,15], Abra [39,27], Accu-Chek® Performa [39,27], <b>Diagnostic Gold Strip [39,49]</b> , Glucomaxx® [39,55]							



Naszym wyborem

**enarenal**  
 enalapryli maleas

<b>Dilzem® retard:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu <b>90 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100% <b>10,15</b> Limit <b>8,90</b> R <sup>(1)</sup> <b>4,45</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Diltiazem hydrochloride</i>   ATC: C08DB01   wyk: B   EAN ~ 213214 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Pfizer Polska Sp. z o.o.		
<b>Dilzem® retard 120:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu <b>120 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100% <b>11,87</b> Limit <b>11,87</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Diltiazem hydrochloride</i>   ATC: C08DB01   wyk: B   EAN ~ 482917 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Pfizer Polska Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Oxycardil® 120 [X], Dilzem® retard 120 [11,87]		
<b>Dilzem® retard 180:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu <b>180 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100% <b>17,13</b> Limit <b>17,13</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Diltiazem hydrochloride</i>   ATC: C08DB01   wyk: B   EAN ~ 483310 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Pfizer Polska Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Oxycardil® 180 [X], Dilzem® retard 180 [17,13]		
<b>Diovan®:</b> tabl. powł. <b>160 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>33,54</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>18,56</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Valsartan</i>   ATC: C09CA03   wyk: B   EAN ~ 929214 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Novartis Poland Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Apo-Valsart [X], AuroValsart [17,89], Valsartan Medical Valley [17,89], Valtap [18,18], Valzek [24,82], Tensart [25,22], Bespres [26,19], Avasart [26,77], Valsacor® 160 mg tabletki powlekane [27,09], Dipper-Mono [27,34], Vanatex® [27,34], Diovan® [33,54]		
<b>Diphereline® SR 3,75:</b> inj. dom. [llof. do przyg. zaw. o przedł. uwaln.] <b>3,75 mg</b> - 1 zest.	Rx	100% <b>285,06</b> Limit <b>285,06</b> B <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>129,59</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Triptorelin</i>   ATC: L02AE04   wyk: B   EAN ~ 486915 (1) Program lekowy: leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci (2) Rak prostaty WP: Obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X   Ipsen Poland Sp. z o.o.		
<b>Diphereline® SR 11,25 mg:</b> inj. dom. [llof. do przyg. zaw. o przedł. uwaln.] <b>11,25 mg</b> - 1 zest.	Rx	100% <b>619,99</b> Limit <b>565,55</b> R <sup>(1)</sup> <b>64,04</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Triptorelin</i>   ATC: L02AE04   wyk: B   EAN ~ 894413 (1) Rak prostaty WP: Obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X   Ipsen Poland Sp. z o.o.		
<b>Dipperam:</b> tabl. powł. <b>5/160 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>24,25</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>9,27</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Amlodipine + Valsartan</i>   ATC: C09DB01   wyk: B   EAN ~ 708257 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Sandoz GmbH		
Odpowiedniki: Avasart Plus [24,25], Dipperam [24,25]		
<b>Dipperam:</b> tabl. powł. <b>5/80 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>12,61</b> Limit <b>10,70</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,12</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Amlodipine + Valsartan</i>   ATC: C09DB01   wyk: B   EAN ~ 708226 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Sandoz GmbH		
Odpowiedniki: Avasart Plus [12,45], Dipperam [12,61]		
<b>Dipperam:</b> tabl. powł. <b>5/80 mg</b> - 56 szt. ◆	Rx	100% <b>23,68</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>8,70</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Amlodipine + Valsartan</i>   ATC: C09DB01   wyk: B   EAN ~ 670936 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Sandoz GmbH		

<b>Dipperam:</b> tabl. powł. <b>5/160 mg</b> - 56 szt. ◆	Rx	100% <b>44,79</b> Limit <b>42,80</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>14,83</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Amlodipine + Valsartan</i>   ATC: C09DB01   wyk: B   EAN ~ 670937 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Sandoz GmbH		
<b>Dipperam:</b> tabl. powł. <b>10/160 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>24,25</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>9,27</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Amlodipine + Valsartan</i>   ATC: C09DB01   wyk: B   EAN ~ 708288 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Sandoz GmbH		
Odpowiedniki: Avasart Plus [24,25], Dipperam [24,25]		
<b>Dipperam:</b> tabl. powł. <b>10/160 mg</b> - 56 szt. ◆	Rx	100% <b>44,79</b> Limit <b>42,80</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>14,83</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Amlodipine + Valsartan</i>   ATC: C09DB01   wyk: B   EAN ~ 670938 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Sandoz GmbH		
<b>Dipperam HCT:</b> tabl. powł. <b>5/160/12,5 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>21,40</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>6,42</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Amlodipine + Valsartan + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09DX01   wyk: B   EAN ~ 103333 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Sandoz GmbH		
Odpowiedniki: Dipperam HCT [21,40], Valtricom [26,47]		
<b>Dipperam HCT:</b> tabl. powł. <b>10/160/12,5 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>21,40</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>6,42</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Amlodipine + Valsartan + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09DX01   wyk: B   EAN ~ 670933 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:, T2:C, T3:C   Sandoz GmbH		
Odpowiedniki: Dipperam HCT [21,40], Valtricom [26,47]		
<b>Dipperam HCT:</b> tabl. powł. <b>10/160/25 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>21,40</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>6,42</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Amlodipine + Valsartan + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09DX01   wyk: B   EAN ~ 103334 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Sandoz GmbH		
Odpowiedniki: Dipperam HCT [21,40], Valtricom [26,47]		
<b>Dipper-Mono:</b> tabl. powł. <b>80 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>14,15</b> Limit <b>10,70</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>6,66</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Valsartan</i>   ATC: C09CA03   wyk: B   EAN ~ 830961 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Sandoz GmbH		
Odpowiedniki: Apo-Valsart [X], AuroValsart [9,61], Valsartan Medical Valley [9,61], Valtap [9,75], Valzek [12,89], Tensart [13,46], Bespres [13,58], Valsacor® 80 mg tabletki powlekane [14,02], Avasart [14,15], Vanatex® [14,15], Dipper-Mono [14,15], Diovan® [22,42]		
<b>Dipper-Mono:</b> tabl. powł. <b>80 mg</b> - 56 szt.	Rx	100% <b>22,01</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>7,03</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Valsartan</i>   ATC: C09CA03   wyk: B   EAN ~ 830985 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Sandoz GmbH		



<b>Dipper-Mono:</b> tabl. powł. 160 mg - 28 szt.	Rx	100%	27,34
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	12,36
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Valsartan</i>	ATC: C09CA03	wyk: B	EAN ~ 831067
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: Apo-Valsart [X], Auro-Valsart [17,89], Valsartan Medical Valley [17,89], Valtap [18,18], Valzek [24,82], Tensart [25,22], Bespres [26,19], Avasart [26,77], Valsacor® 160 mg tabletki powlekane [27,09], Vanatex® [27,34], Dipper-Mono [27,34], Diovan® [33,54]			
<b>Dipper-Mono:</b> tabl. powł. 160 mg - 56 szt.	Rx	100%	42,39
		Limit	42,39
		30% <sup>(1)</sup>	12,72
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Valsartan</i>	ATC: C09CA03	wyk: B	EAN ~ 831081
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Sandoz GmbH			
<b>Dipper-Mono:</b> tabl. powł. 320 mg - 28 szt.	Rx	100%	48,23
		Limit	42,80
		30% <sup>(1)</sup>	18,27
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Valsartan</i>	ATC: C09CA03	wyk: B	EAN ~ 831159
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: Valsacor® 320 mg tabletki powlekane - (IR) [33,23], Dipper-Mono [48,23], Valsacor® 320 mg tabletki powlekane [51,62]			
<b>Diprophos®:</b> inj. [zaw.] (6,43 mg+ 2,63 mg/ml) - 5 amp. 1 ml	Rx	100%	68,31
		Limit	68,31
		50% <sup>(1)</sup>	34,16
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Betamethasone dipropionate + Betamethasone sodium phosphate</i>	ATC: H02AB01	wyk: B	EAN ~ 121625
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
MSD Polska Sp. z o.o.			
<b>Dironorm:</b> tabl. 10/5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	15,89
		Limit	5,58
		R <sup>(1)</sup>	13,51
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lisinopril + Amlodipine</i>	ATC: C09BB03	wyk: B	EAN ~ 701803
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.			
<b>Dironorm:</b> tabl. 20/5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	22,74
		Limit	11,17
		R <sup>(1)</sup>	17,97
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lisinopril + Amlodipine</i>	ATC: C09BB03	wyk: B	EAN ~ 970520
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.			
<b>Dironorm:</b> tabl. 20/10 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	24,69
		Limit	11,17
		R <sup>(1)</sup>	19,92
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lisinopril + Amlodipine</i>	ATC: C09BB03	wyk: B	EAN ~ 761685
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.			
<b>Diuresin® SR:</b> tabl. powł. o przedl. uwalnianiu 1,5 mg - 30 szt.	Rx	100%	11,53
		Limit	9,18
		30% <sup>(1)</sup>	5,10
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Indapamide</i>	ATC: C03BA11	wyk: B	EAN ~ 975815
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Polfarmex S.A.			
Odpowiedniki: Ipres long 1,5 [X], Indapamide SR Genoptim [8,02], Sympamid SR [8,10], Rawel® SR [8,14], Index SR [8,30], Opamid [9,37], Indapen® SR [11,52], Diuresin® SR [11,53], Tertensif® SR [13,48]			
<b>Diuresin® SR:</b> tabl. powł. o przedl. uwalnianiu 1,5 mg - 60 szt.	Rx	100%	18,35
		Limit	18,35
		30% <sup>(1)</sup>	5,51
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Indapamide</i>	ATC: C03BA11	wyk: B	EAN ~ 276621
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Polfarmex S.A.			
Odpowiedniki: Rawel® SR [15,07], Diuresin® SR [18,35]			
<b>Divigel 0,1%:</b> żel 0,5 mg/0,5 g - 28 sasz. 0,5 g	Rx	100%	31,71
		Limit	11,70
		30% <sup>(1)</sup>	23,52
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Estradiol hemihydrate</i>	ATC: G03CA03	wyk: B	EAN ~ 447619
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Transseksualizm (F64.0) (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X			
Orion Pharma Poland Sp. o.o.			
<b>Divigel 0,1%:</b> żel 1 mg/g - 28 sasz. 1 g	Rx	100%	41,25
		Limit	23,39
		30% <sup>(1)</sup>	24,88
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Estradiol hemihydrate</i>	ATC: G03CA03	wyk: B	EAN ~ 447718
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Transseksualizm (F64.0) (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X			
Orion Pharma Poland Sp. o.o.			
<b>Divigel 0,1% - (IR):</b> żel 1 mg/g - 28 sasz.	Rx	100%	31,52
		Limit	23,39
		30% <sup>(1)</sup>	15,15
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Estradiol hemihydrate</i>	ATC: G03CA03	wyk: B	EAN ~ 144167
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Transseksualizm (F64.0) (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X			
Inharm Sp. z o.o.			
<b>Divina:</b> tabl. 2 mg+ 10 mg - 21 szt.	Rx	100%	14,59
		Limit	14,59
		30% <sup>(1)</sup>	4,38
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Estradiol + Medroxyprogesterone</i>	ATC: G03FB06	wyk: B	EAN ~ 661411
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X			
Orion Pharma Poland Sp. o.o.			
<b>Dnor:</b> tabl. 100 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	8,64
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Allopurinol</i>	ATC: M04AA01	wyk: B	EAN ~ 150861
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Orion Pharma Poland Sp. o.o.			
Odpowiedniki: Dnor [8,64], Argadopin [8,65], Allupol® [8,81], Milurit® [9,02]			
<b>Dnor:</b> tabl. 300 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	14,74
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Allopurinol</i>	ATC: M04AA01	wyk: B	EAN ~ 150865
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Orion Pharma Poland Sp. o.o.			
Odpowiedniki: Dnor [14,74], Argadopin [14,75], Allupol® [15,46], Milurit® [15,57]			
<b>Donecept:</b> tabl. powł. 5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	20,64
		Limit	18,79
		30% <sup>(1)</sup>	7,49
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Donepezil hydrochloride</i>	ATC: N06DA02	wyk: B	EAN ~ 689781
(1) Choroba Alzheimera WP: Otepienie z ciałami Lewy'ego; otepienie w przebiegu choroby Parkinsona (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Actavis Group PTC ehf.			
Odpowiedniki: Apo-Doperil [X], Donecil [X], Donepestan [X], Donepezil Polfarmex [X], Memorin [18,46], Pamigen [19,76], Donepezil Bluefish [19,83], Doneprion [20,33], Donecept [20,64], Donesyn [20,82], Donepex [22,17], Yasnal® [25,41], Cogiton® 5 [25,68]			
<b>Donecept:</b> tabl. powł. 10 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	38,95
		Limit	37,57
		30% <sup>(1)</sup>	12,65
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Donepezil hydrochloride</i>	ATC: N06DA02	wyk: B	EAN ~ 689873
(1) Choroba Alzheimera WP: Otepienie z ciałami Lewy'ego; otepienie w przebiegu choroby Parkinsona (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Actavis Group PTC ehf.			
Odpowiedniki: Apo-Doperil [X], Donepestan [X], Donepezil Polfarmex [X], Donepezil Bluefish [32,71], Memorin [34,02], Doneprion [35,27], Donecil [37,35], Donecept - (IR) [37,52], Pamigen [37,54], Donepex [37,57], Donesyn [38,15], Donecept [38,95], Yasnal® [39,29], Cogiton® 10 [43,87]			



ZAKODOWANY DO WALKI  
Z ZAKAŻENIEM

Donecept - (IR): tabl. powł. 10 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	37,52
		Limit	37,52
		30% <sup>(1)</sup>	11,26
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Donepezil hydrochloride** | ATC: N06DA02 | wyk: B | EAN ~ 146414  
 (1) Choroba Alzheimera WP: Ołepienie z ciałami Lewy'ego; ołepienie w przebiegu choroby Parkinsona  
 (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Apo-Doperil [X], Donepestan [X], Donepezil Polfarmex [X], Donepezil Bluefish [32,71], Memiorion [34,02], Doneprion [35,27], Donecetil [37,35], Donecept - (IR) [37,52], Pamigen [37,54], Donepex [37,57], Donesyn [38,15], Donecept [38,95], Yasnal® [39,29], Cogiton® 10 [43,87]

Donecetil: tabl. powł. 10 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	37,35
		Limit	37,35
		30% <sup>(1)</sup>	11,21
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Donepezil hydrochloride** | ATC: N06DA02 | wyk: B | EAN ~ 683666  
 (1) Choroba Alzheimera WP: Ołepienie z ciałami Lewy'ego; ołepienie w przebiegu choroby Parkinsona  
 (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Bausch Health

Odpowiedniki: Apo-Doperil [X], Donepestan [X], Donepezil Polfarmex [X], Donepezil Bluefish [32,71], Memiorion [34,02], Doneprion [35,27], Donecetil [37,35], Donecept - (IR) [37,52], Pamigen [37,54], Donepex [37,57], Donesyn [38,15], Donecept [38,95], Yasnal® [39,29], Cogiton® 10 [43,87]

Donecetil ODT: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	40,53
		Limit	40,25
		30% <sup>(1)</sup>	12,36
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Donepezil hydrochloride** | ATC: N06DA02 | wyk: B | EAN ~ 851492  
 (1) Choroba Alzheimera WP: Ołepienie z ciałami Lewy'ego; ołepienie w przebiegu choroby Parkinsona  
 (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Bausch Health

Odpowiedniki: Apo-Doperil [X], Donepestan [X], Donepezil Polfarmex [X], Donepezil Bluefish [32,71], Memiorion [34,02], Doneprion [35,27], Donecetil [37,35], Donecept - (IR) [37,52], Pamigen [37,54], Donepex [37,57], Donesyn [38,15], Donecept [38,95], Yasnal® [39,29], Cogiton® 10 [43,87]

Donepex: tabl. powł. 5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	22,17
		Limit	18,79
		30% <sup>(1)</sup>	9,02
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Donepezil hydrochloride** | ATC: N06DA02 | wyk: B | EAN ~ 055912  
 (1) Choroba Alzheimera WP: Ołepienie z ciałami Lewy'ego; ołepienie w przebiegu choroby Parkinsona  
 (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Celon Pharma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Apo-Doperil [X], Donecetil [X], Donepestan [X], Donepezil Polfarmex [X], Memiorion [18,46], Pamigen [19,76], Donepezil Bluefish [19,83], Doneprion [20,33], Donecept [20,64], Donesyn [20,82], Donepex [22,17], Yasnal® [25,41], Cogiton® 5 [25,68]

Donepex: tabl. powł. 10 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	37,57
		Limit	37,57
		30% <sup>(1)</sup>	11,27
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Donepezil hydrochloride** | ATC: N06DA02 | wyk: B | EAN ~ 056018  
 (1) Choroba Alzheimera WP: Ołepienie z ciałami Lewy'ego; ołepienie w przebiegu choroby Parkinsona  
 (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Celon Pharma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Apo-Doperil [X], Donepestan [X], Donepezil Polfarmex [X], Donepezil Bluefish [32,71], Memiorion [34,02], Doneprion [35,27], Donecetil [37,35], Donecept - (IR) [37,52], Pamigen [37,54], Donepex [37,57], Donesyn [38,15], Donecept [38,95], Yasnal® [39,29], Cogiton® 10 [43,87]

Donepezil Bluefish: tabl. powł. 5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	19,83
		Limit	18,79
		30% <sup>(1)</sup>	6,68
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Donepezil hydrochloride** | ATC: N06DA02 | wyk: B | EAN ~ 814077  
 (1) Choroba Alzheimera WP: Ołepienie z ciałami Lewy'ego; ołepienie w przebiegu choroby Parkinsona  
 (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Bluefish Pharmaceuticals

Odpowiedniki: Apo-Doperil [X], Donecetil [X], Donepestan [X], Donepezil Polfarmex [X], Memiorion [18,46], Pamigen [19,76], Donepezil Bluefish [19,83], Doneprion [20,33], Donecept [20,64], Donesyn [20,82], Donepex [22,17], Yasnal® [25,41], Cogiton® 5 [25,68]

Donepezil Bluefish: tabl. powł. 10 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	32,71
		Limit	32,71
		30% <sup>(1)</sup>	9,81
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Donepezil hydrochloride** | ATC: N06DA02 | wyk: B | EAN ~ 814138  
 (1) Choroba Alzheimera WP: Ołepienie z ciałami Lewy'ego; ołepienie w przebiegu choroby Parkinsona  
 (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Bluefish Pharmaceuticals

Odpowiedniki: Apo-Doperil [X], Donepestan [X], Donepezil Polfarmex [X], Donepezil Bluefish [32,71], Memiorion [34,02], Doneprion [35,27], Donecetil [37,35], Donecept - (IR) [37,52], Pamigen [37,54], Donepex [37,57], Donesyn [38,15], Donecept [38,95], Yasnal® [39,29], Cogiton® 10 [43,87]

Donesyn: tabl. powł. 5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	20,82
		Limit	18,79
		30% <sup>(1)</sup>	7,67
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Donepezil hydrochloride** | ATC: N06DA02 | wyk: B | EAN ~ 657353  
 (1) Choroba Alzheimera WP: Ołepienie z ciałami Lewy'ego; ołepienie w przebiegu choroby Parkinsona  
 (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Vipharm SA

Odpowiedniki: Apo-Doperil [X], Donecetil [X], Donepestan [X], Donepezil Polfarmex [X], Memiorion [18,46], Pamigen [19,76], Donepezil Bluefish [19,83], Doneprion [20,33], Donecept [20,64], Donesyn [20,82], Donepex [22,17], Yasnal® [25,41], Cogiton® 5 [25,68]

Donesyn: tabl. powł. 10 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	38,15
		Limit	37,57
		30% <sup>(1)</sup>	11,85
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Donepezil hydrochloride** | ATC: N06DA02 | wyk: B | EAN ~ 657360  
 (1) Choroba Alzheimera WP: Ołepienie z ciałami Lewy'ego; ołepienie w przebiegu choroby Parkinsona  
 (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Vipharm SA

Odpowiedniki: Apo-Doperil [X], Donepestan [X], Donepezil Polfarmex [X], Donepezil Bluefish [32,71], Memiorion [34,02], Doneprion [35,27], Donecetil [37,35], Donecept - (IR) [37,52], Pamigen [37,54], Donepex [37,57], Donesyn [38,15], Donecept [38,95], Yasnal® [39,29], Cogiton® 10 [43,87]

Doreta: tabl. powł. 37,5/325 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	15,63
		Limit	14,20
		30% <sup>(1)</sup>	5,69
		B <sup>(2)</sup>	1,43

INN: **Tramadol hydrochloride + Paracetamol** | ATC: N02AX52 | wyk: B | EAN ~ 735167  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Padolten [15,56], Doreta [15,63], Poltram® Combo [15,76], Tramapar [15,76]

Doreta: tabl. powł. 37,5/325 mg - 90 szt. ◆	Rx	100%	22,67
		Limit	21,30
		30% <sup>(1)</sup>	7,76
		B <sup>(2)</sup>	1,37

INN: **Tramadol hydrochloride + Paracetamol** | ATC: N02AX52 | wyk: B | EAN ~ 143923  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Padolten [22,67], Doreta [22,67], Poltram® Combo [22,96]

Doreta: tabl. powł. 75/650 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	29,63
		Limit	28,39
		30% <sup>(1)</sup>	9,76
		B <sup>(2)</sup>	1,24

INN: **Tramadol hydrochloride + Paracetamol** | ATC: N02AX52 | wyk: B | EAN ~ 936595  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Poltram® Combo Forte [29,48], Doreta [29,63]

Doreta: tabl. powł. 75/650 mg - 90 szt. ◆	Rx	100%	42,59
		Limit	42,59
		30% <sup>(1)</sup>	12,78
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Tramadol hydrochloride + Paracetamol** | ATC: N02AX52 | wyk: B | EAN ~ 143930  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Poltram® Combo Forte [42,55], Doreta [42,59]

Doxanorm®: tabl. 1 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	13,97
		Limit	4,80
		30% <sup>(1)</sup>	10,61
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Doxazosin** | ATC: C02CA04, G04CA | wyk: B | EAN ~ 854318  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 r.; nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 r.  
 (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przerost gruczołu krokowego (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Bausch Health

Odpowiedniki: Doxorion [7,14], Apo-Doxan 1 [12,75], Zoxon® 1 [12,77], Doxar [13,04], Doxanorm® [13,97]

Doxanorm®: tabl. 2 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	18,45
		Limit	9,61
		30% <sup>(1)</sup>	11,72
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Doxazosin** | ATC: C02CA04, G04CA | wyk: B | EAN ~ 854417  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 r.; nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 r.  
 (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przerost gruczołu krokowego (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Bausch Health

Odpowiedniki: Doxorion [X], Doxazosin Aurovitas [8,33], Adadox [9,01], Kamiren® [17,45], Doxonex® [17,60], Zoxon® 2 [17,61], Apo-Doxan 2 [17,73], Doxanorm® [18,45], Doxar [18,90]



Skuteczny przepływ

pentoxifyline  
**polfilin**  
 prolongatum

400 mg x 20 tabl. ♥ 400 mg x 60 tabl.

Doxanorm®: tabl. 4 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	24,61
		Limit	19,21
		30% <sup>(1)</sup>	11,16
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	8,60
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Doxazosin* ATC: C02CA04, G04CA wyk: B EAN ~ 854516  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przerost gruczołu krokowego (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Bausch Health

Odpowiedniki: Doxorion [X], Doxazosin Aurovitas [15,40], Adadox [16,82], Doxar [23,53], Dozox [23,96], Zoxon® 4 [23,97], Doxanorm® [24,61], Kamiren® [24,73], Apo-Doxan 4 [26,90], Doxonex® [27,12]

Doxar: tabl. 1 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	13,04
		Limit	4,80
		30% <sup>(1)</sup>	8,71
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	10,30
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Doxazosin* ATC: C02CA04, G04CA wyk: B EAN ~ 484911  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż.; nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przerost gruczołu krokowego (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Doxorion [7,14], Apo-Doxan 1 [12,75], Zoxon® 1 [12,77], Doxar [13,04], Doxanorm® [13,97]

Doxar: tabl. 2 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	18,90
		Limit	9,61
		30% <sup>(1)</sup>	10,95
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	11,24
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Doxazosin* ATC: C02CA04, G04CA wyk: B EAN ~ 485017  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż.; nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przerost gruczołu krokowego (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Doxorion [X], Doxazosin Aurovitas [8,33], Adadox [9,01], Kamiren® [17,45], Doxonex® [17,60], Zoxon® 2 [17,61], Apo-Doxan 2 [17,73], Doxanorm® [18,45], Doxar [18,90]

Doxar: tabl. 4 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	23,53
		Limit	19,21
		30% <sup>(1)</sup>	9,07
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	6,77
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Doxazosin* ATC: C02CA04, G04CA wyk: B EAN ~ 485116  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przerost gruczołu krokowego (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Doxorion [X], Doxazosin Aurovitas [15,40], Adadox [16,82], Doxar [23,53], Dozox [23,96], Zoxon® 4 [23,97], Doxanorm® [24,61], Kamiren® [24,73], Apo-Doxan 4 [26,90], Doxonex® [27,12]

Doxar: tabl. 4 mg - 120 szt. ◆	Rx	100%	71,74
		Limit	71,74
		30% <sup>(1)</sup>	19,37
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	11,52
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Doxazosin* ATC: C02CA04, G04CA wyk: B EAN ~ 660289  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przerost gruczołu krokowego (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Doxar XL: tabl. o przedł. uwalnianiu 4 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	23,84
		Limit	19,21
		30% <sup>(1)</sup>	10,39
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	7,83
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Doxazosin* ATC: C02CA04, G04CA wyk: B EAN ~ 790951  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przerost gruczołu krokowego (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Actavis Group PTC ehf.

Odpowiedniki: Doxazosin XR Genoptim [15,41], Doxar XL [23,84]

Doxar XL: tabl. o przedł. uwalnianiu 4 mg - 90 szt. ◆	Rx	100%	70,42
		Limit	57,63
		30% <sup>(1)</sup>	30,08
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	22,39
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Doxazosin* ATC: C02CA04, G04CA wyk: B EAN ~ 884582  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przerost gruczołu krokowego (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Actavis Group PTC ehf.

Doxazosin Aurovitas: tabl. 2 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	8,33
		Limit	8,33
		30% <sup>(1)</sup>	2,50
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Doxazosin* ATC: C02CA04 wyk: B EAN ~ 305291  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż.; nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przerost gruczołu krokowego (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Doxorion [X], Doxazosin Aurovitas [8,33], Adadox [9,01], Kamiren® [17,45], Doxonex® [17,60], Zoxon® 2 [17,61], Apo-Doxan 2 [17,73], Doxanorm® [18,45], Doxar [18,90]

Doxazosin Aurovitas: tabl. 4 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	15,40
		Limit	15,40
		30% <sup>(1)</sup>	4,62
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Doxazosin* ATC: C02CA04 wyk: B EAN ~ 305420  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przerost gruczołu krokowego (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Doxorion [X], Doxazosin Aurovitas [15,40], Adadox [16,82], Doxar [23,53], Dozox [23,96], Zoxon® 4 [23,97], Doxanorm® [24,61], Kamiren® [24,73], Apo-Doxan 4 [26,90], Doxonex® [27,12]

Doxazosin XR Genoptim : tabl. o przedł. uwalnianiu 4 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	15,41
		Limit	15,41
		30% <sup>(1)</sup>	4,62
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Doxazosin* ATC: C02CA04 wyk: B EAN ~ 006679  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przerost gruczołu krokowego (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Synoptis Pharma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Doxazosin XR Genoptim [15,41], Doxar XL [23,84]

Doxonex®: tabl. 2 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	17,60
		Limit	9,61
		30% <sup>(1)</sup>	10,87
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	11,19
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Doxazosin* ATC: C02CA04 wyk: B EAN ~ 114961  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż.; nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przerost gruczołu krokowego (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Doxorion [X], Doxazosin Aurovitas [8,33], Adadox [9,01], Kamiren® [17,45], Doxonex® [17,60], Zoxon® 2 [17,61], Apo-Doxan 2 [17,73], Doxanorm® [18,45], Doxar [18,90]

Doxonex®: tabl. 4 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	27,12
		Limit	19,21
		30% <sup>(1)</sup>	13,67
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	11,11
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Doxazosin* ATC: C02CA04 wyk: B EAN ~ 114971  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przerost gruczołu krokowego (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Doxorion [X], Doxazosin Aurovitas [15,40], Adadox [16,82], Doxar [23,53], Dozox [23,96], Zoxon® 4 [23,97], Doxanorm® [24,61], Kamiren® [24,73], Apo-Doxan 4 [26,90], Doxonex® [27,12]

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

Doxycyclinum Polfarmex: kaps. twarde 100 mg - 10 szt. ◆	Rx	100%	10,85
		Limit	10,85
		50% <sup>(1)</sup>	5,43
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Doxycycline hyclate* ATC: J01AA02 wyk: B EAN ~ 330576  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D Polfarmex S.A.

Odpowiedniki: Doxycyclinum Polfarmex [10,85], Doxycyclinum TZF [13,27]

Doxycyclinum TZF: kaps. 100 mg - 10 szt. ◆	Rx	100%	13,27
		Limit	10,85
		50% <sup>(1)</sup>	7,07
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Doxycycline hyclate* ATC: J01AA02 wyk: B EAN ~ 072316  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA

Odpowiedniki: Doxycyclinum Polfarmex [10,85], Doxycyclinum TZF [13,27]

Dozox: tabl. 4 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	23,96
		Limit	19,21
		30% <sup>(1)</sup>	10,51
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	7,95
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Doxazosin* ATC: C02CA04, G04CA wyk: B EAN ~ 140005  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przerost gruczołu krokowego (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C +pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Doxorion [X], Doxazosin Aurovitas [15,40], Adadox [16,82], Doxar [23,53], Dozox [23,96], Zoxon® 4 [23,97], Doxanorm® [24,61], Kamiren® [24,73], Apo-Doxan 4 [26,90], Daxonex® [27,12]

Dozox: tabl. 4 mg - 90 szt. ◆	Rx	100%	66,76
		Limit	57,63
		30% <sup>(1)</sup>	26,42
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	18,73
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Doxazosin* ATC: C02CA04, G04CA wyk: B EAN ~ 140012  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przerost gruczołu krokowego (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C +pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Adadox [45,36], Dozox [66,76], Zoxon® 4 [68,02]

Driptane®: tabl. 5 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	21,88
		Limit	17,55
		30% <sup>(1)</sup>	9,60
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Oxybutynin* ATC: G04BD04 wyk: B EAN ~ 783816  
(1) Stwardnienie rozsiane (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B Mylan Healthcare Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Oxybutyninum Aflorim [17,55], Driptane® [21,88]

Duexon: aerozol inhal. [zaw.] 25/125 µg/dawkę - 1 poj. (120 dawek)	Rx	100%	87,85
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	12,73
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Fluticasone propionate + Salmeterol* ATC: R03AK06 wyk: A EAN ~ 100476  
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Astma (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Adamed Sp. z o.o.

Duexon: aerozol inhal. [zaw.] 25/250 µg/dawkę - 1 poj. (120 dawek)	Rx	100%	104,52
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	13,73
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Fluticasone propionate + Salmeterol* ATC: R03AK06 wyk: A EAN ~ 100477  
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Astma, Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Adamed Sp. z o.o.

Duexon: aerozol inhal. [zaw.] 25/50 µg/dawkę - 1 poj. (120 dawek)	Rx	100%	71,93
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Fluticasone propionate + Salmeterol* ATC: R03AK06 wyk: A EAN ~ 100478  
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Astma, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Adamed Sp. z o.o.

Duexon Pro: prosz. do inhal. 100/50 µg/dawkę - 1 inhal. (60 dawek)	Rx	100%	71,85
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Fluticasone propionate + Salmeterol* ATC: R03AK06 wyk: A EAN ~ 100473  
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Astma (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Duexon Pro [71,85], Asaris [71,96]

Duexon Pro: prosz. do inhal. 250/50 µg/dawkę - 1 inhal. (60 dawek)	Rx	100%	87,41
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	12,29
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Fluticasone propionate + Salmeterol* ATC: R03AK06 wyk: A EAN ~ 100474  
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Astma (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Duexon Pro [87,41], Salfumix Easyhaler [89,01], Asaris [90,16]

Duexon Pro: prosz. do inhal. 500/50 µg/dawkę - 1 inhal. (60 dawek)	Rx	100%	103,97
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	13,18
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Fluticasone propionate + Salmeterol* ATC: R03AK06 wyk: A EAN ~ 100475  
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Astma (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Duexon Pro [103,97], Asaris [106,83], Salfumix Easyhaler [106,83]

Dulofor: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	15,64
		Limit	14,56
		30% <sup>(1)</sup>	5,45
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	13,18
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Duloxetine* ATC: N06AX21 wyk: B EAN ~ 141977  
(1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: AuroDulox [15,10], Duloxetine Zentiva [15,53], Dulxetenon [15,53], Dulofor [15,64], Duloxetine Mylan [15,98], Dulsevia [16,38], Dutilox [16,43], Depratal [21,20]

Dulofor: kaps. dojelitowe, twarde 60 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	29,51
		Limit	29,12
		30% <sup>(1)</sup>	9,13
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Duloxetine* ATC: N06AX21 wyk: B EAN ~ 141981  
(1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Dulsevia - (IR) [28,40], AuroDulox [28,44], Duloxetine Zentiva [29,28], Dulxetenon [29,28], Dulofor [29,51], Duloxetine Mylan [30,20], Dulsevia [31,00], Dutilox [31,12], Depratal [40,68]

Duloxetine +pharma: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	16,07
		Limit	15,60
		30% <sup>(1)</sup>	5,15
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Duloxetine* ATC: N06AX21 wyk: B EAN ~ 014029  
(1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C +Pharma Arzneimittel GmbH

Duloxetine +pharma: kaps. dojelitowe, twarde 60 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	30,22
		Limit	30,22
		30% <sup>(1)</sup>	9,07
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Duloxetine* ATC: N06AX21 wyk: B EAN ~ 014021  
(1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C +Pharma Arzneimittel GmbH



# ZOLPIC

Daj owcom odpocząć.  
zolidem



Duloxetine Mylan: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg - 28 szt. ◆		Rx	100% 15,98 Limit 14,56 30% <sup>(1)</sup> 5,79 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.		
INN: Duloxetine (1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		ATC: N06AX21	wyk: B	EAN ~ 771064	
Odpowiedniki: AuroDulox [15,10], Duloxetine Zentiva [15,53], Dulxetenon [15,53], Dulofor [15,64], Duloxetine Mylan [15,98], Dulsevnia [16,38], Dutilox [16,43], Depratal [21,20]					
Duloxetine Mylan: kaps. dojelitowe, twarde 60 mg - 28 szt. ◆		Rx	100% 30,20 Limit 29,12 30% <sup>(1)</sup> 9,82 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.		
INN: Duloxetine (1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		ATC: N06AX21	wyk: B	EAN ~ 771066	
Odpowiedniki: Dulsevnia - (IR) [28,40], AuroDulox [28,44], Duloxetine Zentiva [29,28], Dulxetenon [29,28], Dulofor [29,51], Duloxetine Mylan [30,20], Dulsevnia [31,00], Dutilox [31,12], Depratal [40,68]					
Duloxetine Zentiva: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg - 28 szt. ◆		Rx	100% 15,53 Limit 14,56 30% <sup>(1)</sup> 5,34 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.		
INN: Duloxetine (1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		ATC: N06AX21	wyk: B	EAN ~ 231040	
Odpowiedniki: AuroDulox [15,10], Dulxetenon [15,53], Duloxetine Zentiva [15,53], Dulofor [15,64], Duloxetine Mylan [15,98], Dulsevnia [16,38], Dutilox [16,43], Depratal [21,20]					
Duloxetine Zentiva: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg - 56 szt. ◆		Rx	100% 28,71 Limit 28,71 30% <sup>(1)</sup> 8,61 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.		
INN: Duloxetine (1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		ATC: N06AX21	wyk: B	EAN ~ 142363	
Odpowiedniki: Duloxetine Zentiva [28,71], Dulsevnia [31,00], Dutilox [31,32], Depratal [40,68]					
Duloxetine Zentiva: kaps. dojelitowe, twarde 60 mg - 28 szt. ◆		Rx	100% 29,28 Limit 29,12 30% <sup>(1)</sup> 8,90 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.		
INN: Duloxetine (1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		ATC: N06AX21	wyk: B	EAN ~ 123106	
Odpowiedniki: Dulsevnia - (IR) [28,40], AuroDulox [28,44], Dulxetenon [29,28], Duloxetine Zentiva [29,28], Dulofor [29,51], Duloxetine Mylan [30,20], Dulsevnia [31,00], Dutilox [31,12], Depratal [40,68]					
Duloxetine Zentiva: kaps. dojelitowe, twarde 60 mg - 56 szt. ◆		Rx	100% 53,66 Limit 53,66 30% <sup>(1)</sup> 16,10 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.		
INN: Duloxetine (1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		ATC: N06AX21	wyk: B	EAN ~ 123107	
Odpowiedniki: Dulsevnia - (IR) [52,97], Duloxetine Zentiva [53,66], Dulsevnia [58,24], Dutilox [58,88], Depratal [77,64]					
Dulsevnia: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg - 28 szt. ◆		Rx	100% 16,38 Limit 14,56 30% <sup>(1)</sup> 6,19 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.		
INN: Duloxetine (1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		ATC: N06AX21	wyk: B	EAN ~ 222239	
Odpowiedniki: AuroDulox [15,10], Duloxetine Zentiva [15,53], Dulxetenon [15,53], Dulofor [15,64], Duloxetine Mylan [15,98], Dulsevnia [16,38], Dutilox [16,43], Depratal [21,20]					
Dulsevnia: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg - 56 szt. ◆		Rx	100% 31,00 Limit 29,12 30% <sup>(1)</sup> 10,62 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.		
INN: Duloxetine (1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		ATC: N06AX21	wyk: B	EAN ~ 222253	
Odpowiedniki: Duloxetine Zentiva [28,71], Dulsevnia [31,00], Dutilox [31,32], Depratal [40,68]					
Dulsevnia: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg - 90 szt. ◆		Rx	100% 43,49 Limit 43,49 30% <sup>(1)</sup> 13,05 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.		
INN: Duloxetine (1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		ATC: N06AX21	wyk: B	EAN ~ 122227	
Odpowiedniki: Duloxetine Zentiva [28,71], Dulsevnia [31,00], Dutilox [31,12], Depratal [40,68]					
Dulsevnia: kaps. dojelitowe, twarde 60 mg - 28 szt. ◆		Rx	100% 31,00 Limit 29,12 30% <sup>(1)</sup> 10,62 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.		
INN: Duloxetine (1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		ATC: N06AX21	wyk: B	EAN ~ 222321	
Odpowiedniki: Dulsevnia - (IR) [28,40], AuroDulox [28,44], Duloxetine Zentiva [29,28], Dulxetenon [29,28], Dulofor [29,51], Duloxetine Mylan [30,20], Dulsevnia [31,00], Dutilox [31,12], Depratal [40,68]					
Dulsevnia: kaps. dojelitowe, twarde 60 mg - 56 szt. ◆		Rx	100% 58,24 Limit 58,24 30% <sup>(1)</sup> 17,47 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.		
INN: Duloxetine (1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		ATC: N06AX21	wyk: B	EAN ~ 222345	
Odpowiedniki: Dulsevnia - (IR) [52,97], Duloxetine Zentiva [53,66], Dulsevnia [58,24], Dutilox [58,88], Depratal [77,64]					
Dulsevnia: kaps. dojelitowe, twarde 60 mg - 90 szt. ◆		Rx	100% 81,77 Limit 81,77 30% <sup>(1)</sup> 24,53 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.		
INN: Duloxetine (1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		ATC: N06AX21	wyk: B	EAN ~ 122236	
Odpowiedniki: Duloxetine Zentiva [28,71], Dulsevnia [31,00], Dutilox [31,32], Depratal [40,68]					
Dulsevnia: kaps. dojelitowe, twarde 90 mg - 28 szt. ◆		Rx	100% 44,82 Limit 43,68 30% <sup>(1)</sup> 14,24 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.		
INN: Duloxetine (1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		ATC: N06AX21	wyk: B	EAN ~ 352172	
Odpowiedniki: Dulxetenon [40,98], Dulsevnia [44,82]					
Dulsevnia - (IR): kaps. dojelitowe, twarde 60 mg - 28 szt. ◆		Rx	100% 28,40 Limit 28,40 30% <sup>(1)</sup> 8,52 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.		
INN: Duloxetine (1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		ATC: N06AX21	wyk: B	EAN ~ 148074	
Odpowiedniki: Dulsevnia - (IR) [28,40], AuroDulox [28,44], Duloxetine Zentiva [29,28], Dulxetenon [29,28], Dulofor [29,51], Duloxetine Mylan [30,20], Dulsevnia [31,00], Dutilox [31,12], Depratal [40,68]					
Dulsevnia - (IR): kaps. dojelitowe, twarde 60 mg - 56 szt. ◆		Rx	100% 52,97 Limit 52,97 30% <sup>(1)</sup> 15,89 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.		
INN: Duloxetine (1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		ATC: N06AX21	wyk: B	EAN ~ 148075	
Odpowiedniki: Dulsevnia - (IR) [52,97], Duloxetine Zentiva [53,66], Dulsevnia [58,24], Dutilox [58,88], Depratal [77,64]					

**ADRENALINA WZF**

Adrenalinum

Zawsze pod ręką!

**Refundacja** od lipca 2015  
Poziom odpłatności 50%

ADR-WZF/131/06-2015

Dulxetenon: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg - 28 szt. ◆	Rx	100% 15,53 Limit 14,56 30% <sup>(1)</sup> 5,34 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Duloxetine</i> ATC: N06AX21 wyk: B EAN ~ 139668 (1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Neuraxpharm Arzneimittel GmbH		
Odpowiedniki: AuroDulox [15,10], Duloxetine Zentiva [15,53], Dulxetenon [15,53], Dulofor [15,64], Duloxetine Mylan [15,98], Dulsevia [16,38], Dutilox [16,43], Depratal [21,20]		
Dulxetenon: kaps. dojelitowe, twarde 60 mg - 28 szt. ◆	Rx	100% 29,28 Limit 29,12 30% <sup>(1)</sup> 8,90 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Duloxetine</i> ATC: N06AX21 wyk: B EAN ~ 139666 (1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Neuraxpharm Arzneimittel GmbH		
Odpowiedniki: Dulsevia - (IR) [28,40], AuroDulox [28,44], Duloxetine Zentiva [29,28], Dulxetenon [29,28], Dulofo- [29,51], Duloxetine Mylan [30,20], Dulsevia [31,00], Dutilox [31,12], Depratal [40,68]		
Dulxetenon: kaps. dojelitowe, twarde 90 mg - 28 szt. ◆	Rx	100% 40,98 Limit 40,98 30% <sup>(1)</sup> 12,29 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Duloxetine</i> ATC: N06AX21 wyk: B EAN ~ 468651 (1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Neuraxpharm Arzneimittel GmbH		
Odpowiedniki: Dulxetenon [40,98], Dulsevia [44,82]		
Dulxetenon: kaps. dojelitowe, twarde 120 mg - 28 szt. ◆	Rx	100% 53,11 Limit 53,11 30% <sup>(1)</sup> 15,93 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Duloxetine</i> ATC: N06AX21 wyk: B EAN ~ 468699 (1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Neuraxpharm Arzneimittel GmbH		
Odpowiedniki: DuoResp Spiromax [121,20], Bufomix Easyhaler [127,96]		
DuoResp Spiromax: prosz. do inhal. 160/4,5 µg/dawkę - 1 inhal. (120 dawkę)	Rx	100% 121,20 Limit 0,00 C <sup>(1)</sup> bezpl. DZ <sup>(2)</sup> bezpl. R <sup>(3)</sup> 30,41 S <sup>(4)</sup> bezpl.
INN: <i>Budesonide + Formoterol</i> ATC: R03AK07 wyk: A EAN ~ 136932 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewle- kła obturacyjna choroba płuc, Astma (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Teva B.V.		
Odpowiedniki: DuoResp Spiromax [121,20], DuoResp Spiromax [111,10], Bufomix Easyhaler [113,27]		
DuoResp Spiromax: prosz. do inhal. 320/9 µg/dawkę - 1 inhal. (60 dawkę)	Rx	100% 111,10 Limit 0,00 C <sup>(1)</sup> bezpl. DZ <sup>(2)</sup> bezpl. R <sup>(3)</sup> 20,31 S <sup>(4)</sup> bezpl.
INN: <i>Budesonide + Formoterol</i> ATC: R03AK07 wyk: A EAN ~ 136963 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma, Przewleka obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Teva B.V.		
Odpowiedniki: Airbufo Forspiro [110,84], DuoResp Spiromax [111,10], Bufomix Easyhaler [113,27]		
Duosone: żel (0,05 mg+ 0,5 mg)/g - tuba 60 g	Rx	100% 99,40 Limit 99,40 30% <sup>(1)</sup> 29,82 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Betamethasone + Calcipotriol</i> ATC: D05AX52 wyk: B EAN ~ 047209 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Bausch Health		
Duosone: żel (0,05 mg+ 0,5 mg)/g - tuba. 30 g	Rx	100% 52,54 Limit 52,54 30% <sup>(1)</sup> 15,76 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Betamethasone + Calcipotriol</i> ATC: D05AX52 wyk: B EAN ~ 047208 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Bausch Health		

DuoTrav: krople do oczu (40 µg+ 5 mg)/ml - 1 but. 2,5 ml	Rx	100% 45,46 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 17,01 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Travoprost + Timolol</i> ATC: S01ED51 wyk: B EAN ~ 586172 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Novartis Europharm Limited		
Odpowiedniki: Travoprost + Timolol Medical Valley [32,69], Rozaduo [39,27], Travoprost+Timolol Genoptim [39,27], DuoTrav [45,46]		
Durogesic™: system transdermalny 25 µg/h - 5 szt. (4,2 mg w plastrze) ◆	Rx-w	100% 40,80 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 4,76 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Fentanyl</i> ATC: N02AB03 wyk: N EAN ~ 765416 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bó- lowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia, Neuralgia popółpaścowa przewlekła (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.		
Durogesic™: system transdermalny 50 µg/h - 5 szt. (8,4 mg w plastrze) ◆	Rx-w	100% 63,54 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 3,20 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Fentanyl</i> ATC: N02AB03 wyk: N EAN ~ 765515 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.		
Durogesic™: system transdermalny 75 µg/h - 5 szt. (12,6 mg w plastrze) ◆	Rx-w	100% 83,04 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 3,20 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Fentanyl</i> ATC: N02AB03 wyk: N EAN ~ 765614 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bó- lowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia, Neuralgia popółpaścowa przewlekła (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.		
Durogesic™: system transdermalny 100 µg/h - 5 szt. (16,8 mg w plastrze) ◆	Rx-w	100% 101,88 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 3,20 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Fentanyl</i> ATC: N02AB03 wyk: N EAN ~ 765713 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia, Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.		
Dutazyr: kaps. miękkie 0,5 mg - 30 kaps.	Rx	100% 25,87 Limit 25,87 30% <sup>(1)</sup> 7,76 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Dutasteride</i> ATC: G04CB02 wyk: B EAN ~ 145635 (1) Leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Aristo Pharma Sp. z o.o.		
Dutilox: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg - 28 szt. ◆	Rx	100% 16,43 Limit 14,56 30% <sup>(1)</sup> 6,24 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Duloxetine</i> ATC: N06AX21 wyk: B EAN ~ 124954 (1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukoń- czenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Symphar Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: AuroDulox [15,10], Duloxetine Zentiva [15,53], Dulxetenon [15,53], Dulofofor [15,64], Duloxetine Mylan [15,98], Dulsevia [16,38], Dutilox [16,43], Depratal [21,20]		
Dutilox: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg - 56 szt. ◆	Rx	100% 31,32 Limit 29,12 30% <sup>(1)</sup> 10,94 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Duloxetine</i> ATC: N06AX21 wyk: B EAN ~ 124961 (1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukoń- czenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Symphar Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Duloxetine Zentiva [28,71], Dulsevia [31,00], Dutilox [31,32], Depratal [40,68]		



<b>Dutilox:</b> kaps. dojelitowe, twarde <b>60 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	<b>31,12</b> <b>29,12</b> <b>10,74</b> bezpł. bezpł.
INN: <b>Duloxetine</b> (1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: <b>N06AX21</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>124988</b> Symphar Sp. z o.o.
<b>Dutilox:</b> kaps. dojelitowe, twarde <b>60 mg</b> - 56 szt. ◆	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	<b>58,88</b> <b>58,24</b> <b>18,11</b> bezpł. bezpł.
INN: <b>Duloxetine</b> (1) Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: <b>N06AX21</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>124994</b> Symphar Sp. z o.o.
<b>Dynid:</b> roztw. doust. <b>0,5 mg/ml</b> - 1 but. 150 ml	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	<b>16,79</b> <b>16,79</b> <b>5,04</b> bezpł. bezpł.
INN: <b>Desloratadine</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: <b>R06AX27</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>975921</b> Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o.
<b>Dynid:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	<b>14,16</b> <b>13,46</b> <b>4,74</b> bezpł. bezpł.
INN: <b>Desloratadine</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: <b>R06AX27</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>979981</b> Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o.
<b>Dynid:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 60 szt.	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	<b>25,31</b> <b>25,31</b> <b>7,59</b> bezpł. bezpł.
INN: <b>Desloratadine</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1; T2; C; T3; C	ATC: <b>R06AX27</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>024166</b> Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o.
<b>Easiphen:</b> płyn odżywczy [smak owoce leśne] - 18 poj. 250 ml	Ś	100% Limit R <sup>(1)</sup>	<b>544,27</b> <b>544,27</b> <b>3,20</b>
INN: <b>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</b> (1) Fenylketonuria   Kat. ciąży: N	ATC: <b>V06CA</b>	wyk:	EAN ~ <b>625929</b> Nutricia Polska Sp. z o.o.
<b>Easydrip Classic:</b> igły do penów <b>0,25x5 mm (31G)</b> - 100 szt.	WM	100% Limit 30% <sup>(1)</sup>	<b>18,82</b> <b>18,82</b> <b>5,65</b>
INN: (1) Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta   Kat. ciąży: N	ATC:	wyk:	EAN ~ <b>293000</b> Sandstone Medical
<b>Easydrip Classic:</b> igły do penów <b>0,30x8 mm (30G)</b> - 100 szt.	WM	100% Limit 30% <sup>(1)</sup>	<b>18,82</b> <b>18,82</b> <b>5,65</b>
INN: (1) Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta   Kat. ciąży:	ATC:	wyk:	EAN ~ <b>293017</b> Sandstone Medical
<b>Ebetrexat:</b> inj. [roztw.] <b>7,5 mg/0,375 ml</b> - 1 amp.-strzyk. ◆	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	<b>23,21</b> <b>0,00</b> bezpł. <b>3,20</b> bezpł.
INN: <b>Methotrexate</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: <b>L01BA01</b>	wyk: <b>A</b>	EAN ~ <b>701852</b> EBEWE PHARMA GmbH

<b>Ebetrexat:</b> inj. [roztw.] <b>7,5 mg/0,375 ml</b> - 4 amp.-strzyk. ◆	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	<b>88,99</b> <b>0,00</b> bezpł. <b>3,20</b> bezpł.
INN: <b>Methotrexate</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: <b>L01BA01</b>	wyk: <b>A</b>	EAN ~ <b>701869</b> EBEWE PHARMA GmbH
<b>Ebetrexat:</b> inj. [roztw.] <b>10 mg/0,5 ml</b> - 4 amp.-strzyk. ◆	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	<b>116,19</b> <b>0,00</b> bezpł. <b>3,20</b> bezpł.
INN: <b>Methotrexate</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: <b>L01BA01</b>	wyk: <b>A</b>	EAN ~ <b>701920</b> EBEWE PHARMA GmbH
<b>Ebetrexat:</b> inj. [roztw.] <b>15 mg/0,75 ml</b> - 4 amp.-strzyk. ◆	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	<b>169,61</b> <b>0,00</b> bezpł. <b>3,20</b> bezpł.
INN: <b>Methotrexate</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: <b>L01BA01</b>	wyk: <b>A</b>	EAN ~ <b>702040</b> EBEWE PHARMA GmbH
<b>Ebetrexat:</b> inj. [roztw.] <b>20 mg/ml</b> - 4 amp.-strzyk. ◆	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	<b>222,44</b> <b>0,00</b> bezpł. <b>3,41</b> bezpł.
INN: <b>Methotrexate</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: <b>L01BA01</b>	wyk: <b>A</b>	EAN ~ <b>735242</b> EBEWE PHARMA GmbH
<b>Ebetrexat:</b> inj. [roztw.] <b>25 mg/1,25 ml</b> - 4 amp.-strzyk. ◆	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	<b>274,80</b> <b>0,00</b> bezpł. <b>4,27</b> bezpł.
INN: <b>Methotrexate</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: <b>L01BA01</b>	wyk: <b>A</b>	EAN ~ <b>735273</b> EBEWE PHARMA GmbH
<b>Ebetrexat:</b> inj. [roztw.] <b>30 mg/1,5 ml</b> - 4 amp.-strzyk. ◆	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	<b>327,19</b> <b>0,00</b> bezpł. <b>5,12</b> bezpł.
INN: <b>Methotrexate</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: <b>L01BA01</b>	wyk: <b>A</b>	EAN ~ <b>735303</b> EBEWE PHARMA GmbH
<b>Ebivol:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 30 szt. (3 blistry) ◆	Rx	100% Limit R <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	<b>12,91</b> <b>12,91</b> <b>3,20</b> bezpł.
INN: <b>Nebivolol</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	ATC: <b>C07AB12</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>662425</b> Actavis Group PTC ehf.
<b>Ebivol:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx	100% Limit R <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	<b>24,29</b> <b>24,29</b> <b>6,40</b> bezpł.
INN: <b>Nebivolol</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	ATC: <b>C07AB12</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>662456</b> Actavis Group PTC ehf.
<b>Efectin® ER 75:</b> kaps. o przedl. uwalnianiu <b>75 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	<b>25,55</b> <b>21,84</b> <b>10,26</b> bezpł. bezpł.
INN: <b>Venlafaxine</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: <b>N06AX16</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>493913</b> Upjohn EESV
<b>Efectin® ER 75:</b> kaps. o przedl. uwalnianiu <b>75 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	<b>25,55</b> <b>21,84</b> <b>10,26</b> bezpł. bezpł.
INN: <b>Venlafaxine</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: <b>N06AX16</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>493913</b> Upjohn EESV

**Loperamid WZF**  
Loperamidi hydrochloridum

Przerwij niekończące się wizyty

Nowe opakowanie:  
**2 mg x 15 tabl.**

<b>Efectin® ER 150:</b> kaps. o przedl. uwalnianiu <b>150 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>44,82</b> Limit <b>43,68</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>14,24</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Venlafaxine</i>   ATC: <b>N06AX16</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>494019</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Upjohn EESV		
<b>Odpowiedniki:</b> Venlafaxine Bluefish XL [31,86], Symfaksin ER® [32,21], Alventa® - (IR) [32,27], Oriven [32,80], Faxigen XL [38,30], Lafactin [42,60], Alventa® [43,10], Efevelon SR [44,25], Efectin® ER 150 [44,82], Velaxin® ER 150 [44,84], Venlectine [45,62], Axyven [46,26], Venlafaxine Apotex [46,77], Faxelet ER [47,11], Prefaxine [50,06]		
<b>Eferox:</b> tabl. <b>50 µg</b> - 50 szt.	Rx	100% <b>4,53</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>3,54</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Levothyroxine sodium</i>   ATC: <b>H03AA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>143188</b> (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Niedoczynność tarczycy(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>A</b> Aristo Pharma Sp. z o.o.		
<b>Odpowiedniki:</b> Althyxin® [4,24], Eferox [4,53], Letrox® 50 [7,14], Euthyrox® N 50 [7,66]		
<b>Eferox:</b> tabl. <b>50 µg</b> - 100 szt.	Rx	100% <b>8,17</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>3,56</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Levothyroxine sodium</i>   ATC: <b>H03AA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>143189</b> (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Niedoczynność tarczycy(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>A</b> Aristo Pharma Sp. z o.o.		
<b>Odpowiedniki:</b> Eltroxin® [X], Althyxin® [5,68], Eferox [8,17], Euthyrox® N 50 [13,73]		
<b>Eferox:</b> tabl. <b>100 µg</b> - 50 szt.	Rx	100% <b>8,17</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>3,56</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Levothyroxine sodium</i>   ATC: <b>H03AA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>143190</b> (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Niedoczynność tarczycy(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>A</b> Aristo Pharma Sp. z o.o.		
<b>Odpowiedniki:</b> Althyxin® [8,15], Eferox [8,17], Letrox® 100 [8,53], Euthyrox® N 100 [9,38]		
<b>Eferox:</b> tabl. <b>100 µg</b> - 100 szt.	Rx	100% <b>15,32</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>7,11</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Levothyroxine sodium</i>   ATC: <b>H03AA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>143191</b> (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Niedoczynność tarczycy(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>A</b> Aristo Pharma Sp. z o.o.		
<b>Odpowiedniki:</b> Eltroxin® [X], Althyxin® [15,27], Eferox [15,32], Euthyrox® N 100 [16,80]		
<b>Efevelon SR:</b> kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde <b>37,5 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>11,39</b> Limit <b>10,92</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>3,75</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Venlafaxine</i>   ATC: <b>N06AX16</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>715299</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Actavis Group PTC ehf.		
<b>Odpowiedniki:</b> Symfaksin ER® [10,37], Oriven [10,53], Faxigen XL [11,02], Efevelon SR [11,39], Lafactin [12,03], Velaxin® ER 37,5 [12,56], Venlectine [12,69], Alventa® [12,77], Venlafaxine Apotex [12,82], Faxelet ER [13,10], Axyven [13,37], Prefaxine [13,80]		
<b>Efevelon SR:</b> kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde <b>75 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>23,60</b> Limit <b>21,84</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>8,31</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Venlafaxine</i>   ATC: <b>N06AX16</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>715350</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Actavis Group PTC ehf.		
<b>Odpowiedniki:</b> Venlafaxine Bluefish XL [17,37], Alventa® - (IR) [17,75], Symfaksin ER® [19,46], Oriven [19,60], Faxigen XL [20,62], Lafactin [22,78], Alventa® [23,03], Efevelon SR [23,60], Velaxin® ER 75 [23,91], Venlectine [24,18], Venlafaxine Apotex [24,46], Faxelet ER [24,62], Axyven [25,04], Efectin® ER 75 [25,55], Prefaxine [26,50]		

<b>Efevelon SR:</b> kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde <b>150 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>44,25</b> Limit <b>43,68</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>13,67</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Venlafaxine</i>   ATC: <b>N06AX16</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>715374</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Actavis Group PTC ehf.		
<b>Odpowiedniki:</b> Venlafaxine Bluefish XL [31,86], Symfaksin ER® [32,21], Alventa® - (IR) [32,27], Oriven [32,80], Faxigen XL [38,30], Lafactin [42,60], Alventa® [43,10], Efevelon SR [44,25], Efectin® ER 150 [44,82], Velaxin® ER 150 [44,84], Venlectine [45,62], Axyven [46,26], Venlafaxine Apotex [46,77], Faxelet ER [47,11], Prefaxine [50,06]		
<b>Effentora:</b> tabl. podpoliczkowe <b>100 µg</b> - 28 szt. ◆	Rx-w	100% <b>568,16</b> Limit <b>568,16</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fentanyl</i>   ATC: <b>N02AB03</b>   wyk: <b>N</b>   EAN ~ <b>643011</b> (1) Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.		
<b>Odpowiedniki:</b> AuroFena [485,73], Effentora [568,16]		
<b>Effentora:</b> tabl. podpoliczkowe <b>200 µg</b> - 28 szt. ◆	Rx-w	100% <b>568,16</b> Limit <b>568,16</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fentanyl</i>   ATC: <b>N02AB03</b>   wyk: <b>N</b>   EAN ~ <b>643035</b> (1) Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.		
<b>Odpowiedniki:</b> AuroFena [485,73], Effentora [568,16]		
<b>Effentora:</b> tabl. podpoliczkowe <b>400 µg</b> - 28 szt. ◆	Rx-w	100% <b>568,16</b> Limit <b>568,16</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fentanyl</i>   ATC: <b>N02AB03</b>   wyk: <b>N</b>   EAN ~ <b>643059</b> (1) Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.		
<b>Odpowiedniki:</b> AuroFena [485,73], Effentora [568,16]		
<b>Egiramlon:</b> kaps. twarde <b>5/10 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100% <b>17,49</b> Limit <b>17,33</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,36</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Ramipril + Amlodipine</i>   ATC: <b>C09BB07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>936809</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> PROTERAPIA Sp.z.o.o.		
<b>Odpowiedniki:</b> Sumilar Duo [16,31], Ramizek Combi [17,33], Sumilar [17,33], Rimal [17,34], Egiramlon [17,49]		
<b>Egiramlon:</b> kaps. twarde <b>5/5 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100% <b>9,23</b> Limit <b>8,67</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>3,16</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Ramipril + Amlodipine</i>   ATC: <b>C09BB07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>936779</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> PROTERAPIA Sp.z.o.o.		
<b>Odpowiedniki:</b> Sumilar Duo [8,45], Ramizek Combi [9,16], Rimal [9,16], Sumilar [9,16], Egiramlon [9,23]		
<b>Egiramlon:</b> kaps. twarde <b>10/5 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100% <b>9,23</b> Limit <b>8,67</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>3,16</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Ramipril + Amlodipine</i>   ATC: <b>C09BB07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>936854</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> PROTERAPIA Sp.z.o.o.		
<b>Odpowiedniki:</b> Sumilar Duo [8,45], Ramizek Combi [9,16], Rimal [9,16], Sumilar [9,16], Egiramlon [9,23]		
<b>Egiramlon:</b> kaps. twarde <b>10/10 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100% <b>17,49</b> Limit <b>17,33</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,36</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Ramipril + Amlodipine</i>   ATC: <b>C09BB07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>936885</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> PROTERAPIA Sp.z.o.o.		
<b>Odpowiedniki:</b> Sumilar Duo [16,31], Ramizek Combi [17,33], Rimal [17,34], Egiramlon [17,49]		





<b>Egistrozol:</b> tabl. powł. <b>1 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>61,00</b> Limit <b>52,94</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>8,06</b> R <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Anastrozole</b>   ATC: <b>L02BG03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>082148</b>					
(1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii WP: Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Egis Polska Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Anastrozole Eugia [48,81], Anastrozol Bluefish [52,36], Atrozol [56,41], Anastrozol Teva [59,51], Apo-Nastrol [60,98], <b>Egistrozol [61,00]</b> , Arimidex® [64,43]					
<b>Egistrozol - (IR):</b> tabl. powł. <b>1 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>52,91</b> Limit <b>52,91</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Anastrozole</b>   ATC: <b>L02BG03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>146428</b>					
(1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii WP: Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Delfarma Sp. z o.o.					
<b>Egolanza:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 28 szt. ♦	Rx	100% <b>49,36</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>6,63</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Olanzapine</b>   ATC: <b>N05AH03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>824076</b>					
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Egis Polska Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Olanzina - (IR) [X], Ranofren [33,38], Zalasta® - (IR) [35,25], Zalasta® - (IR) [35,27], Olanzaran [39,75], Olanzapina Mylan [42,83], Olazax [44,55], Olinat® [44,78], Olanzina [45,56], Olanzapina Apotex [47,73], Zalasta® [48,38], <b>Egolanza [49,36]</b> , Olzapin [50,51]					
<b>Egolanza:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 56 szt. ♦	Rx	100% <b>92,71</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>4,05</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Olanzapine</b>   ATC: <b>N05AH03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>095666</b>					
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Egis Polska Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Olanzapina Mylan [23,40], <b>Egolanza [92,71]</b> , Olzapin [96,49]					
<b>Egolanza:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 28 szt. ♦	Rx	100% <b>93,41</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>4,75</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Olanzapine</b>   ATC: <b>N05AH03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>824106</b>					
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Egis Polska Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Olanzina - (IR) [X], Zalasta® - (IR) [60,09], Zalasta® - (IR) [65,24], Zalasta® - (IR) [76,23], Olanzapina Mylan - (IR) [77,32], Olanzaran [79,67], Olanzapina Mylan [80,36], Olazax [83,79], Olinat® [86,54], <b>Egolanza - (IR) [89,74]</b> , <b>Egolanza - (IR) [90,20]</b> , Olanzina [90,34], Zalasta® [91,44], Olzapin [92,44], <b>Egolanza [93,41]</b> , Olanzapina Apotex [93,71], Ranofren [99,50]					
<b>Egolanza:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 56 szt. ♦	Rx	100% <b>176,17</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>5,97</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Olanzapine</b>   ATC: <b>N05AH03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>827343</b>					
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Egis Polska Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Olanzapina Mylan [36,40], <b>Egolanza - (IR) [170,22]</b> , <b>Egolanza - (IR) [171,13]</b> , <b>Egolanza [176,17]</b> , Olzapin [183,72]					
<b>Egolanza - (IR):</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 28 szt. ♦	Rx	100% <b>90,20</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Olanzapine</b>   ATC: <b>N05AH03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>146129</b>					
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Delfarma Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Olanzina - (IR) [X], Zalasta® - (IR) [60,09], Zalasta® - (IR) [65,24], Zalasta® - (IR) [76,23], Olanzapina Mylan - (IR) [77,32], Olanzaran [79,67], Olanzapina Mylan [80,36], Olazax [83,79], Olinat® [86,54], <b>Egolanza - (IR) [89,74]</b> , <b>Egolanza - (IR) [90,20]</b> , Olanzina [90,34], Zalasta® [91,44], Olzapin [92,44], <b>Egolanza [93,41]</b> , Olanzapina Apotex [93,71], Ranofren [99,50]					
<b>Egolanza - (IR):</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 56 szt. ♦	Rx	100% <b>171,13</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>5,97</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Olanzapine</b>   ATC: <b>N05AH03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>146130</b>					
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Delfarma Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Olanzapina Mylan [36,40], <b>Egolanza - (IR) [170,22]</b> , <b>Egolanza - (IR) [171,13]</b> , <b>Egolanza [176,17]</b> , Olzapin [183,72]					
<b>Egolanza - (IR):</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 56 szt. ♦	Rx	100% <b>170,22</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>5,97</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Olanzapine</b>   ATC: <b>N05AH03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>148062</b>					
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Inpharm Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Olanzapina Mylan [36,40], <b>Egolanza - (IR) [170,22]</b> , <b>Egolanza - (IR) [171,13]</b> , <b>Egolanza [176,17]</b> , Olzapin [183,72]					
<b>Egoropal®:</b> inj. [zaw. o przedl. uwalnianiu] <b>75 mg</b> - 1 amp.-strzyk. 75 mg (+ 2 igły) ♦	Rx	100% <b>365,03</b> Limit <b>365,03</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Paliperidone</b>   ATC: <b>N05AX13</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>718870</b>					
(1) Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia rysperydonem lub paliperidone, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego   Kat. ciąży: <b>C</b> Egis Polska Sp. z o.o.					
<b>Egoropal®:</b> inj. [zaw. o przedl. uwalnianiu] <b>100 mg</b> - 1 amp.-strzyk. 100 mg (+ 2 igły) ♦	Rx	100% <b>485,50</b> Limit <b>485,50</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Paliperidone</b>   ATC: <b>N05AX13</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>718871</b>					
(1) Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia rysperydonem lub paliperidone, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego   Kat. ciąży: <b>C</b> Egis Polska Sp. z o.o.					
<b>Egoropal®:</b> inj. [zaw. o przedl. uwalnianiu] <b>150 mg</b> - 1 amp.-strzyk. 150 mg (+ 2 igły) ♦	Rx	100% <b>729,08</b> Limit <b>729,08</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Paliperidone</b>   ATC: <b>N05AX13</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>718872</b>					
(1) Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia rysperydonem lub paliperidone, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego   Kat. ciąży: <b>C</b> Egis Polska Sp. z o.o.					
<b>Eligard® 22,5 mg:</b> inj. podsk. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] <b>22,5 mg</b> - 1 zest. ♦	Rx	100% <b>659,45</b> Limit <b>565,55</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>103,50</b> R <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Leuprorelin acetate</b>   ATC: <b>L02AE02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>075751</b>					
(1) Rak prostaty WP: Obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>N</b> RECORDATI Polska Sp. z o.o.					
<b>Eligard® 45 mg:</b> inj. podsk. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] <b>45 mg</b> - 1 zest. ♦	Rx	100% <b>1234,60</b> Limit <b>1131,11</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>122,69</b> R <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Leuprorelin acetate</b>   ATC: <b>L02AE02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>634057</b>					
(1) Rak prostaty WP: Obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>N</b> RECORDATI Polska Sp. z o.o.					
<b>Eligard® 45 mg:</b> inj. podsk. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] <b>45 mg</b> - 1 zest. ♦	Rx	100% <b>80,38</b> Limit <b>34,36</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>56,33</b> R <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Apixaban</b>   ATC: <b>B01AF02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>086104</b>					
(1) Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - profilaktyka pierwotna, Leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Bristol Myers Squibb Sp. z o.o.					

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

▼Eliquis: tabl. powł. 5 mg - 56 szt.		Rx	100% 275,11 Limit 192,42 30% <sup>(1)</sup> 140,42 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Apixaban</i>	ATC: B01AF02	wyk: B	EAN ~ 101939
(1) Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Bristol Myers Squibb Sp. z o.o.			
Elitason: maść 1 mg/g - 1 tuba 50 g		Rx	100% 17,02 Limit 16,66 50% <sup>(1)</sup> 8,69 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Mometasono furoate</i>	ATC: D07AC13	wyk: B	EAN ~ 103965
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Aflorarm Farmacja Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Elitason [17,02], Momecutan [20,64]			
Elonva®: inj. [roztw.] 100 µg - 1 amp.-strzyk.		Rx-z	100% 1360,36 Limit 1360,36 R <sup>(1)</sup> 3,20
INN: <i>Corifollitropin alfa</i>	ATC: G03GA09	wyk: B	EAN ~ 077482
(1) Kontrolowana hiperstimulacja jajników w skojarzeniu z antagonistą GnRH u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli   Kat. ciąży: X			
Merck Sharp & Dohme Limited			
Elonva®: inj. [roztw.] 150 µg - 1 amp.-strzyk.		Rx-z	100% 1360,36 Limit 1360,36 R <sup>(1)</sup> 3,20
INN: <i>Corifollitropin alfa</i>	ATC: G03GA09	wyk: B	EAN ~ 077499
(1) Kontrolowana hiperstimulacja jajników w skojarzeniu z antagonistą GnRH u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli   Kat. ciąży: X			
Merck Sharp & Dohme Limited			
Emanera: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 28 szt.		Rx	100% 9,27 Limit 8,29 50% <sup>(1)</sup> 5,13 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Esomeprazole</i>	ATC: A02BC05	wyk: B	EAN ~ 926497
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Texitax [9,15], Emanera [9,27], Helides [9,59]			
Emanera: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 56 szt.		Rx	100% 17,55 Limit 16,58 50% <sup>(1)</sup> 9,26 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Esomeprazole</i>	ATC: A02BC05	wyk: B	EAN ~ 074975
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Helides [17,30], Emanera [17,55]			
Emanera: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 84 szt.		Rx	100% 47,30 Limit 47,30 50% <sup>(1)</sup> 23,65 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Esomeprazole</i>	ATC: A02BC05	wyk: B	EAN ~ 975319
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Krka Polska Sp. z o.o.			
Emanera: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 84 szt.		Rx	100% 25,25 Limit 24,87 50% <sup>(1)</sup> 12,82 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Esomeprazole</i>	ATC: A02BC05	wyk: B	EAN ~ 975316
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1; T2; T3; B			
Krka Polska Sp. z o.o.			

Emanera: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 28 szt.		Rx	100% 17,55 Limit 16,58 50% <sup>(1)</sup> 9,26 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Esomeprazole</i>	ATC: A02BC05	wyk: B	EAN ~ 926534
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Texitax [17,30], Emanera [17,55], Helides [18,21]			
Emanera: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 56 szt.		Rx	100% 33,16 Limit 33,16 50% <sup>(1)</sup> 16,58 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Esomeprazole</i>	ATC: A02BC05	wyk: B	EAN ~ 074999
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Helides [32,65], Emanera [33,16]			
EMEND®: kaps. twarde 125 mg+ 80 mg - 1 szt. (125 mg)+ 2 szt. (80 mg)		Rx	100% 68,69 Limit 68,69 B <sup>(1)</sup> bezpl.
INN: <i>Aprepitant</i>	ATC: A04AD12	wyk: B	EAN ~ 007387
(1) Chemioterapia ICD10: C.0.12.   Kat. ciąży: B			
Merck Sharp & Dohme Limited			
Enarena®: tabl. 5 mg - 30 szt. ◆		Rx	100% 4,53 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 4,08 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Enalapril maleate</i>	ATC: C09AA02	wyk: B	EAN ~ 014934
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Niewydolność serca inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1; C, T2; D, T3; D			
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			
Enarena®: tabl. 5 mg - 60 szt. ◆		Rx	100% 8,17 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 5,21 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Enalapril maleate</i>	ATC: C09AA02	wyk: B	EAN ~ 014958
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Niewydolność serca inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1; C, T2; D, T3; D			
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			
Enarena®: tabl. 10 mg - 30 szt. ◆		Rx	100% 7,04 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 4,19 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Enalapril maleate</i>	ATC: C09AA02	wyk: B	EAN ~ 015030
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Niewydolność serca inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1; C, T2; D, T3; D			
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			
Enarena®: tabl. 10 mg - 60 szt. ◆		Rx	100% 13,04 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 7,44 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Enalapril maleate</i>	ATC: C09AA02	wyk: B	EAN ~ 015054
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Niewydolność serca inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1; C, T2; D, T3; D			
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			
Enarena®: tabl. 20 mg - 30 szt. ◆		Rx	100% 12,49 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 6,95 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Enalapril maleate</i>	ATC: C09AA02	wyk: B	EAN ~ 020836
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Niewydolność serca inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1; C, T2; D, T3; D			
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			



# ZOLPIC

zolidem

Daj owcom odpocząć.



Enarenal®: tabl. 20 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	22,53
		Limit	0,00
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(5)</sup>	bezpł.

INN: *Enalapril maleate* | ATC: C09AA02 | wyk: B | EAN ~ 020829  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Niewydolność serca inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D

Encortolon®: tabl. 5 mg - 20 szt. (blister)	Rx	100%	13,03
		Limit	0,00
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(5)</sup>	bezpł.

INN: *Prednisolone* | ATC: H02AB06 | wyk: B | EAN ~ 400794  
 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Autoimmunizacyjne zapalenie trzustki u dzieci do 18 r.; eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 r. (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D

Encorton®: tabl. 1 mg - 20 szt. (blister)	Rx	100%	10,62
		Limit	1,50
		B <sup>(1)</sup>	8,21
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Prednisone* | ATC: H02AB07 | wyk: B | EAN ~ 128941  
 (1) Nowotwory złośliwe (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia; miastenia; zespół miastyczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina - Barrego); obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; stan po przeszczepie narządu. kończyny, tkanek, komórek lub szpiku; miopatia wrodzona u dzieci do 18 r. (5) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Encorton®: tabl. 5 mg - 20 szt.	Rx	100%	15,37
		Limit	7,51
		B <sup>(1)</sup>	7,07
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Prednisone* | ATC: H02AB07 | wyk: B | EAN ~ 641185  
 (1) Nowotwory złośliwe (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia; miastenia; zespół miastyczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina - Barrego); obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; stan po przeszczepie narządu. kończyny, tkanek, komórek lub szpiku; miopatia wrodzona u dzieci do 18 r. (5) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Encorton®: tabl. 5 mg - 100 szt. (blistry)	Rx	100%	37,57
		Limit	37,57
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Prednisone* | ATC: H02AB07 | wyk: B | EAN ~ 641192  
 (1) Nowotwory złośliwe (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia; miastenia; zespół miastyczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina - Barrego); obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; stan po przeszczepie narządu. kończyny, tkanek, komórek lub szpiku; miopatia wrodzona u dzieci do 18 r. (5) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Encorton®: tabl. 10 mg - 20 szt.	Rx	100%	25,74
		Limit	15,03
		B <sup>(1)</sup>	9,64
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Prednisone* | ATC: H02AB07 | wyk: B | EAN ~ 405312  
 (1) Nowotwory złośliwe (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia; miastenia; zespół miastyczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina - Barrego); obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; stan po przeszczepie narządu. kończyny, tkanek, komórek lub szpiku; miopatia wrodzona u dzieci do 18 r. (5) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Encorton®: tabl. 20 mg - 20 szt.	Rx	100%	35,54
		Limit	30,06
		B <sup>(1)</sup>	4,93
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Prednisone* | ATC: H02AB07 | wyk: B | EAN ~ 405411  
 (1) Nowotwory złośliwe (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia; miastenia; zespół miastyczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina - Barrego); obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; stan po przeszczepie narządu. kończyny, tkanek, komórek lub szpiku; miopatia wrodzona u dzieci do 18 r. (5) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Endovelle: tabl. 2 mg - 28 szt.	Rx	100%	39,82
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(4)</sup>	6,60

INN: *Dienogest* | ATC: G03DB08 | wyk: B | EAN ~ 139856  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Endometriozia | Kat. ciąży: X

Endovelle: tabl. 2 mg - 84 szt.	Rx	100%	109,25
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(4)</sup>	8,96

INN: *Dienogest* | ATC: G03DB08 | wyk: B | EAN ~ 139857  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Endometriozia | Kat. ciąży: X

Endoxan: tabl. draż. 50 mg - 50 szt.	Rx	100%	76,87
		Limit	89,72
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Cyclophosphamide* | ATC: L01AA01 | wyk: A | EAN ~ 240814  
 (1) Nowotwory złośliwe (2) Chemioterapia ICD10: C.13. (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne; amyloidoz; zespół hemofagocytowy; zespół POEMS; małopłytkowość oporna na leczenie kortykosteroidami; anemia hemolityczna oporna na leczenie kortykosteroidami; sarkoidoz; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL - z wyjątkiem idiopatycznego włókienia płuc (5) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D

Enerzair Breezhaler: prosz. do inhal. [kaps. twarde] 46/114/136 µg/dawkę - 30 szt.	Rx	100%	195,99
		Limit	195,99
		30% <sup>(1)</sup>	58,80
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Glycopyrronium bromide + Indacaterol + Mometasone furoate* | ATC: R03AL12 | wyk: | EAN ~ 104459  
 (1) Podtrzymujące leczenie astmy u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli choroby w wyniku podtrzymującego leczenia skojarzonego długo działającym bta2-mimetykiem i kortykosteroidem wziewnym podawanym w dużych dawkach, u których wystąpiło co najmniej jedno zaostrzenie astmy w poprzednim roku (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Enstilar: pianka na skórę (50 µg+ 0,5 mg)/g - 1 poj. 60 g	Rx	100%	167,50
		Limit	105,60
		30% <sup>(1)</sup>	93,58
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Betamethasone + Calcipotriol* | ATC: D05AX52 | wyk: | EAN ~ 283599  
 (1) Leczenie miejscowe łuszczyicy zwyczajnej u dorosłych (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Entocort®: kaps. o przedl. uwalnianiu 3 mg - 100 szt.	Rx	100%	371,71
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,56

INN: *Budesonide* | ATC: A07EA06 | wyk: B | EAN ~ 430314  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba Leśniwskiego-Crohna WP: Postać jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

▼ Envarsus: tabl. o przedl. uwalnianiu 0,75 mg - 30 szt. ◆	Rx-z	100%	123,26
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,70

INN: *Tacrolimus* | ATC: L04AD02 | wyk: B | EAN ~ 192709  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

**ADRENALINA WZF**

Adrenalinum

Zawsze pod ręką!

**Refundacja** od lipca 2015  
Poziom odpłatności 50%

ADR-WZF/131/06-2015

▼Envarsus: tabl. o przedł. uwalnianiu 1 mg - 30 szt. ◆	Rx-z	100%	164,08
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,59
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: Tacrolimus ATC: L04AD02 wyk: B EAN ~ 192730

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Odpowiedniki: Dailiport [93,35], Advagraf [114,58], Envarsus [164,08]

▼Envarsus: tabl. o przedł. uwalnianiu 1 mg - 90 szt. ◆	Rx-z	100%	489,49
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: Tacrolimus ATC: L04AD02 wyk: B EAN ~ 192754

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Chiesi Farmaceutici S.p.A.

▼Envarsus: tabl. o przedł. uwalnianiu 4 mg - 30 szt. ◆	Rx-z	100%	640,36
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,66
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: Tacrolimus ATC: L04AD02 wyk: B EAN ~ 192761

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Epilantin: tabl. powł. 50 mg - 14 szt. ◆	Rx	100%	12,09
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	4,72
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: Lacosamide ATC: N03AX18 wyk: B EAN ~ 149450

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana u chorych poniżej 16 r. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA

Odpowiedniki: Vimpat [X], Trelema [12,09], Epilantin [12,09], Lacosamide Neuraxpharm [12,47], Lacosamide Teva [12,53], Lacosamide Glenmark [12,60], Lacosamide Accord [12,81]

Epilantin: tabl. powł. 100 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	80,78
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: Lacosamide ATC: N03AX18 wyk: B EAN ~ 149455

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana u chorych poniżej 16 r. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA

Odpowiedniki: Vimpat [X], Trelema [80,78], Epilantin [80,78], Lacosamide Neuraxpharm [84,13], Lacosamide Teva [84,53], Lacosamide Glenmark [85,21], Lacosamide Accord [86,92]

Epilantin: tabl. powł. 150 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	117,09
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: Lacosamide ATC: N03AX18 wyk: B EAN ~ 149458

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana u chorych poniżej 16 r. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA

Odpowiedniki: Vimpat [X], Trelema [117,09], Epilantin [117,09], Zilibra [120,78], Lacosamide Neuraxpharm [122,13], Lacosamide Teva [122,73], Lacosamide Glenmark [123,73], Lacosamide Accord [126,30]

Epilantin: tabl. powł. 200 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	153,01
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,98
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: Lacosamide ATC: N03AX18 wyk: B EAN ~ 149461

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana u chorych poniżej 16 r. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA

Odpowiedniki: Vimpat [X], Trelema [153,01], Epilantin [153,01], Zilibra [158,21], Lacosamide Neuraxpharm [159,71], Lacosamide Teva [160,52], Lacosamide Glenmark [161,86], Lacosamide Accord [165,27]

Epitoram: tabl. powł. 25 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	10,40
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	4,98
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: Topiramate ATC: N03AX11 wyk: B EAN ~ 649556

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Padaczka oporna na leczenie WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Epitoram [10,40], Etopro® [10,76], Topamax® [14,74]

Epitoram: tabl. powł. 50 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	19,78
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,74
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: Topiramate ATC: N03AX11 wyk: B EAN ~ 649570

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Padaczka oporna na leczenie WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Epitoram [19,78], Topamax® [20,30], Etopro® [20,53]

Epitoram: tabl. powł. 100 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	37,31
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,04
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: Topiramate ATC: N03AX11 wyk: B EAN ~ 649594

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Padaczka oporna na leczenie WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Epitoram [37,31], Topamax® [38,37], Etopro® [39,23]

Epitoram: tabl. powł. 200 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	70,39
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	4,65
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: Topiramate ATC: N03AX11 wyk: B EAN ~ 649617

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Padaczka oporna na leczenie WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Topamax® [68,94], Epitoram [70,39], Etopro® [73,40]

Epitrigine 50 mg: tabl. 50 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	12,71
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	6,42
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: Lamotrigine ATC: N03AX09 wyk: B EAN ~ 334759

(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrębie OUN - postępowanie wspomagające; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
+pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Lamilept [X], Epitrigine 50 mg [12,71], Symlia [13,11], Lamotrix [14,15], Lamitrin® [26,32]

Epitrigine 100 mg: tabl. 100 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	24,57
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	8,79
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: Lamotrigine ATC: N03AX09 wyk: B EAN ~ 334766

(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrębie OUN - postępowanie wspomagające; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
+pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Lamitrin® [20,15], Epitrigine 100 mg [24,57], Lamilept - (R) [25,37], Symlia [25,38], Lamilept [25,50], Lamotrix [27,43]



Naszym wyborem

**enarenal**  
 enalapryli - maleas

Eprocliv: tabl. powł. 50/1000 mg - 56 szt.	Rx	100%	43,94
		Limit	29,23
		30% <sup>(1)</sup>	23,48
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

 INN: *Sitagliptin + Metformin hydrochloride* | ATC: A10BD07 | wyk: B | EAN ~ 670972

 (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą; cukrzyca typu 2 u pacjentów w których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c  $\geq 7\%$  (przez co najmniej 3 miesiące) (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B | Sandoz GmbH

Odpowiedniki: Symetlip [30,73], Metsigletic [30,75], Maymetsi [38,76], Combodiab [39,85], Eprocliv [43,94], Jamesi® [46,80]

Equoral: kaps. elastyczne 25 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	68,57
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,80
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

 INN: *Ciclosporin* | ATC: L04AD01 | wyk: A | EAN ~ 946426

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; zespół Alport'a z białkomoczem u dzieci do 18 rż.; anemia aplastyczna u dzieci do 18 rż.; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 rż.; aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granulanych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwono krwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kościzny, rogówki, tkanki lub komórek (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Cycloid [68,57], Equoral [68,57], Sandimmun Neoral® [76,24]

Equoral: kaps. elastyczne 50 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	135,93
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

 INN: *Ciclosporin* | ATC: L04AD01 | wyk: A | EAN ~ 946525

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; zespół Alport'a z białkomoczem u dzieci do 18 rż.; anemia aplastyczna u dzieci do 18 rż.; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 rż.; aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granulanych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwono krwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kościzny, rogówki, tkanki lub komórek (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Cycloid [135,93], Equoral [135,93], Sandimmun Neoral® [144,89]

Equoral: kaps. elastyczne 100 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	271,44
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

 INN: *Ciclosporin* | ATC: L04AD01 | wyk: A | EAN ~ 946624

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; zespół Alport'a z białkomoczem u dzieci do 18 rż.; anemia aplastyczna u dzieci do 18 rż.; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 rż.; aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granulanych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwono krwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kościzny, rogówki, tkanki lub komórek (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Cycloid [271,44], Equoral [271,44], Sandimmun Neoral® [279,29]

Equoral: roztw. doust. 100 mg/ml - 1 but. 50 ml ◆	Rx	100%	314,67
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

 INN: *Ciclosporin* | ATC: L04AD01 | wyk: A | EAN ~ 946716

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; zespół Alport'a z białkomoczem u dzieci do 18 rż.; anemia aplastyczna u dzieci do 18 rż.; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 rż.; aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granulanych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwono krwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kościzny, rogówki, tkanki lub komórek (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Equoral - (IR) [305,51], Equoral [314,67]

Equoral - (IR): roztw. doust. 100 mg/ml - 1 but. 50 ml ◆	Rx	100%	305,51
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

 INN: *Ciclosporin* | ATC: L04AD01 | wyk: A | EAN ~ 146067

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; zespół Alport'a z białkomoczem u dzieci do 18 rż.; anemia aplastyczna u dzieci do 18 rż.; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 rż.; aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granulanych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwono krwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kościzny, rogówki, tkanki lub komórek (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Inpharm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Equoral - (IR) [305,51], Equoral [314,67]

Equoral - (IR): roztw. doust. 100 mg/ml - but. 50 ml ◆	Rx	100%	305,50
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

 INN: *Ciclosporin* | ATC: L04AD01 | wyk: A | EAN ~ 148042

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; zespół Alport'a z białkomoczem u dzieci do 18 rż.; anemia aplastyczna u dzieci do 18 rż.; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 rż.; aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granulanych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwono krwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kościzny, rogówki, tkanki lub komórek (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Delfarma Sp. z o.o.

Erfin®: tabl. 250 mg - 14 szt.	Rx	100%	27,39
		Limit	24,59
		50% <sup>(1)</sup>	15,10
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

 INN: *Terbinafine* | ATC: D01BA02 | wyk: B | EAN ~ 621057

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Polfarmex S.A.

Odpowiedniki: Zelefin [26,00], Erfin® [27,39]

Erfin®: tabl. 250 mg - 28 szt.	Rx	100%	51,46
		Limit	49,17
		50% <sup>(1)</sup>	26,88
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

 INN: *Terbinafine* | ATC: D01BA02 | wyk: B | EAN ~ 621064

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Polfarmex S.A.

Odpowiedniki: Myconafine [49,17], Zelefin [50,54], Erfin® [51,46]

Ergotaminum Filofarm®: tabl. draż. 1 mg - 20 szt. ◆	Rx	100%	6,24
		Limit	6,24
		50% <sup>(1)</sup>	3,12
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

 INN: *Ergotamine* | ATC: G02AB02 | wyk: A | EAN ~ 211517

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X | Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "FILOFARM"

Esetin: tabl. 10 mg - 30 szt.	Rx	100%	23,39
		Limit	14,23
		30% <sup>(1)</sup>	13,43
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

 INN: *Ezetimibe* | ATC: C10AX09 | wyk: B | EAN ~ 138866

(1) Leczenie uzupełniające w trakcie leczenia statyną lub włączane jednocześnie ze statyną albo leczenie w przypadku stwierdzenia nietolerancji co najmniej 2 statyn - jednej w najmniejszej początkowej dawce na dobrej i drugiej w dowolnej dostępnej dawce przez okres leczenia nie krótszy niż 3 miesiące, w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, w których ryzyko pierwszego lub kolejnego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako co najmniej duże, wraz z działaniami mającymi na celu redukcję innych czynników ryzyka (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | S Lab Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Ezoleta [14,23], LIPEGIS [23,34], Esetin [23,39]

Estrofem®: tabl. powł. 2 mg - 28 szt.	Rx	100%	16,23
		Limit	16,23
		30% <sup>(1)</sup>	4,87
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

 INN: *Estradiol hemihydrate* | ATC: G03CA03 | wyk: B | EAN ~ 330713

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Transseksualizm (F64.0) (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X | Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Estrofem® mite: tabl. powł. 1 mg - 28 szt.	Rx	100%	13,65
		Limit	8,12
		30% <sup>(1)</sup>	7,97
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

 INN: *Estradiol hemihydrate* | ATC: G03CA03 | wyk: B | EAN ~ 823215

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Transseksualizm (F64.0) (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X | Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Etfom: tabl. powł. 1000 mg - 60 szt.	Rx	100%	17,36
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	4,99
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

 INN: *Metformin hydrochloride* | ATC: A10BA02 | wyk: B | EAN ~ 352400

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B | Sandoz GmbH

Odpowiedniki: Glucophage® 1000 mg [X], Avamina [14,27], Metcrean [14,27], Metformax® 1000 - (IR) [15,07], Zenofor [15,13], Metformax® 1000 [16,16], Siofor® 1000 [16,16], Formetic [16,88], Etfom [17,36]

Etform: tabl. powł. 1000 mg - 120 szt.	Rx	100%	30,94
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,40
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Metformin hydrochloride** ATC: **A10BA02** wyk: **B** EAN ~ **352417**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca **WP**: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Sandoz GmbH**  
 Odpowiedniki: Metformax® 1000 - (IR) [28,53], Zenofor [28,53], Metformax® 1000 [29,80], Formetic [30,55], Siofor® 1000 [30,60], **Etform [30,94]**

Etform 500: tabl. powł. 500 mg - 60 szt.	Rx	100%	10,54
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,95
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Metformin hydrochloride** ATC: **A10BA02** wyk: **B** EAN ~ **698141**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca **WP**: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Sandoz GmbH**  
 Odpowiedniki: Avamina [7,66], Metcrean [7,66], Zenofor [8,07], Siofor® 500 [8,55], Formetic [9,36], Metformax® 500 [10,54], **Etform 500 [10,54]**

Etform 500: tabl. powł. 500 mg - 90 szt.	Rx	100%	15,50
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,02
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Metformin hydrochloride** ATC: **A10BA02** wyk: **B** EAN ~ **698172**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca **WP**: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Sandoz GmbH**  
 Odpowiedniki: Avamina [10,56], Metcrean [11,03], Zenofor [11,65], Siofor® 500 [12,38], Formetic [12,55], **Etform 500 [15,50]**

Etform 850: tabl. powł. 850 mg - 60 szt.	Rx	100%	14,95
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	4,91
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Metformin hydrochloride** ATC: **A10BA02** wyk: **B** EAN ~ **698257**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca **WP**: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Sandoz GmbH**  
 Odpowiedniki: Avamina [12,50], Zenofor [13,07], Siofor® 850 [13,88], Formetic [13,93], Glucophage® 850 mg [13,94], Metformax® 850 [14,95], **Etform 850 [14,95]**

Etform 850: tabl. powł. 850 mg - 90 szt.	Rx	100%	21,76
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,99
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Metformin hydrochloride** ATC: **A10BA02** wyk: **B** EAN ~ **698271**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca **WP**: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Sandoz GmbH**  
 Odpowiedniki: Avamina [16,95], Metcrean [17,79], Zenofor [18,91], Siofor® 850 [20,29], Formetic [20,57], Metformax® 850 [21,76], **Etform 850 [21,76]**

Etform SR: tabl. o przedł. uwalnianiu 500 mg - 30 szt.	Rx	100%	6,76
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,07
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Metformin hydrochloride** ATC: **A10BA02** wyk: **B** EAN ~ **104925**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca **WP**: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Sandoz GmbH**  
 Odpowiedniki: Zenofor SR [6,57], **Etform SR [6,76]**, Metcrean XR [6,86], Siofor® XR 500 mg [7,71], Symformin XR [7,81], Avamina SR [9,31], Glucophage® XR [9,32], Metformax® SR 500 [9,48]

Etform SR: tabl. o przedł. uwalnianiu 500 mg - 60 szt.	Rx	100%	12,68
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	8,09
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Metformin hydrochloride** ATC: **A10BA02** wyk: **B** EAN ~ **104926**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca **WP**: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Sandoz GmbH**  
 Odpowiedniki: Diabufor XR [10,85], Ranmet XR [10,85], Zenofor SR [12,29], **Etform SR [12,68]**, Metcrean XR [12,89], Symformin XR [14,89], Avamina SR [17,25], Metformax® SR 500 [18,58], Glucophage® XR [18,87]

Etform SR: tabl. o przedł. uwalnianiu 500 mg - 120 szt.	Rx	100%	24,81
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	12,44
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Metformin hydrochloride** ATC: **A10BA02** wyk: **B** EAN ~ **104927**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca **WP**: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Sandoz GmbH**  
 Odpowiedniki: **Etform SR [24,81]**, Siofor® XR 500 mg [29,07], Avamina SR [30,07]

Etform SR: tabl. o przedł. uwalnianiu 750 mg - 30 szt.	Rx	100%	9,69
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,05
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Metformin hydrochloride** ATC: **A10BA02** wyk: **B** EAN ~ **104928**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca **WP**: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Sandoz GmbH**  
 Odpowiedniki: Zenofor SR [9,43], **Etform SR [9,69]**, Siofor® XR 750 mg [10,82], Symformin XR [11,26], Metformax® SR 750 [11,46], Avamina SR [13,07], Glucophage® XR [13,67]

Etform SR: tabl. o przedł. uwalnianiu 750 mg - 60 szt.	Rx	100%	18,84
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	10,36
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Metformin hydrochloride** ATC: **A10BA02** wyk: **B** EAN ~ **104929**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca **WP**: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Sandoz GmbH**  
 Odpowiedniki: Diabufor XR [16,01], Ranmet XR [16,01], Zenofor SR [18,27], **Etform SR [18,84]**, Symformin XR [22,16], Metformax® SR 750 [22,57], Avamina SR [24,11], Glucophage® XR [28,12]

Etform SR: tabl. o przedł. uwalnianiu 750 mg - 120 szt.	Rx	100%	36,54
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	17,98
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Metformin hydrochloride** ATC: **A10BA02** wyk: **B** EAN ~ **104930**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca **WP**: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Sandoz GmbH**  
 Odpowiedniki: **Etform SR [36,54]**, Siofor® XR 750 mg [41,32]

Etform SR: tabl. o przedł. uwalnianiu 1000 mg - 30 szt.	Rx	100%	12,68
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	8,09
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Metformin hydrochloride** ATC: **A10BA02** wyk: **B** EAN ~ **104931**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca **WP**: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Sandoz GmbH**  
 Odpowiedniki: Glucophage® XR [X], Zenofor SR [12,29], **Etform SR [12,68]**, Siofor® XR 1000 mg [14,27], Metformax® SR 1000 [14,79], Symformin XR [14,86], Avamina SR [16,50]

Etform SR: tabl. o przedł. uwalnianiu 1000 mg - 60 szt.	Rx	100%	24,81
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	12,44
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Metformin hydrochloride** ATC: **A10BA02** wyk: **B** EAN ~ **104932**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca **WP**: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Sandoz GmbH**  
 Odpowiedniki: Diabufor XR [21,05], Ranmet XR [21,05], Zenofor SR [24,04], **Etform SR [24,81]**, Metformax® SR 1000 [28,92], Symformin XR [29,21], Avamina SR [32,48], Glucophage® XR [37,21]

Etform SR: tabl. o przedł. uwalnianiu 1000 mg - 120 szt.	Rx	100%	47,92
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	23,18
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Metformin hydrochloride** ATC: **A10BA02** wyk: **B** EAN ~ **104933**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca **WP**: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Sandoz GmbH**  
 Odpowiedniki: **Etform SR [47,92]**, Siofor® XR 1000 mg [54,29]

Ethambutol Teva: kaps. 250 mg - 250 szt. ◆	Rx	100%	111,53
		Limit	111,53
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Ethambutol** ATC: **J04AK02** wyk: **B** EAN ~ **227310**  
 (1) Gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **D** **Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.**



Skuteczny przepływ

pentoxifylline  
**polfilin**  
 prolongatum

400 mg x 20 tabl. ♥ 400 mg x 60 tabl.

Etiagen: tabl. powł. 25 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	8,36
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,01
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Quetiapine** | ATC: N05AH04 | wyk: B | EAN ~ 806355  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z otępieniem(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Mylan Ireland Limited  
 Odpowiedniki: Kefrenex [X], Kwetina [7,32], Kventiax® [7,82], Bonogren [8,15], Pinexet [8,25], Etiagen [8,36], ApoTiapina [8,47], Ketilept® [8,47], Kwetaplex [8,56], Ketrel [8,58], Setinin [8,90]

Etiagen: tabl. powł. 100 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	48,06
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,85
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Quetiapine** | ATC: N05AH04 | wyk: B | EAN ~ 806362  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Mylan Ireland Limited  
 Odpowiedniki: Bonogren [44,28], Kefrenex [46,86], Etiagen [48,06], Kwetina [48,28], Setinin [48,66], Kventiax® [49,08], Ketilept® [50,16], Ketipinor® [51,37], Pinexet [51,71], ApoTiapina [51,72], Kwetaplex [52,86], Ketrel [54,46]

Etiagen: tabl. powł. 200 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	90,75
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,13
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Quetiapine** | ATC: N05AH04 | wyk: B | EAN ~ 806386  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Mylan Ireland Limited  
 Odpowiedniki: Bonogren [84,34], Kefrenex [88,34], Etiagen [90,75], Kwetina [91,21], Setinin [91,97], Kventiax® [92,82], Ketilept® [93,83], Ketipinor® [95,21], Pinexet [96,92], ApoTiapina [98,08], Kwetaplex [100,36], Ketrel [102,65]

Etiabax: tabl. 10 mg - 28 szt.	Rx	100%	13,27
		Limit	13,27
		30% <sup>(1)</sup>	3,98
		R <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Ezetimibe** | ATC: C10AX09 | wyk: B | EAN ~ 140230  
 (1) Leczenie uzupełniające w trakcie leczenia statyną lub włączane jednocześnie ze statyną albo leczenie w przypadku stwierdzenia nietolerancji co najmniej 2 statyn – jednej w najmniejszej początkowej dawce na dobę i drugiej w dowolnej dostępnej dawce przez okres leczenia nie krótszy niż 3 miesiące, w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego lub kolejnego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako co najmniej duże, wraz z działaniami mającymi na celu redukcję innych czynników ryzyka(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Ezetimibe Genoptim [13,26], Etiabax [13,27], Ezen [20,19], Ezehron [20,22]

Etiabax: tabl. 10 mg - 90 szt.	Rx	100%	38,72
		Limit	38,72
		30% <sup>(1)</sup>	11,62
		R <sup>(2)</sup>	5,34
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Ezetimibe** | ATC: C10AX09 | wyk: B | EAN ~ 140231  
 (1) Leczenie uzupełniające w trakcie leczenia statyną lub włączane jednocześnie ze statyną albo leczenie w przypadku stwierdzenia nietolerancji co najmniej 2 statyn – jednej w najmniejszej początkowej dawce na dobę i drugiej w dowolnej dostępnej dawce przez okres leczenia nie krótszy niż 3 miesiące, w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego lub kolejnego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako co najmniej duże, wraz z działaniami mającymi na celu redukcję innych czynników ryzyka(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.

Etopro®: tabl. powł. 25 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	10,76
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,34
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Topiramate** | ATC: N03AX11 | wyk: B | EAN ~ 061488  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka oporna na leczenie WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Bausch Health  
 Odpowiedniki: Eptoram [10,40], Etopro® [10,76], Topamax® [14,74]

Etopro®: tabl. powł. 50 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	20,53
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,49
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Topiramate** | ATC: N03AX11 | wyk: B | EAN ~ 061471  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka oporna na leczenie WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Bausch Health  
 Odpowiedniki: Eptoram [19,78], Topamax® [20,30], Etopro® [20,53]

Etopro®: tabl. powł. 100 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	39,23
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,96
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Topiramate** | ATC: N03AX11 | wyk: B | EAN ~ 061495  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka oporna na leczenie WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Bausch Health  
 Odpowiedniki: Eptoram [37,31], Topamax® [38,37], Etopro® [39,23]

Etopro®: tabl. powł. 200 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	73,40
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,66
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Topiramate** | ATC: N03AX11 | wyk: B | EAN ~ 061464  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka oporna na leczenie WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Bausch Health  
 Odpowiedniki: Topamax® [68,94], Eptoram [70,39], Etopro® [73,40]

Etruzil: tabl. powł. 2,5 mg - 30 szt.	Rx	100%	61,54
		Limit	56,72
		B <sup>(1)</sup>	4,82
		R <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Letrozole** | ATC: L02BG04 | wyk: A | EAN ~ 710201  
 (1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii WP: Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
 Egis Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Letrozole Bluefish [55,81], Letrozole Aurovitas [56,61], Aromek™ [56,72], Lametta® [56,72], Clarzo-le [61,54], Etruzil [61,54]

Etruzil: tabl. powł. 2,5 mg - 90 szt.	Rx	100%	156,03
		Limit	156,03
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Letrozole** | ATC: L02BG04 | wyk: A | EAN ~ 071025  
 (1) Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii, Rak piersi w II rzucie hormonoterapii WP: Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
 Egis Polska Sp. z o.o.

Euphyllin® Long: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde 200 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	8,71
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,21
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Theophylline** | ATC: R03DA04 | wyk: B | EAN ~ 967010  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Bradykardia u dzieci do 18 r.ż.(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Euphyllin® Long: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde 300 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	11,47
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	4,63
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Theophylline** | ATC: R03DA04 | wyk: B | EAN ~ 967011  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Bradykardia u dzieci do 18 r.ż.(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Euthyrox® N 25: tabl. 25 µg - 50 szt.	Rx	100%	6,82
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	6,82

INN: **Levothyroxine sodium** | ATC: H03AA01 | wyk: B | EAN ~ 051112  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Niedoczynność tarczycy(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: A  
 Merck Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Althyxin® [4,03], Euthyrox® N 25 [6,82], Letrox® 25 [7,57]

Euthyrox® N 25: tabl. 25 µg - 100 szt.	Rx	100%	9,51
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	8,52

INN: **Levothyroxine sodium** | ATC: H03AA01 | wyk: B | EAN ~ 051129  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Niedoczynność tarczycy(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: A  
 Merck Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Althyxin® [5,49], Euthyrox® N 25 [9,51]

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

Euthyrox® N 50: tabl. 50 µg - 50 szt.	Rx	100%	7,66
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	6,67
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Levothyroxine sodium</i>   ATC: H03AA01   wyk: B   EAN ~ 051211		(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Niedoczynność tarczycy (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A	
Odpowiedniki: Althyxin® [4,24], Eferox [4,53], Letrox® 50 [7,14], Euthyrox® N 50 [7,66]			
Euthyrox® N 50: tabl. 50 µg - 100 szt.	Rx	100%	13,73
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	8,91
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Levothyroxine sodium</i>   ATC: H03AA01   wyk: B   EAN ~ 051228		(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Niedoczynność tarczycy (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A	
Odpowiedniki: Eltroxin® [X], Althyxin® [5,68], Eferox [8,17], Euthyrox® N 50 [13,73]			
Euthyrox® N 75: tabl. 75 µg - 50 szt.	Rx	100%	8,75
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	5,67
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Levothyroxine sodium</i>   ATC: H03AA01   wyk: B   EAN ~ 051310		(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Niedoczynność tarczycy (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A	
Odpowiedniki: Althyxin® [6,33], Letrox® 75 [7,46], Euthyrox® N 75 [8,75]			
Euthyrox® N 75: tabl. 75 µg - 100 szt.	Rx	100%	15,26
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	8,02
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Levothyroxine sodium</i>   ATC: H03AA01   wyk: B   EAN ~ 051327		(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Niedoczynność tarczycy (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A	
Odpowiedniki: Althyxin® [11,79], Euthyrox® N 75 [15,26]			
Euthyrox® N 88 µg: tabl. 88 µg - 50 szt.	Rx	100%	9,28
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	5,11
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Levothyroxine sodium</i>   ATC: H03AA01   wyk: B   EAN ~ 718986		(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Niedoczynność tarczycy (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A	
Odpowiedniki: Althyxin® [11,79], Euthyrox® N 75 [15,26]			
Euthyrox® N 100: tabl. 100 µg - 50 szt.	Rx	100%	9,38
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	4,56
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Levothyroxine sodium</i>   ATC: H03AA01   wyk: B   EAN ~ 051419		(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Niedoczynność tarczycy (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A	
Odpowiedniki: Althyxin® [8,15], Eferox [8,17], Letrox® 100 [8,53], Euthyrox® N 100 [9,38]			
Euthyrox® N 100: tabl. 100 µg - 100 szt.	Rx	100%	16,80
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	7,16
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Levothyroxine sodium</i>   ATC: H03AA01   wyk: B   EAN ~ 051426		(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Niedoczynność tarczycy (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A	
Odpowiedniki: Eltroxin® [X], Althyxin® [15,27], Eferox [15,32], Euthyrox® N 100 [16,80]			

Euthyrox® N 112 µg: tabl. 112 µg - 50 szt.	Rx	100%	10,14
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	4,74
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Levothyroxine sodium</i>   ATC: H03AA01   wyk: B   EAN ~ 719006		(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Niedoczynność tarczycy (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A	
Odpowiedniki: Althyxin® [9,97], Letrox® 125 [10,00], Euthyrox® N 125 [10,90]			
Euthyrox® N 125: tabl. 125 µg - 50 szt.	Rx	100%	10,90
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	4,87
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Levothyroxine sodium</i>   ATC: H03AA01   wyk: B   EAN ~ 051518		(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Niedoczynność tarczycy (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A	
Odpowiedniki: Althyxin® [9,97], Letrox® 125 [10,00], Euthyrox® N 125 [10,90]			
Euthyrox® N 125: tabl. 125 µg - 100 szt.	Rx	100%	20,66
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	8,89
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Levothyroxine sodium</i>   ATC: H03AA01   wyk: B   EAN ~ 051525		(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Niedoczynność tarczycy (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A	
Odpowiedniki: Althyxin® [18,75], Euthyrox® N 125 [20,66]			
Euthyrox® N 137 µg: tabl. 137 µg - 50 szt.	Rx	100%	11,45
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	4,87
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Levothyroxine sodium</i>   ATC: H03AA01   wyk: B   EAN ~ 719037		(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Niedoczynność tarczycy (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A	
Odpowiedniki: Althyxin® [11,79], Euthyrox® N 75 [15,26]			
Euthyrox® N 150: tabl. 150 µg - 50 szt.	Rx	100%	12,41
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	5,33
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Levothyroxine sodium</i>   ATC: H03AA01   wyk: B   EAN ~ 051617		(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Niedoczynność tarczycy (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A	
Odpowiedniki: Althyxin® [11,79], Letrox® 150 [11,97], Euthyrox® N 150 [12,41]			
Euthyrox® N 150: tabl. 150 µg - 100 szt.	Rx	100%	22,57
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	10,67
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Levothyroxine sodium</i>   ATC: H03AA01   wyk: B   EAN ~ 051624		(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Niedoczynność tarczycy (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A	
Odpowiedniki: Althyxin® [22,24], Euthyrox® N 150 [22,57]			
Euthyrox® N 175: tabl. 175 µg - 50 szt.	Rx	100%	14,66
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	6,22
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Levothyroxine sodium</i>   ATC: H03AA01   wyk: B   EAN ~ 051716		(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Niedoczynność tarczycy (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A	
Odpowiedniki: Althyxin® [13,54], Euthyrox® N 175 [14,66]			





**ZOLPIC** Daj owcom odpocząć.  
zolidem



Euthyrox® N 200: tabl. 200 µg - 50 szt.	Rx	100%	16,02
		Limit	0,00
		c <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	7,11
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		
INN: <i>Levothyroxine sodium</i>	ATC: H03AA01	wyk: B	EAN ~ 051815
(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Niedoczynnosc tarczycy(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A			
Odpowiedniki: Althyxin® [15,27], Euthyrox® N 200 [16,02]			

EverCare: test diagnostyczny do szybkich oznaczeń - 50 szt.	WM	100%	38,80
		Limit	38,80
		30% <sup>(1)</sup>	11,64
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Glukoza we krwi</i>	ATC: V07AD	wyk: B	EAN ~ 480035
(1) Cukrzyca(2) Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej   Kat. ciąży: N			
Odpowiedniki: DIAVUE ToGo [35,43], OKmeter Core [35,43], Wellion SymPhar [36,63], G-BIO [37,55], Multisure GK [37,66], Everchek [37,77], Examedin® Fast [38,12], GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A [38,23], Cera-Chek 1 Code [38,33], VivaChek Ino [38,33], VivaChek Ino [38,33], One Touch Select Plus [38,35], GlucoCard 01 Sensor [38,66], Glucosense® [38,77], EverCare [38,80], GensuCare [38,80], Optium Xido [38,88], Contour Plus [39,09], Contour TS [39,09], iXell® [39,15], Abra [39,27], Accu-Chek® Performa [39,27], Diagnostic Gold Strip [39,49], Glucomaxx® [39,55]			

Everchek: test paskowy - 50 szt.	WM	100%	37,77
		Limit	37,77
		30% <sup>(1)</sup>	11,33
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Glukoza we krwi</i>	ATC: V07AD	wyk: B	EAN ~ 480356
(1) Cukrzyca(2) Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej   Kat. ciąży: N			
Odpowiedniki: DIAVUE ToGo [35,43], OKmeter Core [35,43], Wellion SymPhar [36,63], G-BIO [37,55], Multisure GK [37,66], Everchek [37,77], Examedin® Fast [38,12], GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A [38,23], Cera-Chek 1 Code [38,33], VivaChek Ino [38,33], VivaChek Ino [38,33], One Touch Select Plus [38,35], GlucoCard 01 Sensor [38,66], Glucosense® [38,77], EverCare [38,80], GensuCare [38,80], Optium Xido [38,88], Contour Plus [39,09], Contour TS [39,09], iXell® [39,15], Abra [39,27], Accu-Chek® Performa [39,27], Diagnostic Gold Strip [39,49], Glucomaxx® [39,55]			

Evertas: system transdermalny 4,6 mg/24 h - 30 szt. ◆	Rx	100%	69,04
		Limit	14,62
		30% <sup>(1)</sup>	58,81
		R <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>	ATC: N06DA03	wyk: B	EAN ~ 078386
(1) Choroba Alzheimera(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Rywastygmina Aurovitas/ApoteX [X], Evertas [69,04]			

Evertas: system transdermalny 9,5 mg/24 h - 30 szt. ◆	Rx	100%	140,83
		Limit	30,19
		30% <sup>(1)</sup>	119,70
		R <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>	ATC: N06DA03	wyk: B	EAN ~ 078454
(1) Choroba Alzheimera(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Rywastygmina Aurovitas/ApoteX [X], Evertas - (IR) [131,03], Evertas - (IR) [131,15], Evertas [140,83]			

Evertas: system transdermalny 13,3 mg/24 h - 30 sasz. ◆	Rx	100%	177,57
		Limit	42,27
		30% <sup>(1)</sup>	147,98
		R <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>	ATC: N06DA03	wyk: B	EAN ~ 147811
(1) Choroba Alzheimera(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Evertas [177,57], Exelon® [223,78]			

Evertas - (IR): system transdermalny 9,5 mg/24 h - 30 szt. ◆	Rx	100%	131,03
		Limit	30,19
		30% <sup>(1)</sup>	109,90
		R <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>	ATC: N06DA03	wyk: B	EAN ~ 142176
(1) Choroba Alzheimera(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Rywastygmina Aurovitas/ApoteX [X], Evertas - (IR) [131,03], Evertas - (IR) [131,15], Evertas [140,83]			

Evertas - (IR): system transdermalny 9,5 mg/24 h - 30 szt. ◆	Rx	100%	131,15
		Limit	30,19
		30% <sup>(1)</sup>	110,02
		R <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>	ATC: N06DA03	wyk: B	EAN ~ 143941
(1) Choroba Alzheimera(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Rywastygmina Aurovitas/ApoteX [X], Evertas - (IR) [131,03], Evertas - (IR) [131,15], Evertas [140,83]			

Examedin® Fast: test paskowy - 50 szt.	WM	100%	38,12
		Limit	38,12
		30% <sup>(1)</sup>	11,44
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Glukoza we krwi</i>	ATC: V07AD	wyk: B	EAN ~ 701848
(1) Cukrzyca(2) Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej   Kat. ciąży: Y			
Odpowiedniki: DIAVUE ToGo [35,43], OKmeter Core [35,43], Wellion SymPhar [36,63], G-BIO [37,55], Multisure GK [37,66], Everchek [37,77], Examedin® Fast [38,12], GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A [38,23], Cera-Chek 1 Code [38,33], VivaChek Ino [38,33], VivaChek Ino [38,33], One Touch Select Plus [38,35], GlucoCard 01 Sensor [38,66], Glucosense® [38,77], EverCare [38,80], GensuCare [38,80], Optium Xido [38,88], Contour Plus [39,09], Contour TS [39,09], iXell® [39,15], Abra [39,27], Accu-Chek® Performa [39,27], Diagnostic Gold Strip [39,49], Glucomaxx® [39,55]			

Exbol: tabl. powł. 37,5 mg+ 325 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	8,26
		Limit	7,10
		30% <sup>(1)</sup>	3,29
		R <sup>(2)</sup>	1,16
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tramadol hydrochloride + Paracetamol</i>	ATC: N02AX52	wyk: B	EAN ~ 971763
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Tramadol + Paracetamol Medreg [8,22], Exbol [8,26]			

Exbol: tabl. powł. 37,5 mg+ 325 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	15,53
		Limit	14,20
		30% <sup>(1)</sup>	5,59
		R <sup>(2)</sup>	1,33
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tramadol hydrochloride + Paracetamol</i>	ATC: N02AX52	wyk: B	EAN ~ 097179
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Tramadol + Paracetamol Medreg [15,50], Exbol [15,53]			

Exbol: tabl. powł. 37,5 mg+ 325 mg - 90 szt. ◆	Rx	100%	22,64
		Limit	21,30
		30% <sup>(1)</sup>	7,73
		R <sup>(2)</sup>	1,34
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tramadol hydrochloride + Paracetamol</i>	ATC: N02AX52	wyk: B	EAN ~ 047124
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Tramadol + Paracetamol Medreg [22,38], Exbol [22,64]			

Exelon®: system transdermalny 4,6 mg/24 h - 30 sasz. ◆	Rx-z	100%	85,37
		Limit	14,62
		30% <sup>(1)</sup>	75,14
		R <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>	ATC: N06DA03	wyk: B	EAN ~ 066704
(1) Choroba Alzheimera(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Rywastygmina Aurovitas/ApoteX [X], Evertas - (IR) [131,03], Evertas - (IR) [131,15], Evertas [140,83]			

Exelon®: system transdermalny 9,5 mg/24 h - 30 sasz. ◆	Rx-z	100%	161,50
		Limit	30,19
		30% <sup>(1)</sup>	140,37
		R <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>	ATC: N06DA03	wyk: B	EAN ~ 066704
(1) Choroba Alzheimera(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Rywastygmina Aurovitas/ApoteX [X], Evertas - (IR) [131,03], Evertas - (IR) [131,15], Evertas [140,83]			

Exelon®: system transdermalny 13,3 mg/24 h - 30 sasz. ◆	Rx-z	100%	223,78
		Limit	42,27
		30% <sup>(1)</sup>	194,19
		R <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>	ATC: N06DA03	wyk: B	EAN ~ 032609
(1) Choroba Alzheimera(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Evertas [177,57], Exelon® [223,78]			

Explemed: tabl. 15 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	106,21
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	8,83
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Aripiprazole</i>	ATC: N05AX12	wyk: B	EAN ~ 236946
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Aripiprazole Glenmark [X], Abilify® - (IR) [86,03], Abilify® - (IR) [86,05], Aripiprazole Orion [87,65], Aricogon [96,93], Arpixor [97,91], Apiprax [100,14], Aribit [100,98], Asduter [100,98], Abilify® [105,54], Aripilek [106,09], Explemed [106,21], Apra [109,87], Aripiprazole Aurovitas [120,09], Aryzalera [122,62], Aripiprazole Sandoz [125,84]			

Explemed: tabl. 15 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	106,21
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	8,83
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Aripiprazole</i>	ATC: N05AX12	wyk: B	EAN ~ 236946
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Aripiprazole Glenmark [X], Abilify® - (IR) [86,03], Abilify® - (IR) [86,05], Aripiprazole Orion [87,65], Aricogon [96,93], Arpixor [97,91], Apiprax [100,14], Aribit [100,98], Asduter [100,98], Abilify® [105,54], Aripilek [106,09], Explemed [106,21], Apra [109,87], Aripiprazole Aurovitas [120,09], Aryzalera [122,62], Aripiprazole Sandoz [125,84]			

Explemed: tabl. 15 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	201,22
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,03
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Aripiprazole</i>		ATC: N05AX12	wyk: B EAN ~ 236953
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Abilify® - (IR) [162,19], Abilify® - (IR) [162,23], Arpixon [185,95], Abilify® [201,16], Apra [201,22], Aribit [201,22], Aripilek [201,22], Explemed [201,22], Aryzalera [235,37], Aripiprazole Sandoz [243,23]			
Exfuber Ag+: opatrunek specjalistyczny 2x45 cm - 1 szt.	WM	100%	20,96
		Limit	20,45
		30% <sup>(1)</sup>	6,65
		EAN ~ 015115	
INN: <i>Emplastr antybiotyczny</i>		ATC: V20AA	wyk: EAN ~ 015115
(1) Rany przewlekłe z równoczesnym ubytkiem tkankowym (tj. rany głębokie) z cechami infekcji, ze średnim i dużym wysiękiem o różnej etiologii   Kat. ciąży: N			
Odpowiedniki: Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.			
Exfuber Ag+: opatrunek specjalistyczny 4,5x10 cm - 1 szt.	WM	100%	22,93
		Limit	10,23
		30% <sup>(1)</sup>	15,77
		EAN ~ 015119	
INN: <i>Emplastr antybiotyczny</i>		ATC: V20AA	wyk: EAN ~ 015119
(1) Rany przewlekłe z równoczesnym ubytkiem tkankowym (tj. rany głębokie) z cechami infekcji, ze średnim i dużym wysiękiem o różnej etiologii   Kat. ciąży: N			
Odpowiedniki: Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.			
Exfuber Ag+: opatrunek specjalistyczny 4,5x30 cm - 1 szt.	WM	100%	30,29
		Limit	30,29
		30% <sup>(1)</sup>	9,09
		EAN ~ 015121	
INN: <i>Emplastr antybiotyczny</i>		ATC: V20AA	wyk: EAN ~ 015121
(1) Rany przewlekłe z równoczesnym ubytkiem tkankowym (tj. rany głębokie) z cechami infekcji, ze średnim i dużym wysiękiem o różnej etiologii   Kat. ciąży: N			
Odpowiedniki: Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.			
Exfuber Ag+: opatrunek specjalistyczny 5x5 cm - 1 szt.	WM	100%	11,61
		Limit	5,68
		30% <sup>(1)</sup>	7,63
		EAN ~ 015116	
INN: <i>Emplastr antybiotyczny</i>		ATC: V20AA	wyk: EAN ~ 015116
(1) Rany przewlekłe z równoczesnym ubytkiem tkankowym (tj. rany głębokie) z cechami infekcji, ze średnim i dużym wysiękiem o różnej etiologii   Kat. ciąży: N			
Odpowiedniki: Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.			
Exfuber Ag+: opatrunek specjalistyczny 10x10 cm - 1 szt.	WM	100%	23,14
		Limit	22,72
		30% <sup>(1)</sup>	7,24
		EAN ~ 015117	
INN: <i>Emplastr antybiotyczny</i>		ATC: V20AA	wyk: EAN ~ 015117
(1) Rany przewlekłe z równoczesnym ubytkiem tkankowym (tj. rany głębokie) z cechami infekcji, ze średnim i dużym wysiękiem o różnej etiologii   Kat. ciąży: N			
Odpowiedniki: Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.			
Exfuber Ag+: opatrunek specjalistyczny 15x15 cm - 1 szt.	WM	100%	48,15
		Limit	48,15
		30% <sup>(1)</sup>	14,45
		EAN ~ 015118	
INN: <i>Emplastr antybiotyczny</i>		ATC: V20AA	wyk: EAN ~ 015118
(1) Rany przewlekłe z równoczesnym ubytkiem tkankowym (tj. rany głębokie) z cechami infekcji, ze średnim i dużym wysiękiem o różnej etiologii   Kat. ciąży: N			
Odpowiedniki: Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.			
Exfuber Ag+: opatrunek specjalistyczny 20x30 cm - 1 szt.	WM	100%	117,93
		Limit	117,93
		30% <sup>(1)</sup>	35,38
		EAN ~ 015122	
INN: <i>Emplastr antybiotyczny</i>		ATC: V20AA	wyk: EAN ~ 015122
(1) Rany przewlekłe z równoczesnym ubytkiem tkankowym (tj. rany głębokie) z cechami infekcji, ze średnim i dużym wysiękiem o różnej etiologii   Kat. ciąży: N			
Odpowiedniki: Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.			
Exfuber Ag+: opatrunek specjalistyczny 20x4,5 cm - 1 szt.	WM	100%	20,96
		Limit	20,45
		30% <sup>(1)</sup>	6,65
		EAN ~ 015120	
INN: <i>Emplastr antybiotyczny</i>		ATC: V20AA	wyk: EAN ~ 015120
(1) Rany przewlekłe z równoczesnym ubytkiem tkankowym (tj. rany głębokie) z cechami infekcji, ze średnim i dużym wysiękiem o różnej etiologii   Kat. ciąży: N			
Odpowiedniki: Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.			
Ezechron: tabl. 10 mg - 28 szt.	Rx	100%	20,22
		Limit	13,28
		30% <sup>(1)</sup>	9,83
		EAN ~ 347161	
INN: <i>Ezetimibe</i>		ATC: C10AX09	wyk: B EAN ~ 347161
(1) Leczenie uzupełniające w trakcie leczenia statyną lub włączone jednocześnie ze statyną albo leczenie w przypadku stwierdzenia nietolerancji co najmniej 2 statyn – jednej w najmniejszej początkowej dawce na dobę i drugiej w dowolnej dostępnej dawce przez okres leczenia nie krótszy niż 3 miesiące, w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego lub kolejnego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako co najmniej duże, wraz z działaniami mającymi na celu redukcję innych czynników ryzyka (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Ezetimibe Genoptim [13,26], Etibax [13,27], Ezen [20,19], Ezechron [20,22]			
Ezechron Duo: tabl. 5/10 mg - 28 szt.	Rx	100%	24,75
		Limit	13,28
		30% <sup>(1)</sup>	13,90
		EAN ~ 003321	
INN: <i>Rosuvastatin + Ezetimibe</i>		ATC: C10BA06	wyk: B EAN ~ 003321
(1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Adamed Sp. z o.o.			

Ezechron Duo: tabl. 5/10 mg - 56 szt.	Rx	100%	48,25
		Limit	26,56
		30% <sup>(1)</sup>	26,69
		EAN ~ 003338	
INN: <i>Rosuvastatin + Ezetimibe</i>		ATC: C10BA06	wyk: B EAN ~ 003338
(1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Adamed Sp. z o.o.			
Ezechron Duo: tabl. 10/10 mg - 28 szt.	Rx	100%	24,75
		Limit	13,28
		30% <sup>(1)</sup>	13,90
		EAN ~ 003352	
INN: <i>Rosuvastatin + Ezetimibe</i>		ATC: C10BA06	wyk: B EAN ~ 003352
(1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Adamed Sp. z o.o.			
Ezechron Duo: tabl. 10/10 mg - 56 szt.	Rx	100%	48,25
		Limit	26,56
		30% <sup>(1)</sup>	26,69
		EAN ~ 003369	
INN: <i>Rosuvastatin + Ezetimibe</i>		ATC: C10BA06	wyk: B EAN ~ 003369
(1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Adamed Sp. z o.o.			
Ezechron Duo: tabl. 20/10 mg - 28 szt.	Rx	100%	24,75
		Limit	13,28
		30% <sup>(1)</sup>	13,90
		EAN ~ 003383	
INN: <i>Rosuvastatin + Ezetimibe</i>		ATC: C10BA06	wyk: B EAN ~ 003383
(1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Adamed Sp. z o.o.			
Ezechron Duo: tabl. 20/10 mg - 56 szt.	Rx	100%	48,25
		Limit	26,56
		30% <sup>(1)</sup>	26,69
		EAN ~ 003390	
INN: <i>Rosuvastatin + Ezetimibe</i>		ATC: C10BA06	wyk: B EAN ~ 003390
(1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Adamed Sp. z o.o.			
Ezen: tabl. 10 mg - 28 szt.	Rx	100%	20,19
		Limit	13,28
		30% <sup>(1)</sup>	10,89
		EAN ~ 096229	
INN: <i>Ezetimibe</i>		ATC: C10AX09	wyk: B EAN ~ 096229
(1) Leczenie uzupełniające w trakcie leczenia statyną lub włączone jednocześnie ze statyną albo leczenie w przypadku stwierdzenia nietolerancji co najmniej 2 statyn – jednej w najmniejszej początkowej dawce na dobę i drugiej w dowolnej dostępnej dawce przez okres leczenia nie krótszy niż 3 miesiące, w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego lub kolejnego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako co najmniej duże, wraz z działaniami mającymi na celu redukcję innych czynników ryzyka (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Ezetimibe Genoptim [13,26], Etibax [13,27], Ezen [20,19], Ezechron [20,22]			
Ezetimibe Genoptim: tabl. 10 mg - 28 szt.	Rx	100%	13,26
		Limit	13,26
		30% <sup>(1)</sup>	3,98
		EAN ~ 141445	
INN: <i>Ezetimibe</i>		ATC: C10AX09	wyk: B EAN ~ 141445
(1) Leczenie uzupełniające w trakcie leczenia statyną lub włączone jednocześnie ze statyną albo leczenie w przypadku stwierdzenia nietolerancji co najmniej 2 statyn – jednej w najmniejszej początkowej dawce na dobę i drugiej w dowolnej dostępnej dawce przez okres leczenia nie krótszy niż 3 miesiące, w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego lub kolejnego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako co najmniej duże, wraz z działaniami mającymi na celu redukcję innych czynników ryzyka (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Ezetimibe Genoptim [13,26], Etibax [13,27], Ezen [20,19], Ezechron [20,22]			
Ezoleta: tabl. 10 mg - 30 szt.	Rx	100%	14,23
		Limit	14,23
		30% <sup>(1)</sup>	4,27
		EAN ~ 311407	
INN: <i>Ezetimibe</i>		ATC: C10AX09	wyk: B EAN ~ 311407
(1) Leczenie uzupełniające w trakcie leczenia statyną lub włączone jednocześnie ze statyną albo leczenie w przypadku stwierdzenia nietolerancji co najmniej 2 statyn – jednej w najmniejszej początkowej dawce na dobę i drugiej w dowolnej dostępnej dawce przez okres leczenia nie krótszy niż 3 miesiące, w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego lub kolejnego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako co najmniej duże, wraz z działaniami mającymi na celu redukcję innych czynników ryzyka (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Ezoleta [14,23], LIPEGIS [23,34], Esetin [23,39]			



Naszym wyborem **enarenal**  
enalaprilii maleas

<b>Famogast®: tabl. powł. 40 mg - 30 szt.</b>	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	14,20 0,00 bezpł. 4,03 bezpł.
INN: <b>Famotidine</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>	ATC: <b>A02BA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>014835</b> Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
<b>Famogast®: tabl. powł. 40 mg - 60 szt.</b>	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	25,84 0,00 bezpł. 5,76 bezpł.
INN: <b>Famotidine</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>	ATC: <b>A02BA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>014828</b> Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
<b>Fanipos: aerozol do nosa 50 µg/dawkę - 1 poj. (120 dawek)</b>	Rx	100% Limit 50% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	16,22 12,87 9,79 bezpł. bezpł.
INN: <b>Fluticason propionate</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: <b>R01AD08</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>570720</b> Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
<b>Fanipos: aerozol do nosa 50 µg/dawkę - 2 poj. (120 dawek)</b>	Rx	100% Limit 50% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	31,22 25,73 18,36 bezpł. bezpł.
INN: <b>Fluticason propionate</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: <b>R01AD08</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>660371</b> Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
<b>Faxigen XL: kaps. o przedl. uwalnianiu 37,5 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	11,02 10,92 3,38 bezpł. bezpł.
INN: <b>Venlafaxine</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe <b>WP</b> : Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: <b>N06AX16</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>721498</b> Mylan Ireland Limited
<b>Odpowiedniki</b> : Symfaksin ER <sup>®</sup> [10,37], Oriven [10,53], Faxigen XL [11,02], Efevelon SR [11,39], Lafactin [12,03], Velaxin <sup>®</sup> ER 37,5 [12,56], Venlectine [12,69], Alventa <sup>®</sup> [12,77], Venlafaxine Apotex [12,82], Faxelet ER [13,10], Axxyen [13,37], Prefaxine [13,80]			
<b>Faxigen XL: kaps. o przedl. uwalnianiu 75 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	20,62 20,62 6,19 bezpł. bezpł.
INN: <b>Venlafaxine</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe <b>WP</b> : Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: <b>N06AX16</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>721504</b> Mylan Ireland Limited
<b>Odpowiedniki</b> : Venlafaxine Bluefish XL [17,37], Alventa <sup>®</sup> - (IR) [17,75], Symfaksin ER <sup>®</sup> [19,46], Oriven [19,60], Faxigen XL [20,62], Lafactin [22,78], Alventa <sup>®</sup> [23,03], Efevelon SR [23,60], Velaxin <sup>®</sup> ER 75 [23,91], Venlectine [24,18], Venlafaxine Apotex [24,46], Faxelet ER [24,62], Axxyen [25,04], Efectin <sup>®</sup> ER 75 [25,55], Prefaxine [26,50]			
<b>Faxigen XL: kaps. o przedl. uwalnianiu 150 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	38,30 38,30 11,49 bezpł. bezpł.
INN: <b>Venlafaxine</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe <b>WP</b> : Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: <b>N06AX16</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>721528</b> Mylan Ireland Limited
<b>Odpowiedniki</b> : Venlafaxine Bluefish XL [31,86], Symfaksin ER <sup>®</sup> [32,21], Alventa <sup>®</sup> - (IR) [32,27], Oriven [32,80], Faxigen XL [38,30], Lafactin [42,60], Alventa <sup>®</sup> [43,10], Efevelon SR [44,25], Efectin <sup>®</sup> ER 150 [44,82], Velaxin <sup>®</sup> ER 150 [44,84], Venlectine [45,62], Axxyen [46,26], Venlafaxine Apotex [46,77], Faxelet ER [47,11], Prefaxine [50,06]			
<b>Faxolet ER: kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde 37,5 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	13,10 10,92 5,46 bezpł. bezpł.
INN: <b>Venlafaxine</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe <b>WP</b> : Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: <b>N06AX16</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>691760</b> Adamed Sp. z o.o.
<b>Odpowiedniki</b> : Symfaksin ER <sup>®</sup> [10,37], Oriven [10,53], Faxigen XL [11,02], Efevelon SR [11,39], Lafactin [12,03], Velaxin <sup>®</sup> ER 37,5 [12,56], Venlectine [12,69], Alventa <sup>®</sup> [12,77], Venlafaxine Apotex [12,82], Faxelet ER [13,10], Axxyen [13,37], Prefaxine [13,80]			
<b>Faxolet ER: kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde 75 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	24,62 21,84 9,33 bezpł. bezpł.
INN: <b>Venlafaxine</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe <b>WP</b> : Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: <b>N06AX16</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>691906</b> Adamed Sp. z o.o.
<b>Odpowiedniki</b> : Venlafaxine Bluefish XL [17,37], Alventa <sup>®</sup> - (IR) [17,75], Symfaksin ER <sup>®</sup> [19,46], Oriven [19,60], Faxigen XL [20,62], Lafactin [22,78], Alventa <sup>®</sup> [23,03], Efevelon SR [23,60], Velaxin <sup>®</sup> ER 75 [23,91], Venlectine [24,18], Venlafaxine Apotex [24,46], Faxelet ER [24,62], Axxyen [25,04], Efectin <sup>®</sup> ER 75 [25,55], Prefaxine [26,50]			
<b>Faxolet ER: kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde 150 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	47,11 43,68 16,53 bezpł. bezpł.
INN: <b>Venlafaxine</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe <b>WP</b> : Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: <b>N06AX16</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>691883</b> Adamed Sp. z o.o.
<b>Odpowiedniki</b> : Venlafaxine Bluefish XL [31,86], Symfaksin ER <sup>®</sup> [32,21], Alventa <sup>®</sup> - (IR) [32,27], Oriven [32,80], Faxigen XL [38,30], Lafactin [42,60], Alventa <sup>®</sup> [43,10], Efevelon SR [44,25], Efectin <sup>®</sup> ER 150 [44,82], Velaxin <sup>®</sup> ER 150 [44,84], Venlectine [45,62], Axxyen [46,26], Venlafaxine Apotex [46,77], Faxelet ER [47,11], Prefaxine [50,06]			
<b>Febrofen®: kaps. o przedl. uwalnianiu 200 mg - 20 szt.</b>	Rx	100% Limit 50% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	18,51 13,63 11,70 bezpł. bezpł.
INN: <b>Ketoprofen</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP</b> : Ból w przebiegu chorób nowotworowych - w przypadkach innych niż określone w ChPL(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:B, T2:B, T3:D</b>	ATC: <b>M01AE03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>413317</b> Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
<b>Febuxostat Aurovitas: tabl. powł. 80 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	33,86 20,20 19,72 bezpł. bezpł.
INN: <b>Febuxostat</b> (1) Leczenie przewlekłej hiperurykემii u dorosłych pacjentów w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złogów moczanowych, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: <b>M04AA03</b>	wyk:	EAN ~ <b>139187</b> Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
<b>Odpowiedniki</b> : Prohidna [33,86], Febuxostat Aurovitas [33,86], Febuxostat Krka [35,36], Denofix [35,40], Adenuric <sup>®</sup> [46,68]			
<b>Faxigen XL: kaps. o przedl. uwalnianiu 150 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	38,30 38,30 11,49 bezpł. bezpł.
INN: <b>Venlafaxine</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe <b>WP</b> : Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: <b>N06AX16</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>721528</b> Mylan Ireland Limited
<b>Odpowiedniki</b> : Venlafaxine Bluefish XL [31,86], Symfaksin ER <sup>®</sup> [32,21], Alventa <sup>®</sup> - (IR) [32,27], Oriven [32,80], Faxigen XL [38,30], Lafactin [42,60], Alventa <sup>®</sup> [43,10], Efevelon SR [44,25], Efectin <sup>®</sup> ER 150 [44,82], Velaxin <sup>®</sup> ER 150 [44,84], Venlectine [45,62], Axxyen [46,26], Venlafaxine Apotex [46,77], Faxelet ER [47,11], Prefaxine [50,06]			
<b>Febuxostat Aurovitas: tabl. powł. 120 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	49,94 30,31 28,72 34,79 bezpł.
INN: <b>Febuxostat</b> (1) Leczenie przewlekłej hiperurykémii u dorosłych pacjentów w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złogów moczanowych, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych(2) Zapobieganie i leczenie przewlekłej hiperurykémii u dorosłych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: <b>M04AA03</b>	wyk:	EAN ~ <b>139194</b> Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
<b>Odpowiedniki</b> : Febuxostat Aurovitas [49,94], Adenuric <sup>®</sup> [51,11], Febuxostat Krka [52,22], Denofix [52,25]			
<b>Febuxostat Krka: tabl. powł. 80 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	35,36 20,20 21,22 bezpł.
INN: <b>Febuxostat</b> (1) Leczenie przewlekłej hiperurykémii u dorosłych pacjentów w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złogów moczanowych, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: <b>M04AA03</b>	wyk:	EAN ~ <b>970515</b> Krka Polska Sp. z o.o.
<b>Odpowiedniki</b> : Febuxostat Aurovitas [33,86], Prohidna [33,86], Febuxostat Krka [35,36], Denofix [35,40], Adenuric <sup>®</sup> [46,68]			

<b>Febuxostat Krka:</b> tabl. powł. 120 mg - 28 szt. ◆		Rx	100% 52,22 Limit 30,31 30% <sup>(1)</sup> 31,00 50% <sup>(2)</sup> 37,07 S <sup>(3)</sup> bezpl.	<b>Fentanyl Actavis:</b> system transdermalny 75 µg/h - 10 szt. (12,375 mg w plastrze) ◆		Rx-w	100% 191,31 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 4,80 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Febuxostat</i>	ATC: M04AA03	wyk: EAN ~ 970514	(1) Leczenie przewlekłej hiperurykემii u dorosłych pacjentów w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złogów moczianowych, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych (2) Zapobieganie i leczenie przewlekłej hiperurykემii u dorosłych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		INN: <i>Fentanyl</i>	ATC: N02AB03	wyk: N EAN ~ 204846
Odpowiedniki: Febuxostat Aurovitas [49,94], Adenuric® [51,11], Febuxostat Krka [52,22], Denofix [52,25]		Krka Polska Sp. z o.o.		(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia, Nowotwory złośliwe, Neuralgia popółpaścowa przewlekła (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		Actavis Group PTC ehf.	
<b>Femoston® conti:</b> tabl. powł. 1 mg+ 5 mg - 28 szt.		Rx	100% 26,53 Limit 16,23 30% <sup>(1)</sup> 15,17 S <sup>(2)</sup> bezpl.	<b>Fentanyl Actavis:</b> system transdermalny 100 µg/h - 5 szt. (16,5 mg w plastrze) ◆		Rx-w	100% 129,58 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 3,20 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Estradiol + Dydrogesterone</i>	ATC: G03FA14	wyk: B EAN ~ 973316	(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X		INN: <i>Fentanyl</i>	ATC: N02AB03	wyk: N EAN ~ 000098
Odpowiedniki: Femoston Aurovitas [49,94], Adenuric® [51,11], Femoston Krka [52,22], Denofix [52,25]		Mylan Healthcare Sp. z o.o.		(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Nowotwory złośliwe, Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		Actavis Group PTC ehf.	
<b>Fenardin®:</b> kaps. twarde 160 mg - 30 szt.		Rx	100% 21,43 Limit 19,00 30% <sup>(1)</sup> 8,13 S <sup>(2)</sup> bezpl.	<b>Fentanyl Actavis:</b> system transdermalny 100 µg/h - 10 szt. (16,5 mg w plastrze) ◆		Rx-w	100% 251,09 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 6,40 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Fenofibrate</i>	ATC: C10AB05	wyk: B EAN ~ 713974	(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		INN: <i>Fentanyl</i>	ATC: N02AB03	wyk: N EAN ~ 204853
Odpowiedniki: Grofibrat® S [19,34], Fenardin® [21,43], Lipanthyl® Supra 160 [24,41]		Bausch Health		(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia, Nowotwory złośliwe, Neuralgia popółpaścowa przewlekła (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		Actavis Group PTC ehf.	
<b>Fenardin®:</b> kaps. twarde 267 mg - 30 szt.		Rx	100% 27,96 Limit 25,36 30% <sup>(1)</sup> 10,21 S <sup>(2)</sup> bezpl.	<b>Fevarin®:</b> tabl. powł. 50 mg - 60 szt. ◆		Rx	100% 38,39 Limit 14,11 30% <sup>(1)</sup> 28,51 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Fenofibrate</i>	ATC: C10AB05	wyk: B EAN ~ 611065	(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		INN: <i>Fluvoxamine maleate</i>	ATC: N06AB08	wyk: B EAN ~ 347728
Odpowiedniki: Grofibrat® M [26,60], Biofibrat® [27,77], Fenardin® [27,96], Lipanthyl® 267M [32,02]		Bausch Health		(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		Mylan Healthcare Sp. z o.o.	
<b>Fentanyl Actavis:</b> system transdermalny 25 µg/h - 10 szt. (4,125 mg w plastrze) ◆		Rx-w	100% 71,43 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 3,20 S <sup>(3)</sup> bezpl.	<b>Fentanyl Actavis:</b> system transdermalny 50 µg/h - 5 szt. (8,25 mg w plastrze) ◆		Rx	100% 38,39 Limit 14,11 30% <sup>(1)</sup> 28,51 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Fentanyl</i>	ATC: N02AB03	wyk: N EAN ~ 204822	(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Nowotwory złośliwe, Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		INN: <i>Fluvoxamine maleate</i>	ATC: N06AB08	wyk: B EAN ~ 347827
Odpowiedniki: Actavis Group PTC ehf.		Mylan Healthcare Sp. z o.o.		(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		Mylan Healthcare Sp. z o.o.	
<b>Fentanyl Actavis:</b> system transdermalny 50 µg/h - 5 szt. (8,25 mg w plastrze) ◆		Rx-w	100% 69,26 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 3,20 S <sup>(3)</sup> bezpl.	<b>Fiasp®:</b> inj. [roztw.] 100 j/ml - 1 fiol. 10 ml		Rx	100% 80,99 Limit 0,00 C <sup>(1)</sup> bezpl. DZ <sup>(2)</sup> bezpl. R <sup>(3)</sup> 17,00 S <sup>(4)</sup> bezpl.
INN: <i>Fentanyl</i>	ATC: N02AB03	wyk: N EAN ~ 000050	(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Nowotwory złośliwe, Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		INN: <i>Insulin aspart</i>	ATC: A10AB05	wyk: B EAN ~ 137805
Odpowiedniki: Actavis Group PTC ehf.		Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.		(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca typu I (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A		Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.	
<b>Fentanyl Actavis:</b> system transdermalny 50 µg/h - 10 szt. (8,25 mg w plastrze) ◆		Rx-w	100% 132,22 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 3,20 S <sup>(3)</sup> bezpl.	<b>Fiasp®:</b> inj. [roztw.] 100 j/ml - 5 wkł. 3 ml		Rx	100% 129,32 Limit 0,00 C <sup>(1)</sup> bezpl. DZ <sup>(2)</sup> bezpl. R <sup>(3)</sup> 32,54 S <sup>(4)</sup> bezpl.
INN: <i>Fentanyl</i>	ATC: N02AB03	wyk: N EAN ~ 204839	(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia, Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		INN: <i>Insulin aspart</i>	ATC: A10AB05	wyk: B EAN ~ 130629
Odpowiedniki: Actavis Group PTC ehf.		Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.		(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca typu I (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A		Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.	
<b>Fentanyl Actavis:</b> system transdermalny 75 µg/h - 5 szt. (12,375 mg w plastrze) ◆		Rx-w	100% 99,12 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 3,20 S <sup>(3)</sup> bezpl.	<b>Fibracol Plus:</b> opatrunek leczniczy 10,2x22,2 cm - 1 szt.		WM	100% 138,57 Limit 138,57 30% <sup>(1)</sup> 41,57 R <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Fentanyl</i>	ATC: N02AB03	wyk: N EAN ~ 000081	(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia, Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		INN: <i>Emplastri collagenosa</i>	ATC: V20AA	wyk: EAN ~ 800110
Odpowiedniki: Actavis Group PTC ehf.		Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.		(1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N		Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.	



<b>Fibracol Plus:</b> opatrunek leczniczy <b>10,2x11,1 cm</b> - 1 szt.	WM 100% <b>76,18</b> Limit <b>69,29</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>27,68</b> B <sup>(2)</sup> <b>6,89</b>	<b>Finaster®:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 120 szt.	Rx 100% <b>104,55</b> Limit <b>104,55</b> R <sup>(1)</sup> <b>12,80</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpl.</b>
INN: <i>Emplastrum collagenosum</i> ATC: V20AA wyk: EAN ~ 800109 (1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.	INN: <i>Finasteride</i> ATC: G04CB01 wyk: B EAN ~ 207311 (1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.		
<b>Finamef:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 30 szt.	Rx 100% <b>30,07</b> Limit <b>26,72</b> R <sup>(1)</sup> <b>6,55</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpl.</b>	<b>Finasterid Stada:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 30 szt.	Rx 100% <b>24,03</b> Limit <b>24,03</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>7,21</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpl.</b>
INN: <i>Finasteride</i> ATC: G04CB01 wyk: B EAN ~ 713127 (1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Finahit [X], Finaride [X], Finasteridum Bluefish [22,20], Finasterid Stada [24,01], Finamef - (IR) [26,17], Uroneyzr [27,24], Finaran [28,33], Symasteride [28,38], Finpros [28,45], Penester® [29,58], Hyplafin [29,82], Antiprost [29,85], Adaster [29,86], Androster [30,02], <b>Finamef [30,07]</b> , Apo-Fina [30,11], Finaster® [30,19]	INN: <i>Dutasteride</i> ATC: G04CB02 wyk: EAN ~ 146049 (1) Leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Findarts [24,03], Adadut [30,20]		
<b>Finamef:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 90 szt.	Rx 100% <b>82,11</b> Limit <b>80,15</b> R <sup>(1)</sup> <b>11,56</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpl.</b>	<b>Findarts:</b> kaps. miękkie <b>0,5 mg</b> - 30 szt.	Rx 100% <b>63,98</b> Limit <b>63,98</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>19,19</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpl.</b>
INN: <i>Finasteride</i> ATC: G04CB01 wyk: B EAN ~ 713141 (1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Finahit [X], Finasteridum Bluefish [58,50], Finasterid Stada [62,95], Symasteride [73,12], Penester® [79,74], Finaster® [80,15], Apo-Fina [80,81], Adaster [81,49], Androster [81,97], <b>Finamef [82,11]</b>	INN: <i>Dutasteride</i> ATC: G04CB02 wyk: EAN ~ 146050 (1) Leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.		
<b>Finamef - (IR):</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 30 szt.	Rx 100% <b>26,17</b> Limit <b>26,17</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpl.</b>	<b>Findarts Duo:</b> kaps. twarde <b>0,5 mg+ 0,4 mg</b> - 30 szt. w but.	Rx 100% <b>31,00</b> Limit <b>28,23</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>11,24</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpl.</b>
INN: <i>Finasteride</i> ATC: G04CB01 wyk: B EAN ~ 282288 (1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Delfarma Sp. z o.o. Odpowiedniki: Finahit [X], Finaride [X], Finasteridum Bluefish [22,20], Finasterid Stada [24,01], Finamef - (IR) [26,17], Uroneyzr [27,24], Finaran [28,33], Symasteride [28,38], Finpros [28,45], Penester® [29,58], Hyplafin [29,82], Antiprost [29,85], Adaster [29,86], Androster [30,02], Finamef [30,07], Apo-Fina [30,11], Finaster® [30,19]	INN: <i>Dutasteride + Tamsulosin hydrochloride</i> ATC: G04CA52 wyk: EAN ~ 143871 (1) Leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.		
<b>Finaran:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 30 szt.	Rx 100% <b>28,33</b> Limit <b>26,72</b> R <sup>(1)</sup> <b>4,81</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpl.</b>	<b>Findarts Duo:</b> kaps. twarde <b>0,5 mg+ 0,4 mg</b> - 90 szt. w but.	Rx 100% <b>84,68</b> Limit <b>84,68</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>25,40</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpl.</b>
INN: <i>Finasteride</i> ATC: G04CB01 wyk: B EAN ~ 082391 (1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. Odpowiedniki: Finahit [X], Finaride [X], Finasteridum Bluefish [22,20], Finasterid Stada [24,01], Finamef - (IR) [26,17], Uroneyzr [27,24], Finaran [28,33], Symasteride [28,38], Finpros [28,45], Penester® [29,58], Hyplafin [29,82], Antiprost [29,85], Adaster [29,86], Androster [30,02], Finamef [30,07], Apo-Fina [30,11], Finaster® [30,19]	INN: <i>Dutasteride + Tamsulosin hydrochloride</i> ATC: G04CA52 wyk: EAN ~ 143874 (1) Leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.		
<b>Finasteridum Bluefish:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 30 szt.	Rx 100% <b>22,20</b> Limit <b>22,20</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpl.</b>	<b>Finlepsin:</b> tabl. <b>200 mg</b> - 50 szt.	Rx 100% <b>14,71</b> Limit <b>11,34</b> B <sup>(1)</sup> <b>3,03</b> C <sup>(2)</sup> <b>bezpl.</b> DZ <sup>(3)</sup> <b>bezpl.</b> R <sup>(4)</sup> <b>5,91</b> S <sup>(5)</sup> <b>bezpl.</b>
INN: <i>Finasteride</i> ATC: G04CB01 wyk: B EAN ~ 096571 (1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Bluefish Pharmaceuticals Odpowiedniki: Finahit [X], Finaride [X], Finasteridum Bluefish [22,20], Finasterid Stada [24,01], Finamef - (IR) [26,17], Uroneyzr [27,24], Finaran [28,33], Symasteride [28,38], Finpros [28,45], Penester® [29,58], Hyplafin [29,82], Antiprost [29,85], Adaster [29,86], Androster [30,02], Finamef [30,07], Apo-Fina [30,11], Finaster® [30,19]	INN: <i>Carbamazepine</i> ATC: N03AF01 wyk: B EAN ~ 014117 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie OUN; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające; neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach innych niż określone w ChPL (5) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.		
<b>Finasteridum Bluefish:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 90 szt.	Rx 100% <b>58,50</b> Limit <b>58,50</b> R <sup>(1)</sup> <b>9,60</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpl.</b>	<b>Finlepsin 200 retard:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>200 mg</b> - 50 szt.	Rx 100% <b>19,29</b> Limit <b>11,34</b> B <sup>(1)</sup> <b>7,16</b> C <sup>(2)</sup> <b>bezpl.</b> DZ <sup>(3)</sup> <b>bezpl.</b> R <sup>(4)</sup> <b>10,04</b> S <sup>(5)</sup> <b>bezpl.</b>
INN: <i>Finasteride</i> ATC: G04CB01 wyk: B EAN ~ 096601 (1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Bluefish Pharmaceuticals Odpowiedniki: Finahit [X], Finasteridum Bluefish [58,50], Finasterid Stada [62,95], Symasteride [73,12], Penester® [79,74], Finaster® [80,15], Apo-Fina [80,81], Adaster [81,49], Androster [81,97], Finamef [82,11]	INN: <i>Carbamazepine</i> ATC: N03AF01 wyk: B EAN ~ 030315 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie OUN; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające; neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach innych niż określone w ChPL (5) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.		
<b>Finaster®:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 30 szt.	Rx 100% <b>30,19</b> Limit <b>26,72</b> R <sup>(1)</sup> <b>6,67</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpl.</b>	<b>Finaster®:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 90 szt.	Rx 100% <b>80,15</b> Limit <b>80,15</b> R <sup>(1)</sup> <b>9,60</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpl.</b>
INN: <i>Finasteride</i> ATC: G04CB01 wyk: B EAN ~ 151218 (1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. Odpowiedniki: Finahit [X], Finaride [X], Finasteridum Bluefish [22,20], Finasterid Stada [24,01], Finamef - (IR) [26,17], Uroneyzr [27,24], Finaran [28,33], Symasteride [28,38], Finpros [28,45], Penester® [29,58], Hyplafin [29,82], Antiprost [29,85], Adaster [29,86], Androster [30,02], Finamef [30,07], Apo-Fina [30,11], <b>Finaster® [30,19]</b>	<b>Finaster®:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 90 szt.		
<b>Finaster®:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 90 szt.	Rx 100% <b>80,15</b> Limit <b>80,15</b> R <sup>(1)</sup> <b>9,60</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpl.</b>	<b>Finaster®:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 90 szt.	Rx 100% <b>80,15</b> Limit <b>80,15</b> R <sup>(1)</sup> <b>9,60</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpl.</b>
INN: <i>Finasteride</i> ATC: G04CB01 wyk: B EAN ~ 811045 (1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. Odpowiedniki: Finahit [X], Finasteridum Bluefish [58,50], Finasterid Stada [62,95], Symasteride [73,12], Penester® [79,74], <b>Finaster® [80,15]</b> , Apo-Fina [80,81], Adaster [81,49], Androster [81,97], Finamef [82,11]	<b>Finaster®:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 90 szt.		



Finlepsin 400 retard: tabl. o przedl. uwalnianiu 400 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	23,08
		Limit	13,61
		B <sup>(1)</sup>	8,52
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		R <sup>(4)</sup>	11,40
		S <sup>(5)</sup>	bezpł.

INN: *Carbamazepine* ATC: N03AF01 wyk: B EAN ~ 014216  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Padaczka WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie OUN; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające; neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach innych niż określone w ChPL (5) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
 Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Finlepsin 400 retard: tabl. o przedl. uwalnianiu 400 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	37,56
		Limit	22,68
		B <sup>(1)</sup>	13,39
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		R <sup>(4)</sup>	16,27
		S <sup>(5)</sup>	bezpł.

INN: *Carbamazepine* ATC: N03AF01 wyk: B EAN ~ 014223  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Padaczka WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie OUN; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające; neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach innych niż określone w ChPL (5) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
 Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Finospir: tabl. 25 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	9,42
		Limit	6,01
		30% <sup>(1)</sup>	5,21
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Spiroglactone* ATC: C03DA01 wyk: B EAN ~ 965854  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Orion Pharma Poland Sp. o.o.

Finospir: tabl. 25 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	20,98
		Limit	20,02
		30% <sup>(1)</sup>	6,97
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Spiroglactone* ATC: C03DA01 wyk: B EAN ~ 965861  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Orion Pharma Poland Sp. o.o.

Finospir: tabl. 50 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	13,10
		Limit	12,01
		30% <sup>(1)</sup>	4,69
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Spiroglactone* ATC: C03DA01 wyk: B EAN ~ 965878  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Orion Pharma Poland Sp. o.o.

Finospir: tabl. 50 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	36,74
		Limit	36,74
		30% <sup>(1)</sup>	11,02
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Spiroglactone* ATC: C03DA01 wyk: B EAN ~ 965885  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Orion Pharma Poland Sp. o.o.

Finospir: tabl. 100 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	22,96
		Limit	22,96
		30% <sup>(1)</sup>	6,89
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Spiroglactone* ATC: C03DA01 wyk: B EAN ~ 965977  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Orion Pharma Poland Sp. o.o.

Odpowiedniki: Ismian [X], Verospiron® [22,27], Finospir [22,96]

Finpros: tabl. powł. 5 mg - 30 szt.	Rx	100%	28,45
		Limit	26,72
		R <sup>(1)</sup>	4,93
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Finasteride* ATC: G04CB01 wyk: B EAN ~ 017973  
 (1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: N  
 Krka Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Finahit [X], Finaride [X], Finasteridum Bluefish [22,20], Finasterid Stada [24,01], Finamef - (IR) [26,17], Uronexyr [27,24], Finaran [28,33], Symasteride [28,38], Finpros [28,45], Penester® [29,58], Hyplafin [29,82], Antiprost [29,85], Adaster [29,86], Androster [30,02], Finamef [30,07], Apo-Fina [30,11], Finaster® [30,19]

Finxta: tabl. powł. 5 mg - 28 szt.	Rx	100%	28,38
		Limit	24,94
		R <sup>(1)</sup>	6,64
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Finasteride* ATC: G04CB01 wyk: B EAN ~ 050895  
 (1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: N  
 RECORDATI Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Finahit [X], Zasterid® [27,70], Finxta [28,38], Proscar® [28,80]

Firazyr: inj. [roztw.] 10 mg/ml - 1 amp.-strzyż. 3 ml ◆	Rx	100%	2433,07
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Icatibant* ATC: B06AC02 wyk: EAN ~ 740635  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Leczenie ostрых zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u chorych dorosłych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esteraazy C1, Leczenie ostрых, zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u dzieci od 2 roku życia, chorych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esteraazy C1 (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Takeda Global R and D Centre

Firmagon: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 80 mg - 1 zest.	Rx	100%	556,13
		Limit	556,13
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Degarelix* ATC: L02BX02 wyk: A EAN ~ 774852  
 (1) Zaawansowany hormonozależny rak gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: N  
 Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. o.o.

Firmagon: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 120 mg - 2 zest.	Rx	100%	1635,54
		Limit	1635,54
		R <sup>(1)</sup>	9,48
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Degarelix* ATC: L02BX02 wyk: A EAN ~ 774869  
 (1) Zaawansowany hormonozależny rak gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: N  
 Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. o.o.

Flixonase®: aerozol do nosa 50 µg/dawkę - 1 but. 10 ml (120 dawek)	Rx	100%	16,28
		Limit	12,87
		50% <sup>(1)</sup>	9,85
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Fluticasone propionate* ATC: R01AD08 wyk: B EAN ~ 933839  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Flixotide®: aerozol wziewny bezfreonowy [zaw.] 50 µg/dawkę - 1 poj. (120 dawek)	Rx	100%	29,62
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	20,62
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Fluticasone propionate* ATC: R03BA05 wyk: B EAN ~ 851317  
 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Flixotide®: aerozol wziewny bezfreonowy [zaw.] 125 µg/dawkę - 1 poj. (60 dawek)	Rx	100%	33,37
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	21,32
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Fluticasone propionate* ATC: R03BA05 wyk: B EAN ~ 851416  
 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

<b>Flixotide®:</b> aerozol wziewny bezfreonowy [zaw.] <b>125 µg/dawkę</b> - 1 poj. (120 dawek)	Rx	100% <b>64,10</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>36,80</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Flonidan®:</b> tabl. <b>10 mg</b> - 60 szt.	Rx	100% <b>31,78</b> Limit <b>26,91</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>12,94</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fluticasono propionato</i>   ATC: R03BA05   wyk: B   EAN ~ 851423 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Astma, Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	INN: <i>Loratadine</i>   ATC: R06AX13   wyk: B   EAN ~ 223343 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 2 rż.; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczyń i ruchomym Quinckego - u pacjentów powyżej 2 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Sandoz GmbH Odpowiedniki: Loratadyna Galena [31,77], Flonidan® [31,78]		
<b>Flixotide®:</b> aerozol wziewny bezfreonowy [zaw.] <b>250 µg/dawkę</b> - 1 poj. (120 dawek)	Rx	100% <b>101,19</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>45,52</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Flonidan®:</b> tabl. <b>10 mg</b> - 90 szt.	Rx	100% <b>48,48</b> Limit <b>40,37</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>20,22</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fluticasono propionato</i>   ATC: R03BA05   wyk: B   EAN ~ 851522 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Astma, Przewłoka obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	INN: <i>Loratadine</i>   ATC: R06AX13   wyk: B   EAN ~ 223350 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 2 rż.; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczyń i ruchomym Quinckego - u pacjentów powyżej 2 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Sandoz GmbH Odpowiedniki: Loratadyna Galena [46,08], Flonidan® [48,48]		
<b>Flixotide®:</b> aerozol wziewny bezfreonowy [zaw.] <b>250 µg/dawkę</b> - 1 poj. (60 dawek)	Rx	100% <b>63,53</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>36,23</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Flonidan®:</b> zaw. doust. <b>1 mg/ml</b> - 1 but. 120 ml	Rx	100% <b>13,65</b> Limit <b>13,65</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>4,10</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fluticasono propionato</i>   ATC: R03BA05   wyk: B   EAN ~ 851515 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Astma, Przewłoka obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	INN: <i>Loratadine</i>   ATC: R06AX13   wyk: B   EAN ~ 739318 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 2 rż.; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczyń i ruchomym Quinckego - u pacjentów powyżej 2 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Sandoz GmbH		
<b>Flixotide® Dysk:</b> prosz. do inhal. <b>50 µg/dawkę</b> - 1 poj. (60 dawek)	Rx	100% <b>19,75</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>16,85</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Fluanxol®:</b> tabl. powł. <b>0,5 mg</b> - 50 szt. ◆	Rx	100% <b>18,18</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>14,90</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fluticasono propionato</i>   ATC: R03BA05   wyk: B   EAN ~ 484522 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Astma, Przewłoka obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	INN: <i>Flupentixol</i>   ATC: N05AF01   wyk: A   EAN ~ 074258 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Lundbeck Poland Sp. z o.o.		
<b>Flixotide® Dysk:</b> prosz. do inhal. <b>100 µg/dawkę</b> - 1 poj. (60 dawek)	Rx	100% <b>30,14</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>21,14</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Fluanxol®:</b> tabl. powł. <b>3 mg</b> - 50 szt. ◆	Rx	100% <b>38,90</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fluticasono propionato</i>   ATC: R03BA05   wyk: B   EAN ~ 484621 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Astma (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	INN: <i>Flupentixol</i>   ATC: N05AF01   wyk: A   EAN ~ 074296 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Lundbeck Poland Sp. z o.o.		
<b>Flixotide® Dysk:</b> prosz. do inhal. <b>250 µg/dawkę</b> - 1 poj. (60 dawek)	Rx	100% <b>60,16</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>32,86</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Fluanxol® Depot:</b> inj. [roztw. olejowy] <b>20 mg/ml</b> - 1 amp. 1 ml ◆	Rx	100% <b>16,94</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fluticasono propionato</i>   ATC: R03BA05   wyk: B   EAN ~ 484720 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Astma, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	INN: <i>Flupentixol</i>   ATC: N05AF01   wyk: A   EAN ~ 127214 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Lundbeck Poland Sp. z o.o.		
<b>Flixotide® Dysk:</b> prosz. do inhal. <b>500 µg/dawkę</b> - 1 poj. (60 dawek)	Rx	100% <b>105,24</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>49,57</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Fluconazole®:</b> kaps. <b>50 mg</b> - 7 szt.	Rx	100% <b>13,64</b> Limit <b>10,38</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>7,61</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fluticasono propionato</i>   ATC: R03BA05   wyk: B   EAN ~ 484829 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Astma (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	INN: <i>Fluconazole</i>   ATC: J02AC01   wyk: B   EAN ~ 490516 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA Odpowiedniki: Mycosyst® [10,87], Fluzaxol [11,36], Fluconazole Genoptim [11,41], Flumycon® [11,66], Fluconazole Pofarmex [12,23], Fluconazole® [13,64]		
<b>Flonidan®:</b> tabl. <b>10 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>16,62</b> Limit <b>13,46</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>7,20</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Fluconazole®:</b> kaps. <b>50 mg</b> - 14 szt.	Rx	100% <b>26,32</b> Limit <b>20,77</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>14,35</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Loratadine</i>   ATC: R06AX13   wyk: B   EAN ~ 739233 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 2 rż.; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczyń i ruchomym Quinckego - u pacjentów powyżej 2 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Sandoz GmbH Odpowiedniki: Flonidan® [16,62], Loratadyna Galena [16,73], Loratan [17,08]			INN: <i>Fluconazole</i>   ATC: J02AC01   wyk: B   EAN ~ 490523 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA Odpowiedniki: Fluconazolium Aflofarm [19,08], Fluconazole Genoptim [21,65], Flumycon® [22,16], Fluconazole Pofarmex [23,38], Fluconazole® [26,32]		



<b>Fluocast®: kaps. 100 mg - 7 szt.</b>	Rx	100%	<b>26,32</b>
		Limit	<b>20,77</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>14,35</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Fluconazole** ATC: **J02AC01** wyk: **B** EAN ~ **662371**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
**Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA**

Odpowiedniki: Fluconazole Aurovitas [18,96], Fluconazolium Afloram [19,01], Mycosyst® [21,30], Fluxazol [21,33], Fluconazole Genoptim [21,65], Flumycon® [22,16], Fluconazole Polfarmex [23,47], **Fluocast® [26,32]**

<b>Fluocast®: kaps. 100 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	<b>95,32</b>
		Limit	<b>83,06</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>48,41</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Fluconazole** ATC: **J02AC01** wyk: **B** EAN ~ **662388**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
**Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA**

Odpowiedniki: Fluconazole Aurovitas [65,80], Fluconazole Genoptim [75,04], Flumycon® [78,66], Fluconazole Polfarmex [83,48], Mycosyst® [83,77], **Fluocast® [95,32]**

<b>Fluocast®: kaps. 150 mg - 1 szt.</b>	Rx	100%	<b>6,34</b>
		Limit	<b>4,45</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>3,71</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Fluconazole** ATC: **J02AC01** wyk: **B** EAN ~ **490615**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
**Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA**

Odpowiedniki: Flumycon® [5,46], Fluxazol [5,60], Fluconazole Polfarmex [5,74], Fluconazole Genoptim [5,88], **Fluocast® [6,34]**

<b>Fluocast®: kaps. 150 mg - 3 szt.</b>	Rx	100%	<b>13,22</b>
		Limit	<b>13,22</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>5,95</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Fluconazole** ATC: **J02AC01** wyk: **B** EAN ~ **946633**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
**Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA**

Odpowiedniki: **Fluocast® [13,22]**, Fluconazole Polfarmex [15,47]

<b>Fluocast®: kaps. twarde 200 mg - 7 szt.</b>	Rx	100%	<b>42,67</b>
		Limit	<b>41,53</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>19,72</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Fluconazole** ATC: **J02AC01** wyk: **B** EAN ~ **283247**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
**Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA**

Odpowiedniki: Fluconazole Aurovitas [35,23], Fluconazolium Afloram [35,35], Fluxazol [39,98], Mycosyst® [41,53], Flumycon® [41,67], **Fluocast® [42,67]**, Fluconazole Polfarmex [43,38], Fluconazole Genoptim [44,76]

<b>Fluconazin: syrop 5 mg/ml - 1 but. 150 ml</b>	Rx	100%	<b>32,32</b>
		Limit	<b>32,32</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>16,16</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Fluconazole** ATC: **J02AC01** wyk: **B** EAN ~ **097219**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
**Przedsiębiorstwo Produktów Farmaceutycznych Hasco-Lek SA**

Odpowiedniki: Candifluc (Fluconazolium Afloram) [27,74], Fluconazole Hasco [32,32], Fluconazole Polfarmex [32,32], **Fluconazin [32,32]**

<b>Fluconazole Aurovitas: kaps. twarde 100 mg - 7 szt.</b>	Rx	100%	<b>18,96</b>
		Limit	<b>18,96</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>9,48</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Fluconazole** ATC: **J04AC01** wyk: EAN ~ **146287**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
**Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.**

Odpowiedniki: **Fluconazole Aurovitas [18,96]**, Fluconazolium Afloram [19,01], Mycosyst® [21,30], Fluxazol [21,33], Fluconazole Genoptim [21,65], Flumycon® [22,16], Fluconazole Polfarmex [23,47], **Fluocast® [26,32]**

<b>Fluconazole Aurovitas: kaps. twarde 100 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	<b>65,80</b>
		Limit	<b>65,80</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>32,90</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Fluconazole** ATC: **J04AC01** wyk: EAN ~ **146293**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
**Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.**

Odpowiedniki: **Fluconazole Aurovitas [65,80]**, Fluconazole Genoptim [75,04], Flumycon® [78,66], Fluconazole Polfarmex [83,48], Mycosyst® [83,77], **Fluocast® [95,32]**

<b>Fluconazole Aurovitas: kaps. twarde 200 mg - 7 szt.</b>	Rx	100%	<b>35,23</b>
		Limit	<b>35,23</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>17,62</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Fluconazole** ATC: **J04AC01** wyk: EAN ~ **146315**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
**Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.**

Odpowiedniki: **Fluconazole Aurovitas [35,23]**, Fluconazolium Afloram [35,35], Fluxazol [39,98], Mycosyst® [41,53], Flumycon® [41,67], **Fluocast® [42,67]**, Fluconazole Polfarmex [43,38], Fluconazole Genoptim [44,76]

<b>Fluconazole Genoptim: kaps. twarde 50 mg - 7 szt.</b>	Rx	100%	<b>11,41</b>
		Limit	<b>10,38</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>6,22</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Fluconazole** ATC: **J02AC01** wyk: EAN ~ **262457**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
**Synopsis Pharma Sp. z o.o.**

Odpowiedniki: Mycosyst® [10,87], Fluxazol [11,36], **Fluconazole Genoptim [11,41]**, Flumycon® [11,66], Fluconazole Polfarmex [12,23], **Fluocast® [13,64]**

<b>Fluconazole Genoptim: kaps. twarde 50 mg - 14 szt.</b>	Rx	100%	<b>21,65</b>
		Limit	<b>20,77</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>11,27</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Fluconazole** ATC: **J02AC01** wyk: EAN ~ **262488**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
**Synopsis Pharma Sp. z o.o.**

Odpowiedniki: Fluconazolium Afloram [19,08], **Fluconazole Genoptim [21,65]**, Flumycon® [22,16], Fluconazole Polfarmex [23,38], **Fluocast® [26,32]**

<b>Fluconazole Genoptim: kaps. twarde 100 mg - 7 szt.</b>	Rx	100%	<b>21,65</b>
		Limit	<b>20,77</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>11,27</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Fluconazole** ATC: **J02AC01** wyk: EAN ~ **262617**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
**Synopsis Pharma Sp. z o.o.**

Odpowiedniki: Fluconazole Aurovitas [18,96], Fluconazolium Afloram [19,01], Mycosyst® [21,30], Fluxazol [21,33], **Fluconazole Genoptim [21,65]**, Flumycon® [22,16], Fluconazole Polfarmex [23,47], **Fluocast® [26,32]**

<b>Fluconazole Genoptim: kaps. twarde 100 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	<b>75,04</b>
		Limit	<b>75,04</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>37,52</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Fluconazole** ATC: **J02AC01** wyk: EAN ~ **262679**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
**Synopsis Pharma Sp. z o.o.**

Odpowiedniki: Fluconazole Aurovitas [65,80], **Fluconazole Genoptim [75,04]**, Flumycon® [78,66], Fluconazole Polfarmex [83,48], Mycosyst® [83,77], **Fluocast® [95,32]**

<b>Fluconazole Hasco: syrop 5 mg/ml - 1 but. 150 ml</b>	Rx	100%	<b>32,32</b>
		Limit	<b>32,32</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>16,16</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Fluconazole** ATC: **J02AC01** wyk: **B** EAN ~ **273798**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
**Przedsiębiorstwo Produktów Farmaceutycznych Hasco-Lek SA**

Odpowiedniki: Candifluc (Fluconazolium Afloram) [27,74], Fluconazin [32,32], Fluconazole Polfarmex [32,32], **Fluconazole Hasco [32,32]**



<b>Fluconazole Polfarmex: syrop 5 mg/ml - 1 but. 150 ml</b>	Rx	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>32,32</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>32,32</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>16,16</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	32,32	Limit	32,32	50% <sup>(1)</sup>	16,16	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Fluconazole Polfarmex: tabl. 200 mg - 7 szt.</b>	Rx	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>43,38</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>41,53</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>22,62</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	43,38	Limit	41,53	50% <sup>(1)</sup>	22,62	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	32,32																								
Limit	32,32																								
50% <sup>(1)</sup>	16,16																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	43,38																								
Limit	41,53																								
50% <sup>(1)</sup>	22,62																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
INN: <b>Fluconazole</b>   ATC: <b>J02AC01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>859511</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> <b>Polfarmex S.A.</b> Odpowiedniki: Candifluc (Fluconazolom Aflofarm) [27,74], Fluconazin [32,32], Fluconazole Hasco [32,32], <b>Fluconazole Polfarmex [32,32]</b>			INN: <b>Fluconazole</b>   ATC: <b>J02AC01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>022549</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> <b>Polfarmex S.A.</b> Odpowiedniki: Fluconazole Aurovitas [35,23], Fluconazolom Aflofarm [35,35], Fluxazol [39,98], Mycosyst® [41,53], Flumycon® [41,67], Flucofast® [42,67], <b>Fluconazole Polfarmex [43,38]</b> , Fluconazole Genoptim [44,76]																						
<b>Fluconazole Polfarmex: tabl. 50 mg - 7 szt.</b>	Rx	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>12,23</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>10,38</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>7,04</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	12,23	Limit	10,38	50% <sup>(1)</sup>	7,04	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Fluconazole Polfarmex: tabl. 200 mg - 14 szt.</b>	Rx	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>82,05</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>82,05</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>41,03</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	82,05	Limit	82,05	50% <sup>(1)</sup>	41,03	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	12,23																								
Limit	10,38																								
50% <sup>(1)</sup>	7,04																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	82,05																								
Limit	82,05																								
50% <sup>(1)</sup>	41,03																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
INN: <b>Fluconazole</b>   ATC: <b>J02AC01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>859672</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> <b>Polfarmex S.A.</b> Odpowiedniki: Mycosyst® [10,87], Fluxazol [11,36], Fluconazole Genoptim [11,41], Flumycon® [11,66], <b>Fluconazole Polfarmex [12,23]</b> , Flucofast® [13,64]			INN: <b>Fluconazole</b>   ATC: <b>J02AC01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>022556</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> <b>Polfarmex S.A.</b> Odpowiedniki: Flumycon® [27,85], Mycosyst® [54,85], <b>Fluconazole Polfarmex [82,05]</b>																						
<b>Fluconazole Polfarmex: tabl. 50 mg - 14 szt.</b>	Rx	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>23,38</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>20,77</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>13,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	23,38	Limit	20,77	50% <sup>(1)</sup>	13,00	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Fluconazolom Aflofarm: kaps. twarde 50 mg - 14 szt.</b>	Rx	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>19,08</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>19,08</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>9,54</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	19,08	Limit	19,08	50% <sup>(1)</sup>	9,54	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	23,38																								
Limit	20,77																								
50% <sup>(1)</sup>	13,00																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	19,08																								
Limit	19,08																								
50% <sup>(1)</sup>	9,54																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
INN: <b>Fluconazole</b>   ATC: <b>J02AC01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>859610</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> <b>Polfarmex S.A.</b> Odpowiedniki: Fluconazolom Aflofarm [19,08], Fluconazole Genoptim [21,65], Flumycon® [22,16], <b>Fluconazole Polfarmex [23,38]</b> , Flucofast® [26,32]			INN: <b>Fluconazole</b>   ATC: <b>J02AC01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>142344</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> <b>Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: <b>Fluconazolom Aflofarm [19,08]</b> , Fluconazole Genoptim [21,65], Flumycon® [22,16], Fluconazole Polfarmex [23,38], Flucofast® [26,32]																						
<b>Fluconazole Polfarmex: tabl. 100 mg - 7 szt.</b>	Rx	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>23,47</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>20,77</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>13,09</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	23,47	Limit	20,77	50% <sup>(1)</sup>	13,09	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Fluconazolom Aflofarm: kaps. twarde 100 mg - 7 szt.</b>	Rx	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>19,01</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>19,01</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>9,51</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	19,01	Limit	19,01	50% <sup>(1)</sup>	9,51	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	23,47																								
Limit	20,77																								
50% <sup>(1)</sup>	13,09																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	19,01																								
Limit	19,01																								
50% <sup>(1)</sup>	9,51																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
INN: <b>Fluconazole</b>   ATC: <b>J02AC01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>859719</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> <b>Polfarmex S.A.</b> Odpowiedniki: Fluconazole Aurovitas [18,96], Fluconazolom Aflofarm [19,01], Mycosyst® [21,30], Fluxazol [21,33], Fluconazole Genoptim [21,65], Flumycon® [22,16], <b>Fluconazole Polfarmex [23,47]</b> , Flucofast® [26,32]			INN: <b>Fluconazole</b>   ATC: <b>J02AC01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>142345</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> <b>Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: Fluconazole Aurovitas [18,96], <b>Fluconazolom Aflofarm [19,01]</b> , Mycosyst® [21,30], Fluxazol [21,33], Fluconazole Genoptim [21,65], Flumycon® [22,16], Fluconazole Polfarmex [23,47], Flucofast® [26,32]																						
<b>Fluconazole Polfarmex: tabl. 100 mg - 28 szt.</b>	Rx	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>83,48</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>83,06</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>41,95</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	83,48	Limit	83,06	50% <sup>(1)</sup>	41,95	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Fluconazolom Aflofarm: kaps. twarde 200 mg - 7 szt.</b>	Rx	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>35,35</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>35,35</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>17,68</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	35,35	Limit	35,35	50% <sup>(1)</sup>	17,68	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	83,48																								
Limit	83,06																								
50% <sup>(1)</sup>	41,95																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	35,35																								
Limit	35,35																								
50% <sup>(1)</sup>	17,68																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
INN: <b>Fluconazole</b>   ATC: <b>J02AC01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>780181</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> <b>Polfarmex S.A.</b> Odpowiedniki: Fluconazole Aurovitas [65,80], Fluconazole Genoptim [75,04], Flumycon® [78,66], <b>Fluconazole Polfarmex [83,48]</b> , Mycosyst® [83,77], Flucofast® [95,32]			INN: <b>Fluconazole</b>   ATC: <b>J02AC01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>142350</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> <b>Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: Fluconazole Aurovitas [35,23], <b>Fluconazolom Aflofarm [35,35]</b> , Fluxazol [39,98], Mycosyst® [41,53], Flumycon® [41,67], Flucofast® [42,67], Fluconazole Polfarmex [43,38], Fluconazole Genoptim [44,76]																						
<b>Fluconazole Polfarmex: tabl. 150 mg - 1 szt.</b>	Rx	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>5,74</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>4,45</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>3,52</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	5,74	Limit	4,45	50% <sup>(1)</sup>	3,52	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Fluconazole Polfarmex: syrop 5 mg/ml - 1 but. 150 ml</b>	Rx	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>X</td></tr> </table>	100%	X								
100%	5,74																								
Limit	4,45																								
50% <sup>(1)</sup>	3,52																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	X																								
INN: <b>Fluconazole</b>   ATC: <b>J02AC01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>017874</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> <b>Polfarmex S.A.</b> Odpowiedniki: Flumycon® [5,46], Fluxazol [5,60], <b>Fluconazole Polfarmex [5,74]</b> , Fluconazole Genoptim [5,88], Flucofast® [6,34]			<b>Fluconazole Polfarmex: syrop 5 mg/ml - 1 but. 150 ml</b>																						
<b>Fluconazole Polfarmex: tabl. 150 mg - 3 szt.</b>	Rx	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>15,47</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>13,35</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>8,80</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	15,47	Limit	13,35	50% <sup>(1)</sup>	8,80	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Fluconazole Polfarmex: syrop 5 mg/ml - 1 but. 150 ml</b>	Rx	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>11,66</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>10,38</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>6,47</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	11,66	Limit	10,38	50% <sup>(1)</sup>	6,47	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	15,47																								
Limit	13,35																								
50% <sup>(1)</sup>	8,80																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	11,66																								
Limit	10,38																								
50% <sup>(1)</sup>	6,47																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
INN: <b>Fluconazole</b>   ATC: <b>J02AC01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>017881</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> <b>Polfarmex S.A.</b> Odpowiedniki: Flucofast® [13,22], <b>Fluconazole Polfarmex [15,47]</b>			<b>Fluconazole Polfarmex: syrop 5 mg/ml - 1 but. 150 ml</b>																						
<b>Fluconazole Polfarmex: syrop 5 mg/ml - 1 but. 150 ml</b>			<b>Fluconazole Polfarmex: syrop 5 mg/ml - 1 but. 150 ml</b>																						
<b>Fluconazole Polfarmex: syrop 5 mg/ml - 1 but. 150 ml</b>			<b>Fluconazole Polfarmex: syrop 5 mg/ml - 1 but. 150 ml</b>																						
<b>Fluconazole Polfarmex: syrop 5 mg/ml - 1 but. 150 ml</b>			<b>Fluconazole Polfarmex: syrop 5 mg/ml - 1 but. 150 ml</b>																						
<b>Fluconazole Polfarmex: syrop 5 mg/ml - 1 but. 150 ml</b>			<b>Fluconazole Polfarmex: syrop 5 mg/ml - 1 but. 150 ml</b>																						



Naszym wyborem

**enarenal**  
 enalapryli maleas

<b>Flumycon®: kaps. twarde 100 mg - 7 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>22,16</b> Limit <b>20,77</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>11,78</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fluconazole</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	ATC: J02AC01	wyk: B EAN ~ 086973 Actavis Group PTC ehf.
<b>Flumycon®: kaps. twarde 100 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>78,66</b> Limit <b>78,66</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>39,33</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fluconazole</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	ATC: J02AC01	wyk: B EAN ~ 869756 Actavis Group PTC ehf.
<b>Flumycon®: kaps. twarde 150 mg - 1 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>5,46</b> Limit <b>4,45</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>3,24</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fluconazole</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	ATC: J02AC01	wyk: B EAN ~ 869763 Actavis Group PTC ehf.
<b>Flumycon®: kaps. twarde 150 mg - 7 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>29,53</b> Limit <b>29,53</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>14,77</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fluconazole</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	ATC: J02AC01	wyk: B EAN ~ 136574 Actavis Group PTC ehf.
<b>Flumycon®: kaps. twarde 200 mg - 7 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>41,67</b> Limit <b>41,53</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>20,91</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fluconazole</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	ATC: J02AC01	wyk: B EAN ~ 869770 Actavis Group PTC ehf.
<b>Fluoksetyna EGIS: kaps. twarde 20 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>16,12</b> Limit <b>13,17</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>6,90</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fluoxetine</i> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: N06AB03	wyk: B EAN ~ 776955 Egis Polska Sp. z o.o.
<b>Fluoxetine Aurovitas: kaps. twarde 20 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>15,01</b> Limit <b>14,11</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,13</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fluoxetine</i> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: N06AB03	wyk: B EAN ~ 131762 Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
<b>Fluoxetin Polpharma: kaps. twarde 20 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>20,07</b> Limit <b>14,11</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>9,17</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fluoxetine</i> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: N06AB03	wyk: B EAN ~ 770311 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

<b>Flurhinal: aerozol inhal. [zaw.] 125 µg/dawkę - 1 poj. (120 dawek)</b>	Rx	100% <b>34,91</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>7,61</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fluticasone propionate</i> (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: R03BA05	wyk: B EAN ~ 140177 Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o.
<b>Flurhinal: aerozol inhal. [zaw.] 250 µg/dawkę - 1 poj. (120 dawek)</b>	Rx	100% <b>65,74</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>10,07</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fluticasone propionate</i> (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: R03BA05	wyk: B EAN ~ 140178 Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o.
<b>Flutamid Egis: tabl. 250 mg - 100 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>68,69</b> Limit <b>68,69</b> B <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Flutamide</i> (1) Nowotwory złośliwe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	ATC: L02BB01	wyk: A EAN ~ 139217 Egis Polska Sp. z o.o.
<b>Fluticomb: aerozol inhal. [zaw.] 50/25 µg/dawkę - 1 inhal. (120 dawek)</b>	Rx	100% <b>71,94</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fluticasone propionate + Salmeterol</i> (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: R03AK06	wyk: A EAN ~ 140389 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
<b>Fluticomb: aerozol inhal. [zaw.] 125/25 µg/dawkę - 1 inhal. (120 dawek)</b>	Rx	100% <b>87,86</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>12,74</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fluticasone propionate + Salmeterol</i> (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: R03AK06	wyk: A EAN ~ 140395 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
<b>Fluticomb: aerozol inhal. [zaw.] 250/25 µg/dawkę - 1 inhal. (120 dawek)</b>	Rx	100% <b>104,53</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>13,74</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fluticasone propionate + Salmeterol</i> (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: R03AK06	wyk: A EAN ~ 140396 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
<b>Flutixon: prosz. do inhal. [kaps.] 125 µg/dawkę - 60 szt.</b>	Rx	100% <b>42,68</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>15,38</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fluticasone propionate</i> (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: D07AC17	wyk: B EAN ~ 785858 Adamed Sp. z o.o.
<b>Flutixon: prosz. do inhal. [kaps. twarde] 125 µg/dawkę - 120 szt.</b>	Rx	100% <b>75,53</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>19,86</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fluticasone propionate</i> (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: D07AC17	wyk: B EAN ~ 938001 Adamed Sp. z o.o.

Flutixon: prosz. do inhal. [kaps.] 250 µg/dawkę - 60 szt.	Rx	100%	75,87
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	20,20
INN: <i>Fluticasono propionato</i>   ATC: D07AC17   wyk: B   EAN ~ 785889		(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	
Adamed Sp. z o.o.			
Flutixon: prosz. do inhal. [kaps. twarde] 250 µg/dawkę - 120 szt.	Rx	100%	144,27
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	32,95
INN: <i>Fluticasono propionato</i>   ATC: D07AC17   wyk: B   EAN ~ 938025		(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	
Adamed Sp. z o.o.			
Fluxazol: kaps. twarde 50 mg - 7 szt. ◆	Rx	100%	11,36
		Limit	10,38
		50% <sup>(1)</sup>	6,17
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Fluconazole</i>   ATC: J02AC01   wyk: B   EAN ~ 138826		(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	
Aristo Pharma Sp. z o.o.		Odpowiedniki: Mycosyst® [10,87], Fluxazol [11,36], Fluconazole Genoptim [11,41], Flumycan® [11,66], Fluconazole Polfarmex [12,23], Flucostat® [13,64]	
Fluxazol: kaps. twarde 100 mg - 7 szt. ◆	Rx	100%	21,33
		Limit	20,77
		50% <sup>(1)</sup>	10,95
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Fluconazole</i>   ATC: J02AC01   wyk: B   EAN ~ 138827		(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	
Aristo Pharma Sp. z o.o.		Odpowiedniki: Fluconazole Aurovitas [18,96], Fluconazolom Aflofarm [19,01], Mycosyst® [21,30], Fluxazol [21,33], Fluconazole Genoptim [21,65], Flumycan® [22,16], Fluconazole Polfarmex [23,47], Flucostat® [26,32]	
Fluxazol: kaps. twarde 150 mg - 1 szt. ◆	Rx	100%	5,60
		Limit	4,45
		50% <sup>(1)</sup>	3,38
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Fluconazole</i>   ATC: J02AC01   wyk: B   EAN ~ 138828		(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	
Aristo Pharma Sp. z o.o.		Odpowiedniki: Flumycan® [5,46], Fluxazol [5,60], Fluconazole Polfarmex [5,74], Fluconazole Genoptim [5,88], Flucostat® [6,34]	
Fluxazol: kaps. twarde 200 mg - 7 szt. ◆	Rx	100%	39,98
		Limit	39,98
		50% <sup>(1)</sup>	19,99
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Fluconazole</i>   ATC: J02AC01   wyk: B   EAN ~ 138829		(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	
Aristo Pharma Sp. z o.o.		Odpowiedniki: Fluconazole Aurovitas [35,23], Fluconazolom Aflofarm [35,35], Fluxazol [39,98], Mycosyst® [41,53], Flumycan® [41,67], Flucostat® [42,67], Fluconazole Polfarmex [43,38], Fluconazole Genoptim [44,76]	
Fluxemed: kaps. twarde 20 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	14,87
		Limit	14,11
		30% <sup>(1)</sup>	4,99
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Fluoxetine</i>   ATC: N06AB03   wyk: B   EAN ~ 742509		(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	
PRO. MED. PL Sp. z o.o.		Odpowiedniki: Fluxemed [14,87], Fluoxetine Aurovitas [15,01], Andepin® [19,62], Fluoxetin Polpharma [20,07], Bioxetin [20,27], Seronil® [25,77]	
Foam Lite Convatec: opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny 5,5x12 cm - 1 szt.	WM	100%	8,84
		Limit	7,52
		30% <sup>(1)</sup>	3,58
		B <sup>(2)</sup>	1,32
INN: <i>Emplastrum microfibrillum cellulosa</i>   ATC:   wyk:   EAN ~ 142255		(1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	
ConvaTec Polska Sp. z o.o.			
Foam Lite Convatec: opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny 8x8 cm - 1 szt.	WM	100%	8,59
		Limit	7,30
		30% <sup>(1)</sup>	3,48
		B <sup>(2)</sup>	1,29
INN: <i>Emplastrum microfibrillum cellulosa</i>   ATC:   wyk:   EAN ~ 142224		(1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	
ConvaTec Polska Sp. z o.o.			
Foam Lite Convatec: opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny 10x10 cm - 1 szt.	WM	100%	12,92
		Limit	11,40
		30% <sup>(1)</sup>	4,94
		B <sup>(2)</sup>	1,52
INN: <i>Emplastrum microfibrillum cellulosa</i>   ATC:   wyk:   EAN ~ 142231		(1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	
ConvaTec Polska Sp. z o.o.			
Foam Lite Convatec: opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny 15x15 cm - 1 szt.	WM	100%	27,48
		Limit	25,65
		30% <sup>(1)</sup>	9,53
		B <sup>(2)</sup>	1,83
INN: <i>Emplastrum microfibrillum cellulosa</i>   ATC:   wyk:   EAN ~ 142248		(1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	
ConvaTec Polska Sp. z o.o.			
Fokusin®: kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde 0,4 mg - 30 szt.	Rx	100%	23,46
		Limit	19,21
		R <sup>(1)</sup>	7,45
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i>   ATC: G04CA03   wyk: B   EAN ~ 573585		(1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N	
Zentiva PL Sp. z o.o.			
Fokusin®: kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde 0,4 mg - 90 szt.	Rx	100%	65,28
		Limit	57,63
		R <sup>(1)</sup>	17,25
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i>   ATC: G04CA03   wyk: B   EAN ~ 573592		(1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N	
Zentiva PL Sp. z o.o.			
Fokusin® - (IR): kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde 0,4 mg - 30 szt.	Rx	100%	16,34
		Limit	16,34
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i>   ATC: G04CA02   wyk: B   EAN ~ 147068		(1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N	
Inpharm Sp. z o.o.			
Fokusin® - (IR): kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde 0,4 mg - 30 szt.	Rx	100%	16,25
		Limit	16,25
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i>   ATC: G04CA02   wyk: B   EAN ~ 149679		(1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N	
Delfarma Sp. z o.o.			
Fokusin® - (IR): kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde 0,4 mg - 90 szt.	Rx	100%	43,64
		Limit	43,64
		R <sup>(1)</sup>	9,60
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i>   ATC: G04CA02   wyk: B   EAN ~ 149680		(1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N	
Delfarma Sp. z o.o.			
Fokusin® - (IR): kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde 0,4 mg - 90 szt.	Rx	100%	43,88
		Limit	43,88
		R <sup>(1)</sup>	9,60
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i>   ATC: G04CA02   wyk: B   EAN ~ 147069		(1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N	
Inpharm Sp. z o.o.			
Foradil®: prosz. do inhal. [kaps.] 12 µg/dawkę - 60 szt.	Rx	100%	61,26
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	6,30
INN: <i>Formoterol</i>   ATC: R03AC13   wyk: A   EAN ~ 792924		(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	
Novartis Poland Sp. z o.o.		Odpowiedniki: Forastmin® [60,81], Foradil® [61,26], Zafiron® [61,73], Oxodil PPH [61,89]	
Foradil®: prosz. do inhal. [kaps.] 12 µg/dawkę - 180 szt.	Rx	100%	162,95
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	9,60
INN: <i>Formoterol</i>   ATC: R03AC13   wyk: A   EAN ~ 020934		(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	
Novartis Poland Sp. z o.o.		Odpowiedniki: Foradil® [162,95], Forastmin® [169,78]	



Forastmin®: prosz. do inhal. [kaps. twarde] 12 µg/dawkę - 60 szt.	Rx	100%	60,81
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	5,85
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Formoterol* ATC: R03AC13 wyk: A EAN ~ 614400  
 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Bausch Health  
 Odpowiedniki: Forastmin® [60,81], Foradil® [61,26], Zafiron® [61,73], Oxodil PPH [61,89]

Forastmin®: prosz. do inhal. [kaps. twarde] 12 µg/dawkę - 120 szt.	Rx	100%	116,28
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	6,40
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Formoterol* ATC: R03AC13 wyk: A EAN ~ 218287  
 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Bausch Health  
 Odpowiedniki: Forastmin® [116,28], Oxodil PPH [116,32], Zafiron® [116,32]

Forastmin®: prosz. do inhal. [kaps. twarde] 12 µg/dawkę - 180 szt.	Rx	100%	169,78
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	9,60
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Formoterol* ATC: R03AC13 wyk: A EAN ~ 218294  
 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Bausch Health  
 Odpowiedniki: Foradil® [162,95], Forastmin® [169,78]

Formetic: tabl. powł. 500 mg - 30 szt.	Rx	100%	5,13
		Limit	3,89
		30% <sup>(1)</sup>	2,41
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	4,44
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Metformin hydrochloride* ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 078943  
 (1) Zespół policystycznych jajników (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA  
 Odpowiedniki: Metcrean [4,26], Metformin Bluefish [4,26], Zenofer [4,47], Avamina [4,51], Siofor® 500 [5,11], Formetic [5,13], Metformax® 500 [5,71], Glucophage® 500 mg [5,91], Metfogamma 500 [7,30]

Formetic: tabl. powł. 500 mg - 60 szt.	Rx	100%	9,36
		Limit	7,79
		30% <sup>(1)</sup>	3,91
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	4,77
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Metformin hydrochloride* ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 078950  
 (1) Zespół policystycznych jajników (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA  
 Odpowiedniki: Avamina [7,66], Metcrean [7,66], Zenofer [8,07], Siofor® 500 [8,55], Formetic [9,36], Etfom 500 [10,54], Metformax® 500 [10,54]

Formetic: tabl. powł. 500 mg - 90 szt.	Rx	100%	12,55
		Limit	11,68
		30% <sup>(1)</sup>	4,37
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	4,07
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Metformin hydrochloride* ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 078967  
 (1) Zespół policystycznych jajników (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA  
 Odpowiedniki: Avamina [10,56], Metcrean [11,03], Zenofer [11,65], Siofor® 500 [12,38], Formetic [12,55], Etfom 500 [15,50]

Formetic: tabl. powł. 500 mg - 120 szt.	Rx	100%	16,14
		Limit	15,57
		30% <sup>(1)</sup>	5,24
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,77
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Metformin hydrochloride* ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 061440  
 (1) Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi, Zespół policystycznych jajników (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA  
 Odpowiedniki: Zenofer [15,13], Formetic [16,14], Siofor® 500 [16,17]

Formetic: tabl. powł. 850 mg - 30 szt.	Rx	100%	7,39
		Limit	0,00
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,97

INN: *Metformin hydrochloride* ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 079001  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA  
 Odpowiedniki: Metfogamma 850 [6,20], Metformin Bluefish [6,37], Metcrean [6,64], Avamina [6,97], Zenofer [6,99], Formetic [7,39], Siofor® 850 [7,40], Metformax® 850 [7,93], Glucophage® 850 mg [8,16]

Formetic: tabl. powł. 850 mg - 60 szt.	Rx	100%	13,93
		Limit	0,00
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,89

INN: *Metformin hydrochloride* ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 079025  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA  
 Odpowiedniki: Avamina [12,50], Zenofer [13,07], Siofor® 850 [13,88], Formetic [13,93], Glucophage® 850 mg [13,94], Etfom 850 [14,95], Metformax® 850 [14,95]

Formetic: tabl. powł. 850 mg - 90 szt.	Rx	100%	20,57
		Limit	0,00
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	4,80

INN: *Metformin hydrochloride* ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 079032  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA  
 Odpowiedniki: Avamina [16,95], Metcrean [17,79], Zenofer [18,91], Siofor® 850 [20,29], Formetic [20,57], Etfom 850 [21,76], Metformax® 850 [21,76]

Formetic: tabl. powł. 850 mg - 120 szt.	Rx	100%	26,47
		Limit	26,47
		30% <sup>(1)</sup>	7,94
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	5,44
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Metformin hydrochloride* ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 061442  
 (1) Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA  
 Odpowiedniki: Zenofer [24,76], Formetic [26,47], Siofor® 850 [26,59]

Formetic: tabl. powł. 1000 mg - 30 szt.	Rx	100%	8,61
		Limit	7,79
		30% <sup>(1)</sup>	3,16
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	4,02
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Metformin hydrochloride* ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 078974  
 (1) Zespół policystycznych jajników (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA  
 Odpowiedniki: Metformin Bluefish [7,33], Metfogamma 1000 [7,93], Zenofer [8,07], Avamina [8,36], Siofor® 1000 [8,55], Formetic [8,61], Glucophage® 1000 mg [8,63], Metformax® 1000 [8,67]

Formetic: tabl. powł. 1000 mg - 60 szt.	Rx	100%	16,88
		Limit	15,57
		30% <sup>(1)</sup>	5,98
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	4,51
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Metformin hydrochloride* ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 078981  
 (1) Zespół policystycznych jajników (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA  
 Odpowiedniki: Glucophage® 1000 mg [X], Avamina [14,27], Metcrean [14,27], Metformax® 1000 - (IR) [15,07], Zenofer [15,13], Metformax® 1000 [16,16], Siofor® 1000 [16,16], Formetic [16,88], Etfom [17,36]



Skuteczny przepływ

pentoxifylline  
**polfilin**  
 prolongatum

400 mg x 20 tabl. ♥ 400 mg x 60 tabl.

<b>Formetic:</b> tabl. powł. <b>1000 mg</b> - 90 szt.	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td><b>23,95</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>23,36</b></td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>7,60</b></td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(3)</sup></td><td><b>5,39</b></td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	<b>23,95</b>		Limit	<b>23,36</b>		30% <sup>(1)</sup>	<b>7,60</b>		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	<b>5,39</b>		S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Forxiga:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 30 szt.	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td><b>161,09</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>161,09</b></td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>48,33</b></td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	<b>161,09</b>		Limit	<b>161,09</b>		30% <sup>(1)</sup>	<b>48,33</b>		S <sup>(2)</sup>	bezpł.			
Rx	100%	<b>23,95</b>																																		
	Limit	<b>23,36</b>																																		
	30% <sup>(1)</sup>	<b>7,60</b>																																		
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																																		
	R <sup>(3)</sup>	<b>5,39</b>																																		
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.																																		
Rx	100%	<b>161,09</b>																																		
	Limit	<b>161,09</b>																																		
	30% <sup>(1)</sup>	<b>48,33</b>																																		
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																																		
INN: <b>Metformin hydrochloride</b>   ATC: <b>A10BA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>078998</b> (1) Zespół policystycznych jajników (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> <b>Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA</b> Odpowiedniki: Avamina [19,69], Zenofor [22,01], Metformax® 1000 - (IR) [22,10], Siofor® 1000 [23,56], Metformax® 1000 [23,63], <b>Formetic</b> [23,95]		INN: <b>Dapagliflozin</b>   ATC: <b>A10BK01</b>   wyk: <b>EAN ~ 097588</b> (1) Przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z eGFR < ml/min/1,73m <sup>2</sup> , albuminurią lub białkomoczem oraz leczonych terapią opartą na ACE-i/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniami do tych terapii, Przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z LVEF ≥ 2% oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA: -pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy β-adrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów (z frakcją wyrzutową z LVEF ≤ 40%) lub - pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy β-adrenolityków oraz jeśli wskazane diuretykach (z frakcją wyrzutową z LVEF 41-50%), Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przestrost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>   <b>AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.</b>																																		
<b>Formetic:</b> tabl. powł. <b>1000 mg</b> - 120 szt.	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td><b>30,55</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>30,55</b></td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>9,17</b></td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(3)</sup></td><td><b>6,40</b></td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	<b>30,55</b>		Limit	<b>30,55</b>		30% <sup>(1)</sup>	<b>9,17</b>		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	<b>6,40</b>		S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Fostex:</b> aerozol inhal. [roztw.] <b>100/6 µg/dawkę</b> - 1 poj. (180 dawek)	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td><b>165,91</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>29,73</b></td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	<b>165,91</b>		Limit	<b>0,00</b>		C <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	<b>29,73</b>		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx	100%	<b>30,55</b>																																		
	Limit	<b>30,55</b>																																		
	30% <sup>(1)</sup>	<b>9,17</b>																																		
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																																		
	R <sup>(3)</sup>	<b>6,40</b>																																		
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.																																		
Rx	100%	<b>165,91</b>																																		
	Limit	<b>0,00</b>																																		
	C <sup>(1)</sup>	bezpł.																																		
	R <sup>(2)</sup>	<b>29,73</b>																																		
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																																		
INN: <b>Metformin hydrochloride</b>   ATC: <b>A10BA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>061444</b> (1) Zespół policystycznych jajników, Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   <b>Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA</b> Odpowiedniki: Metformax® 1000 - (IR) [28,53], Zenofor [28,53], Metformax® 1000 [29,80], <b>Formetic</b> [30,55], Siofor® 1000 [30,60], Eiform [30,94]		INN: <b>Formoterol + Beclometasone dipropionate</b>   ATC: <b>R03AK07</b>   wyk: <b>A</b>   EAN ~ <b>054152</b> (1) Kobiety w ciąży (2) Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   <b>Chiesi Poland Sp. z o.o.</b>																																		
<b>Formodual:</b> aerozol inhal. [roztw.] ( <b>100 µg+ 6 µg/dawkę</b> ) - 1 poj. 180 dawek	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td><b>140,98</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>4,80</b></td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	<b>140,98</b>		Limit	<b>0,00</b>		C <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	<b>4,80</b>		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Fostex:</b> aerozol inhal. [roztw.] <b>200/6 µg/dawkę</b> - 1 poj. (180 dawek)	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td><b>165,91</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>29,73</b></td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	<b>165,91</b>		Limit	<b>0,00</b>		C <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	<b>29,73</b>		S <sup>(3)</sup>	bezpł.			
Rx	100%	<b>140,98</b>																																		
	Limit	<b>0,00</b>																																		
	C <sup>(1)</sup>	bezpł.																																		
	R <sup>(2)</sup>	<b>4,80</b>																																		
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																																		
Rx	100%	<b>165,91</b>																																		
	Limit	<b>0,00</b>																																		
	C <sup>(1)</sup>	bezpł.																																		
	R <sup>(2)</sup>	<b>29,73</b>																																		
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																																		
INN: <b>Beclomethasone dipropionate + Formoterol fumarate dihydric</b>   ATC: <b>R03AK08</b>   wyk: <b>EAN ~ 005874</b> (1) Kobiety w ciąży (2) Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b>   <b>Chiesi Farmaceutici S.p.A.</b>		INN: <b>Formoterol + Beclomethasone dipropionate</b>   ATC: <b>R03AK07</b>   wyk: <b>A</b>   EAN ~ <b>245696</b> (1) Kobiety w ciąży (2) Astma (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   <b>Chiesi Poland Sp. z o.o.</b>																																		
<b>Formodual:</b> aerozol inhal. [roztw.] ( <b>200 µg+ 6 µg/dawkę</b> ) - 1 poj. 180 dawek	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td><b>140,98</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>4,80</b></td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	<b>140,98</b>		Limit	<b>0,00</b>		C <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	<b>4,80</b>		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Fostex Nexthaler:</b> prosz. do inhal. <b>100/6 µg/dawkę</b> - 1 inhal. 180 dawek	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td><b>165,91</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>140,98</b></td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>67,22</b></td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	<b>165,91</b>		Limit	<b>140,98</b>		30% <sup>(1)</sup>	<b>67,22</b>		C <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.			
Rx	100%	<b>140,98</b>																																		
	Limit	<b>0,00</b>																																		
	C <sup>(1)</sup>	bezpł.																																		
	R <sup>(2)</sup>	<b>4,80</b>																																		
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																																		
Rx	100%	<b>165,91</b>																																		
	Limit	<b>140,98</b>																																		
	30% <sup>(1)</sup>	<b>67,22</b>																																		
	C <sup>(2)</sup>	bezpł.																																		
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																																		
INN: <b>Beclomethasone dipropionate + Formoterol fumarate dihydric</b>   ATC: <b>R03AK08</b>   wyk: <b>EAN ~ 300680</b> (1) Kobiety w ciąży (2) Astma (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b>   <b>Chiesi Farmaceutici S.p.A.</b>		INN: <b>Formoterol + Beclomethasone dipropionate</b>   ATC: <b>R03AK08</b>   wyk: <b>A</b>   EAN ~ <b>300314</b> (1) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   <b>Chiesi Farmaceutici S.p.A.</b>																																		
<b>Formoterol® Easyhaler®:</b> prosz. do inhal. <b>12 µg/dawkę</b> - 1 inhal. prosz. (120 dawek + opak. ochronne)	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td><b>117,35</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(3)</sup></td><td><b>7,43</b></td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	<b>117,35</b>		Limit	<b>0,00</b>		C <sup>(1)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	<b>7,43</b>		S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Fostex Nexthaler:</b> prosz. do inhal. <b>100/6 µg/dawkę</b> - 2 inhal. 180 dawek	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td><b>320,41</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>281,96</b></td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>123,04</b></td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	<b>320,41</b>		Limit	<b>281,96</b>		30% <sup>(1)</sup>	<b>123,04</b>		C <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx	100%	<b>117,35</b>																																		
	Limit	<b>0,00</b>																																		
	C <sup>(1)</sup>	bezpł.																																		
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																																		
	R <sup>(3)</sup>	<b>7,43</b>																																		
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.																																		
Rx	100%	<b>320,41</b>																																		
	Limit	<b>281,96</b>																																		
	30% <sup>(1)</sup>	<b>123,04</b>																																		
	C <sup>(2)</sup>	bezpł.																																		
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																																		
INN: <b>Formoterol</b>   ATC: <b>R03AC13</b>   wyk: <b>A</b>   EAN ~ <b>337446</b> (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Astma (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   <b>Orion Pharma Poland Sp. o.o.</b>		INN: <b>Urofollitropin</b>   ATC: <b>G03GA04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>083212</b> (1) Kontrolowana hiperstimulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli; Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) - refundacja do 3 cykli   Kat. ciąży: <b>X</b>   <b>IBSA Poland sp. z o.o.</b>																																		
<b>Fortimel Max:</b> płyn doust. [smak truskawkowy] - 4 but. 300 ml	<table border="1"> <tr><td>Ś</td><td>100%</td><td><b>56,16</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>56,16</b></td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(1)</sup></td><td><b>3,20</b></td></tr> </table>	Ś	100%	<b>56,16</b>		Limit	<b>56,16</b>		R <sup>(1)</sup>	<b>3,20</b>																										
Ś	100%	<b>56,16</b>																																		
	Limit	<b>56,16</b>																																		
	R <sup>(1)</sup>	<b>3,20</b>																																		
INN: <b>Dieta wysokoenergetyczna</b>   ATC: <b>V06</b>   wyk: <b>EAN ~ 553578</b> (1) Mukowiscydoza   Kat. ciąży: <b>N</b>   <b>Nutricia Polska Sp. z o.o.</b>																																				
<b>Fortimel Max:</b> płyn doust. [smak waniliowy] - 4 but. 300 ml	<table border="1"> <tr><td>Ś</td><td>100%</td><td><b>56,16</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>56,16</b></td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(1)</sup></td><td><b>3,20</b></td></tr> </table>	Ś	100%	<b>56,16</b>		Limit	<b>56,16</b>		R <sup>(1)</sup>	<b>3,20</b>																										
Ś	100%	<b>56,16</b>																																		
	Limit	<b>56,16</b>																																		
	R <sup>(1)</sup>	<b>3,20</b>																																		
INN: <b>Dieta wysokoenergetyczna</b>   ATC: <b>V06</b>   wyk: <b>EAN ~ 553486</b> (1) Mukowiscydoza   Kat. ciąży: <b>N</b>   <b>Nutricia Polska Sp. z o.o.</b>																																				

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

Fraxiparine®: inj. doż./podsk. [roztw.] 2850 j.m. aXa/0,3 ml - 10 amp.-strzyk. 0,3 ml	Rx	100%	79,59
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	48,43
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: Nadroparin calcium ATC: B01AB06 wyk: B EAN ~ 075621

(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 rż. - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciężarnych po wszczęciu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednią częstą kontrolą INR, d) nawroty żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

Fraxiparine®: inj. doż./podsk. [roztw.] 3800 j.m. aXa/0,4 ml - 10 amp.-strzyk. 0,4 ml	Rx	100%	100,66
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	58,05
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: Nadroparin calcium ATC: B01AB06 wyk: B EAN ~ 716821

(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 rż. - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciężarnych po wszczęciu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednią częstą kontrolą INR, d) nawroty żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

Fraxiparine®: inj. doż./podsk. [roztw.] 5700 j.m. aXa/0,6 ml - 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	Rx	100%	148,33
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	82,81
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: Nadroparin calcium ATC: B01AB06 wyk: B EAN ~ 075720

(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 rż. - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciężarnych po wszczęciu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednią częstą kontrolą INR, d) nawroty żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

Fraxiparine®: inj. doż./podsk. [roztw.] 7600 j.m. aXa/0,8 ml - 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	Rx	100%	187,30
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	98,87
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: Nadroparin calcium ATC: B01AB06 wyk: B EAN ~ 716920

(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 rż. - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciężarnych po wszczęciu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednią częstą kontrolą INR, d) nawroty żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

Fraxidi®: inj. podsk. [roztw.] 11 400 j.m. aXa/0,6 ml - 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	Rx	100%	224,38
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	91,21
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: Nadroparin calcium ATC: B01AB06 wyk: B EAN ~ 836932

(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 rż. - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciężarnych po wszczęciu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednią częstą kontrolą INR, d) nawroty żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

Fraxidi®: inj. podsk. [roztw.] 15 200 j.m. aXa/0,8 ml - 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	Rx	100%	298,46
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	120,90
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: Nadroparin calcium ATC: B01AB06 wyk: B EAN ~ 837038

(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 rż. - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciężarnych po wszczęciu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednią częstą kontrolą INR, d) nawroty żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B



**ZOLPIC** Daj owcom odpocząć.  
zolpidem



Fromilid® 250: tabl. powł. 250 mg - 14 szt. ◆	Rx	100% 20,29 Limit 18,08 50% <sup>(1)</sup> 11,25 DZ <sup>(2)</sup> bezpł. S <sup>(3)</sup> bezpł.		Furocef: tabl. powł. 500 mg - 14 szt. ◆	Rx	100% 47,90 Limit 47,90 50% <sup>(1)</sup> 23,95 DZ <sup>(2)</sup> bezpł. S <sup>(3)</sup> bezpł.	
INN: <i>Clarithromycin</i>   ATC: J01FA09   wyk: B   EAN ~ 773626 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.				INN: <i>Cefuroxime</i>   ATC: J01DC02   wyk: B   EAN ~ 231217 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Klarmin® [18,87], Klabax® [20,23], Fromilid® 250 [20,29], Klacid® [22,41]				Odpowiedniki: Cefuroxime Axetil Aurovitas [46,12], Furocef [47,90], Xorimax® 500 [49,27], Zamur 500 [51,10]			
Fromilid® 500: tabl. powł. 500 mg - 14 szt. ◆	Rx	100% 28,07 Limit 28,07 50% <sup>(1)</sup> 14,04 DZ <sup>(2)</sup> bezpł. S <sup>(3)</sup> bezpł.		Furosemid Medreg: tabl. 40 mg - 30 szt.	Rx	100% 7,66 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 3,20 S <sup>(3)</sup> bezpł.	
INN: <i>Clarithromycin</i>   ATC: J01FA09   wyk: B   EAN ~ 781010 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.				INN: <i>Furosemide</i>   ATC: C03CA01   wyk: B   EAN ~ 645197 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objawowe przerzuty w OUN - profilaktyka i leczenie wspomagające (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C MedReg sro			
Odpowiedniki: Klabax® [27,21], Fromilid® 500 [28,07], Klarmin® [30,36], Taclar® [34,88], Klacid® [42,72]				Odpowiedniki: Furosemidum Aurovitas [9,23], Furosemidum Polfarmex [9,61], Furosemidum Polpharma [9,77]			
Fromilid® 500: tabl. powł. 500 mg - 28 szt. ◆	Rx	100% 50,90 Limit 50,90 50% <sup>(1)</sup> 25,45 DZ <sup>(2)</sup> bezpł. S <sup>(3)</sup> bezpł.		Furosemidum Aurovitas: tabl. 40 mg - 30 szt. ◆	Rx	100% 9,23 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 3,20 S <sup>(3)</sup> bezpł.	
INN: <i>Clarithromycin</i>   ATC: J01FA09   wyk: B   EAN ~ 036546 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.				INN: <i>Furosemide</i>   ATC: C03CA01   wyk: B   EAN ~ 143458 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objawowe przerzuty w OUN - profilaktyka i leczenie wspomagające (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Klabax® [27,21], Fromilid® 500 [28,07], Klarmin® [30,36], Taclar® [34,88], Klacid® [42,72]				Odpowiedniki: Furosemidum Aurovitas [9,23], Furosemidum Polfarmex [9,61], Furosemidum Polpharma [9,77]			
Furaginum Adamed: tabl. 50 mg - 30 szt.	Rx	100% 5,87 Limit 5,42 50% <sup>(1)</sup> 2,84 DZ <sup>(2)</sup> bezpł. S <sup>(3)</sup> bezpł.		Furosemidum Polfarmex: tabl. 40 mg - 30 szt.	Rx	100% 9,61 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 3,20 S <sup>(3)</sup> bezpł.	
INN: <i>Furagin</i>   ATC: J01XE   wyk: B   EAN ~ 357215 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Adamed Sp. z o.o.				INN: <i>Furosemide</i>   ATC: C03CA01   wyk: B   EAN ~ 223794 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objawowe przerzuty w OUN - profilaktyka i leczenie wspomagające (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Polfarmex S.A.			
Odpowiedniki: Furaginum Teva [5,87], Furaginum Adamed [5,87]				Odpowiedniki: Furosemidum Aurovitas [9,23], Furosemidum Polfarmex [9,61], Furosemidum Polpharma [9,77]			
Furaginum Teva: tabl. 50 mg - 30 szt.	Rx	100% 5,87 Limit 5,42 50% <sup>(1)</sup> 2,84 DZ <sup>(2)</sup> bezpł. S <sup>(3)</sup> bezpł.		Furosemidum Polpharma: tabl. 40 mg - 30 szt.	Rx	100% 9,77 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 3,02 S <sup>(3)</sup> bezpł.	
INN: <i>Furagin</i>   ATC: J01XE   wyk: B   EAN ~ 988235 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:X, T2:B, T3:B Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.				INN: <i>Furosemide</i>   ATC: C03CA01   wyk: B   EAN ~ 135028 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objawowe przerzuty w OUN - profilaktyka i leczenie wspomagające (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			
Odpowiedniki: Furaginum Adamed [5,87], Furaginum Teva [5,87]				Odpowiedniki: Furosemidum Aurovitas [9,23], Furosemidum Polfarmex [9,61], Furosemidum Polpharma [9,77]			
Furaginum Teva: tabl. 100 mg - 30 szt.	Rx	100% 10,84 Limit 10,84 50% <sup>(1)</sup> 4,88 DZ <sup>(2)</sup> bezpł. S <sup>(3)</sup> bezpł.		Gabapentin Aurovitas: kaps. twarde 100 mg - 100 szt. ◆	Rx	100% 17,37 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 3,68 S <sup>(3)</sup> bezpł.	
INN: <i>Furagin</i>   ATC: J01XE   wyk: B   EAN ~ 373238 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:X, T2:B, T3:B Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.				INN: <i>Gabapentin</i>   ATC: N03AX12   wyk: B   EAN ~ 133110 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Padaczka oporna na leczenie WP: Ból inny niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Furaginum Adamed [5,87], Furaginum Teva [5,87]				Odpowiedniki: Gabacol [X], Gabapentin Aurovitas [17,37], Gabagamma 100 [17,83], Gabapentin Teva 100 mg [21,38], Neurontin® 100 [22,82]			
Furazek: tabl. 100 mg - 30 szt. ◆	Rx	100% 10,85 Limit 10,84 50% <sup>(1)</sup> 4,89 DZ <sup>(2)</sup> bezpł. S <sup>(3)</sup> bezpł.		Gabapentin Aurovitas: kaps. twarde 300 mg - 100 szt. ◆	Rx	100% 47,25 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 3,20 S <sup>(3)</sup> bezpł.	
INN: <i>Furazidin</i>   ATC: J01XE03   wyk: B   EAN ~ 304102 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:X, T2:B, T3:B Adamed Sp. z o.o.				INN: <i>Gabapentin</i>   ATC: N03AX12   wyk: B   EAN ~ 133115 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Padaczka oporna na leczenie WP: Ból inny niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Furaginum Adamed [5,87], Furaginum Teva [5,87]				Odpowiedniki: Gabacol [X], Gabapentin Teva - (IR) [46,50], Gabapentin Aurovitas [47,25], Gabapentin Teva 300 mg [50,68], Neurontin® 300 [63,16]			
Furocef: tabl. powł. 500 mg - 10 szt. ◆	Rx	100% 35,20 Limit 35,20 50% <sup>(1)</sup> 17,60 DZ <sup>(2)</sup> bezpł. S <sup>(3)</sup> bezpł.					
INN: <i>Cefuroxime</i>   ATC: J01DC02   wyk: B   EAN ~ 231194 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Krka Polska Sp. z o.o.							
Odpowiedniki: Cefuroxime Axetil Aurovitas [33,92], Furocef [35,20], Xorimax® 500 - (IR) [35,52], Zamur 500 [37,48], Xorimax® 500 [38,51]							

<b>Gabapentin Aurovitas:</b> kaps. twarde <b>400 mg</b> - 100 szt. ◆	Rx	100% <b>61,21</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Gabapentin</i>   ATC: N03AX12   wyk: B   EAN ~ 133120 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka oporna na leczenie WP: Ból inny niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Gabacol [X], Gabapentin Aurovitas [61,21], Gabapentin Teva 400 mg [67,28], Neurontin® 400 [81,59]		
<b>Gabapentin Teva 100 mg:</b> kaps. twarde <b>100 mg</b> - 100 szt. ◆	Rx	100% <b>21,38</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>7,69</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Gabapentin</i>   ATC: N03AX12   wyk: B   EAN ~ 339495 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka oporna na leczenie WP: Ból inny niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Gabacol [X], Gabapentin Aurovitas [17,37], Gabagamma 100 [17,83], Gabapentin Teva 100 mg [21,38], Neurontin® 100 [22,82]		
<b>Gabapentin Teva 300 mg:</b> kaps. twarde <b>300 mg</b> - 100 szt. ◆	Rx	100% <b>50,68</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Gabapentin</i>   ATC: N03AX12   wyk: B   EAN ~ 339709 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka oporna na leczenie WP: Ból inny niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Gabacol [X], Gabapentin Teva - (IR) [46,50], Gabapentin Aurovitas [47,25], Gabapentin Teva 300 mg [50,68], Neurontin® 300 [63,16]		
<b>Gabapentin Teva 400 mg:</b> kaps. twarde <b>400 mg</b> - 100 szt. ◆	Rx	100% <b>67,28</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Gabapentin</i>   ATC: N03AX12   wyk: B   EAN ~ 339600 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka oporna na leczenie WP: Ból inny niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Gabacol [X], Gabapentin Aurovitas [61,21], Gabapentin Teva 400 mg [67,28], Neurontin® 400 [81,59]		
<b>Gabapentin Teva 600 mg:</b> tabl. powł. <b>600 mg</b> - 100 szt. ◆	Rx	100% <b>100,47</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,56</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Gabapentin</i>   ATC: N03AX12   wyk: B   EAN ~ 338542 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka oporna na leczenie WP: Ból inny niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Gabapentin Teva 600 mg [100,47], Neurontin® 600 [117,30]		
<b>Gabapentin Teva 800 mg:</b> tabl. powł. <b>800 mg</b> - 100 szt. ◆	Rx	100% <b>133,90</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>4,74</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Gabapentin</i>   ATC: N03AX12   wyk: B   EAN ~ 338658 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka oporna na leczenie WP: Ból inny niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Gabapentin Teva 800 mg [133,90], Neurontin® 800 [135,39]		
<b>Gabapentin Teva - (IR):</b> kaps. twarde <b>300 mg</b> - 100 szt. ◆	Rx	100% <b>46,50</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Gabapentin</i>   ATC: N03AX12   wyk: B   EAN ~ 142534 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka oporna na leczenie WP: Ból inny niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Delfarma Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Gabacol [X], Gabapentin Teva - (IR) [46,50], Gabapentin Aurovitas [47,25], Gabapentin Teva 300 mg [50,68], Neurontin® 300 [63,16]		

<b>Gabitril®:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 50 szt. ◆	Rx	100% <b>96,07</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>4,58</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Tiagabine</i>   ATC: N03AG06   wyk: B   EAN ~ 058822 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka oporna na leczenie(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.		
<b>Gabitril®:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 50 szt. ◆	Rx	100% <b>189,39</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Tiagabine</i>   ATC: N03AG06   wyk: B   EAN ~ 058839 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka oporna na leczenie(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.		
<b>Gabitril®:</b> tabl. powł. <b>15 mg</b> - 50 szt. ◆	Rx	100% <b>281,04</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Tiagabine</i>   ATC: N03AG06   wyk: B   EAN ~ 058846 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka oporna na leczenie(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.		
<b>Galvus®:</b> tabl. <b>50 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>67,73</b> Limit <b>14,62</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>57,50</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Vildagliptin</i>   ATC: A10BH02   wyk: B   EAN ~ 105887 (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą; cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c $\geq 7\%$ (przez co najmniej 3 miesiące)(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Novartis Europharm Limited		
Odpowiedniki: Viglita [15,61], Kwikaton [15,83], Gliptivil [21,33], Anvidis [28,00], Galvus® [67,73]		
<b>Galvus®:</b> tabl. <b>50 mg</b> - 56 szt.	Rx	100% <b>133,92</b> Limit <b>29,23</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>113,46</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Vildagliptin</i>   ATC: A10BH02   wyk: B   EAN ~ 105888 (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą; cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c $\geq 7\%$ (przez co najmniej 3 miesiące)(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Novartis Europharm Limited		
Odpowiedniki: Viglita [29,63], Kwikaton [30,32], Anvidis [41,07], Gliptivil [41,07], Galvus® [133,92]		
<b>Ganfort®:</b> krople do oczu [roztw.] <b>(0,3 mg+ 5 mg/ml)</b> - 1 but. 3 ml	Rx	100% <b>42,33</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>10,09</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Bimatoprost + Timolol</i>   ATC: S01ED51   wyk: B   EAN ~ 574315 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG		
<b>Ganirelix Gedeon Richter:</b> inj. [roztw.] <b>0,25 mg/0,5 ml</b> - 1 amp.-strz. 0,5 ml	Rx-z	100% <b>97,10</b> Limit <b>97,10</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>48,55</b>
INN: <i>Ganirelix</i>   ATC: H01CC01   wyk: B   EAN ~ 137204 (1) Zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników w programach wspomaganego rozrodu - refundacja do 3 cykli   Kat. ciąży: X Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.		
<b>Gasec®-20 Gastrocaps®:</b> kaps. twarde <b>20 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>16,34</b> Limit <b>12,43</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>10,13</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Omeprazole</i>   ATC: A02BC01   wyk: B   EAN ~ 420537 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Teva B.V.		
Odpowiedniki: Prenome [9,47], Heligen Neo [9,66], Omeprazole Genoptim [10,75], Agastin® [11,85], Goprazol [12,39], Progamist [14,57], Ultop [16,26], Gasec®-20 Gastrocaps® [16,34], Helicid® 20 [18,49], Prazol® [19,18], Bioprazol® [19,76], Polprazol® [20,92]		





Naszym wyborem

enarenal

enalaprilii maleas

<b>Gasec®-20 Gastrocaps®</b> : kaps. twarde <b>20 mg</b> - 56 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>31,40</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>24,87</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>18,97</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>31,40</b>	Limit	<b>24,87</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>18,97</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	bezpł.	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Gensulin M50 (50/50)</b> : inj. zawiesina [M50] <b>100 j.m./ml</b> - 5 wkł. 3 ml	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>104,40</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td><b>7,62</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>104,40</b>	Limit	<b>0,00</b>	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	<b>7,62</b>	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	<b>31,40</b>																										
Limit	<b>24,87</b>																										
50% <sup>(1)</sup>	<b>18,97</b>																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
100%	<b>104,40</b>																										
Limit	<b>0,00</b>																										
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	<b>7,62</b>																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
INN: <b>Omeprazole</b>   ATC: <b>A02BC01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>420544</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Teva B.V. Odpowiedniki: Ultop [30,13], Prazol® [30,50], Gasec®-20 Gastrocaps® [31,40]		INN: <b>Insulin human/Insulin isophanic human</b>   ATC: <b>A10AD01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>853519</b> (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>A</b> Bioton S.A.																									
<b>G-BIO</b> : test paskowy - 50 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>37,55</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>37,55</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>11,27</b></td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>3,20</b></td></tr> </table>	100%	<b>37,55</b>	Limit	<b>37,55</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>11,27</b>	R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>	<b>Gensulin M50 (50/50)</b> : inj. zawiesina [M50] <b>100 j.m./ml</b> - 10 wkł. 3 ml	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>185,80</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td><b>8,00</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>185,80</b>	Limit	<b>0,00</b>	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	<b>8,00</b>	S <sup>(4)</sup>	bezpł.				
100%	<b>37,55</b>																										
Limit	<b>37,55</b>																										
30% <sup>(1)</sup>	<b>11,27</b>																										
R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>																										
100%	<b>185,80</b>																										
Limit	<b>0,00</b>																										
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	<b>8,00</b>																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
INN: <b>Glukoza we krwi</b>   ATC: <b>V07AD</b>   wyk:   EAN ~ <b>000004</b>		INN: <b>Insulin human/Insulin isophanic human</b>   ATC: <b>A10AD01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>095858</b>																									
(1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej   Kat. ciąży: <b>N</b> Pharm Supply Sp. z o.o. Odpowiedniki: DIAVUE ToGo [35,43], OKmeter Core [35,43], Wellion SymPhar [36,63], G-BIO [37,55], Multisure GK [37,66], Everchek [37,77], Examedin® Fast [38,12], GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A [38,23], Cera-Chek 1 Code [38,33], VivaChek Ino [38,33], VivaChek Ino [38,33], One Touch Select Plus [38,35], Glucocard 01 Sensor [38,66], Glucosense® [38,77], EverCare [38,80], GensuCare [38,80], Optium Xido [38,88], Contour Plus [39,09], Contour TS [39,09], iXell® [39,15], Abra [39,27], Accu-Chek® Performa [39,27], Diagnostic Gold Strip [39,49], Glucomaxx® [39,55]		(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>A</b> Bioton S.A.																									
<b>GensuCare</b> : test paskowy - 50 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>38,80</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>38,80</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>11,64</b></td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>3,20</b></td></tr> </table>	100%	<b>38,80</b>	Limit	<b>38,80</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>11,64</b>	R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>	<b>Gensulin N</b> : inj. [zaw.] <b>100 j.m./ml</b> - 5 wkł. 3 ml	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>104,40</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td><b>7,62</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>104,40</b>	Limit	<b>0,00</b>	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	<b>7,62</b>	S <sup>(4)</sup>	bezpł.				
100%	<b>38,80</b>																										
Limit	<b>38,80</b>																										
30% <sup>(1)</sup>	<b>11,64</b>																										
R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>																										
100%	<b>104,40</b>																										
Limit	<b>0,00</b>																										
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	<b>7,62</b>																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
INN: <b>Glukoza we krwi</b>   ATC: <b>V07AD</b>   wyk:   EAN ~ <b>161135</b>		INN: <b>Insulin isophanic human</b>   ATC: <b>A10AC01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>852413</b>																									
(1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej   Kat. ciąży: <b>N</b> Bioton S.A.		(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>A</b> Bioton S.A.																									
<b>Gensulin M30 (30/70)</b> : inj. zawiesina [M30] <b>100 j.m./ml</b> - 5 wkł. 3 ml	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>100,78</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td><b>4,00</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>100,78</b>	Limit	<b>0,00</b>	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	<b>4,00</b>	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Gensulin N</b> : inj. [zaw.] <b>100 j.m./ml</b> - 10 wkł. 3 ml	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>185,80</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td><b>8,00</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>185,80</b>	Limit	<b>0,00</b>	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	<b>8,00</b>	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	<b>100,78</b>																										
Limit	<b>0,00</b>																										
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	<b>4,00</b>																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
100%	<b>185,80</b>																										
Limit	<b>0,00</b>																										
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	<b>8,00</b>																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
INN: <b>Insulin human/Insulin isophanic human</b>   ATC: <b>A10AD01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>853113</b>		INN: <b>Insulin isophanic human</b>   ATC: <b>A10AC01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>095859</b>																									
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>A</b> Bioton S.A.		(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>A</b> Bioton S.A.																									
<b>Gensulin M30 (30/70)</b> : inj. zawiesina [M30] <b>100 j.m./ml</b> - 10 wkł. 3 ml	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>185,80</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td><b>8,00</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>185,80</b>	Limit	<b>0,00</b>	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	<b>8,00</b>	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Gensulin R</b> : inj. [roztw.] <b>100 j.m./ml</b> - 5 wkł. 3 ml	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>104,40</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td><b>7,62</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>104,40</b>	Limit	<b>0,00</b>	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	<b>7,62</b>	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	<b>185,80</b>																										
Limit	<b>0,00</b>																										
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	<b>8,00</b>																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
100%	<b>104,40</b>																										
Limit	<b>0,00</b>																										
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	<b>7,62</b>																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
INN: <b>Insulin human/Insulin isophanic human</b>   ATC: <b>A10AD01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>095856</b>		INN: <b>Insulin human</b>   ATC: <b>A10AB01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>852116</b>																									
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>A</b> Bioton S.A.		(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>A</b> Bioton S.A.																									
<b>Gensulin M40 (40/60)</b> : inj. zawiesina [M40] <b>100 j.m./ml</b> - 5 wkł. 3 ml	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>100,78</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td><b>4,00</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>100,78</b>	Limit	<b>0,00</b>	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	<b>4,00</b>	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Gensulin R</b> : inj. [roztw.] <b>100 j.m./ml</b> - 10 wkł. 3 ml	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>185,80</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td><b>8,00</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>185,80</b>	Limit	<b>0,00</b>	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	<b>8,00</b>	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	<b>100,78</b>																										
Limit	<b>0,00</b>																										
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	<b>4,00</b>																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
100%	<b>185,80</b>																										
Limit	<b>0,00</b>																										
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	<b>8,00</b>																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
INN: <b>Insulin human/Insulin isophanic human</b>   ATC: <b>A10AD01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>853311</b>		INN: <b>Insulin human</b>   ATC: <b>A10AB01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>095860</b>																									
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>A</b> Bioton S.A.		(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>A</b> Bioton S.A.																									
<b>Gensulin M40 (40/60)</b> : inj. zawiesina [M40] <b>100 j.m./ml</b> - 10 wkł. 3 ml	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>185,80</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td><b>8,00</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>185,80</b>	Limit	<b>0,00</b>	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	<b>8,00</b>	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Gentamicin WZF 0,3%</b> : krople do oczu [roztw.] <b>3 mg/ml</b> - 1 but. 5 ml	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>9,10</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>9,10</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>4,55</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>9,10</b>	Limit	<b>9,10</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>4,55</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
100%	<b>185,80</b>																										
Limit	<b>0,00</b>																										
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	<b>8,00</b>																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
100%	<b>9,10</b>																										
Limit	<b>9,10</b>																										
50% <sup>(1)</sup>	<b>4,55</b>																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
INN: <b>Insulin human/Insulin isophanic human</b>   ATC: <b>A10AD01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>853311</b>		INN: <b>Gentamicin sulphate</b>   ATC: <b>S01AA11</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>092413</b>																									
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>A</b> Bioton S.A.		(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Polfa Warszawa SA																									
<b>Gerdin 20 mg</b> : tabl. dojelitowe <b>20 mg</b> - 28 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>7,36</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>6,22</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>4,25</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>7,36</b>	Limit	<b>6,22</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>4,25</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Gerdin 20 mg</b> : tabl. dojelitowe <b>20 mg</b> - 28 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>7,36</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>6,22</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>4,25</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>7,36</b>	Limit	<b>6,22</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>4,25</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.				
100%	<b>7,36</b>																										
Limit	<b>6,22</b>																										
50% <sup>(1)</sup>	<b>4,25</b>																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
100%	<b>7,36</b>																										
Limit	<b>6,22</b>																										
50% <sup>(1)</sup>	<b>4,25</b>																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
INN: <b>Insulin human/Insulin isophanic human</b>   ATC: <b>A10AD01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>095857</b>		INN: <b>Pantoprazole</b>   ATC: <b>A02BC02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>245399</b>																									
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>A</b> Bioton S.A.		(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> S Lab Sp. z o.o.																									
Odpowiedniki: Pamyl 20 mg [6,32], Pantoprazole Genoptim [6,80], Ozion [6,91], Pantoprazole Bluefish [7,13], Panrazol [7,23], Gerdin 20 mg [7,36], Panprazolox [8,05], Noacid [8,37], Ranloc [9,02], Nolpaza® 20 mg tabletki dojelitowe [9,07], Controloc® 20 [9,80], Panzol [10,03], IPP 20 [10,14], Contix [10,48], Anesteloc® 20 [11,29]																											

**Loperamid WZF**  
Loperamidi hydrochloridum

Przerwij niekończące się wizyty

Nowe opakowanie:  
**2 mg x 15 tabl.**

<b>Gerdi 40 mg:</b> tabl. dojelitowe <b>40 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>13,46</b> Limit <b>12,43</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>7,25</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Pantoprazole</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B S Lab Sp. z o.o.	ATC: <b>A02BC02</b> wyk: B EAN ~ <b>245337</b>	
<b>Odpowiedniki:</b> Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [11,61], Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [11,63], Pamyli 40 mg [12,71], Pantoprazole Genoptim [12,71], Ozion [12,93], Pantoprazole Bluefish [13,25], <b>Gerdi 40 mg [13,46]</b> , Panrazol [13,71], Panprazol [15,37], Contix [15,47], Noacid [16,00], Ranloc [17,37], Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe [17,49], Controloc® 40 [17,52], Panzol [19,53], IPP 40 [19,66], Anesteloc® 40 [19,74]		
<b>Gisartan:</b> tabl. <b>80/12,5 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>31,12</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>16,14</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	ATC: <b>C09DA07</b> wyk: B EAN ~ <b>080051</b>	
<b>Odpowiedniki:</b> Toptelmi HCT [23,61], Telmisartan + HCT Genoptim [25,51], Telmix Plus [27,46], Tezeo HCT [29,52], Tolucombi [30,55], Actelsar HCT [31,00], Telmisartan HCT EGIS [31,00], Zanacondar Combi [31,12], <b>Gisartan [31,12]</b> , Polsart Plus [31,65], Telmizek HCT [33,98], PritorPlus® [35,35], MicardisPlus [38,59]		
<b>Gisartan:</b> tabl. <b>80/25 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>31,12</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>16,14</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	ATC: <b>C09DA07</b> wyk: B EAN ~ <b>080174</b>	
<b>Odpowiedniki:</b> Toptelmi HCT [23,61], Telmisartan + HCT Genoptim [25,51], Telmix Plus [27,46], Tezeo HCT [29,52], Tolucombi [30,55], Actelsar HCT [31,00], Telmisartan HCT EGIS [31,00], Zanacondar Combi [31,12], <b>Gisartan [31,12]</b> , Polsart Plus [31,65], Telmizek HCT [33,98], PritorPlus® [35,35], MicardisPlus [38,59]		
<b>Glandex:</b> tabl. powł. <b>25 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100% <b>76,55</b> Limit <b>56,72</b> B <sup>(1)</sup> <b>19,83</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Exemestane</b> (1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii WP: Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA	ATC: <b>L02BG06</b> wyk: B EAN ~ <b>812202</b>	
<b>Odpowiedniki:</b> Symex [76,42], <b>Glandex [76,55]</b>		
<b>Glibetic 1 mg:</b> tabl. <b>1 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>6,05</b> Limit <b>4,91</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,91</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Glimepiride</b> (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA	ATC: <b>A10BB12</b> wyk: B EAN ~ <b>097615</b>	
<b>Odpowiedniki:</b> Glitoprel [X], Symglic® [4,89], GlimeHEXAL 1 [5,14], Diari® [6,00], <b>Glibetic 1 mg [6,05]</b> , Amaryl® 1 [6,63]		
<b>Glibetic 2 mg:</b> tabl. <b>2 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>11,30</b> Limit <b>9,83</b> R <sup>(1)</sup> <b>4,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Glimepiride</b> (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA	ATC: <b>A10BB12</b> wyk: B EAN ~ <b>097516</b>	
<b>Odpowiedniki:</b> Glimepiride Aurovitas [X], Glitoprel [X], Symglic® [9,02], GlimeHEXAL 2 [9,39], Diari® [10,09], Amaryl® 2 [11,23], <b>Glibetic 2 mg [11,30]</b>		
<b>Glibetic 3 mg:</b> tabl. <b>3 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>16,34</b> Limit <b>14,74</b> R <sup>(1)</sup> <b>5,76</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Glimepiride</b> (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA	ATC: <b>A10BB12</b> wyk: B EAN ~ <b>097417</b>	
<b>Odpowiedniki:</b> Glimepiride Aurovitas [X], Glitoprel [X], Symglic® [12,32], GlimeHEXAL 3 [13,55], Diari® [14,14], <b>Glibetic 3 mg [16,34]</b> , Amaryl® 3 [17,61]		
<b>Glibetic 4 mg:</b> tabl. <b>4 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>19,65</b> Limit <b>19,65</b> R <sup>(1)</sup> <b>5,76</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Glimepiride</b> (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA	ATC: <b>A10BB12</b> wyk: B EAN ~ <b>097318</b>	
<b>Odpowiedniki:</b> Glimepiride Aurovitas [X], Glitoprel [X], Symglic® [16,46], Diari® [17,55], GlimeHEXAL 4 [17,55], Amaryl® 4 [17,60], <b>Glibetic 4 mg [19,65]</b>		

<b>Gliclada®:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>90 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>24,58</b> Limit <b>14,74</b> R <sup>(1)</sup> <b>14,64</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Gliclazide</b> (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Krka Polska Sp. z o.o.	ATC: <b>A10BB09</b> wyk: B EAN ~ <b>267230</b>	
<b>Odpowiedniki:</b> Symazide MR [X], Clazicon [12,09], Symazide MR 30 [12,20], <b>Gliclada® [15,62]</b> , Diaprel® MR [24,95]		
<b>Gliclada®:</b> tabl. o zmodyf. uwalnianiu <b>30 mg</b> - 60 szt.	Rx	100% <b>15,62</b> Limit <b>9,83</b> R <sup>(1)</sup> <b>8,99</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Gliclazide</b> (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Krka Polska Sp. z o.o.	ATC: <b>A10BB09</b> wyk: B EAN ~ <b>647224</b>	
<b>Odpowiedniki:</b> Symazide MR [X], Clazicon [12,09], Symazide MR 30 [12,20], <b>Gliclada® [15,62]</b> , Diaprel® MR [24,95]		
<b>Gliclada®:</b> tabl. o zmodyf. uwalnianiu <b>30 mg</b> - 90 szt.	Rx	100% <b>23,16</b> Limit <b>14,74</b> R <sup>(1)</sup> <b>13,22</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Gliclazide</b> (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Krka Polska Sp. z o.o.	ATC: <b>A10BB09</b> wyk: B EAN ~ <b>647231</b>	
<b>Odpowiedniki:</b> Symazide MR [X], Clazicon [12,09], Diagen [12,09], Salson [12,36], Symazide MR [13,05], <b>Gliclada® [15,50]</b> , Oziclide MR [15,62], Diaprel® MR [23,50]		
<b>Gliclada®:</b> tabl. o zmodyf. uwalnianiu <b>60 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>15,50</b> Limit <b>9,83</b> R <sup>(1)</sup> <b>8,87</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Gliclazide</b> (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Krka Polska Sp. z o.o.	ATC: <b>A10BB09</b> wyk: B EAN ~ <b>056100</b>	
<b>Odpowiedniki:</b> Gliclazide Zentiva [X], Clazicon [12,09], Diagen [12,09], Salson [12,36], Symazide MR [13,05], <b>Gliclada® [15,50]</b> , Oziclide MR [15,62], Diaprel® MR [23,50]		
<b>Gliclada®:</b> tabl. o zmodyf. uwalnianiu <b>60 mg</b> - 60 szt.	Rx	100% <b>30,20</b> Limit <b>19,65</b> R <sup>(1)</sup> <b>16,95</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Gliclazide</b> (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Krka Polska Sp. z o.o.	ATC: <b>A10BB09</b> wyk: B EAN ~ <b>056131</b>	
<b>Odpowiedniki:</b> Symazide MR 60 [23,55], Salson [23,90], <b>Gliclada® [30,20]</b> , Oziclide MR [30,42]		
<b>GlimeHEXAL 1:</b> tabl. <b>1 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>5,14</b> Limit <b>4,91</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,43</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Glimepiride</b> (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sandoz GmbH	ATC: <b>A10BB12</b> wyk: B EAN ~ <b>337453</b>	
<b>Odpowiedniki:</b> Glitoprel [X], Symglic® [4,89], <b>GlimeHEXAL 1 [5,14]</b> , Diari® [6,00], Glibetic 1 mg [6,05], Amaryl® 1 [6,63]		
<b>GlimeHEXAL 2:</b> tabl. <b>2 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>9,39</b> Limit <b>9,39</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Glimepiride</b> (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sandoz GmbH	ATC: <b>A10BB12</b> wyk: B EAN ~ <b>337521</b>	
<b>Odpowiedniki:</b> Glimepiride Aurovitas [X], Glitoprel [X], Symglic® [9,02], <b>GlimeHEXAL 2 [9,39]</b> , Diari® [10,09], Amaryl® 2 [11,23], Glibetic 2 mg [11,30]		
<b>GlimeHEXAL 3:</b> tabl. <b>3 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>13,55</b> Limit <b>13,55</b> R <sup>(1)</sup> <b>4,80</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Glimepiride</b> (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sandoz GmbH	ATC: <b>A10BB12</b> wyk: B EAN ~ <b>338078</b>	
<b>Odpowiedniki:</b> Glimepiride Aurovitas [X], Glitoprel [X], Symglic® [12,32], <b>GlimeHEXAL 3 [13,55]</b> , Diari® [14,14], Glibetic 3 mg [16,34], Amaryl® 3 [17,61]		
<b>GlimeHEXAL 4:</b> tabl. <b>4 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>17,55</b> Limit <b>17,55</b> R <sup>(1)</sup> <b>6,40</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Glimepiride</b> (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sandoz GmbH	ATC: <b>A10BB12</b> wyk: B EAN ~ <b>338146</b>	
<b>Odpowiedniki:</b> Glimepiride Aurovitas [X], Glitoprel [X], Symglic® [16,46], Diari® [17,55], <b>GlimeHEXAL 4 [17,55]</b> , Amaryl® 4 [17,60], Glibetic 4 mg [19,65]		
<b>GlimeHEXAL 6:</b> tabl. <b>6 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>25,76</b> Limit <b>25,76</b> R <sup>(1)</sup> <b>9,60</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Glimepiride</b> (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sandoz GmbH	ATC: <b>A10BB12</b> wyk: B EAN ~ <b>338207</b>	
<b>Odpowiedniki:</b> Symglic® [25,52], <b>GlimeHEXAL 6 [25,76]</b>		



<b>Glipizide BP: tabl. 5 mg - 30 szt.</b>			Rx	100%	11,93
				Limit	4,91
				R <sup>(1)</sup>	10,22
				S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Glipizide</i>		ATC: A10BB07	wyk: B	EAN ~ 791712	
(1) Cukrzyca(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Galena"					
<b>Gliptivil: tabl. 50 mg - 28 szt. ◆</b>			Rx	100%	21,33
				Limit	14,62
				30% <sup>(1)</sup>	11,10
				S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Vildagliptin</i>		ATC: A10BD02	wyk: B	EAN ~ 149272	
(1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą; cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c ≥ 7% (przez co najmniej 3 miesiące)(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Viglita [15,61], Kwikaton [15,83], Gliptivil [21,33], Anvildis [28,00], Galvus® [67,73]					
<b>Gliptivil: tabl. 50 mg - 56 szt. ◆</b>			Rx	100%	41,07
				Limit	29,23
				30% <sup>(1)</sup>	20,61
				S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Vildagliptin</i>		ATC: A10BD02	wyk: B	EAN ~ 149273	
(1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą; cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c ≥ 7% (przez co najmniej 3 miesiące)(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Viglita [29,63], Kwikaton [30,32], Anvildis [41,07], Gliptivil [41,07], Galvus® [133,92]					
<b>Gliptivil Combo: tabl. powł. 50 mg/1000 mg - 60 szt. ◆</b>			Rx	100%	32,70
				Limit	31,32
				30% <sup>(1)</sup>	10,78
				S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Vildagliptin + Metformin hydrochloride</i>		ATC: A10BD08	wyk: B	EAN ~ 149699	
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.					
<b>Gliptivil Combo: tabl. powł. 50 mg/850 mg - 60 szt. ◆</b>			Rx	100%	32,70
				Limit	31,32
				30% <sup>(1)</sup>	10,78
				S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Vildagliptin + Metformin hydrochloride</i>		ATC: A10BD08	wyk: B	EAN ~ 149697	
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.					
<b>GlucaGen® 1 mg HypoKit: inj. [prosz.+ rozp.] 1 mg - 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk.</b>			Rx	100%	65,74
				Limit	0,00
				DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
				R <sup>(2)</sup>	3,20
				S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Glucagon</i>		ATC: H04AA01	wyk: B	EAN ~ 693313	
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.					
<b>Glucocard 01 Sensor: test diagnostyczny do szybkich oznaczeń - 50 szt.</b>			WM	100%	38,66
				Limit	38,66
				30% <sup>(1)</sup>	11,60
				R <sup>(2)</sup>	3,20
INN: <i>Glukoza we krwi</i>		ATC: V07AD	wyk: B	EAN ~ 785590	
(1) Cukrzyca(2) Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej   Kat. ciąży: N Color Trading Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: DIAVUE ToGo [35,43], OKmeter Core [35,43], Wellion SymPhar [36,63], G-BIO [37,55], Multisure GK [37,66], Everchek [37,77], Examedin® Fast [38,12], GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A [38,23], Cera-Chek 1 Code [38,33], VivaChek Ino [38,33], VivaChek Ino [38,33], One Touch Select Plus [38,35], Glucocard 01 Sensor [38,66], Glucosense® [38,77], EverCare [38,80], GensuCare [38,80], Optium Xido [38,88], Contour Plus [39,09], Contour TS [39,09], iXell® [39,15], Abra [39,27], Accu-Chek® Performa [39,27], Diagnostic Gold Strip [39,49], Glucomaxx® [39,55]					
<b>GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A: test paskowy - 50 szt.</b>			WM	100%	38,23
				Limit	38,23
				30% <sup>(1)</sup>	11,47
				R <sup>(2)</sup>	3,20
INN: <i>Glukoza we krwi</i>		ATC: V07AD	wyk: B	EAN ~ 340125	
(1) Cukrzyca(2) Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej   Kat. ciąży: N Disphar International B.V.					
Odpowiedniki: DIAVUE ToGo [35,43], OKmeter Core [35,43], Wellion SymPhar [36,63], G-BIO [37,55], Multisure GK [37,66], Everchek [37,77], Examedin® Fast [38,12], GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A [38,23], Cera-Chek 1 Code [38,33], VivaChek Ino [38,33], VivaChek Ino [38,33], One Touch Select Plus [38,35], Glucocard 01 Sensor [38,66], Glucosense® [38,77], EverCare [38,80], GensuCare [38,80], Optium Xido [38,88], Contour Plus [39,09], Contour TS [39,09], iXell® [39,15], Abra [39,27], Accu-Chek® Performa [39,27], Diagnostic Gold Strip [39,49], Glucomaxx® [39,55]					
<b>Glucomaxx®: test paskowy - 50 szt.</b>			WM	100%	39,55
				Limit	39,09
				30% <sup>(1)</sup>	12,19
				R <sup>(2)</sup>	3,66
INN: <i>Glukoza we krwi</i>		ATC: V07AD	wyk: B	EAN ~ 882327	
(1) Cukrzyca(2) Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej   Kat. ciąży: N Genexo Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: DIAVUE ToGo [35,43], OKmeter Core [35,43], Wellion SymPhar [36,63], G-BIO [37,55], Multisure GK [37,66], Everchek [37,77], Examedin® Fast [38,12], GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A [38,23], Cera-Chek 1 Code [38,33], VivaChek Ino [38,33], VivaChek Ino [38,33], One Touch Select Plus [38,35], Glucocard 01 Sensor [38,66], Glucosense® [38,77], EverCare [38,80], GensuCare [38,80], Optium Xido [38,88], Contour Plus [39,09], Contour TS [39,09], iXell® [39,15], Abra [39,27], Accu-Chek® Performa [39,27], Diagnostic Gold Strip [39,49], Glucomaxx® [39,55]					
<b>GlucoPhage® 500 mg: tabl. powł. 500 mg - 30 szt.</b>			Rx	100%	5,91
				Limit	0,00
				DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
				R <sup>(2)</sup>	5,22
				S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i>		ATC: A10BA02	wyk: B	EAN ~ 789276	
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Merck Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Metcrean [4,26], Metformin Bluefish [4,26], Zenofor [4,47], Avamina [4,51], Siofor® 500 [5,11], Formetic [5,13], Metformax® 500 [5,71], GlucoPhage® 500 mg [5,91], Metformax 500 [7,30]					
<b>GlucoPhage® 850 mg: tabl. powł. 850 mg - 30 szt.</b>			Rx	100%	8,16
				Limit	0,00
				DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
				R <sup>(2)</sup>	4,74
				S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i>		ATC: A10BA02	wyk: B	EAN ~ 789290	
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Merck Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Metformin 850 [6,20], Metformin Bluefish [6,37], Metcrean [6,64], Avamina [6,97], Zenofor [6,99], Formetic [7,39], Siofor® 850 [7,40], Metformax® 850 [7,93], GlucoPhage® 850 mg [8,16]					
<b>GlucoPhage® 850 mg: tabl. powł. 850 mg - 60 szt.</b>			Rx	100%	13,94
				Limit	0,00
				DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
				R <sup>(2)</sup>	3,90
				S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i>		ATC: A10BA02	wyk: B	EAN ~ 789306	
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Merck Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Avamina [12,50], Zenofor [13,07], Siofor® 850 [13,88], Formetic [13,93], GlucoPhage® 850 mg [13,94], Etfom 850 [14,95], Metformax® 850 [14,95]					
<b>GlucoPhage® 1000 mg: tabl. powł. 1000 mg - 30 szt.</b>			Rx	100%	8,63
				Limit	0,00
				DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
				R <sup>(2)</sup>	4,04
				S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i>		ATC: A10BA02	wyk: B	EAN ~ 717248	
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Merck Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Metformin Bluefish [7,33], Metformax 1000 [7,93], Zenofor [8,07], Avamina [8,36], Siofor® 1000 [8,55], Formetic [8,61], GlucoPhage® 1000 mg [8,63], Metformax® 1000 [8,67]					
<b>GlucoPhage® XR: tabl. o przedł. uwalnianiu 500 mg - 30 szt.</b>			Rx	100%	9,32
				Limit	0,00
				DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
				R <sup>(2)</sup>	8,63
				S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i>		ATC: A10BA02	wyk: B	EAN ~ 624751	
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Merck Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Zenofor SR [6,57], Etfom SR [6,76], Metcrean XR [6,86], Siofor® XR 500 mg [7,71], Symformin XR [7,81], Avamina SR [9,31], GlucoPhage® XR [9,32], Metformax® SR 500 [9,48]					
<b>GlucoPhage® XR: tabl. o przedł. uwalnianiu 500 mg - 60 szt.</b>			Rx	100%	18,87
				Limit	0,00
				DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
				R <sup>(2)</sup>	14,28
				S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i>		ATC: A10BA02	wyk: B	EAN ~ 624768	
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Merck Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Diabufor XR [10,85], Ranmet XR [10,85], Zenofor SR [12,29], Etfom SR [12,68], Metcrean XR [12,89], Symformin XR [14,89], Avamina SR [17,25], Metformax® SR 500 [18,58], GlucoPhage® XR [18,87]					



<b>Glucophage® XR:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>750 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>13,67</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>11,03</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Metformin hydrochloride</i>   ATC: <b>A10BA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>213429</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Merck Sp. z o.o. Odpowiedniki: Zenofor SR [9,43], Eform SR [9,69], Siofor® XR 750 mg [10,82], Symformin XR [11,26], Metformax® SR 750 [11,46], Avamina SR [13,07], <b>Glucophage® XR [13,67]</b>		
<b>Glucophage® XR:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>750 mg</b> - 60 szt.	Rx	100% <b>28,12</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>19,64</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Metformin hydrochloride</i>   ATC: <b>A10BA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>213436</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Merck Sp. z o.o. Odpowiedniki: Diabufor XR [16,01], Ranmet XR [16,01], Zenofor SR [18,27], Eform SR [18,84], Symformin XR [22,16], Metformax® SR 750 [22,57], Avamina SR [24,11], <b>Glucophage® XR [28,12]</b>		
<b>Glucophage® XR:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>1000 mg</b> - 60 szt.	Rx	100% <b>37,21</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>24,84</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Metformin hydrochloride</i>   ATC: <b>A10BA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>864461</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Merck Sp. z o.o. Odpowiedniki: Diabufor XR [21,05], Ranmet XR [21,05], Zenofor SR [24,04], Eform SR [24,81], Metformax® SR 1000 [28,92], Symformin XR [29,21], Avamina SR [32,48], <b>Glucophage® XR [37,21]</b>		
<b>Glucosense®:</b> test diagnostyczny do szybkich oznaczeń - 50 szt.	WM	100% <b>38,77</b> Limit <b>38,77</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>11,63</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b>
INN: <i>Glukoza we krwi</i>   ATC: <b>V07AD</b>   wyk: <b>EAN ~ 562274</b> (1) Cukrzyca(2) Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięcia insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej   Kat. ciąży: <b>N</b>   Genexo Sp. z o.o.		
<b>Glypivilo:</b> tabl. <b>50 mg</b> - 60 szt.	Rx	100% <b>41,29</b> Limit <b>31,32</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>19,37</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Vildagliptin</i>   ATC: <b>L01XE01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>137238</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Krka Polska Sp. z o.o.		
<b>Gonal-®:</b> inj. podsk. [roztw.] <b>75 j.m.</b> - 1 fiol. (+1 amp.-strzyk. rozp.)	Rx-z	100% <b>97,99</b> Limit <b>76,49</b> R <sup>(1)</sup> <b>24,70</b>
INN: <i>Follitropin alfa</i>   ATC: <b>G03GA05</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>697304</b> (1) Kontrolowana hiperstimulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rękujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli; Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rękujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) - refundacja do 3 cykli; Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH, FSH w skojarzeniu z hormonem leutinizującym LH - refundacja do 3 cykli   Kat. ciąży: <b>X</b>   Merck Sp. z o.o.		
<b>Gonal-®:</b> inj. podsk. [roztw.] <b>300 j.m./0,5 ml</b> - 1 wstrzyk. (+ 8 igieł)	Rx-z	100% <b>362,19</b> Limit <b>305,99</b> R <sup>(1)</sup> <b>59,40</b>
INN: <i>Follitropin alfa</i>   ATC: <b>G03GA05</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>007257</b> (1) Kontrolowana hiperstimulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rękujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli; Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rękujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) - refundacja do 3 cykli; Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH, FSH w skojarzeniu z hormonem leutinizującym LH - refundacja do 3 cykli   Kat. ciąży: <b>X</b>   Merck Sp. z o.o.		

<b>Gonal-®:</b> inj. podsk. [roztw.] <b>900 j.m./1,5 ml</b> - 1 wstrzyk. (+ 20 igieł)	Rx-z	100% <b>1058,85</b> Limit <b>918,00</b> R <sup>(1)</sup> <b>144,05</b>
INN: <i>Follitropin alfa</i>   ATC: <b>G03GA05</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>007240</b> (1) Kontrolowana hiperstimulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rękujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli; Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rękujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) - refundacja do 3 cykli; Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH, FSH w skojarzeniu z hormonem leutinizującym LH - refundacja do 3 cykli   Kat. ciąży: <b>X</b>   Merck Sp. z o.o.		
<b>Gonapeptyl Daily:</b> inj. [roztw.] <b>0,1 mg/ml</b> - 7 amp.-strzyk. 1 ml	Rx	100% <b>172,40</b> Limit <b>172,40</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Triptorelin</i>   ATC: <b>L02AE04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>707553</b> (1) Desensybilizacja przysadki mózkowej i zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, poddawanych kontrolowanej hiperstimulacji jajników - refundacja do 3 cykli WP: Obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b>   Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.		
<b>Goprazol:</b> kaps. dojelitowe, twarde <b>20 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>12,39</b> Limit <b>12,39</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>6,20</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Omeprazole</i>   ATC: <b>A02BC01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>077663</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>A</b>   S Lab Sp. z o.o.		
<b>Granuflex®:</b> opatrunek leczniczy <b>10x10 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>7,69</b> Limit <b>7,07</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>2,74</b> B <sup>(2)</sup> <b>0,62</b>
INN: <i>Emplastr hydrocolloidosa</i>   ATC: <b>V20</b>   wyk: <b>EAN ~ 515082</b> (1) Przewlekłe owróżdzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: <b>N</b>   ConvaTec Polska Sp. z o.o.		
<b>Granuflex®:</b> opatrunek leczniczy <b>15x15 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>15,71</b> Limit <b>15,71</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>4,71</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Emplastr hydrocolloidosa</i>   ATC: <b>V20</b>   wyk: <b>EAN ~ 515081</b> (1) Przewlekłe owróżdzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: <b>N</b>   ConvaTec Polska Sp. z o.o.		
<b>Granuflex®:</b> opatrunek leczniczy <b>15x20 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>21,08</b> Limit <b>21,08</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>6,32</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Emplastr hydrocolloidosa</i>   ATC: <b>V20</b>   wyk: <b>EAN ~ 515080</b> (1) Przewlekłe owróżdzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: <b>N</b>   ConvaTec Polska Sp. z o.o.		
<b>Granuflex®:</b> opatrunek leczniczy <b>20x20 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>27,28</b> Limit <b>27,28</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>8,18</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Emplastr hydrocolloidosa</i>   ATC: <b>V20</b>   wyk: <b>EAN ~ 515084</b> (1) Przewlekłe owróżdzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: <b>N</b>   ConvaTec Polska Sp. z o.o.		
<b>Granuflex® Extra Thin:</b> opatrunek leczniczy <b>7,5x7,5 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>4,71</b> Limit <b>3,98</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>1,92</b> B <sup>(2)</sup> <b>0,73</b>
INN: <i>Emplastr hydrocolloidosa</i>   ATC: <b>V20</b>   wyk: <b>EAN ~ 515085</b> (1) Przewlekłe owróżdzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: <b>N</b>   ConvaTec Polska Sp. z o.o.		
<b>Granuflex® Extra Thin:</b> opatrunek leczniczy <b>10x10 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>7,61</b> Limit <b>7,07</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>2,66</b> B <sup>(2)</sup> <b>0,54</b>
INN: <i>Emplastr hydrocolloidosa</i>   ATC: <b>V20</b>   wyk: <b>EAN ~ 515724</b> (1) Przewlekłe owróżdzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: <b>N</b>   ConvaTec Polska Sp. z o.o.		
<b>Granuflex® Extra Thin:</b> opatrunek leczniczy <b>10x10 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>7,61</b> Limit <b>7,07</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>2,66</b> B <sup>(2)</sup> <b>0,54</b>
INN: <i>Emplastr hydrocolloidosa</i>   ATC: <b>V20</b>   wyk: <b>EAN ~ 515724</b> (1) Przewlekłe owróżdzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: <b>N</b>   ConvaTec Polska Sp. z o.o.		

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

Granuflex® Extra Thin: opatrunek leczniczy 15x15 cm - 1 szt.	WM	100%	15,90
		Limit	15,90
		30% <sup>(1)</sup>	4,77
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Emplastrum hydrocolloidosum* ATC: V20 wyk: EAN ~ 515725  
 (1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N  
 ConvuTec Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Medisorb H [15,70], Granuflex® [15,71], Granuflex® Extra Thin [15,90], Hydrocoll Thin [16,53], Hydrocoll [24,64]

GranuGEL®: opatrunek leczniczy [żel] - 1 op. 15 g	WM	100%	11,72
		Limit	11,72
		30% <sup>(1)</sup>	3,52
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Emplastrum hydrocolloidosum* ATC: V20 wyk: EAN ~ 157266  
 (1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N  
 ConvuTec Polska Sp. z o.o.

Grepid: tabl. powł. 75 mg - 28 szt.	Rx	100%	22,95
		Limit	22,95
		30% <sup>(1)</sup>	6,89
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Clopidogrel* ATC: B01AC04 wyk: B EAN ~ 727667  
 (1) Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania. Miazdżycza objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom. Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Pharmathen S.A.  
 Odpowiedniki: Clopidogrel Teva [X], Trombex [X], Clopidogrel Genoptim [14,40], Zyllt - (IR) [21,32], Zyllt® - (IR) [21,35], Clopidogrel Bluefish [21,75], Agregex - (IR) [21,80], Agregex - (IR) [22,36], Agregex - (IR) [22,38], Pegorel [22,95], Grepid [22,95], Clopidogrel KRKA [23,52], Zyllt® [23,52], Clopidogrel Apotex [25,70], Clopidogrel Aurovit-as [25,76], Agregex [25,80], Clopidix [26,33], Flavocorin® [27,08], Areplex® [34,83]

Grofibrat®: kaps. twarde 100 mg - 50 szt.	Rx	100%	16,34
		Limit	15,83
		30% <sup>(1)</sup>	4,73
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Fenofibrate* ATC: C10AB05 wyk: B EAN ~ 109814  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Grofibrat® 200: kaps. 200 mg - 30 szt.	Rx	100%	19,68
		Limit	19,00
		30% <sup>(1)</sup>	5,74
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Fenofibrate* ATC: C10AB05 wyk: B EAN ~ 492114  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Grofibrat® M: kaps. twarde 267 mg - 30 szt.	Rx	100%	26,60
		Limit	26,60
		30% <sup>(1)</sup>	7,18
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Fenofibrate* ATC: C10AB05 wyk: B EAN ~ 403230  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Grofibrat® M: kaps. twarde 267 mg - 60 szt.	Rx	100%	49,44
		Limit	49,44
		30% <sup>(1)</sup>	13,35
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Fenofibrate* ATC: C10AB05 wyk: B EAN ~ 403240  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Grofibrat® M: kaps. twarde 267 mg - 90 szt.	Rx	100%	71,49
		Limit	71,49
		30% <sup>(1)</sup>	19,31
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Fenofibrate* ATC: C10AB05 wyk: B EAN ~ 403250  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Grofibrat® S: tabl. powł. 160 mg - 30 szt.	Rx	100%	19,34
		Limit	19,00
		30% <sup>(1)</sup>	5,44
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Fenofibrate* ATC: C10AB05 wyk: B EAN ~ 212339  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Grofibrat® S [19,34], Fenardin® [21,43], Lipanthyl® Supra 160 [24,41]

Grofibrat® S: tabl. powł. 160 mg - 60 szt.	Rx	100%	36,74
		Limit	36,74
		30% <sup>(1)</sup>	9,92
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Fenofibrate* ATC: C10AB05 wyk: B EAN ~ 031500  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Grofibrat® S: tabl. powł. 160 mg - 90 szt.	Rx	100%	53,17
		Limit	53,17
		30% <sup>(1)</sup>	14,35
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Fenofibrate* ATC: C10AB05 wyk: B EAN ~ 031609  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Grofibrat® S: tabl. powł. 215 mg - 30 szt.	Rx	100%	25,36
		Limit	25,36
		30% <sup>(1)</sup>	6,85
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Fenofibrate* ATC: C10AB05 wyk: B EAN ~ 201173  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Grofibrat® S [25,36], Lipanthyl® Supra 215 [32,12]

Grofibrat® S: tabl. powł. 215 mg - 60 szt.	Rx	100%	48,40
		Limit	48,40
		30% <sup>(1)</sup>	13,07
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Fenofibrate* ATC: C10AB05 wyk: B EAN ~ 031708  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Grofibrat® S: tabl. powł. 215 mg - 90 szt.	Rx	100%	70,05
		Limit	70,05
		30% <sup>(1)</sup>	18,92
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Fenofibrate* ATC: C10AB05 wyk: B EAN ~ 031807  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Gyno-Femidazol®: tabl. dopochwowa 100 mg - 15 szt.	Rx	100%	27,05
		Limit	27,05
		50% <sup>(1)</sup>	12,18
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Miconazole nitrate* ATC: G01AF04 wyk: B EAN ~ 281312  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Haloperidol Unia: krople doustne 2 mg/ml - 1 but. 10 ml ◆	Rx	100%	6,01
		Limit	6,01
		30% <sup>(1)</sup>	1,80
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Haloperidol* ATC: N05AD01 wyk: B EAN ~ 239412  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Zakłady Farmaceutyczne "UNIA" Spółdzielnia Pracy

Haloperidol WZF: tabl. 1 mg - 40 szt. ◆	Rx	100%	6,54
		Limit	4,31
		30% <sup>(1)</sup>	3,17
		B <sup>(2)</sup>	2,01

INN: *Haloperidol* ATC: N05AD01 wyk: B EAN ~ 104017  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroba Huntingtona (2) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Polfa Warszawa SA

Haloperidol WZF: tabl. 5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	16,18
		Limit	16,18
		30% <sup>(1)</sup>	4,36
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Haloperidol* ATC: N05AD01 wyk: B EAN ~ 722617  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroba Huntingtona (2) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Polfa Warszawa SA



# ZOLPIC

zolpidem

Daj owcom odpocząć.



Haloperidol WZF 0,2%: krople doust. 2 mg/ml - 1 but. 10 ml ◆	Rx	100%	6,67
		Limit	6,01
		30% <sup>(1)</sup>	2,21
		B <sup>(2)</sup>	0,59
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Haloperidol* ATC: N05AD01 wyk: B EAN ~ 969319  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroba Huntingtona (2) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Polfa Warszawa SA

Hascovir: tabl. 200 mg - 30 szt.	Rx	100%	15,95
		Limit	12,67
		50% <sup>(1)</sup>	9,62
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Aciclovir* ATC: J05AB01 wyk: B EAN ~ 049515  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA  
 Odpowiedniki: Aciclovir Aurovitas [14,21], Hascovir [15,95], Heviran® [16,14]

Hascovir: tabl. 400 mg - 30 szt.	Rx	100%	26,47
		Limit	25,34
		50% <sup>(1)</sup>	13,80
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Aciclovir* ATC: J05AB01 wyk: B EAN ~ 052218  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA  
 Odpowiedniki: Aciclovir Aurovitas [23,04], Hascovir [26,47], Heviran® [28,73]

Hascovir: tabl. 800 mg - 30 szt.	Rx	100%	49,54
		Limit	49,54
		50% <sup>(1)</sup>	24,77
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Aciclovir* ATC: J05AB01 wyk: B EAN ~ 835782  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA  
 Odpowiedniki: Aciclovir Aurovitas [42,67], Hascovir [49,54], Heviran® [50,67]

Helicid® 20: kaps. 20 mg - 14 szt.	Rx	100%	9,09
		Limit	6,22
		50% <sup>(1)</sup>	5,98
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Omeprazole* ATC: A02BC01 wyk: B EAN ~ 420612  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: A  
 Zentiva PL Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Bioprazol® [X], Helicid® 20 [9,09], Prazol® [12,13]

Helicid® 20: kaps. 20 mg - 28 szt.	Rx	100%	18,49
		Limit	12,43
		50% <sup>(1)</sup>	12,28
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Omeprazole* ATC: A02BC01 wyk: B EAN ~ 420629  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: A  
 Zentiva PL Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Prenome [9,47], Heligen Neo [9,66], Omeprazole Genoptim [10,75], Agastin® [11,85], Goprazol [12,39], Progestim [14,57], Ultop [16,26], Gasec®-20 Gastrocaps® [16,34], Helicid® 20 [18,49], Prazol® [19,18], Bioprazol® [19,76], Polprazol® [20,92]

Helicid® 20: kaps. 20 mg - 90 szt.	Rx	100%	47,69
		Limit	39,97
		50% <sup>(1)</sup>	27,71
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Omeprazole* ATC: A02BC01 wyk: B EAN ~ 422654  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: A  
 Zentiva PL Sp. z o.o.

Helicid® Forte: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 28 szt.	Rx	100%	28,53
		Limit	24,87
		50% <sup>(1)</sup>	16,10
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Omeprazole* ATC: A02BC01 wyk: B EAN ~ 921324  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: A  
 Zentiva PL Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Prenome [15,39], Prazol® [17,28], Heligen Neo [17,59], Omeprazole Genoptim [19,68], Bioprazol® [26,94], Helicid® Forte [28,53], Ultop [30,13], Polprazol® PPH [32,52]

Helides: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 28 szt.	Rx	100%	9,59
		Limit	8,29
		50% <sup>(1)</sup>	5,45
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Esomeprazole* ATC: A02BC05 wyk: EAN ~ 084133  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Zentiva PL Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Texibax [9,15], Emanera [9,27], Helides [9,59]

Helides: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 56 szt.	Rx	100%	17,30
		Limit	16,58
		50% <sup>(1)</sup>	9,01
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Esomeprazole* ATC: A02BC05 wyk: EAN ~ 119575  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Zentiva PL Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Helides [17,30], Emanera [17,55]

Helides: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 28 szt.	Rx	100%	18,21
		Limit	16,58
		50% <sup>(1)</sup>	9,92
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Esomeprazole* ATC: A02BC05 wyk: EAN ~ 084136  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Zentiva PL Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Texibax [17,30], Emanera [17,55], Helides [18,21]

Helides: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 56 szt.	Rx	100%	32,65
		Limit	32,65
		50% <sup>(1)</sup>	16,33
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Esomeprazole* ATC: A02BC05 wyk: EAN ~ 119576  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Zentiva PL Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Helides [32,65], Emanera [33,16]

Heligen Neo: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 28 szt.	Rx	100%	9,66
		Limit	9,66
		50% <sup>(1)</sup>	4,83
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Omeprazole* ATC: A02BC01 wyk: EAN ~ 274467  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: A  
 Viatris Ltd  
 Odpowiedniki: Prenome [9,47], Heligen Neo [9,66], Omeprazole Genoptim [10,75], Agastin® [11,85], Goprazol [12,39], Progestim [14,57], Ultop [16,26], Gasec®-20 Gastrocaps® [16,34], Helicid® 20 [18,49], Prazol® [19,18], Bioprazol® [19,76], Polprazol® [20,92]

Heligen Neo: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 28 szt.	Rx	100%	17,59
		Limit	17,59
		50% <sup>(1)</sup>	8,80
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Omeprazole* ATC: A02BC01 wyk: EAN ~ 274511  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: A  
 Viatris Ltd  
 Odpowiedniki: Prenome [15,39], Prazol® [17,28], Heligen Neo [17,59], Omeprazole Genoptim [19,68], Bioprazol® [26,94], Helicid® Forte [28,53], Ultop [30,13], Polprazol® PPH [32,52]

Heviran®: tabl. powl. 200 mg - 30 szt.	Rx	100%	16,14
		Limit	12,67
		50% <sup>(1)</sup>	8,83
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Aciclovir* ATC: J05AB01 wyk: B EAN ~ 840014  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA  
 Odpowiedniki: Aciclovir Aurovitas [14,21], Hascovir [15,95], Heviran® [16,14]

Heviran®: tabl. powl. 400 mg - 30 szt.	Rx	100%	28,73
		Limit	25,34
		50% <sup>(1)</sup>	14,45
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Aciclovir* ATC: J05AB01 wyk: B EAN ~ 840113  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA  
 Odpowiedniki: Aciclovir Aurovitas [23,04], Hascovir [26,47], Heviran® [28,73]

<b>Heviran®:</b> tabl. powł. <b>800 mg</b> - 30 szt. Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td>50,67</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>50,67</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>22,81</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	50,67	Limit	50,67	50% <sup>(1)</sup>	22,81	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	bezpł.	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Humalog®:</b> inj. [roztw.] <b>100 j./ml</b> - 5 wkł. 3 ml Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td>135,28</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>38,50</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	135,28	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	38,50	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	50,67																								
Limit	50,67																								
50% <sup>(1)</sup>	22,81																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
100%	135,28																								
Limit	0,00																								
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	38,50																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
INN: <i>Aciclovir</i>   ATC: J05AB01   wyk: B   EAN ~ 840229 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA	INN: <i>Insulin lispro</i>   ATC: A10AD04   wyk: B   EAN ~ 692422 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A Eli Lilly Polska Sp. z o.o.																								
<b>Hiconcil:</b> kaps. <b>500 mg</b> - 16 szt. Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td>9,40</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	9,40	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Humalog® Mix 25:</b> inj. [zaw.] <b>100 j.m./ml</b> - 5 wkł. 3 ml Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td>135,98</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>39,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	135,98	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	39,20	S <sup>(4)</sup>	bezpł.		
100%	9,40																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	3,20																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	135,98																								
Limit	0,00																								
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	39,20																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
INN: <i>Amoxicillin</i>   ATC: J01CA04   wyk: B   EAN ~ 066117 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Krka Polska Sp. z o.o.	INN: <i>Insulin lispro</i>   ATC: A10AD04   wyk: B   EAN ~ 45510 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A Eli Lilly Polska Sp. z o.o.																								
Odpowiedniki: Aciclovir Aurovitas [42,67], Hascovir [49,54], Heviran® [50,67]	Odpowiedniki: Humalog® Mix 50 [135,98], Humalog® Mix 25 [135,98]																								
<b>Hiconcil:</b> prosz. do przyg. zaw. doust. <b>250 mg/5 ml</b> - 1 but. 100 ml Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td>14,38</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	14,38	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Humalog® Mix 50:</b> inj. [zaw.] <b>100 j.m./ml</b> - 5 wkł. 3 ml Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td>135,98</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>39,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	135,98	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	39,20	S <sup>(4)</sup>	bezpł.		
100%	14,38																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	3,20																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	135,98																								
Limit	0,00																								
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	39,20																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
INN: <i>Amoxicillin</i>   ATC: J01CA04   wyk: B   EAN ~ 083619 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Krka Polska Sp. z o.o.	INN: <i>Insulin lispro</i>   ATC: A10AD04   wyk: B   EAN ~ 455614 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A Eli Lilly Polska Sp. z o.o.																								
Odpowiedniki: Ospamox® [8,95], Hiconcil [9,40], Amotaks® [14,21], Amotaks® Dis [14,21]	Odpowiedniki: Humalog® Mix 25 [135,98], Humalog® Mix 50 [135,98]																								
<b>Hiconcil combi:</b> prosz. do przyg. zaw. doust. <b>400 mg+ 57 mg/5 ml</b> - 1 but. 14 g ◆ Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td>15,05</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>15,05</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>7,53</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	15,05	Limit	15,05	50% <sup>(1)</sup>	7,53	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	bezpł.	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Humana SL:</b> prosz. do przyg. zaw. odżywczej <b>2043 kJ/100 g</b> - 1 karton 650 g ŚZ <table border="1"> <tr><td>100%</td><td>30,09</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>30,09</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>9,03</td></tr> </table>	100%	30,09	Limit	30,09	30% <sup>(1)</sup>	9,03						
100%	15,05																								
Limit	15,05																								
50% <sup>(1)</sup>	7,53																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
100%	30,09																								
Limit	30,09																								
30% <sup>(1)</sup>	9,03																								
INN: <i>Amoxicillin + Clavulanic acid</i>   ATC: J01CR02   wyk: B   EAN ~ 233846 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Krka Polska Sp. z o.o.	INN: <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>   ATC: V06DF   wyk: B   EAN ~ 400232 (1) Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe   Kat. ciąży: A Humana Poland sp. z o.o.																								
<b>Hiconcil combi:</b> tabl. powł. <b>875 mg+ 125 mg</b> - 14 szt. ◆ Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td>29,00</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>29,00</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>14,50</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	29,00	Limit	29,00	50% <sup>(1)</sup>	14,50	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	bezpł.	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Humulin® M3 (30/70):</b> inj. [zaw.] <b>100 j.m./ml</b> - 5 wkł. 3 ml Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td>100,90</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>4,12</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	100,90	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	4,12	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	29,00																								
Limit	29,00																								
50% <sup>(1)</sup>	14,50																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
100%	100,90																								
Limit	0,00																								
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	4,12																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
INN: <i>Amoxicillin + Clavulanic acid</i>   ATC: J01CR02   wyk: B   EAN ~ 233624 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Krka Polska Sp. z o.o.	INN: <i>Insulin human/Insulin isophanic human</i>   ATC: A10AD01   wyk: B   EAN ~ 246014 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A Eli Lilly Polska Sp. z o.o.																								
Odpowiedniki: Amylan [25,22], Ramoclav - (IR) [28,14], Hiconcil combi [29,00]	Odpowiedniki: Polhumin® Mix-2 [97,72], Polhumin® Mix-3 [97,72], Polhumin® Mix-4 [97,72], Polhumin® Mix-5 [97,72], Humulin® M3 (30/70) [100,90]																								
<b>Hitaxa:</b> roztw. doust. <b>0,5 mg/ml</b> - 1 but. 150 ml Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td>20,46</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>17,09</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>8,50</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	20,46	Limit	17,09	30% <sup>(1)</sup>	8,50	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	bezpł.	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Humulin® N:</b> inj. [zaw.] <b>100 j.m./ml</b> - 5 wkł. 3 ml Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td>100,90</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>4,12</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	100,90	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	4,12	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	20,46																								
Limit	17,09																								
30% <sup>(1)</sup>	8,50																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
100%	100,90																								
Limit	0,00																								
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	4,12																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
INN: <i>Desloratadine</i>   ATC: R06AX27   wyk: B   EAN ~ 981458 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Adamed Sp. z o.o.	INN: <i>Insulin isophanic human</i>   ATC: A10AC01   wyk: B   EAN ~ 246717 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A Eli Lilly Polska Sp. z o.o.																								
Odpowiedniki: Jovesto [X], Dynid [16,79], Deslodyna [18,39], Hitaxa [20,46]	Odpowiedniki: Insulatard® Penfill® [96,88], Polhumin® N [97,72], Humulin® N [100,90], Gensulin N [104,40]																								
<b>Hitaxa:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>2,5 mg</b> - 30 szt. Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td>9,73</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>6,73</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>5,02</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	9,73	Limit	6,73	30% <sup>(1)</sup>	5,02	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	bezpł.	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Humulin® R:</b> inj. [roztw.] <b>100 j.m./ml</b> - 5 wkł. 3 ml Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td>100,90</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>4,12</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	100,90	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	4,12	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	9,73																								
Limit	6,73																								
30% <sup>(1)</sup>	5,02																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
100%	100,90																								
Limit	0,00																								
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	4,12																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
INN: <i>Desloratadine</i>   ATC: R06AX27   wyk: B   EAN ~ 981359 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Adamed Sp. z o.o.	INN: <i>Insulin human</i>   ATC: A10AB01   wyk: B   EAN ~ 247011 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A Eli Lilly Polska Sp. z o.o.																								
Odpowiedniki: Actrapid® Penfill® [96,88], Polhumin® R [97,72], Humulin® R [100,90], Gensulin R [104,40]	Odpowiedniki: Actrapid® Penfill® [96,88], Polhumin® R [97,72], Humulin® R [100,90], Gensulin R [104,40]																								
<b>Hitaxa:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>5 mg</b> - 30 szt. Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td>18,85</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>13,46</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>9,43</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	18,85	Limit	13,46	30% <sup>(1)</sup>	9,43	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	bezpł.	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>HydroClean advance:</b> opatrunek hydroaktywny z mechanizmem płucząco-absorbującym <b>7,5x7,5 cm</b> - 1 szt. WM <table border="1"> <tr><td>100%</td><td>33,21</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>33,21</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>9,96</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	33,21	Limit	33,21	30% <sup>(1)</sup>	9,96	R <sup>(2)</sup>	bezpł.				
100%	18,85																								
Limit	13,46																								
30% <sup>(1)</sup>	9,43																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
100%	33,21																								
Limit	33,21																								
30% <sup>(1)</sup>	9,96																								
R <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
INN: <i>Desloratadine</i>   ATC: R06AX27   wyk: B   EAN ~ 981373 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Adamed Sp. z o.o.	INN: <i>Emplastr collagenosa</i>   ATC: V20   wyk: B   EAN ~ 242934 (1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.																								



Naszym wyborem

**enarenal**  
 enalapryli maleas

**HydroClean advance:** opatrunek hydroaktywny z mechanizmem płuczająco-absorbującym **10x10 cm** - 1 szt.

100%	55,51
Limit	55,51
30% <sup>(1)</sup>	16,65
B <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Emplastr collagenosa* ATC: V20 wyk: EAN ~ 242231  
 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

**HydroClean advance cavity:** opatrunek hydroaktywny z mechanizmem płuczająco-absorbującym **7,5x7,5 cm** - 1 szt.

100%	33,21
Limit	33,21
30% <sup>(1)</sup>	9,96
B <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Emplastr collagenosa* ATC: V20AA wyk: EAN ~ 301068  
 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

**HydroClean plus:** opatrunek hydroaktywny z mechanizmem płuczająco-absorbującym i substancją antybakteryjną **7,5x7,5 cm** - 1 szt.

100%	41,53
Limit	39,52
30% <sup>(1)</sup>	13,87
B <sup>(2)</sup>	2,01

INN: *Emplastr collagenosa* ATC: V20 wyk: EAN ~ 890915  
 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

**HydroClean plus:** opatrunek hydroaktywny z mechanizmem płuczająco-absorbującym i substancją antybakteryjną **10x10 cm** - 1 szt.

100%	70,26
Limit	70,26
30% <sup>(1)</sup>	21,08
B <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Emplastr collagenosa* ATC: V20 wyk: EAN ~ 890922  
 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

**HydroClean plus cavity:** opatrunek hydroaktywny z mechanizmem płuczająco-absorbującym i substancją antybakteryjną **7,5x7,5 cm** - 1 szt.

100%	41,53
Limit	39,52
30% <sup>(1)</sup>	13,87
B <sup>(2)</sup>	2,01

INN: *Emplastr collagenosa* ATC: V20 wyk: EAN ~ 890946  
 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

**Hydrocoll:** opatrunek leczniczy **10x10 cm** - 1 szt.

100%	10,10
Limit	7,07
30% <sup>(1)</sup>	5,15
B <sup>(2)</sup>	3,03

INN: *Emplastr hydrocolloidosa* ATC: V20 wyk: EAN ~ 222464  
 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Medisorb H [7,45], Granuflex® Extra Thin [7,61], Granuflex® [7,69], Hydrocoll Thin [9,05], Hydrocoll [10,10]

**Hydrocoll:** opatrunek leczniczy **15x15 cm** - 1 szt.

100%	24,64
Limit	15,90
30% <sup>(1)</sup>	13,51
B <sup>(2)</sup>	8,74

INN: *Emplastr hydrocolloidosa* ATC: V20 wyk: EAN ~ 222471  
 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Medisorb H [7,45], Granuflex® [15,71], Granuflex® Extra Thin [15,90], Hydrocoll Thin [16,53], Hydrocoll [24,64]

**Hydrocoll:** opatrunek leczniczy **20x20 cm** - 1 szt.

100%	39,42
Limit	28,27
30% <sup>(1)</sup>	19,63
B <sup>(2)</sup>	11,15

INN: *Emplastr hydrocolloidosa* ATC: V20 wyk: EAN ~ 222488  
 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Medisorb H [26,26], Granuflex® [27,28], Hydrocoll [39,42]

**Hydrocoll Thin:** opatrunek leczniczy **10x10 cm** - 1 szt.

100%	9,05
Limit	7,07
30% <sup>(1)</sup>	4,10
B <sup>(2)</sup>	1,98

INN: *Emplastr hydrocolloidosa* ATC: V20 wyk: EAN ~ 222525  
 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Medisorb H [7,45], Granuflex® Extra Thin [7,61], Granuflex® [7,69], Hydrocoll Thin [9,05], Hydrocoll [10,10]

**Hydrocoll Thin:** opatrunek leczniczy **15x15 cm** - 1 szt.

100%	16,53
Limit	15,90
30% <sup>(1)</sup>	5,40
B <sup>(2)</sup>	0,63

INN: *Emplastr hydrocolloidosa* ATC: V20 wyk: EAN ~ 222532  
 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Medisorb H [15,70], Granuflex® [15,71], Granuflex® Extra Thin [15,90], Hydrocoll Thin [16,53], Hydrocoll [24,64]

**Hydrocortisonum AFP:** krem **10 mg/g** - 1 op. 15 g

100%	7,57
Limit	7,57
50% <sup>(1)</sup>	3,79
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Hydrocortisone* ATC: D07AA02 wyk: B EAN ~ 950317  
 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:D, T2:C, T3:C Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

**Hydrocortisonum-SF:** tabl. **10 mg** - 60 szt.

100%	18,95
Limit	18,95
30% <sup>(1)</sup>	5,69
C <sup>(2)</sup>	bezpł.
DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Hydrocortisone* ATC: H02AB09 wyk: B EAN ~ 218140  
 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2)Kobiety w ciąży(3)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:D, T2:C, T3:C Sun-Farm Sp. z o.o.

**HydroTac:** opatrunek leczniczy **10x20 cm** - 1 szt.

100%	22,38
Limit	15,08
30% <sup>(1)</sup>	11,82
B <sup>(2)</sup>	7,30

INN: *Emplastr hydropolymerosa* ATC: V20 wyk: EAN ~ 737074  
 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

**HydroTac:** opatrunek leczniczy **10x10 cm** - 1 szt.

100%	10,95
Limit	7,54
30% <sup>(1)</sup>	5,67
B <sup>(2)</sup>	3,41

INN: *Emplastr hydropolymerosa* ATC: V20 wyk: EAN ~ 737043  
 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

**HydroTac:** opatrunek leczniczy **15x15 cm** - 1 szt.

100%	24,76
Limit	16,96
30% <sup>(1)</sup>	12,89
B <sup>(2)</sup>	7,80

INN: *Emplastr hydropolymerosa* ATC: V20 wyk: EAN ~ 737258  
 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: HydroTac Comfort [16,97], HydroTac [24,76]

**HydroTac:** opatrunek leczniczy **20x20 cm** - 1 szt.

100%	38,06
Limit	30,16
30% <sup>(1)</sup>	16,95
B <sup>(2)</sup>	7,90

INN: *Emplastr hydropolymerosa* ATC: V20 wyk: EAN ~ 737401  
 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: HydroTac Comfort [28,11], HydroTac [38,06]

**HydroTac Comfort:** opatrunek leczniczy **12,5x12,5 cm** - 1 szt.

100%	11,78
Limit	11,78
30% <sup>(1)</sup>	3,53
B <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Emplastr hydropolymerosa* ATC: V20 wyk: EAN ~ 736534  
 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

**HydroTac Comfort:** opatrunek leczniczy **15x15 cm** - 1 szt.

100%	16,97
Limit	16,96
30% <sup>(1)</sup>	5,10
B <sup>(2)</sup>	0,01

INN: *Emplastr hydropolymerosa* ATC: V20 wyk: EAN ~ 736596  
 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: HydroTac Comfort [16,97], HydroTac [24,76]

**HydroTac Comfort:** opatrunek leczniczy **20x20 cm** - 1 szt.

100%	28,11
Limit	28,11
30% <sup>(1)</sup>	8,43
B <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Emplastr hydropolymerosa* ATC: V20 wyk: EAN ~ 736749  
 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: HydroTac Comfort [28,11], HydroTac [38,06]

**Hydroxycarbamid Teva:** kaps. **500 mg** - 100 szt. (but.) ◆

100%	91,28
Limit	105,19
B <sup>(1)</sup>	bezpł.
B <sup>(2)</sup>	bezpł.
DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Hydroxycarbamide* ATC: L01XX05 wyk: A EAN ~ 836758  
 (1)Nowotwory złośliwe(2)Chemioterapia ICD10: C.29.(3)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.



<p><b>Hydroxyurea medac:</b> kaps. twarde <b>500 mg</b> - 100 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>91,28</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>105,19</td></tr> <tr><td>B<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	91,28	Limit	105,19	B <sup>(1)</sup>	bezpł.	B <sup>(2)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	S <sup>(1)</sup>	bezpł.	<p><b>Icatibant Accord:</b> inf. [roztw.] <b>10 mg/ml</b> - 1 amp.-strzyk. 3 ml ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>2433,07</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	2433,07	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(2)</sup>	bezpł.
100%	91,28																								
Limit	105,19																								
B <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
B <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
100%	2433,07																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	3,20																								
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
<p>INN: <i>Hydroxycarbamide</i>   ATC: L01XX05   wyk: A   EAN ~ 944927 (1) Nowotwory złośliwe(2) Chemioterapia ICD10: C.29.(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D   medac GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce</p>		<p>INN: <i>Icatibant</i>   ATC: B06AC02   wyk: EAN ~ 577441 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Leczenie ostrego, zagrażającego życiu napadu obrzęku naczynioruchowego u dzieci od 2 roku życia, chorych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1, Leczenie ostrego zagrażającego życiu napadu obrzęku naczynioruchowego u chorych dorosłych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.</p>																							
<p><b>Hyplafin:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 30 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>29,82</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>26,72</td></tr> <tr><td>R<sup>(1)</sup></td><td>6,30</td></tr> <tr><td>S<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	29,82	Limit	26,72	R <sup>(1)</sup>	6,30	S <sup>(1)</sup>	bezpł.	<p><b>Icatibant Fresenius:</b> inj. [roztw.] <b>10 mg/ml</b> - 1 amp.-strzyk. 3 ml ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>2211,61</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	2211,61	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(2)</sup>	bezpł.				
100%	29,82																								
Limit	26,72																								
R <sup>(1)</sup>	6,30																								
S <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
100%	2211,61																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	3,20																								
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
<p>INN: <i>Finasteride</i>   ATC: G04CB01   wyk: B   EAN ~ 017997 (1) Przerost gruczołu krokowego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N   +pharma Polska Sp. z o.o.</p>		<p>INN: <i>Icatibant</i>   ATC: B06AC02   wyk: EAN ~ 148587 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Leczenie ostrego, zagrażającego życiu napadu obrzęku naczynioruchowego u dzieci od 2 roku życia, chorych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1, Leczenie ostrego zagrażającego życiu napadu obrzęku naczynioruchowego u chorych dorosłych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.</p>																							
<p>Odpowiedniki: Finahit [X], Finaride [X], Finasteridum Bluefish [22,20], Finasterid Stada [24,01], Finamef - (IR) [26,17], Uronexyr [27,24], Finaran [28,33], Symasteride [28,38], Finpros [28,45], Penester® [29,58], Hyplafin [29,82], Antiprost [29,85], Adaster [29,86], Androster [30,02], Finamef [30,07], Apo-Fina [30,11], Finaster® [30,19]</p>		<p>Odpowiedniki: Icatibant Fresenius [2211,61], Firazyr [2433,07]</p>																							
<p><b>Hytrin®:</b> tabl. <b>2 mg</b> - 28 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>13,45</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>7,17</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>8,43</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>9,48</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	13,45	Limit	7,17	30% <sup>(1)</sup>	8,43	R <sup>(2)</sup>	9,48	S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Icatibant Medical Valley:</b> inj. [roztw.] <b>30 mg</b> - 1 amp.-strzyk. 3 ml ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>2211,61</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	2211,61	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(2)</sup>	bezpł.		
100%	13,45																								
Limit	7,17																								
30% <sup>(1)</sup>	8,43																								
R <sup>(2)</sup>	9,48																								
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
100%	2211,61																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	3,20																								
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
<p>INN: <i>Terazosin hydrochloride</i>   ATC: C02CA, G04CA03   wyk: B   EAN ~ 767816 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Przerost gruczołu krokowego(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Sympfar Sp. z o.o.</p>		<p>INN: <i>Icatibant</i>   ATC: B06AC02   wyk: EAN ~ 148471 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Leczenie ostrego, zagrażającego życiu napadu obrzęku naczynioruchowego u dzieci od 2 roku życia, chorych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1, Leczenie ostrego zagrażającego życiu napadu obrzęku naczynioruchowego u chorych dorosłych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Medical Valley Invest AB</p>																							
<p>Odpowiedniki: Finahit [X], Finaride [X], Finasteridum Bluefish [22,20], Finasterid Stada [24,01], Finamef - (IR) [26,17], Uronexyr [27,24], Finaran [28,33], Symasteride [28,38], Finpros [28,45], Penester® [29,58], Hyplafin [29,82], Antiprost [29,85], Adaster [29,86], Androster [30,02], Finamef [30,07], Apo-Fina [30,11], Finaster® [30,19]</p>		<p>Odpowiedniki: Icatibant Medical Valley [2211,61], Ikatybant Ranbaxy [2240,23], Icatibant Zentiva [2394,78]</p>																							
<p><b>Hytrin®:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 28 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>32,73</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>17,93</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>20,18</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>18,00</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	32,73	Limit	17,93	30% <sup>(1)</sup>	20,18	R <sup>(2)</sup>	18,00	S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Icatibant Zentiva:</b> inj. [roztw.] <b>30 mg</b> - 1 amp.-strzyk. 3 ml ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>2394,78</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	2394,78	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(2)</sup>	bezpł.		
100%	32,73																								
Limit	17,93																								
30% <sup>(1)</sup>	20,18																								
R <sup>(2)</sup>	18,00																								
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
100%	2394,78																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	3,20																								
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
<p>INN: <i>Terazosin hydrochloride</i>   ATC: C02CA, G04CA03   wyk: B   EAN ~ 767915 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Przerost gruczołu krokowego(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Sympfar Sp. z o.o.</p>		<p>INN: <i>Icatibant</i>   ATC: B06AC02   wyk: EAN ~ 146930 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Leczenie ostrego, zagrażającego życiu napadu obrzęku naczynioruchowego u dzieci od 2 roku życia, chorych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1, Leczenie ostrego zagrażającego życiu napadu obrzęku naczynioruchowego u chorych dorosłych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Zentiva PL Sp. z o.o.</p>																							
<p>Odpowiedniki: Lorista® HD [26,61], Hyzaar Forte® [28,26]</p>		<p>Odpowiedniki: Icatibant Medical Valley [2211,61], Ikatybant Ranbaxy [2240,23], Icatibant Zentiva [2394,78]</p>																							
<p><b>Hytrin®:</b> tabl. <b>10 mg</b> - 28 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>64,02</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>35,86</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>38,92</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>34,13</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	64,02	Limit	35,86	30% <sup>(1)</sup>	38,92	R <sup>(2)</sup>	34,13	S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Iglessy:</b> igła do penów <b>0,23*4 mm (32G)</b> - 100 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>18,89</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>18,89</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>5,67</td></tr> </table>	100%	18,89	Limit	18,89	30% <sup>(1)</sup>	5,67						
100%	64,02																								
Limit	35,86																								
30% <sup>(1)</sup>	38,92																								
R <sup>(2)</sup>	34,13																								
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
100%	18,89																								
Limit	18,89																								
30% <sup>(1)</sup>	5,67																								
<p>INN: <i>Terazosin hydrochloride</i>   ATC: C02CA, G04CA03   wyk: B   EAN ~ 768011 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Przerost gruczołu krokowego(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Sympfar Sp. z o.o.</p>		<p>INN:   ATC:   wyk: EAN ~ 012045 (1) Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta   Kat. ciąży:   Synoptis Pharma Sp. z o.o.</p>																							
<p>Odpowiedniki: Lorista® HD [26,61], Hyzaar Forte® [28,26]</p>		<p>Odpowiedniki: Icatibant Medical Valley [2211,61], Ikatybant Ranbaxy [2240,23], Icatibant Zentiva [2394,78]</p>																							
<p><b>Hyzaar Forte®:</b> tabl. powł. <b>100/25 mg</b> - 28 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>28,26</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>21,40</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>13,28</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	28,26	Limit	21,40	30% <sup>(1)</sup>	13,28	S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Iglessy:</b> igła do penów <b>0,25*5 mm (31G)</b> - 100 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>18,89</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>18,89</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>5,67</td></tr> </table>	100%	18,89	Limit	18,89	30% <sup>(1)</sup>	5,67								
100%	28,26																								
Limit	21,40																								
30% <sup>(1)</sup>	13,28																								
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
100%	18,89																								
Limit	18,89																								
30% <sup>(1)</sup>	5,67																								
<p>INN: <i>Losartan potassium + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09DA01   wyk: B   EAN ~ 970513 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   MSD Polska Sp. z o.o.</p>		<p>INN:   ATC:   wyk: EAN ~ 012021 (1) Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta   Kat. ciąży:   Synoptis Pharma Sp. z o.o.</p>																							
<p>Odpowiedniki: Lorista® HD [26,61], Hyzaar Forte® [28,26]</p>		<p>Odpowiedniki: Icatibant Medical Valley [2211,61], Ikatybant Ranbaxy [2240,23], Icatibant Zentiva [2394,78]</p>																							
<p><b>Hyzaar®:</b> tabl. powł. <b>50/12,5 mg</b> - 28 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>14,61</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>10,70</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>7,12</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	14,61	Limit	10,70	30% <sup>(1)</sup>	7,12	S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Iglessy:</b> igła do penów <b>0,25*6 mm (31G)</b> - 100 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>18,89</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>18,89</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>5,67</td></tr> </table>	100%	18,89	Limit	18,89	30% <sup>(1)</sup>	5,67								
100%	14,61																								
Limit	10,70																								
30% <sup>(1)</sup>	7,12																								
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
100%	18,89																								
Limit	18,89																								
30% <sup>(1)</sup>	5,67																								
<p>INN: <i>Losartan potassium + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09DA01   wyk: B   EAN ~ 433612 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   MSD Polska Sp. z o.o.</p>		<p>INN:   ATC:   wyk: EAN ~ 012038 (1) Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta   Kat. ciąży:   Synoptis Pharma Sp. z o.o.</p>																							
<p>Odpowiedniki: Losacor® HCT [X], Lorista® H [13,79], Hyzaar® [14,61]</p>		<p>Odpowiedniki: Icatibant Medical Valley [2211,61], Ikatybant Ranbaxy [2240,23], Icatibant Zentiva [2394,78]</p>																							
<p><b>Ibuprofen Hasco:</b> kaps. miękkie <b>200 mg</b> - 60 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>9,19</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>7,28</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	9,19	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	7,28	S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Iglessy:</b> igła do penów <b>0,30*8 mm (30G)</b> - 100 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>18,89</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>18,89</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>5,67</td></tr> </table>	100%	18,89	Limit	18,89	30% <sup>(1)</sup>	5,67						
100%	9,19																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	7,28																								
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
100%	18,89																								
Limit	18,89																								
30% <sup>(1)</sup>	5,67																								
<p>INN: <i>Ibuprofen</i>   ATC: M01AE01   wyk: B   EAN ~ 853540 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:D, T2:D, T3:X   Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA</p>		<p>INN:   ATC:   wyk: EAN ~ 012014 (1) Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta   Kat. ciąży:   Synoptis Pharma Sp. z o.o.</p>																							
<p>Odpowiedniki: Losacor® HCT [X], Lorista® H [13,79], Hyzaar® [14,61]</p>		<p>Odpowiedniki: Icatibant Medical Valley [2211,61], Ikatybant Ranbaxy [2240,23], Icatibant Zentiva [2394,78]</p>																							



<b>Ikatybant Ranbaxy:</b> inj. [roztw.] 30 mg - 1 amp.-strzyk. 3 ml ◆	Rx	100% 2240,23 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 3,20 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Icatibant</i> ATC: B06AC02 wyk: B EAN ~ 147446 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Leczenie ostrych, zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u dzieci od 2 roku życia, chorych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1, Leczenie ostrych zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u chorych dorosłych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. Odpowiedniki: Icatibant Medical Valley [2211,61], Ikatybant Ranbaxy [2240,23], Icatibant Zentiva [2394,78]		
<b>Imuran®:</b> tabl. powł. 50 mg - 100 szt.	Rx	100% 55,59 Limit 55,59 B <sup>(1)</sup> bezpl. DZ <sup>(2)</sup> bezpl. R <sup>(3)</sup> 3,56 S <sup>(4)</sup> bezpl.
INN: <i>Azathioprine</i> ATC: L04AX01 wyk: B EAN ~ 277810 (1) Nowotwory złośliwe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nieswoiste zapalenie jelit inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 rż.; nefropatia IgA inna niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 rż.; zapalenie naczyń inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 rż.; choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanki lub komórek; sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Aspen Pharma Trading Limited		
<b>Inadine:</b> opatrunek leczniczy 5x5 cm - 1 szt.	WM	100% 5,51 Limit 3,76 30% <sup>(1)</sup> 2,88 B <sup>(2)</sup> 1,75
INN: <i>Emplatri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA wyk: B EAN ~ 800425 (1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N Coloplast Sp. z o.o. Odpowiedniki: Aquacel® Extra [5,11], Inadine [5,51]		
<b>Inadine:</b> opatrunek leczniczy 9,5x9,5 cm - 1 szt.	WM	100% 13,59 Limit 13,59 30% <sup>(1)</sup> 4,08 B <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Emplatri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA wyk: B EAN ~ 800426 (1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N Coloplast Sp. z o.o.		
<b>Indapamide SR Genoptim:</b> tabl. powł. o przedł. uwalnianiu 1,5 mg - 30 szt.	Rx	100% 8,02 Limit 8,02 30% <sup>(1)</sup> 2,41 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Indapamide</i> ATC: C03BA11 wyk: B EAN ~ 799398 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Synoptis Pharma Sp. z o.o. Odpowiedniki: Ipres long 1,5 [X], Indapamide SR Genoptim [8,02], Sympamid SR [8,10], Rawel® SR [8,14], Indix SR [8,30], Opamid [9,37], Indapen® SR [11,52], Diuresin® SR [11,53], Tertensif® SR [13,48]		
<b>Indapen®:</b> tabl. powł. 2,5 mg - 20 szt.	Rx	100% 10,00 Limit 10,00 30% <sup>(1)</sup> 2,70 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Indapamide</i> ATC: C03BA11 wyk: B EAN ~ 863013 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA		
<b>Indapen® SR:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu 1,5 mg - 30 szt.	Rx	100% 11,52 Limit 9,18 30% <sup>(1)</sup> 4,58 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Indapamide</i> ATC: C03BA11 wyk: B EAN ~ 665907 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA		
<b>Indapres:</b> tabl. powł. 2,5 mg - 30 szt.	Rx	100% 12,82 Limit 12,82 30% <sup>(1)</sup> 3,47 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Indapamide</i> ATC: C03BA11 wyk: B EAN ~ 223121 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.		
<b>Indix Combi:</b> tabl. powł. 2,5/0,625 mg - 30 szt.	Rx	100% 8,37 Limit 2,79 R <sup>(1)</sup> 8,37 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Perindopril tosylate + Indapamide</i> ATC: C09BA04 wyk: B EAN ~ 050290 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.		

<b>Indix Combi:</b> tabl. powł. 5/1,25 mg - 30 szt.	Rx	100% 16,12 Limit 5,58 R <sup>(1)</sup> 13,74 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Perindopril tosylate + Indapamide</i> ATC: C09BA04 wyk: B EAN ~ 050344 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tetnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.		
<b>Indix Combi:</b> tabl. powł. 10/2,5 mg - 30 szt.	Rx	100% 26,18 Limit 11,17 R <sup>(1)</sup> 21,41 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Perindopril tosylate + Indapamide</i> ATC: C09BA04 wyk: B EAN ~ 131660 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tetnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.		
<b>Indix SR:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu 1,5 mg - 30 szt.	Rx	100% 8,30 Limit 8,30 30% <sup>(1)</sup> 2,24 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Indapamide</i> ATC: C03BA11 wyk: B EAN ~ 025014 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.		
<b>Indix SR:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu 1,5 mg - 90 szt.	Rx	100% 22,42 Limit 22,42 30% <sup>(1)</sup> 6,73 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Indapamide</i> ATC: C03BA11 wyk: B EAN ~ 660401 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.		
<b>Infatrini:</b> płyn 1 kcal/ml - 24 but. 125 ml	Ś	100% 163,93 Limit 103,17 R <sup>(1)</sup> 63,96
INN: <i>Dieta hiperkaloryczna</i> ATC: wyk: B EAN ~ 565021 (1) Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu związanym z chorobą podstawową u niemowląt i dzieci do 6 rż. - mukowicydoza, choroby nowotworowe, wrodzone wady serca   Kat. ciąży: B Nutricia Polska Sp. z o.o.		
<b>Infatrini Peptisorb:</b> płyn 1 kcal/ml - 4 but. 200 ml	Ś	100% 42,90 Limit 42,90 30% <sup>(1)</sup> 12,87
INN: <i>Dieta hiperkaloryczna</i> ATC: V06DF wyk: B EAN ~ 562433 (1) Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe   Kat. ciąży: N Nutricia Polska Sp. z o.o.		
<b>Infatrini Powder:</b> prosz. 1 kcal/ml - 1 op. 400 g	Ś	100% 68,78 Limit 68,78 R <sup>(1)</sup> 3,20
INN: <i>Dieta hiperkaloryczna</i> ATC: V06DF wyk: B EAN ~ 681786 (1) Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu związanym z chorobą podstawową u niemowląt i dzieci do 6 rż. - mukowicydoza, choroby nowotworowe, wrodzone wady serca   Kat. ciąży: B Nutricia Polska Sp. z o.o.		
<b>▼Influvac Tetra 2023/2024:</b> inj. dom./podsk. [zaw.] 60 µg HA/0,5ml - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml (+ igła)	Rx	100% 52,75 Limit 52,75 50% <sup>(1)</sup> 26,38 C <sup>(2)</sup> bezpl. DZ <sup>(3)</sup> bezpl. S <sup>(4)</sup> bezpl.
INN: <i>Influenza vaccine</i> ATC: J07BB02 wyk: B EAN ~ 347352 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Kobiety w ciąży(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Viatris Healthcare Limited		
<b>Instanyl:</b> aerozol do nosa 50 µg/dawkę - 1 but. 3,2 ml ◆	Rx-w	100% 392,30 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 3,20 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Fentanyl</i> ATC: N01AH01 wyk: N EAN ~ 130813 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwałe działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków WP: Ból przebijający u dzieci z chorobą nowotworową, które w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawane są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwałe działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Takeda Polska Sp. z o.o.		



<b>Instanyl:</b> aerozol do nosa <b>100 µg/dawkę</b> - 1 but. 5,3 ml ◊ Rx-w 100% <b>770,92</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Instanyl:</b> aerozol do nosa <b>200 µg/dawkę</b> - 1 but. 5,3 ml ◊ Rx-w 100% <b>770,92</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Insulatard® Penfill®:</b> inj. [zaw.] <b>100 j.m./ml</b> - 5 wkł. 3 ml Rx 100% <b>96,88</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>4,00</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Insulin aspart Sanofi:</b> inj. [roztw.] <b>100 j/ml</b> - 10 wstrzyk. 3 ml (SoloStar) Rx 100% <b>201,40</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>8,00</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Insulin Lispro Sanofi:</b> inj. [roztw.] <b>100 j/ml</b> - 10 wstrzyk. 3 ml (SoloStar) Rx 100% <b>201,15</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>8,00</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Intrasite Conformable:</b> opatrunek hydrożelowy <b>10x10 cm</b> - 1 szt. WM 100% <b>12,53</b> Limit <b>7,97</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>6,95</b> B <sup>(2)</sup> <b>4,56</b>	<b>Intrasite Conformable:</b> opatrunek hydrożelowy <b>10x40 cm</b> - 1 szt. WM 100% <b>45,87</b> Limit <b>31,89</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>23,55</b> B <sup>(2)</sup> <b>13,98</b>	<b>Intrasite Conformable:</b> opatrunek hydrożelowy <b>10x20 cm</b> - 1 szt. WM 100% <b>23,81</b> Limit <b>15,94</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>12,65</b> B <sup>(2)</sup> <b>7,87</b>	<b>▼ Invokana:</b> tabl. powł. <b>100 mg</b> - 30 szt. Rx 100% <b>161,09</b> Limit <b>161,09</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>48,33</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>IPP 20:</b> tabl. dojelitowe <b>20 mg</b> - 28 szt. ◊ Rx 100% <b>10,14</b> Limit <b>6,22</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>7,03</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>IPP 40:</b> tabl. dojelitowe <b>40 mg</b> - 28 szt. ◊ Rx 100% <b>19,66</b> Limit <b>12,43</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>13,45</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Ipravent Inhaler:</b> aerozol inhal. [roztw.] <b>20 µg/dawke</b> - poj. 200 dawek ◊ Rx 100% <b>19,85</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>3,56</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Itrax:</b> kaps. twarde <b>100 mg</b> - 4 szt. Rx 100% <b>13,31</b> Limit <b>11,87</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>7,38</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Itrax:</b> kaps. twarde <b>100 mg</b> - 28 szt. Rx 100% <b>79,47</b> Limit <b>79,47</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>39,74</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <b>Fentanyl</b>   ATC: <b>N01AH01</b>   wyk: <b>N</b>   EAN ~ <b>130819</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków WP: Ból przebijający u dzieci z chorobą nowotworową, które w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawane są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Takeda Polska Sp. z o.o.	INN: <b>Fentanyl</b>   ATC: <b>N01AH01</b>   wyk: <b>N</b>   EAN ~ <b>130820</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków WP: Ból przebijający u dzieci z chorobą nowotworową, które w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawane są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Takeda Polska Sp. z o.o.	INN: <b>Insulin isophanic human</b>   ATC: <b>A10AC01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>348923</b> (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>A</b> Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. Odpowiedniki: Insulatard® Penfill® [96,88], Polhumin® N [97,72], Humulin® N [100,90], Gensulin N [104,40]	INN: <b>Insulin aspart</b>   ATC: <b>A10AB04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>142917</b> (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:B, T2:A, T3:A</b> Sanofi Winthrop Industrie	INN: <b>Insulin Lispro</b>   ATC: <b>A10AB04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>333553</b> (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>A</b> Sanofi Winthrop Industrie	INN: <b>Intrasite Conformable</b>   ATC:   wyk:   EAN ~ <b>422486</b> (1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: <b>N</b> Smith & Nephew Sp. z o.o.	INN: <b>Intrasite Conformable</b>   ATC:   wyk:   EAN ~ <b>422509</b> (1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: <b>N</b> Smith & Nephew Sp. z o.o.	INN: <b>Intrasite Conformable</b>   ATC:   wyk:   EAN ~ <b>422493</b> (1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: <b>N</b> Smith & Nephew Sp. z o.o.	INN: <b>Canagliflozin</b>   ATC: <b>A10BK02</b>   wyk:   EAN ~ <b>109610</b> (1) Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c $\geq 7,5\%$ oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek $\geq 55$ lat dla mężczyzn, $\geq 60$ lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.	INN: <b>Pantoprazole</b>   ATC: <b>A02BC02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>085033</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Sandoz GmbH Odpowiedniki: Pamył 20 mg [6,32], Pantoprazole Genoptim [6,80], Ozion [6,91], Pantoprazole Bluefish [7,13], Panazol [7,23], Gerdin 20 mg [7,36], Panprazol [8,05], Noacid [8,37], Ranloc [9,02], Nolvapa® 20 mg tabletki dojelitowe [9,07], Controloc® 20 [9,80], Panzol [10,03], IPP 20 [10,14], Contix [10,48], Anesteloc® 20 [11,29]	INN: <b>Pantoprazole</b>   ATC: <b>A02BC02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>082643</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Sandoz GmbH Odpowiedniki: Nolvapa® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [11,61], Nolvapa® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [11,63], Pamył 40 mg [12,71], Pantoprazole Genoptim [12,71], Ozion [12,93], Pantoprazole Bluefish [13,25], Gerdin 40 mg [13,46], Panazol [13,71], Panprazol [15,37], Contix [15,47], Noacid [16,00], Ranloc [17,37], Nolvapa® 40 mg tabletki dojelitowe [17,49], Controloc® 40 [17,52], Panzol [19,53], IPP 40 [19,66], Anesteloc® 40 [19,74]	INN: <b>Ipratropium bromide</b>   ATC: <b>R03BB01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>130623</b> (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma. Eozynofilowe zapalenie oskrzeli WP: Mukowiscydoza; dysplazja oskrzelowo-płucna; dyskineza rzęsek (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:D, T2:C, T3:C</b> Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o.	INN: <b>Collagenase</b>   ATC: <b>D03BA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>015412</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Smith & Nephew Sp. z o.o.	INN: <b>Itraconazole</b>   ATC: <b>J02AC02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>858255</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia grzybicze u pacjentów po przeszczepie szpiku - profilaktyka (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Aristo Pharma Sp. z o.o. Odpowiedniki: Orungal® [12,85], Itrax [13,31], Trioxal® [15,11]	INN: <b>Itraconazole</b>   ATC: <b>J02AC02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>858262</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia grzybicze u pacjentów po przeszczepie szpiku - profilaktyka (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Aristo Pharma Sp. z o.o. Odpowiedniki: Orungal® [60,64], Itrax [79,47], Trioxal® [85,82]

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.

  
Sumatriptanum

<b>▼ Ivabradine Anpharm: tabl. powł. 5 mg - 56 szt. ◆</b>			Rx	100% <b>83,37</b> Limit <b>70,31</b> R <sup>(1)</sup> <b>16,26</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Ivabradine</i>	ATC: C01EB17	wyk: EAN ~ 264710		
<p>(1) Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II–NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca <math>\geq 75</math> uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z <math>\beta</math>-adrenolitykiem lub gdy leczenie <math>\beta</math>-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D</p> <p style="text-align: right;"><b>ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.</b></p>				
<p><b>Odpowiedniki:</b> Ivabradine Accord [X], Ivabradine Ranbaxy [68,69], Ivabradine Zentiva [68,69], Bixebra - (IR) [72,05], Raenom [72,12], Bixebra - (IR) [73,22], Bixebra - (IR) [73,25], Ivabradine Mylan [76,70], Ivabradine Anpharm - (IR) [77,85], Ivabradine Aurovitas [80,43], Ivohart [81,01], Ivabradine Genoptim [81,08], Ivabradine Anpharm [83,37], Bixebra [84,72]</p>				
<b>▼ Ivabradine Anpharm: tabl. powł. 7,5 mg - 56 szt. ◆</b>			Rx	100% <b>121,89</b> Limit <b>105,46</b> R <sup>(1)</sup> <b>19,63</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Ivabradine</i>	ATC: C01EB17	wyk: EAN ~ 264734		
<p>(1) Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II–NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca <math>\geq 75</math> uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z <math>\beta</math>-adrenolitykiem lub gdy leczenie <math>\beta</math>-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D</p> <p style="text-align: right;"><b>ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.</b></p>				
<p><b>Odpowiedniki:</b> Ivabradine Accord [X], Ivabradine Aurovitas [X], Ivabradine Ranbaxy [99,79], Ivabradine Zentiva [99,79], Bixebra - (IR) [104,82], Bixebra - (IR) [104,94], Raenom [104,94], Bixebra - (IR) [105,46], Bixebra - (IR) [105,46], Ivabradine Mylan [111,81], Ivabradine Anpharm - (IR) [113,53], Ivohart [118,27], Ivabradine Genoptim [118,32], Ivabradine Anpharm [121,89], Bixebra [123,83]</p>				
<b>▼ Ivabradine Anpharm - (IR): tabl. powł. 5 mg - 56 szt. ◆</b>			Rx	100% <b>77,85</b> Limit <b>70,31</b> R <sup>(1)</sup> <b>10,74</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Ivabradine</i>	ATC: C01EB17	wyk: EAN ~ 860077		
<p>(1) Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II–NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca <math>\geq 75</math> uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z <math>\beta</math>-adrenolitykiem lub gdy leczenie <math>\beta</math>-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D</p> <p style="text-align: right;"><b>Delfarma Sp. z o.o.</b></p>				
<p><b>Odpowiedniki:</b> Ivabradine Accord [X], Ivabradine Ranbaxy [68,69], Ivabradine Zentiva [68,69], Bixebra - (IR) [72,05], Raenom [72,12], Bixebra - (IR) [73,22], Bixebra - (IR) [73,25], Ivabradine Mylan [76,70], Ivabradine Anpharm - (IR) [77,85], Ivabradine Aurovitas [80,43], Ivohart [81,01], Ivabradine Genoptim [81,08], Ivabradine Anpharm [83,37], Bixebra [84,72]</p>				
<b>▼ Ivabradine Anpharm - (IR): tabl. powł. 7,5 mg - 56 szt. ◆</b>			Rx	100% <b>113,53</b> Limit <b>105,46</b> R <sup>(1)</sup> <b>11,27</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Ivabradine</i>	ATC: C01EB17	wyk: EAN ~ 860078		
<p>(1) Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II–NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca <math>\geq 75</math> uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z <math>\beta</math>-adrenolitykiem lub gdy leczenie <math>\beta</math>-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D</p> <p style="text-align: right;"><b>Delfarma Sp. z o.o.</b></p>				
<p><b>Odpowiedniki:</b> Ivabradine Accord [X], Ivabradine Aurovitas [X], Ivabradine Ranbaxy [99,79], Ivabradine Zentiva [99,79], Bixebra - (IR) [104,82], Bixebra - (IR) [104,94], Raenom [104,94], Bixebra - (IR) [105,46], Bixebra - (IR) [105,46], Ivabradine Mylan [111,81], Ivabradine Anpharm - (IR) [113,53], Ivohart [118,27], Ivabradine Genoptim [118,32], Ivabradine Anpharm [121,89], Bixebra [123,83]</p>				
<b>Ivabradine Aurovitas: tabl. powł. 5 mg - 56 szt. ◆</b>			Rx	100% <b>80,43</b> Limit <b>70,31</b> R <sup>(1)</sup> <b>13,32</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Ivabradine</i>	ATC: C01EB17	wyk: EAN ~ 348762		
<p>(1) Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II–NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca <math>\geq 75</math> uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z <math>\beta</math>-adrenolitykiem lub gdy leczenie <math>\beta</math>-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D</p> <p style="text-align: right;"><b>Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.</b></p>				
<p><b>Odpowiedniki:</b> Ivabradine Accord [X], Ivabradine Ranbaxy [68,69], Ivabradine Zentiva [68,69], Bixebra - (IR) [72,05], Raenom [72,12], Bixebra - (IR) [73,22], Bixebra - (IR) [73,25], Ivabradine Mylan [76,70], Ivabradine Anpharm - (IR) [77,85], Ivabradine Aurovitas [80,43], Ivohart [81,01], Ivabradine Genoptim [81,08], Ivabradine Anpharm [83,37], Bixebra [84,72]</p>				
<b>Ivabradine Mylan: tabl. powł. 5 mg - 56 szt. ◆</b>			Rx	100% <b>76,70</b> Limit <b>70,31</b> R <sup>(1)</sup> <b>9,59</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Ivabradine</i>	ATC: C01EB17	wyk: EAN ~ 322779		
<p>(1) Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II–NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca <math>\geq 75</math> uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z <math>\beta</math>-adrenolitykiem lub gdy leczenie <math>\beta</math>-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D</p> <p style="text-align: right;"><b>Viatriis Ltd</b></p>				
<p><b>Odpowiedniki:</b> Ivabradine Accord [X], Ivabradine Ranbaxy [68,69], Ivabradine Zentiva [68,69], Bixebra - (IR) [72,05], Raenom [72,12], Bixebra - (IR) [73,22], Bixebra - (IR) [73,25], Ivabradine Mylan [76,70], Ivabradine Anpharm - (IR) [77,85], Ivabradine Aurovitas [80,43], Ivohart [81,01], Ivabradine Genoptim [81,08], Ivabradine Anpharm [83,37], Bixebra [84,72]</p>				

<b>Ivabradine Mylan: tabl. powł. 7,5 mg - 56 szt. ◆</b>			Rx	100% <b>111,81</b> Limit <b>105,46</b> R <sup>(1)</sup> <b>9,55</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Ivabradine</i>	ATC: C01EB17	wyk: EAN ~ 322786		
<p>(1) Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II–NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca <math>\geq 75</math> uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z <math>\beta</math>-adrenolitykiem lub gdy leczenie <math>\beta</math>-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D</p> <p style="text-align: right;"><b>Viatriis Ltd</b></p>				
<p><b>Odpowiedniki:</b> Ivabradine Accord [X], Ivabradine Aurovitas [X], Ivabradine Ranbaxy [99,79], Ivabradine Zentiva [99,79], Bixebra - (IR) [104,82], Bixebra - (IR) [104,94], Raenom [104,94], Bixebra - (IR) [105,46], Bixebra - (IR) [105,46], Ivabradine Mylan [111,81], Ivabradine Anpharm - (IR) [113,53], Ivohart [118,27], Ivabradine Genoptim [118,32], Ivabradine Anpharm [121,89], Bixebra [123,83]</p>				
<b>Ivabradine Ranbaxy: tabl. powł. 5 mg - 56 szt. ◆</b>			Rx	100% <b>68,69</b> Limit <b>68,69</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Ivabradine</i>	ATC: C01EB17	wyk: EAN ~ 139860		
<p>(1) Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II–NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca <math>\geq 75</math> uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z <math>\beta</math>-adrenolitykiem lub gdy leczenie <math>\beta</math>-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D</p> <p style="text-align: right;"><b>Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.</b></p>				
<p><b>Odpowiedniki:</b> Ivabradine Accord [X], Ivabradine Zentiva [68,69], Ivabradine Ranbaxy [68,69], Bixebra - (IR) [72,05], Raenom [72,12], Bixebra - (IR) [73,22], Bixebra - (IR) [73,25], Ivabradine Mylan [76,70], Ivabradine Anpharm - (IR) [77,85], Ivabradine Aurovitas [80,43], Ivohart [81,01], Ivabradine Genoptim [81,08], Ivabradine Anpharm [83,37], Bixebra [84,72]</p>				
<b>Ivabradine Ranbaxy: tabl. powł. 7,5 mg - 56 szt. ◆</b>			Rx	100% <b>99,79</b> Limit <b>99,79</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Ivabradine</i>	ATC: C01EB17	wyk: EAN ~ 139862		
<p>(1) Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II–NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca <math>\geq 75</math> uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z <math>\beta</math>-adrenolitykiem lub gdy leczenie <math>\beta</math>-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D</p> <p style="text-align: right;"><b>Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.</b></p>				
<p><b>Odpowiedniki:</b> Ivabradine Accord [X], Ivabradine Aurovitas [X], Ivabradine Zentiva [99,79], Ivabradine Ranbaxy [99,79], Bixebra - (IR) [104,82], Bixebra - (IR) [104,94], Raenom [104,94], Bixebra - (IR) [105,46], Bixebra - (IR) [105,46], Ivabradine Mylan [111,81], Ivabradine Anpharm - (IR) [113,53], Ivohart [118,27], Ivabradine Genoptim [118,32], Ivabradine Anpharm [121,89], Bixebra [123,83]</p>				
<b>Ivabradine Zentiva: tabl. powł. 5 mg - 56 szt. ◆</b>			Rx	100% <b>68,69</b> Limit <b>68,69</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Ivabradine</i>	ATC: C01EB17	wyk: EAN ~ 298586		
<p>(1) Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II–NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca <math>\geq 75</math> uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z <math>\beta</math>-adrenolitykiem lub gdy leczenie <math>\beta</math>-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D</p> <p style="text-align: right;"><b>Zentiva PL Sp. z o.o.</b></p>				
<p><b>Odpowiedniki:</b> Ivabradine Accord [X], Ivabradine Ranbaxy [68,69], Ivabradine Zentiva [68,69], Bixebra - (IR) [72,05], Raenom [72,12], Bixebra - (IR) [73,22], Bixebra - (IR) [73,25], Ivabradine Mylan [76,70], Ivabradine Anpharm - (IR) [77,85], Ivabradine Aurovitas [80,43], Ivohart [81,01], Ivabradine Genoptim [81,08], Ivabradine Anpharm [83,37], Bixebra [84,72]</p>				
<b>Ivabradine Zentiva: tabl. powł. 7,5 mg - 56 szt. ◆</b>			Rx	100% <b>99,79</b> Limit <b>99,79</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Ivabradine</i>	ATC: C01EB17	wyk: EAN ~ 298654		
<p>(1) Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II–NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca <math>\geq 75</math> uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z <math>\beta</math>-adrenolitykiem lub gdy leczenie <math>\beta</math>-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D</p> <p style="text-align: right;"><b>Zentiva PL Sp. z o.o.</b></p>				
<p><b>Odpowiedniki:</b> Ivabradine Accord [X], Ivabradine Aurovitas [X], Ivabradine Ranbaxy [99,79], Ivabradine Zentiva [99,79], Bixebra - (IR) [104,82], Bixebra - (IR) [104,94], Raenom [104,94], Bixebra - (IR) [105,46], Bixebra - (IR) [105,46], Ivabradine Mylan [111,81], Ivabradine Anpharm - (IR) [113,53], Ivohart [118,27], Ivabradine Genoptim [118,32], Ivabradine Anpharm [121,89], Bixebra [123,83]</p>				
<b>Ivibene: tabl. 5 mg - 28 szt. ◆</b>			Rx	100% <b>12,07</b> Limit <b>12,07</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Nebivolol</i>	ATC: C07AB12	wyk: EAN ~ 080549		
<p>(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D</p> <p style="text-align: right;"><b>Bioton S.A.</b></p>				
<p><b>Odpowiedniki:</b> Nebivolol Genoptim [11,69], Ivibene [12,07], Nebivolol Aurovitas [12,14], NebivoLek [13,55], Daneb [14,21], Nebispes [15,96], Nebinad [16,19], Nebicard [16,48], Nebile® [16,56], Nebilenin [17,31], Neda® [18,34]</p>				



**ZOLPIC** Daj owcom odpocząć.  
zolpidem



▼Ivohart: tabl. powł. 5 mg - 56 szt. ◆		
Rx	100%	81,01
	Limit	70,31
	R <sup>(1)</sup>	13,90
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.
	Wyk. B	EAN ~ 329785
<b>INN: Ivabradine</b> ATC: C01EB17    wyk. B		
(1)Przelekła niewydolność serca w klasach NYHA II-NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca większą lub równą 75 uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z beta-adrenolitykiem lub ody leczenie beta-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>Bausch Health</b>		
<b>Odpowiedniki:</b> Ivabradine Accord [X], Ivabradine Ranbaxy [68,69], Ivabradine Zentiva [68,69], Bixebra - (IR) [72,05], Raenom [72,12], Bixebra - (IR) [73,22], Bixebra - (IR) [73,25], Ivabradine Mylan [76,70], Ivabradine Anpharm - (IR) [77,85], Ivabradine Aurovitas [80,43], Ivohart [81,01], Ivabradine Genoptim [81,08], Ivabradine Anpharm [83,37], Bixebra [84,72]		

▼Ivohart: tabl. powł. 5 mg - 112 szt. ◆		
Rx	100%	154,56
	Limit	140,61
	R <sup>(1)</sup>	17,93
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.
	Wyk. B	EAN ~ 329822
<b>INN: Ivabradine</b> ATC: C01EB17    wyk. B		
(1)Przelekła niewydolność serca w klasach NYHA II-NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca $\geq 75$ uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z $\beta$ -adrenolitykiem lub ody leczenie $\beta$ -adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>Bausch Health</b>		
<b>Odpowiedniki:</b> Ivabradine Accord [X], Ivabradine Aurovitas [X], Ivabradine Ranbaxy [99,79], Ivabradine Zentiva [99,79], Bixebra - (IR) [104,82], Bixebra - (IR) [104,94], Raenom [104,94], Bixebra - (IR) [105,46], Bixebra - (IR) [105,46], Ivabradine Mylan [111,81], Ivabradine Anpharm - (IR) [113,53], Ivohart [118,27], Ivabradine Genoptim [118,32], Ivabradine Anpharm [121,89], Bixebra [123,83]		

▼Ivohart: tabl. powł. 7,5 mg - 56 szt. ◆		
Rx	100%	118,27
	Limit	105,46
	R <sup>(1)</sup>	16,01
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.
	Wyk. B	EAN ~ 329853
<b>INN: Ivabradine</b> ATC: C01EB17    wyk. B		
(1)Przelekła niewydolność serca w klasach NYHA II-NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca $\geq 75$ uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z $\beta$ -adrenolitykiem lub ody leczenie $\beta$ -adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>Bausch Health</b>		
<b>Odpowiedniki:</b> Ivabradine Accord [X], Ivabradine Aurovitas [X], Ivabradine Ranbaxy [99,79], Ivabradine Zentiva [99,79], Bixebra - (IR) [104,82], Bixebra - (IR) [104,94], Raenom [104,94], Bixebra - (IR) [105,46], Bixebra - (IR) [105,46], Ivabradine Mylan [111,81], Ivabradine Anpharm - (IR) [113,53], Ivohart [118,27], Ivabradine Genoptim [118,32], Ivabradine Anpharm [121,89], Bixebra [123,83]		

▼Ivohart: tabl. powł. 7,5 mg - 112 szt. ◆		
Rx	100%	226,66
	Limit	210,92
	R <sup>(1)</sup>	21,71
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.
	Wyk. B	EAN ~ 329891
<b>INN: Ivabradine</b> ATC: C01EB17    wyk. B		
(1)Przelekła niewydolność serca w klasach NYHA II-NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca $\geq 75$ uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z $\beta$ -adrenolitykiem lub ody leczenie $\beta$ -adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>Bausch Health</b>		

iXell®: test diagnostyczny do szybkich oznaczeń - 50 szt.		
WM	100%	39,15
	Limit	39,09
	30% <sup>(1)</sup>	11,79
	R <sup>(2)</sup>	3,26

INN: Glukoza we krwi    ATC: V07AD    wyk.    EAN ~ 562632		
(1)Cukrzyca(2)Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięcia insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej   Kat. ciąży: N <b>Genexo Sp. z o.o.</b>		
<b>Odpowiedniki:</b> DIAVUE ToGo [35,43], OKmeter Core [35,43], Wellion SymPhar [36,63], G-BIO [37,55], Multisure GK [37,66], Everchek [37,77], Examedin® Fast [38,12], GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A [38,23], Cera-Chek 1 Code [38,33], VivaChek Ino [38,33], VivaChek Ino [38,33], One Touch Select Plus [38,35], Glucomax 01 Sensor [38,66], Glucosense® [38,77], EverCare [38,80], GensuCare [38,80], Optium Xido [38,88], Contour Plus [39,09], Contour TS [39,09], iXell® [39,15], Abra [39,27], Accu-Chek® Performa [39,27], Diagnostic Gold Strip [39,49], Glucomaxx® [39,55]		

Jamesi®: tabl. powł. 50/850 mg - 56 szt.		
Rx	100%	42,67
	Limit	29,23
	30% <sup>(1)</sup>	22,21
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.
	Wyk. B	EAN ~ 148364
<b>INN: Sitagliptin + Metformin hydrochloride</b> ATC: A10BD07    wyk. B		
(1)W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą; cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA <sub>1c</sub> $\geq 7\%$ (przez co najmniej 3 miesiące)(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Zentiva Pl Sp. z o.o. <b>Odpowiedniki:</b> Symetlip [30,73], Metsigletic [30,75], Maymetsi [38,76], Jamesi® [42,67]		

Jamesi®: tabl. powł. 50/1000 mg - 56 szt.		
Rx	100%	46,80
	Limit	29,23
	30% <sup>(1)</sup>	26,34
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.
	Wyk. B	EAN ~ 148373
<b>INN: Sitagliptin + Metformin hydrochloride</b> ATC: A10BD07    wyk. B		
(1)W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą; cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA <sub>1c</sub> $\geq 7\%$ (przez co najmniej 3 miesiące)(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Zentiva Pl Sp. z o.o. <b>Odpowiedniki:</b> Symetlip [30,73], Metsigletic [30,75], Maymetsi [38,76], Combodiab [39,85], Eprocliv [43,94], Jamesi® [46,80]		

Janumet: tabl. powł. 50/1000 mg - 56 szt.		
Rx	100%	80,57
	Limit	29,23
	30% <sup>(1)</sup>	60,11
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.
	Wyk. B	EAN ~ 929771
<b>INN: Sitagliptin + Metformin hydrochloride</b> ATC: A10BD07    wyk. B		
(1)W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą; cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA <sub>1c</sub> $\geq 7\%$ (przez co najmniej 3 miesiące)(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B <b>Merck Sharp &amp; Dohme Limited</b>		
<b>Odpowiedniki:</b> Lonamo Duo [41,87], Janumet [80,57]		

Januvia®: tabl. powł. 100 mg - 28 szt.		
Rx	100%	80,57
	Limit	29,23
	30% <sup>(1)</sup>	60,11
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.
	Wyk. B	EAN ~ 055920
<b>INN: Sitagliptin</b> ATC: A10BH01    wyk. B		
(1)W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą; cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA <sub>1c</sub> $\geq 7\%$ (przez co najmniej 3 miesiące)(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>Merck Sharp &amp; Dohme Limited</b>		
<b>Odpowiedniki:</b> Jazeta [29,23], Lonamo [30,25], Symglicitin [30,32], Silectic [30,34], Sitagliptin Adamed [30,34], Sitagliptin STADA [30,34], Sitagliptin Medical Valley [37,64], Maysiglu [38,21], Sitagliptin Bioton [39,93], Simlerid [43,94], JUZINA® [44,51], Sitagliptin SUN [46,80], Januvia® [80,57]		

▼Jardiance®: tabl. powł. 10 mg - 28 szt.		
Rx	100%	172,95
	Limit	172,95
	30% <sup>(1)</sup>	51,89
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.
	Wyk. B	EAN ~ 113850
<b>INN: Empagliflozin</b> ATC: A10BK03    wyk.		
(1)Przelekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z LVEF $\geq 2\%$ oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA: -pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lechach z grupy $\beta$ -adrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów (z frakcją wyrzutową z LVEF $\leq 40\%$ ) lub - pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lechach z grupy $\beta$ -adrenolityków oraz jeśli wskazane diuretykach (z frakcją wyrzutową z LVEF 41-50%), Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA <sub>1c</sub> $\geq 7,5\%$ oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerosł lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek $\geq 55$ lat dla mężczyzn, $\geq 60$ lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość, Przelekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z eGFR $< \text{ml/min/1,73m}^2$ , albuminurią lub białkomoczem oraz leczonych terapią opartą na ACE-i/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniami do tych terapii(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D <b>Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.</b>		

Jazeta: tabl. powł. 100 mg - 28 szt. ◆		
Rx	100%	29,23
	Limit	29,23
	30% <sup>(1)</sup>	8,77
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.
	Wyk. B	EAN ~ 148050
<b>INN: Sitagliptin</b> ATC: A10BH01    wyk. B		
(1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zentiva Pl Sp. z o.o. <b>Odpowiedniki:</b> Jazeta [29,23], Lonamo [30,25], Symglicitin [30,32], Silectic [30,34], Sitagliptin Adamed [30,34], Sitagliptin STADA [30,34], Sitagliptin Medical Valley [37,64], Maysiglu [38,21], Sitagliptin Bioton [39,93], Simlerid [43,94], JUZINA® [44,51], Sitagliptin SUN [46,80], Januvia® [80,57]		

Jorveza®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 1 mg - 90 szt.		
Rx-z	100%	1796,54
	Limit	1796,54
	R <sup>(1)</sup>	4,80
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.
	Wyk. B	EAN ~ 799443
<b>INN: Budesonide</b> ATC: A07EA06    wyk. B		
(1)Leczenie eozynofilowego zapalenia przelyku (ang. EoE) u pacjentów uprzednio leczonych inhibitorami pompy protonowej (IPP) - leczenie indukcyjne, do 12 tygodni (warunkiem wdrożenia leczenia jest udokumentowanie wykonania badania endoskopowego z pobraniem do oceny histopatologicznej co najmniej 6 wycinków błony śluzowej z proksymalnej i dystalnej części przelyku, z potwierdzeniem EoE poprzez obecność równej lub większej od 15 liczby eozynofili w dużym powiększeniu)(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>Dr. Falk</b>		

Jovesto: tabl. powł. 5 mg - 60 szt.		
Rx	100%	26,91
	Limit	26,91
	30% <sup>(1)</sup>	8,07
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.
<b>INN: Desloratadine</b> ATC: R06AX27    wyk. B		
(1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>Sandoz GmbH</b>		
<b>Odpowiedniki:</b> Desloratadine Aurovitas [22,88], Dynid [25,31], Jovesto - (IR) [25,88], Jovesto - (IR) [26,05], Jovesto [26,91]		

Jovesto: tabl. powł. 5 mg - 90 szt.		
Rx	100%	37,44
	Limit	37,44
	30% <sup>(1)</sup>	11,23
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.
<b>INN: Desloratadine</b> ATC: R06AX27    wyk. B		
(1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>Sandoz GmbH</b>		
<b>Odpowiedniki:</b> Desloratadine Aurovitas [32,63], Delortan [37,10], Jovesto - (IR) [37,15], Jovesto - (IR) [37,38], Jovesto [37,44], Dasselta [43,32]		

Jovesto - (IR): tabl. powł. 5 mg - 60 szt.	Rx	100%	25,88
		Limit	25,88
		30% <sup>(1)</sup>	7,76
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Desloratadine** ATC: R06AX27 wyk: B EAN ~ 149978  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Inpharm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Desloratadine Aurovitas [22,88], Dynid [25,31], Jovesto - (IR) [25,88], Jovesto - (IR) [26,05], Jovesto [26,91]

Jovesto - (IR): tabl. powł. 5 mg - 60 szt.	Rx	100%	26,05
		Limit	26,05
		30% <sup>(1)</sup>	7,82
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Desloratadine** ATC: R06AX27 wyk: B EAN ~ 148017  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Desloratadine Aurovitas [22,88], Dynid [25,31], Jovesto - (IR) [25,88], Jovesto - (IR) [26,05], Jovesto [26,91]

Jovesto - (IR): tabl. powł. 5 mg - 90 szt.	Rx	100%	37,38
		Limit	37,38
		30% <sup>(1)</sup>	11,21
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Desloratadine** ATC: R06AX27 wyk: B EAN ~ 148018  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Desloratadine Aurovitas [32,63], Delortan [37,10], Jovesto - (IR) [37,15], Jovesto - (IR) [37,38], Jovesto [37,44], Dasselta [43,32]

Jovesto - (IR): tabl. powł. 5 mg - 90 szt.	Rx	100%	37,15
		Limit	37,15
		30% <sup>(1)</sup>	11,15
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Desloratadine** ATC: R06AX27 wyk: B EAN ~ 149979  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Inpharm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Desloratadine Aurovitas [32,63], Delortan [37,10], Jovesto - (IR) [37,15], Jovesto - (IR) [37,38], Jovesto [37,44], Dasselta [43,32]

Juvit D3: krople doustne 20 000 j.m./ml - 1 but. 10 ml	Rx	100%	9,83
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Colecalciferol** ATC: A11CC05 wyk: B EAN ~ 047818  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek; osteoporoza posterydowa - profilaktyka (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA

JUZIMETTE®: tabl. powł. 50/1000 mg - 60 szt.	Rx	100%	44,75
		Limit	31,32
		30% <sup>(1)</sup>	22,83
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Sitagliptin + Metformin hydrochloride** ATC: A10BD07 wyk: B EAN ~ 403320  
 (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą; cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c  $\geq 7\%$  (przez co najmniej 3 miesiące) (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: JUZIMETTE® [44,75], Metformax® Combi [49,90]

JUZIMETTE®: tabl. powł. 50/850 mg - 60 szt.	Rx	100%	42,46
		Limit	31,32
		30% <sup>(1)</sup>	20,54
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Sitagliptin + Metformin hydrochloride** ATC: A10BD07 wyk: B EAN ~ 403313  
 (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą; cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c  $\geq 7\%$  (przez co najmniej 3 miesiące) (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

JUZINA®: tabl. powł. 100 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	44,51
		Limit	29,23
		30% <sup>(1)</sup>	24,05
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Sitagliptin** ATC: A10BH01 wyk: B EAN ~ 403288  
 (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą; cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c  $\geq 7\%$  (przez co najmniej 3 miesiące) (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Jazeta [29,23], Lonamo [30,25], Symgliptin [30,32], Sigletic [30,34], Sitagliptin Adamed [30,34], Sitagliptin STADA [30,34], Sitagliptin Medical Valley [37,64], Maysiglu [38,21], Sitagliptin Bioton [39,93], Simlerid [43,94], JUZINA® [44,51], Sitagliptin SUN [46,80], Januvia® [80,57]

Kalipoz® prolongatum: tabl. o przedl. uwalnianiu 391 mg - 60 szt.	Rx	100%	8,76
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Potassium chloride** ATC: A12BA01 wyk: B EAN ~ 257539  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: A  
 GSK PSC Poland Sp. z o.o.

Kalium effervescens (bezcukrowy): granulaty mus. 782 mg/3 g - 20 sasz. 3 g	Rx	100%	30,30
		Limit	5,84
		30% <sup>(1)</sup>	26,21
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Potassium citrate** ATC: A12BA02 wyk: B EAN ~ 269310  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:B, T2:A, T3:A  
 Synteza Sp. z o.o.

Kamiren®: tabl. 2 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	17,45
		Limit	9,61
		30% <sup>(1)</sup>	10,72
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	11,04
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: **Doxazosin** ATC: C02CA04, G04CA wyk: B EAN ~ 491315  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż.; nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przerost gruczołu krokowego (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Doxorion [X], Doxazosin Aurovitas [8,33], Adadox [9,01], Kamiren® [17,45], Doxonex® [17,60], Zoxon® 2 [17,61], Apo-Doxan 2 [17,73], Doxanorm® [18,45], Doxar [18,90]

Kamiren®: tabl. 4 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	24,73
		Limit	19,21
		30% <sup>(1)</sup>	11,28
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	8,72
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: **Doxazosin** ATC: C02CA04, G04CA wyk: B EAN ~ 491414  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przerost gruczołu krokowego (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Doxorion [X], Doxazosin Aurovitas [15,40], Adadox [16,82], Doxar [23,53], Dozox [23,96], Zoxon® 4 [23,97], Doxanorm® [24,61], Kamiren® [24,73], Apo-Doxan 4 [26,90], Doxonex® [27,12]

Kamiren® XL: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 4 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	24,73
		Limit	19,21
		30% <sup>(1)</sup>	11,28
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	8,72
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: **Doxazosin** ATC: C02CA04, G04CA wyk: B EAN ~ 022571  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przerost gruczołu krokowego (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Kamiren® XL [24,73], Cardura® XL [25,53]

Kamiren® XL: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 4 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	46,54
		Limit	38,42
		30% <sup>(1)</sup>	19,65
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	14,52
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: **Doxazosin** ATC: C02CA04, G04CA wyk: B EAN ~ 013820  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przerost gruczołu krokowego (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Kandesar: tabl. 8 mg - 28 szt.	Rx	100%	13,24
		Limit	10,70
		30% <sup>(1)</sup>	5,75
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Candesartan cilexetil** ATC: C09CA06 wyk: B EAN ~ 962839  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Orion Pharma Poland Sp. o.o.

Odpowiedniki: Kandesar [13,24], Candepres [13,46], Carzap [13,46], Atacand® [14,18], Ranacand [14,44], Karbis [14,61]



Naszym wyborem

**enarenal**  
 enalaprilili maleas

<b>Kandesar:</b> tabl. 16 mg - 28 szt.	Rx	100%	25,51
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	10,53
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Candesartan cilexetil</i>	ATC: C09CA06	wyk: B	EAN ~ 962945
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie noreprotektyny u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Odpowiedniki: Carzap - (IR) [21,33], Carzap - (IR) [21,37], Carzap - (IR) [21,37], Candepres - (IR) [21,39], Kandesar [25,51], Candepres [25,97], Carzap [25,97], Ranacand [27,91], Karbis [28,26], Atacand® [28,88]			
	Rx	100%	24,96
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	6,04
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Oxcarbazepine</i>	ATC: N03AF02	wyk: B	EAN ~ 048809
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Karbagen [46,80], Oxepilax [49,97], Trileptal® [49,97]			
<b>Karbagen:</b> tabl. powł. 150 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	46,80
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	5,76
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Oxcarbazepine</i>	ATC: N03AF02	wyk: B	EAN ~ 048823
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Karbagen [46,80], Oxepilax [49,97], Trileptal® [49,97]			
<b>Karbagen:</b> tabl. powł. 300 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	88,47
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Oxcarbazepine</i>	ATC: N03AF02	wyk: B	EAN ~ 048854
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Karbagen [88,47], Trileptal® [94,42], Oxepilax [97,63]			
<b>Karbicombi:</b> tabl. 8/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	13,64
		Limit	10,70
		30% <sup>(1)</sup>	6,15
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>	ATC: C09DA06	wyk: B	EAN ~ 865130
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Odpowiedniki: Candepres HCT [13,46], Karbicombi [13,64], Carzap HCT [13,86]			
<b>Karbicombi:</b> tabl. 8/12,5 mg - 56 szt.	Rx	100%	27,80
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	12,82
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>	ATC: C09DA06	wyk: B	EAN ~ 865147
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Odpowiedniki: Carzap HCT [25,97], Karbicombi [27,80]			
<b>Karbicombi:</b> tabl. 8/12,5 mg - 84 szt.	Rx	100%	39,01
		Limit	32,10
		30% <sup>(1)</sup>	16,54
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>	ATC: C09DA06	wyk: B	EAN ~ 136833
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Odpowiedniki: Karbicombi - (IR) [23,45], Carzap HCT - (IR) [23,56], Carzap HCT [26,77], Candepres HCT [26,79], Karbicombi [28,25]			
<b>Karbicombi:</b> tabl. 16/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	28,25
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	13,27
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>	ATC: C09DA06	wyk: B	EAN ~ 865178
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Odpowiedniki: Karbicombi - (IR) [23,45], Carzap HCT - (IR) [23,56], Carzap HCT [26,77], Candepres HCT [26,79], Karbicombi [28,25]			

<b>Karbicombi:</b> tabl. 16/12,5 mg - 56 szt.	Rx	100%	53,03
		Limit	42,80
		30% <sup>(1)</sup>	23,07
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>	ATC: C09DA06	wyk: B	EAN ~ 865185
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Odpowiedniki: Carzap HCT [49,37], Karbicombi [53,03]			
<b>Karbicombi:</b> tabl. 16/12,5 mg - 84 szt.	Rx	100%	74,27
		Limit	64,20
		30% <sup>(1)</sup>	29,33
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>	ATC: C09DA06	wyk: B	EAN ~ 136840
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Odpowiedniki: Carzap HCT [49,37], Karbicombi [53,03]			
<b>Karbicombi:</b> tabl. 32/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	53,03
		Limit	42,80
		30% <sup>(1)</sup>	23,07
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>	ATC: C09DA06	wyk: B	EAN ~ 865222
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Odpowiedniki: Carzap HCT [48,71], Karbicombi [53,03]			
<b>Karbicombi:</b> tabl. 32/25 mg - 28 szt.	Rx	100%	53,03
		Limit	42,80
		30% <sup>(1)</sup>	23,07
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>	ATC: C09DA06	wyk: B	EAN ~ 865260
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Odpowiedniki: Karbicombi - (IR) [39,46], Carzap HCT [48,71], Candepres HCT [48,80], Karbicombi [53,03]			
<b>Karbicombi - (IR):</b> tabl. 16/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	23,45
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	8,47
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>	ATC: C09DA06	wyk: B	EAN ~ 143230
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Odpowiedniki: Karbicombi - (IR) [23,45], Carzap HCT - (IR) [23,56], Carzap HCT [26,77], Candepres HCT [26,79], Karbicombi [28,25]			
<b>Karbicombi - (IR):</b> tabl. 32/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	39,46
		Limit	39,46
		30% <sup>(1)</sup>	11,84
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>	ATC: C09DA06	wyk: B	EAN ~ 146401
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Odpowiedniki: Karbicombi - (IR) [39,46], Karbicombi - (IR) [44,34], Candepres HCT [48,80]			
<b>Karbicombi - (IR):</b> tabl. 32/25 mg - 28 szt.	Rx	100%	39,46
		Limit	39,46
		30% <sup>(1)</sup>	11,84
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>	ATC: C09DA06	wyk: B	EAN ~ 146390
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Odpowiedniki: Karbicombi - (IR) [39,46], Carzap HCT [48,71], Candepres HCT [48,80], Karbicombi [53,03]			
<b>Karbicombi - (IR):</b> tabl. 32/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	44,34
		Limit	42,80
		30% <sup>(1)</sup>	14,38
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>	ATC: C09DA06	wyk: B	EAN ~ 143232
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Odpowiedniki: Karbicombi - (IR) [39,46], Karbicombi - (IR) [44,34], Candepres HCT [48,80]			

<b>Karbicombi - (IR): tabl. 32 mg+ 25 mg - 30 szt.</b>	Rx	100% <b>42,05</b> Limit <b>42,05</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>12,62</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09DA06   wyk: EAN ~ 143497					
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D					
<b>Karbicombi - (IR): tabl. 32 mg+ 12,5 mg - 30 szt.</b>	Rx	100% <b>42,05</b> Limit <b>42,05</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>12,62</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09DA06   wyk: EAN ~ 143666					
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D					
<b>Karbicombi - (IR): tabl. 32/25 mg - 30 szt.</b>	Rx	100% <b>48,12</b> Limit <b>45,86</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>16,02</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09DA06   wyk: B EAN ~ 142811					
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D					
Odpowiedniki: Candepres HCT - (IR) [41,71], Karbicombi - (IR) [48,12]					
<b>Karbis: tabl. 8 mg - 28 szt.</b>	Rx	100% <b>14,61</b> Limit <b>10,70</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>7,12</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Candesartan cilexetil</i>   ATC: C09CA06   wyk: B EAN ~ 772162					
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D					
Odpowiedniki: Candesar [13,24], Candepres [13,46], Carzap [13,46], Atacand <sup>®</sup> [14,18], Ranacand [14,44], Karbis [14,61]					
<b>Karbis: tabl. 8 mg - 56 szt.</b>	Rx	100% <b>26,99</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>12,01</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Candesartan cilexetil</i>   ATC: C09CA06   wyk: B EAN ~ 772179					
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D					
Odpowiedniki: Carzap [25,97], Karbis [26,99]					
<b>Karbis: tabl. 16 mg - 28 szt.</b>	Rx	100% <b>28,26</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>13,28</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Candesartan cilexetil</i>   ATC: C09CA06   wyk: B EAN ~ 772193					
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D					
Odpowiedniki: Carzap - (IR) [21,33], Carzap - (IR) [21,37], Carzap - (IR) [21,37], Candepres - (IR) [21,39], Candesar [25,51], Candepres [25,97], Carzap [25,97], Ranacand [27,91], Karbis [28,26], Atacand <sup>®</sup> [28,88]					
<b>Karbis: tabl. 16 mg - 56 szt.</b>	Rx	100% <b>51,44</b> Limit <b>42,80</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>21,48</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Candesartan cilexetil</i>   ATC: C09CA06   wyk: B EAN ~ 772209					
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D					
Odpowiedniki: Carzap - (IR) [40,10], Carzap - (IR) [40,17], Carzap - (IR) [40,17], Carzap [49,37], Karbis [51,44]					
<b>Karbis: tabl. 32 mg - 28 szt.</b>	Rx	100% <b>51,44</b> Limit <b>42,80</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>21,48</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Candesartan cilexetil</i>   ATC: C09CA06   wyk: B EAN ~ 772230					
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D					
Odpowiedniki: Candepres - (IR) [39,87], Carzap - (IR) [40,10], Carzap - (IR) [40,17], Carzap - (IR) [40,17], Candepres [44,11], Carzap [49,37], Karbis [51,44]					
<b>Karbis - (IR): tabl. 8 mg - 30 szt.</b>	Rx	100% <b>11,89</b> Limit <b>11,46</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>3,87</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Candesartan cilexetil</i>   ATC: C09CA06   wyk: EAN ~ 147566					
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D					
<b>Karbis - (IR): tabl. 8 mg - 60 szt.</b>	Rx	100% <b>22,54</b> Limit <b>22,54</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>6,76</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Candesartan cilexetil</i>   ATC: C09CA06   wyk: EAN ~ 147567					
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D					
<b>Karbis - (IR): tabl. 16 mg - 30 szt.</b>	Rx	100% <b>22,60</b> Limit <b>22,60</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>6,78</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Candesartan cilexetil</i>   ATC: C09CA06   wyk: EAN ~ 147568					
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D					
Odpowiedniki: Candepres HCT - (IR) [41,71], Karbis - (IR) [48,12]					
<b>Karbis - (IR): tabl. 16 mg - 60 szt.</b>	Rx	100% <b>42,40</b> Limit <b>42,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>12,72</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Candesartan cilexetil</i>   ATC: C09CA06   wyk: EAN ~ 147569					
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D					
Odpowiedniki: Carzap - (IR) [22,25], Karbis - (IR) [22,60]					
<b>Karbis - (IR): tabl. 32 mg - 30 szt.</b>	Rx	100% <b>42,40</b> Limit <b>42,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>12,68</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Candesartan cilexetil</i>   ATC: C09CA06   wyk: B EAN ~ 147575					
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:C, T3:D					
Odpowiedniki: Candepres - (IR) [41,71], Karbis - (IR) [42,28], Karbis - (IR) [42,28], Carzap - (IR) [42,74], Candepres - (IR) [42,84], Carzap - (IR) [43,34]					
<b>Karbis - (IR): tabl. 32 mg - 60 szt.</b>	Rx	100% <b>42,28</b> Limit <b>42,28</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>12,68</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Candesartan cilexetil</i>   ATC: C09CA06   wyk: B EAN ~ 147570					
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D					
Odpowiedniki: Candepres - (IR) [41,71], Karbis - (IR) [42,28], Karbis - (IR) [42,28], Carzap - (IR) [42,74], Candepres - (IR) [42,84], Carzap - (IR) [43,34]					
<b>Kefrenex: tabl. powł. 100 mg - 60 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>46,86</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>5,65</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <i>Quetiapine</i>   ATC: N05AH04   wyk: B EAN ~ 722365					
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C					
Odpowiedniki: Bonogren [44,28], Kefrenex [46,86], Etiagen [48,06], Kwetina [48,28], Setinin [48,66], Kventiax <sup>®</sup> [49,08], Kettlept <sup>®</sup> [50,16], Ketipino <sup>®</sup> [51,37], Pinexet [51,71], ApoTiapina [51,72], Kwetaplex [52,86], Ketrei [54,46]					





ZAKODOWANY DO WALKI  
Z ZAKAŻENIEM

<p><b>Kefrenex:</b> tabl. powł. <b>200 mg</b> - 60 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>88,34</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>3,20</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>88,34</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Ketilept®:</b> tabl. powł. <b>300 mg</b> - 60 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>135,73</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>7,31</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>135,73</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>7,31</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
100%	<b>88,34</b>																								
Limit	<b>0,00</b>																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	<b>135,73</b>																								
Limit	<b>0,00</b>																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	<b>7,31</b>																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
<p>INN: <b>Quetiapine</b>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>722426</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>            Odpowiedniki: Bonogren [84,34], Kefrenex [88,34], Etiagen [90,75], Kwetina [91,21], Setinin [91,97], Kventiax® [92,82], Ketilept® [93,83], Ketipinor® [95,21], Pinexet [96,92], ApoTiapina [98,08], Kwetaplex [100,36], Ketrel [102,65]</p>		<p>INN: <b>Quetiapine</b>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>055630</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>            Odpowiedniki: Bonogren [121,83], Kefrenex [127,84], Setinin [133,27], Ketipinor® [134,37], Kventiax® [134,55], Ketilept® [135,73], Pinexet [140,25], Kwetaplex [145,87]</p>																							
<p><b>Kefrenex:</b> tabl. powł. <b>300 mg</b> - 60 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>127,84</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>4,80</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>127,84</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>4,80</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Ketilept® Retard:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>50 mg</b> - 60 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>26,22</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>7,22</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>26,22</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>7,22</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
100%	<b>127,84</b>																								
Limit	<b>0,00</b>																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	<b>4,80</b>																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	<b>26,22</b>																								
Limit	<b>0,00</b>																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	<b>7,22</b>																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
<p>INN: <b>Quetiapine</b>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>722327</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>            Odpowiedniki: Bonogren [121,83], Kefrenex [127,84], Setinin [133,27], Ketipinor® [134,37], Kventiax® [134,55], Ketilept® [135,73], Pinexet [140,25], Kwetaplex [145,87]</p>		<p>INN: <b>Quetiapine</b>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>219383</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>            Odpowiedniki: Symquel® XR [25,25], Kventiax® SR [26,17], Ketilept® Retard [26,22]</p>																							
<p><b>Keppra®:</b> roztw. doust. <b>100 mg/ml</b> - 1 but. 300 ml ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>108,89</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>37,67</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>108,89</b>	Limit	<b>0,00</b>	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>37,67</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Ketilept® Retard:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>150 mg</b> - 60 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>70,94</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>7,53</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>70,94</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>7,53</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	<b>108,89</b>																								
Limit	<b>0,00</b>																								
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	<b>37,67</b>																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	<b>70,94</b>																								
Limit	<b>0,00</b>																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	<b>7,53</b>																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
<p>INN: <b>Levetiracetam</b>   ATC: <b>N03AX14</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>006755</b>            (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka oporna na leczenie (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>            Odpowiedniki: Trund [X], Levetiracetam NeuroPharma [71,16], Cezarius [74,42], Vetira [74,42], Keppra® [108,89]</p>		<p>INN: <b>Quetiapine</b>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>219420</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>            Odpowiedniki: Kventiax® SR [70,61], Ketilept® Retard [70,94], Kwetaplex XR [71,35]</p>																							
<p><b>Kerendia:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 14 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>143,72</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>143,72</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>43,12</b></td></tr> </table>	100%	<b>143,72</b>	Limit	<b>143,72</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>43,12</b>	<p><b>Ketilept® Retard:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>200 mg</b> - 60 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>92,80</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>7,18</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>92,80</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>7,18</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.						
100%	<b>143,72</b>																								
Limit	<b>143,72</b>																								
30% <sup>(1)</sup>	<b>43,12</b>																								
100%	<b>92,80</b>																								
Limit	<b>0,00</b>																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	<b>7,18</b>																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
<p>INN: <b>Finerenone</b>   ATC: <b>C03DA05</b>   wyk: <b>EAN</b> ~ <b>801353</b>            (1) Przewlekła choroba nerek (stadium 3 i 4, z albuminurią) w przebiegu cukrzycy typu 2, u dorosłych pacjentów leczonych insuliną   Kat. ciąży: <b>D</b>            Bayer Sp. z o.o.</p>		<p>INN: <b>Quetiapine</b>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>219468</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>            Odpowiedniki: Bonogren SR [85,48], Symquel® XR [88,92], Kventiax® SR [92,35], Kvelux SR [92,58], Ketilept® Retard [92,80], Kwetaplex XR [93,50]</p>																							
<p><b>Kerendia:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 14 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>143,72</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>143,72</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>43,12</b></td></tr> </table>	100%	<b>143,72</b>	Limit	<b>143,72</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>43,12</b>	<p><b>Ketilept® Retard:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>300 mg</b> - 60 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>134,54</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>6,12</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>134,54</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>6,12</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.						
100%	<b>143,72</b>																								
Limit	<b>143,72</b>																								
30% <sup>(1)</sup>	<b>43,12</b>																								
100%	<b>134,54</b>																								
Limit	<b>0,00</b>																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	<b>6,12</b>																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
<p>INN: <b>Finerenone</b>   ATC: <b>C03DA05</b>   wyk: <b>EAN</b> ~ <b>801358</b>            (1) Przewlekła choroba nerek (stadium 3 i 4, z albuminurią) w przebiegu cukrzycy typu 2, u dorosłych pacjentów leczonych insuliną   Kat. ciąży: <b>D</b>            Bayer Sp. z o.o.</p>		<p>INN: <b>Quetiapine</b>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>219505</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>            Odpowiedniki: Bonogren SR [125,26], Symquel® XR [128,70], Kventiax® SR [133,85], Kvelux SR [134,19], Ketilept® Retard [134,54], Kwetaplex XR [135,56]</p>																							
<p><b>Ketilept®:</b> tabl. powł. <b>25 mg</b> - 30 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>8,47</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>6,12</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>8,47</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>6,12</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Ketilept® Retard:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>400 mg</b> - 60 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>176,26</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>6,40</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>176,26</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>6,40</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
100%	<b>8,47</b>																								
Limit	<b>0,00</b>																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	<b>6,12</b>																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	<b>176,26</b>																								
Limit	<b>0,00</b>																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	<b>6,40</b>																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
<p>INN: <b>Quetiapine</b>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>055531</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z ołepieniem (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>            PROTERAPIA Sp. z o.o.            Odpowiedniki: Kefrenex [X], Kwetina [7,32], Kventiax® [7,82], Bonogren [8,15], Pinexet [8,25], Etiagen [8,36], ApoTiapina [8,47], Ketilept® [8,47], Kwetaplex [8,56], Ketrel [8,58], Setinin [8,90]</p>		<p>INN: <b>Quetiapine</b>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>219543</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>            Odpowiedniki: Symquel® XR [X], Bonogren SR [166,18], Kventiax® SR [168,47], Kvelux SR [175,80], Ketilept® Retard [176,26], Kwetaplex XR [177,63]</p>																							
<p><b>Ketilept®:</b> tabl. powł. <b>100 mg</b> - 60 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>50,16</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>8,95</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>50,16</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>8,95</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Ketipinor®:</b> tabl. powł. <b>25 mg</b> - 100 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>26,70</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>11,40</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>26,70</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>11,40</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
100%	<b>50,16</b>																								
Limit	<b>0,00</b>																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	<b>8,95</b>																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	<b>26,70</b>																								
Limit	<b>0,00</b>																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	<b>11,40</b>																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
<p>INN: <b>Quetiapine</b>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>055562</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>            PROTERAPIA Sp. z o.o.            Odpowiedniki: Bonogren [44,28], Kefrenex [46,86], Etiagen [48,06], Kwetina [48,28], Setinin [48,66], Kventiax® [49,08], Ketilept® [50,16], Ketipinor® [51,37], Pinexet [51,71], ApoTiapina [51,72], Kwetaplex [52,86], Ketrel [54,46]</p>		<p>INN: <b>Quetiapine</b>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>058808</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia WP: Zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z ołepieniem (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>            Orion Pharma Poland Sp. o.o.</p>																							
<p><b>Ketilept®:</b> tabl. powł. <b>200 mg</b> - 60 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>93,83</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>8,21</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>93,83</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>8,21</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Ketipinor®:</b> tabl. powł. <b>100 mg</b> - 30 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>26,51</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>7,51</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>26,51</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>7,51</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
100%	<b>93,83</b>																								
Limit	<b>0,00</b>																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	<b>8,21</b>																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	<b>26,51</b>																								
Limit	<b>0,00</b>																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	<b>7,51</b>																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
<p>INN: <b>Quetiapine</b>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>055593</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>            PROTERAPIA Sp. z o.o.            Odpowiedniki: Bonogren [84,34], Kefrenex [88,34], Etiagen [90,75], Kwetina [91,21], Setinin [91,97], Kventiax® [92,82], Ketilept® [93,83], Ketipinor® [95,21], Pinexet [96,92], ApoTiapina [98,08], Kwetaplex [100,36], Ketrel [102,65]</p>		<p>INN: <b>Quetiapine</b>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>058778</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>            Orion Pharma Poland Sp. o.o.</p>																							



<b>Ketipinor®:</b> tabl. powł. <b>100 mg</b> - 60 szt. ◆ INN: <i>Quetiapine</i>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>081233</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Odpowiedniki: Bonogren [44,28], Kefrenex [46,86], Etiagen [48,06], Kwetina [48,28], Setinin [48,66], Kventiax® [49,08], Ketilept® [50,16], <b>Ketipinor®</b> [51,37], Pinexet [51,71], ApoTiapina [51,72], Kwetaplex [52,86], Ketrel [54,46]	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>51,37</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>10,16</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>51,37</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>	R <sup>(2)</sup>	<b>10,16</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<b>Ketokaps Med:</b> kaps. miękkie <b>100 mg</b> - 60 szt. ◆ INN: <i>Ketoprofen</i>   ATC: <b>M01AE03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>500507</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Ból w przebiegu chorób nowotworowych - w przypadkach innych niż określone w ChPL(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:B, T2:B, T3:D</b> Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>23,21</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>20,44</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>12,99</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>23,21</b>	Limit	<b>20,44</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>12,99</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>51,37</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
R <sup>(2)</sup>	<b>10,16</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
100%	<b>23,21</b>																						
Limit	<b>20,44</b>																						
50% <sup>(1)</sup>	<b>12,99</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
<b>Ketipinor®:</b> tabl. powł. <b>100 mg</b> - 100 szt. ◆ INN: <i>Quetiapine</i>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>058785</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Orion Pharma Poland Sp. o.o.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>79,69</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>8,88</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>79,69</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>	R <sup>(2)</sup>	<b>8,88</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<b>Ketonal® Duo:</b> kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde <b>150 mg</b> - 30 szt. INN: <i>Ketoprofen</i>   ATC: <b>M01AE03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>064694</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Ból w przebiegu chorób nowotworowych - w przypadkach innych niż określone w ChPL(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:B, T2:B, T3:D</b> Sandoz GmbH	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>21,72</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>15,33</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>14,06</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>21,72</b>	Limit	<b>15,33</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>14,06</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>79,69</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
R <sup>(2)</sup>	<b>8,88</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
100%	<b>21,72</b>																						
Limit	<b>15,33</b>																						
50% <sup>(1)</sup>	<b>14,06</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
<b>Ketipinor®:</b> tabl. powł. <b>200 mg</b> - 30 szt. ◆ INN: <i>Quetiapine</i>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>058754</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Orion Pharma Poland Sp. o.o.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>49,08</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>7,87</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>49,08</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>	R <sup>(2)</sup>	<b>7,87</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<b>Ketonal® forte:</b> tabl. powł. <b>100 mg</b> - 30 szt. INN: <i>Ketoprofen</i>   ATC: <b>M01AE03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>046485</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Ból w przebiegu chorób nowotworowych - w przypadkach innych niż określone w ChPL(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:B, T2:B, T3:D</b> Sandoz GmbH	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>14,93</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>10,22</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>9,82</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>14,93</b>	Limit	<b>10,22</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>9,82</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>49,08</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
R <sup>(2)</sup>	<b>7,87</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
100%	<b>14,93</b>																						
Limit	<b>10,22</b>																						
50% <sup>(1)</sup>	<b>9,82</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
<b>Ketipinor®:</b> tabl. powł. <b>200 mg</b> - 60 szt. ◆ INN: <i>Quetiapine</i>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>081196</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Odpowiedniki: Bonogren [84,34], Kefrenex [88,34], Etiagen [90,75], Kwetina [91,21], Setinin [91,97], Kventiax® [92,82], Ketilept® [93,83], <b>Ketipinor®</b> [95,21], Pinexet [96,92], ApoTiapina [98,08], Kwetaplex [100,36], Ketrel [102,65]	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>95,21</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>9,59</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>95,21</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>	R <sup>(2)</sup>	<b>9,59</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<b>Ketoprofen-SF:</b> kaps. twarde <b>100 mg</b> - 20 szt. INN: <i>Ketoprofen</i>   ATC: <b>M01AE03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>794553</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Ból w przebiegu chorób nowotworowych - w przypadkach innych niż określone w ChPL(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:B, T2:B, T3:D</b> Sun-Farm Sp. z o.o.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>8,35</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>6,81</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>4,95</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>8,35</b>	Limit	<b>6,81</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>4,95</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>95,21</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
R <sup>(2)</sup>	<b>9,59</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
100%	<b>8,35</b>																						
Limit	<b>6,81</b>																						
50% <sup>(1)</sup>	<b>4,95</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
<b>Ketipinor®:</b> tabl. powł. <b>200 mg</b> - 100 szt. ◆ INN: <i>Quetiapine</i>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>058761</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Orion Pharma Poland Sp. o.o.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>151,12</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>8,42</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>151,12</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>	R <sup>(2)</sup>	<b>8,42</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<b>Ketrel:</b> tabl. powł. <b>25 mg</b> - 30 szt. ◆ INN: <i>Quetiapine</i>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>430840</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia <b>WP:</b> Zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z otępieniem(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Celon Pharma Sp. z o.o.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>8,58</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>6,23</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>8,58</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>	R <sup>(2)</sup>	<b>6,23</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>151,12</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
R <sup>(2)</sup>	<b>8,42</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
100%	<b>8,58</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
R <sup>(2)</sup>	<b>6,23</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
<b>Ketipinor®:</b> tabl. powł. <b>300 mg</b> - 60 szt. ◆ INN: <i>Quetiapine</i>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>779062</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Odpowiedniki: Bonogren [121,83], Kefrenex [127,84], Setinin [133,27], <b>Ketipinor®</b> [134,37], Kventiax® [134,55], Ketilept® [135,73], Pinexet [140,25], Kwetaplex [145,87]	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>134,37</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>5,95</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>134,37</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>	R <sup>(2)</sup>	<b>5,95</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<b>Ketrel:</b> tabl. powł. <b>100 mg</b> - 60 szt. ◆ INN: <i>Quetiapine</i>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>430857</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Celon Pharma Sp. z o.o.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>54,46</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>13,25</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>54,46</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>	R <sup>(2)</sup>	<b>13,25</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>134,37</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
R <sup>(2)</sup>	<b>5,95</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
100%	<b>54,46</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
R <sup>(2)</sup>	<b>13,25</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
<b>Keto-Diastix:</b> test diagnostyczny do szybkich oznaczeń - 50 szt. INN: <i>Glukoza i ciała ketonowe w moczu</i>   ATC: <b>V07AE</b>   wyk: <b>EAN ~ 288302</b> (1) Cukrzyca   Kat. ciąży: <b>N</b> Bayer Diabetes Care	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>18,24</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>18,24</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>5,47</b></td></tr> </table>	100%	<b>18,24</b>	Limit	<b>18,24</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>5,47</b>	<b>Ketrel:</b> tabl. powł. <b>200 mg</b> - 60 szt. ◆ INN: <i>Quetiapine</i>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>430888</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Celon Pharma Sp. z o.o.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>102,65</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>17,03</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>102,65</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>	R <sup>(2)</sup>	<b>17,03</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>				
100%	<b>18,24</b>																						
Limit	<b>18,24</b>																						
30% <sup>(1)</sup>	<b>5,47</b>																						
100%	<b>102,65</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
R <sup>(2)</sup>	<b>17,03</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
<b>Ketokaps Med:</b> kaps. miękkie <b>100 mg</b> - 30 szt. ◆ INN: <i>Ketoprofen</i>   ATC: <b>M01AE03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>143605</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Ból w przebiegu chorób nowotworowych - w przypadkach innych niż określone w ChPL(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:B, T2:B, T3:D</b> Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA Odpowiedniki: Ketokaps Med [12,04], Profenid® [12,09], Refastin [14,56], Ketonal® forte [14,93]	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>12,04</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>10,22</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>6,93</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>12,04</b>	Limit	<b>10,22</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>6,93</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<b>Klabax EC:</b> granulát do przyg. roztw. doust. <b>125 mg/5 ml</b> - 1 but 100 ml INN: <i>Clarithromycin</i>   ATC: <b>J01FA09</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>142645</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>28,53</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>28,53</b></td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td><b>14,27</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>28,53</b>	Limit	<b>28,53</b>	50% <sup>(1)</sup>	<b>14,27</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>12,04</b>																						
Limit	<b>10,22</b>																						
50% <sup>(1)</sup>	<b>6,93</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
100%	<b>28,53</b>																						
Limit	<b>28,53</b>																						
50% <sup>(1)</sup>	<b>14,27</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						



# ZOLPIC

Daj owcom odpocząć.  
zolidem



<b>Klabax EC:</b> granulat do przyg. roztw. doust. <b>125 mg/5 ml</b> - 1 but. 60 ml	Rx	100% <b>17,93</b> Limit <b>17,69</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>9,09</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>		<b>Klacid®:</b> granulat do przyg. zaw. <b>250 mg/5 ml</b> - 1 op. 60 ml	Rx	100% <b>45,48</b> Limit <b>35,38</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>27,79</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Clarithromycin</b>   ATC: <b>J01FA09</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>142644</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.	INN: <b>Clarithromycin</b>   ATC: <b>J01FA09</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>780624</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>		Mylan Healthcare Sp. z o.o.
<b>Klabax EC:</b> granulat do przyg. roztw. doust. <b>250 mg/5 ml</b> - 1 but. 100 ml	Rx	100% <b>53,72</b> Limit <b>53,72</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>26,86</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>		<b>Klacid®:</b> tabl. powł. <b>250 mg</b> - 10 szt.	Rx	100% <b>16,37</b> Limit <b>12,92</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>9,91</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Clarithromycin</b>   ATC: <b>J01FA09</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>142647</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:C, T3:D</b>			Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.	INN: <b>Clarithromycin</b>   ATC: <b>J01FA09</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>331819</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>		Mylan Healthcare Sp. z o.o.
<b>Klabax EC:</b> granulat do przyg. roztw. doust. <b>250 mg/5 ml</b> - 1 but. 60 ml	Rx	100% <b>33,84</b> Limit <b>33,84</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>16,92</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>		<b>Klacid®:</b> tabl. powł. <b>250 mg</b> - 14 szt.	Rx	100% <b>22,41</b> Limit <b>18,08</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>13,37</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Clarithromycin</b>   ATC: <b>J01FA09</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>142649</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.	INN: <b>Clarithromycin</b>   ATC: <b>J01FA09</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>331826</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>		Mylan Healthcare Sp. z o.o.
<b>Klabax®:</b> tabl. powł. <b>250 mg</b> - 14 szt.	Rx	100% <b>20,23</b> Limit <b>18,08</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>11,19</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>		<b>Klacid®:</b> tabl. powł. <b>500 mg</b> - 14 szt.	Rx	100% <b>42,72</b> Limit <b>36,16</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>24,64</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Clarithromycin</b>   ATC: <b>J01FA09</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>081165</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.	INN: <b>Clarithromycin</b>   ATC: <b>J01FA09</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>719419</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>		Mylan Healthcare Sp. z o.o.
<b>Klabax®:</b> tabl. powł. <b>500 mg</b> - 14 szt.	Rx	100% <b>27,21</b> Limit <b>27,21</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>13,61</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>		<b>Klarmin®:</b> tabl. powł. <b>500 mg</b> - 14 szt.	Rx	100% <b>30,36</b> Limit <b>30,36</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>15,18</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Clarithromycin</b>   ATC: <b>J01FA09</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>045532</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.	INN: <b>Clarithromycin</b>   ATC: <b>J01FA09</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>030117</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>		Bausch Health
<b>Klabax®:</b> tabl. powł. <b>500 mg</b> - 20 szt.	Rx	100% <b>37,61</b> Limit <b>37,61</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>18,81</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>		<b>Klimicin®:</b> inj. dom./inf. doż. [roztw.] <b>300 mg/2 ml</b> - 5 amp. 2 ml	Rx	100% <b>33,63</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Clarithromycin</b>   ATC: <b>J01FA09</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>045549</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.	INN: <b>Clindamycin</b>   ATC: <b>J01FF01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>067510</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>		Sandoz GmbH
<b>Klacid®:</b> granulat do przyg. zaw. <b>125 mg/5 ml</b> - 1 op. 60 ml	Rx	100% <b>25,59</b> Limit <b>17,69</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>16,75</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>		<b>Klimicin®:</b> kaps. twarde <b>300 mg</b> - 16 szt.	Rx	100% <b>19,11</b> Limit <b>19,11</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>9,56</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Clarithromycin</b>   ATC: <b>J01FA09</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>331710</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			Mylan Healthcare Sp. z o.o.	INN: <b>Clindamycin</b>   ATC: <b>J01FF01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>670739</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>		Sandoz GmbH
<b>Klacid®:</b> granulat do przyg. zaw. <b>125 mg/5 ml</b> - 1 op. 100 ml	Rx	100% <b>37,00</b> Limit <b>29,48</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>22,26</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>		<b>Kliniderm Lite Foam Silicone Border</b> : opatrunek <b>7,5x7,5 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>7,97</b> Limit <b>6,41</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>3,48</b> B <sup>(2)</sup> <b>1,56</b>
INN: <b>Clarithromycin</b>   ATC: <b>J01FA09</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>331727</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			Mylan Healthcare Sp. z o.o.	INN: <b>Emplastrum microfibrificum cellulosae</b>   ATC: <b>V20AA</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>019375</b> (1) Przewlekle owrodzenia (2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: <b>N</b>		Klinion
<b>Klacid®:</b> granulat do przyg. zaw. <b>250 mg/5 ml</b> - 1 op. 100 ml	Rx	100% <b>58,96</b> Limit <b>58,96</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>29,48</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>		<b>Kliniderm Lite Foam Silicone Border</b> : opatrunek <b>10x10 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>13,52</b> Limit <b>11,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,54</b> B <sup>(2)</sup> <b>2,12</b>
INN: <b>Clarithromycin</b>   ATC: <b>J01FA09</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>780631</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			Mylan Healthcare Sp. z o.o.	INN: <b>Emplastrum microfibrificum cellulosae</b>   ATC: <b>V20AA</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>019405</b> (1) Przewlekle owrodzenia (2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: <b>N</b>		Klinion
				<b>Odpowiedniki:</b> Kliniderm® Superabsorbent [12,48], UrgoSuperSuperabsorber [12,89], Kliniderm® Foam Border Silicone [13,52], Kliniderm® Foam Silicone [13,52], Kliniderm® Lite Foam Silicone [13,52], Mepilex Border Flex Lite [13,52], Kliniderm Lite Foam Silicone Border [13,52], Aquacel® Foam [14,73], Aquacel® Extra [15,36]		

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

<b>Kliniderm Lite Foam Silicone Border</b> : opatrunek <b>15x15 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>28,85</b> Limit <b>25,65</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>10,90</b> B <sup>(2)</sup> <b>3,20</b>
INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA wyk: EAN ~ 019450 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N Klinion Odpowiedniki: Mepilex Border Flex [28,41], Mepilex Border Flex Lite [28,84], Kliniderm® Foam Border Silicone [28,85], Kliniderm® Foam Silicone [28,85], Kliniderm® Lite Foam Silicone [28,85], <b>Kliniderm Lite Foam Silicone Border [28,85]</b> , Aquacel® Foam [31,04], Aquacel® Extra [32,46]		
<b>Kliniderm® Foam Border Silicone</b> : opatrunek <b>10x10 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>13,52</b> Limit <b>11,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,54</b> B <sup>(2)</sup> <b>2,12</b>
INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA wyk: EAN ~ 013953 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N Klinion Odpowiedniki: Kliniderm® Superabsorbent [12,48], UrgoSuperSuperabsorber [12,89], Kliniderm Lite Foam Silicone Border [13,52], Kliniderm® Foam Silicone [13,52], Kliniderm® Lite Foam Silicone [13,52], Mepilex Border Flex Lite [13,52], <b>Kliniderm® Foam Border Silicone [13,52]</b> , Aquacel® Foam [14,73], Aquacel® Extra [15,36]		
<b>Kliniderm® Foam Border Silicone</b> : opatrunek <b>15x15 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>28,85</b> Limit <b>25,65</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>10,90</b> B <sup>(2)</sup> <b>3,20</b>
INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA wyk: EAN ~ 014028 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N Klinion Odpowiedniki: Mepilex Border Flex [28,41], Mepilex Border Flex Lite [28,84], Kliniderm Lite Foam Silicone Border [28,85], Kliniderm® Foam Silicone [28,85], Kliniderm® Lite Foam Silicone [28,85], <b>Kliniderm® Foam Border Silicone [28,85]</b> , Aquacel® Foam [31,04], Aquacel® Extra [32,46]		
<b>Kliniderm® Foam Border Silicone</b> : opatrunek <b>15x20 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>37,35</b> Limit <b>34,20</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>13,41</b> B <sup>(2)</sup> <b>3,15</b>
INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA wyk: EAN ~ 014141 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N Klinion Odpowiedniki: <b>Kliniderm® Foam Border Silicone [37,35]</b> , Aquacel® Foam [40,28], Mepilex Transfer [55,72]		
<b>Kliniderm® Foam Border Silicone Heel</b> : opatrunek <b>20x20,8 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>50,49</b> Limit <b>47,42</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>17,30</b> B <sup>(2)</sup> <b>3,07</b>
INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA wyk: EAN ~ 025956 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N Klinion		
<b>Kliniderm® Foam Border Silicone Sacrum</b> : opatrunek <b>22,5x22,5 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>60,40</b> Limit <b>57,71</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>20,00</b> B <sup>(2)</sup> <b>2,69</b>
INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA wyk: EAN ~ 025987 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N Klinion		
<b>Kliniderm® Foam PHMB</b> : opatrunek <b>10x10</b> - 1 szt.	WM	100% <b>13,80</b> Limit <b>12,29</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,20</b> B <sup>(2)</sup> <b>1,51</b>
INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA wyk: EAN ~ 026847 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N Klinion		
<b>Kliniderm® Foam PHMB</b> : opatrunek <b>15x15</b> - 1 szt.	WM	100% <b>29,12</b> Limit <b>27,66</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>9,76</b> B <sup>(2)</sup> <b>1,46</b>
INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA wyk: EAN ~ 026915 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N Klinion		
<b>Kliniderm® Foam PHMB</b> : opatrunek <b>20x20</b> - 1 szt.	WM	100% <b>49,17</b> Limit <b>49,17</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>14,75</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA wyk: EAN ~ 026977 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N Klinion		
<b>Kliniderm® Foam Silicone</b> : opatrunek <b>10x10 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>13,52</b> Limit <b>11,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,54</b> B <sup>(2)</sup> <b>2,12</b>
INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA wyk: EAN ~ 013762 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N H&R Healthcare Odpowiedniki: Kliniderm® Superabsorbent [12,48], UrgoSuperSuperabsorber [12,89], Kliniderm Lite Foam Silicone Border [13,52], Kliniderm® Foam Border Silicone [13,52], Kliniderm® Lite Foam Silicone [13,52], Mepilex Border Flex Lite [13,52], <b>Kliniderm® Foam Silicone [13,52]</b> , Aquacel® Foam [14,73], Aquacel® Extra [15,36]		

<b>Kliniderm® Foam Silicone</b> : opatrunek <b>15x15 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>28,85</b> Limit <b>25,65</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>10,90</b> B <sup>(2)</sup> <b>3,20</b>
INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA wyk: EAN ~ 013793 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N H&R Healthcare Odpowiedniki: Mepilex Border Flex [28,41], Mepilex Border Flex Lite [28,84], Kliniderm Lite Foam Silicone Border [28,85], Kliniderm® Foam Border Silicone [28,85], Kliniderm® Lite Foam Silicone [28,85], <b>Kliniderm® Foam Silicone [28,85]</b> , Aquacel® Foam [31,04], Aquacel® Extra [32,46]		
<b>Kliniderm® Foam Silicone</b> : opatrunek <b>20x20 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>48,68</b> Limit <b>45,60</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>16,76</b> B <sup>(2)</sup> <b>3,08</b>
INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA wyk: EAN ~ 013878 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N H&R Healthcare Odpowiedniki: Kliniderm® Superabsorbent [43,67], <b>Kliniderm® Foam Silicone [48,68]</b> , Aquacel® Foam [52,18]		
<b>Kliniderm® Foam Silicone Heel</b> : opatrunek <b>10x17,5 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>22,79</b> Limit <b>19,95</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>8,83</b> B <sup>(2)</sup> <b>2,84</b>
INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA wyk: EAN ~ 025895 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N Klinion		
<b>Kliniderm® Lite Foam Silicone</b> : opatrunek <b>6x8,5 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>7,32</b> Limit <b>5,81</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>3,25</b> B <sup>(2)</sup> <b>1,51</b>
INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA wyk: EAN ~ 019153 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N Klinion		
<b>Kliniderm® Lite Foam Silicone</b> : opatrunek <b>10x10 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>13,52</b> Limit <b>11,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,54</b> B <sup>(2)</sup> <b>2,12</b>
INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA wyk: EAN ~ 019184 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N Klinion Odpowiedniki: Kliniderm® Superabsorbent [12,48], UrgoSuperSuperabsorber [12,89], Kliniderm Lite Foam Silicone Border [13,52], Kliniderm® Foam Border Silicone [13,52], Kliniderm® Foam Silicone [13,52], Mepilex Border Flex Lite [13,52], <b>Kliniderm® Lite Foam Silicone [13,52]</b> , Aquacel® Foam [14,73], Aquacel® Extra [15,36]		
<b>Kliniderm® Lite Foam Silicone</b> : opatrunek <b>15x15 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>28,85</b> Limit <b>25,65</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>10,90</b> B <sup>(2)</sup> <b>3,20</b>
INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA wyk: EAN ~ 019214 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N Klinion Odpowiedniki: Mepilex Border Flex [28,41], Mepilex Border Flex Lite [28,84], Kliniderm Lite Foam Silicone Border [28,85], Kliniderm® Foam Border Silicone [28,85], Kliniderm® Foam Silicone [28,85], <b>Kliniderm® Lite Foam Silicone [28,85]</b> , Aquacel® Foam [31,04], Aquacel® Extra [32,46]		
<b>Kliniderm® Lite Foam Silicone</b> : opatrunek <b>20x50 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>113,53</b> Limit <b>113,53</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>34,06</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA wyk: EAN ~ 019269 (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N Klinion Odpowiedniki: <b>Kliniderm® Lite Foam Silicone [113,53]</b> , Mepilex [125,32]		
<b>Kliniderm® Superabsorbent</b> : opatrunek <b>10x10 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>12,48</b> Limit <b>11,85</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>4,19</b>
INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA wyk: EAN ~ 067321 (1)Przewlekłe owrzodzenia   Kat. ciąży: N Klinion Odpowiedniki: <b>Kliniderm® Superabsorbent [12,48]</b> , UrgoSuperSuperabsorber [12,89], Kliniderm Lite Foam Silicone Border [13,52], Kliniderm® Foam Border Silicone [13,52], Kliniderm® Foam Silicone [13,52], Kliniderm® Lite Foam Silicone [13,52], Mepilex Border Flex Lite [13,52], Aquacel® Foam [14,73], Aquacel® Extra [15,36]		
<b>Kliniderm® Superabsorbent</b> : opatrunek <b>10x15 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>17,97</b> Limit <b>17,77</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,53</b>
INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA wyk: EAN ~ 067338 (1)Przewlekłe owrzodzenia   Kat. ciąży: N Klinion		
<b>Kliniderm® Superabsorbent</b> : opatrunek <b>10x20 cm</b> - 1 szt.	WM	100% <b>23,50</b> Limit <b>23,50</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>7,05</b>
INN: <i>Emplastri microfibricum cellulosae</i> ATC: V20AA wyk: EAN ~ 066157 (1)Przewlekłe owrzodzenia   Kat. ciąży: N Klinion Odpowiedniki: <b>Kliniderm® Superabsorbent [23,50]</b> , UrgoSuperSuperabsorber [24,37]		

<b>Kliniderm® Superabsorbent:</b> opatrunek <b>20x40 cm</b> - 1 szt.	WM	100% Limit 30% <sup>(1)</sup>	<b>81,09</b> <b>81,09</b> <b>24,33</b>
INN: <i>Emplastrum microfibricum cellulosae</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 048290 (1) Przewlekle owrządzenia   Kat. ciąży: N			Klinion
<b>Kliniderm® Superabsorbent:</b> opatrunek <b>20x20 cm</b> - 1 szt.	WM	100% Limit 30% <sup>(1)</sup>	<b>43,67</b> <b>43,67</b> <b>13,10</b>
INN: <i>Emplastrum microfibricum cellulosae</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 067307 (1) Przewlekle owrządzenia   Kat. ciąży: N			Klinion
<b>Kliniderm® Superabsorbent:</b> opatrunek <b>20x30 cm</b> - 1 szt.	WM	100% Limit 30% <sup>(1)</sup>	<b>62,15</b> <b>62,15</b> <b>18,65</b>
INN: <i>Emplastrum microfibricum cellulosae</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 067314 (1) Przewlekle owrządzenia   Kat. ciąży: N			Klinion
<b>Kliogest®:</b> tabl. powł. <b>2 mg+ 1 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	<b>26,24</b> <b>16,23</b> <b>14,88</b> bezpł.
INN: <i>Estradiol + Norethisterone (stale dawki)</i>   ATC: G03FA01   wyk: B   EAN ~ 329717 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X			Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.
<b>Klozapol®:</b> tabl. <b>25 mg</b> - 50 szt. ◆	Rx	100% Limit B <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	<b>9,22</b> <b>5,27</b> <b>3,95</b> bezpł. bezpł.
INN: <i>Clozapine</i>   ATC: N05AH02   wyk: B   EAN ~ 139422 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			Egis Polska Sp. z o.o.
<b>Klozapol®:</b> tabl. <b>100 mg</b> - 50 szt. ◆	Rx	100% Limit B <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	<b>31,44</b> <b>21,07</b> <b>10,37</b> bezpł. bezpł.
INN: <i>Clozapine</i>   ATC: N05AH02   wyk: B   EAN ~ 139521 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			Egis Polska Sp. z o.o.
<b>Konaten:</b> kaps. twarde <b>10 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup>	<b>31,73</b> <b>0,00</b> bezpł. <b>8,36</b>
INN: <i>Atomoxetine hydrochloride</i>   ATC: N06BA09   wyk: B   EAN ~ 139093 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży   Kat. ciąży: C			Neuraxpharm Arzneimittel GmbH
<b>Konaten:</b> kaps. twarde <b>18 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup>	<b>54,43</b> <b>0,00</b> bezpł. <b>9,81</b>
INN: <i>Atomoxetine hydrochloride</i>   ATC: N06BA09   wyk: B   EAN ~ 139095 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży   Kat. ciąży: C			Neuraxpharm Arzneimittel GmbH
<b>Konaten:</b> kaps. twarde <b>25 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup>	<b>73,51</b> <b>0,00</b> bezpł. <b>10,29</b>
INN: <i>Atomoxetine hydrochloride</i>   ATC: N06BA09   wyk: B   EAN ~ 139097 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży   Kat. ciąży: C			Neuraxpharm Arzneimittel GmbH
<b>Konaten:</b> kaps. twarde <b>40 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup>	<b>113,96</b> <b>0,00</b> bezpł. <b>10,89</b>
INN: <i>Atomoxetine hydrochloride</i>   ATC: N06BA09   wyk: B   EAN ~ 139099 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży   Kat. ciąży: C			Neuraxpharm Arzneimittel GmbH
<b>Kornam®:</b> tabl. <b>2 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	<b>21,24</b> <b>7,68</b> <b>15,86</b> <b>16,76</b> bezpł.
INN: <i>Terazosin hydrochloride</i>   ATC: C02CA, G04CA03   wyk: B   EAN ~ 484119 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Przerost gruczołu krokowego (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			Sandoz GmbH
<b>Kornam®:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	<b>38,64</b> <b>19,21</b> <b>25,19</b> <b>22,63</b> bezpł.
INN: <i>Terazosin hydrochloride</i>   ATC: C02CA, G04CA03   wyk: B   EAN ~ 484317 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Przerost gruczołu krokowego (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			Sandoz GmbH
<b>Kreon® 25 000:</b> kaps. <b>25000 j. Ph. Eur. lipazy</b> - 50 szt.	Rx	100% Limit B <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	<b>71,42</b> <b>62,99</b> <b>8,43</b> bezpł. bezpł.
INN: <i>Pancreatin</i>   ATC: A09AA02   wyk: B   EAN ~ 042579 (1) Mukowiscydoza, Stan po resekcji trzustki (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			Mylan Healthcare Sp. z o.o.
<b>Kvelux SR:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>50 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	<b>13,75</b> <b>0,00</b> bezpł. <b>5,85</b> bezpł.
INN: <i>Quetiapine</i>   ATC: N05AH04   wyk: B   EAN ~ 219758 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			Sandoz GmbH
<b>Kvelux SR:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>200 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	<b>92,58</b> <b>0,00</b> bezpł. <b>6,96</b> bezpł.
INN: <i>Quetiapine</i>   ATC: N05AH04   wyk: B   EAN ~ 219901 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			Sandoz GmbH
<b>Kvelux SR:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>300 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	<b>134,19</b> <b>0,00</b> bezpł. <b>5,77</b> bezpł.
INN: <i>Quetiapine</i>   ATC: N05AH04   wyk: B   EAN ~ 219963 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			Sandoz GmbH
<b>Kvelux SR:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>400 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	<b>175,80</b> <b>0,00</b> bezpł. <b>6,40</b> bezpł.
INN: <i>Quetiapine</i>   ATC: N05AH04   wyk: B   EAN ~ 220020 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			Sandoz GmbH



Naszym wyborem

**enarenal**  
 enalapryli maleas

Kventiax®: tabl. powł. 25 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	7,82
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,47
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Quetiapine** ATC: **N05AH04** wyk: **B** EAN ~ **074068**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z odepniem (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Kefrenex [X], Kwetina [7,32], Kventiax® [7,82], Bonogren [8,15], Pinexet [8,25], Etiagen [8,36], ApoTiapina [8,47], Ketiapt® [8,47], Kwetaplex [8,56], Kretel [8,58], Setinin [8,90]

Kventiax®: tabl. powł. 100 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	49,08
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,87
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Quetiapine** ATC: **N05AH04** wyk: **B** EAN ~ **074143**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Bonogren [44,28], Kefrenex [46,86], Etiagen [48,06], Kwetina [48,28], Setinin [48,66], Kventiax® [49,08], Ketiapt® [50,16], Ketiapor® [51,37], Pinexet [51,71], ApoTiapina [51,72], Kwetaplex [52,86], Kretel [54,46]

Kventiax®: tabl. powł. 200 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	92,82
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Quetiapine** ATC: **N05AH04** wyk: **B** EAN ~ **074235**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Bonogren [84,34], Kefrenex [88,34], Etiagen [90,75], Kwetina [91,21], Setinin [91,97], Kventiax® [92,82], Ketiapt® [93,83], Ketiapor® [95,21], Pinexet [96,92], ApoTiapina [98,08], Kwetaplex [100,36], Kretel [102,65]

Kventiax®: tabl. powł. 300 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	134,55
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,13
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Quetiapine** ATC: **N05AH04** wyk: **B** EAN ~ **074280**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Bonogren [121,83], Kefrenex [127,84], Setinin [133,27], Ketiapor® [134,37], Kventiax® [134,55], Ketiapt® [135,73], Pinexet [140,25], Kwetaplex [145,87]

Kventiax® SR: tabl. o przedl. uwalnianiu 50 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	26,17
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,17
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Quetiapine** ATC: **N05AH04** wyk: **B** EAN ~ **255367**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Symquel® XR [25,25], Kventiax® SR [26,17], Ketiapt® Retard [26,22]

Kventiax® SR: tabl. o przedl. uwalnianiu 150 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	70,61
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Quetiapine** ATC: **N05AH04** wyk: **B** EAN ~ **205591**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Kventiax® SR [70,61], Ketiapt® Retard [70,94], Kwetaplex XR [71,35]

Kventiax® SR: tabl. o przedl. uwalnianiu 200 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	92,35
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,73
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Quetiapine** ATC: **N05AH04** wyk: **B** EAN ~ **205676**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Bonogren SR [85,48], Symquel® XR [88,92], Kventiax® SR [92,35], Kvelux SR [92,58], Ketiapt® Retard [92,80], Kwetaplex XR [93,50]

Kventiax® SR: tabl. o przedl. uwalnianiu 300 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	133,85
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,43
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Quetiapine** ATC: **N05AH04** wyk: **B** EAN ~ **205737**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Bonogren SR [125,26], Symquel® XR [128,70], Kventiax® SR [133,85], Kvelux SR [134,19], Ketiapt® Retard [134,54], Kwetaplex XR [135,56]

Kventiax® SR: tabl. o przedl. uwalnianiu 400 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	168,47
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,40
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Quetiapine** ATC: **N05AH04** wyk: **B** EAN ~ **138092**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Symquel® XR [X], Bonogren SR [166,18], Kventiax® SR [168,47], Kvelux SR [175,80], Ketiapt® Retard [176,26], Kwetaplex XR [177,63]

Kwetaplex: tabl. powł. 25 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	8,56
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,21
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Quetiapine** ATC: **N05AH04** wyk: **B** EAN ~ **688241**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z odepniem (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Kefrenex [X], Kwetina [7,32], Kventiax® [7,82], Bonogren [8,15], Pinexet [8,25], Etiagen [8,36], ApoTiapina [8,47], Ketiapt® [8,47], Kwetaplex [8,56], Kretel [8,58], Setinin [8,90]

Kwetaplex: tabl. powł. 100 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	52,86
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	11,65
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Quetiapine** ATC: **N05AH04** wyk: **B** EAN ~ **688234**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Bonogren [44,28], Kefrenex [46,86], Etiagen [48,06], Kwetina [48,28], Setinin [48,66], Kventiax® [49,08], Ketiapt® [50,16], Ketiapor® [51,37], Pinexet [51,71], ApoTiapina [51,72], Kwetaplex [52,86], Kretel [54,46]

Kwetaplex: tabl. powł. 150 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	76,61
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	13,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Quetiapine** ATC: **N05AH04** wyk: **B** EAN ~ **688272**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Adamed Sp. z o.o.

Kwetaplex: tabl. powł. 200 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	100,36
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	14,74
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Quetiapine** ATC: **N05AH04** wyk: **B** EAN ~ **688296**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Bonogren [84,34], Kefrenex [88,34], Etiagen [90,75], Kwetina [91,21], Setinin [91,97], Kventiax® [92,82], Ketiapt® [93,83], Ketiapor® [95,21], Pinexet [96,92], ApoTiapina [98,08], Kwetaplex [100,36], Kretel [102,65]

Kwetaplex: tabl. powł. 300 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	145,87
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	17,45
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Quetiapine** ATC: **N05AH04** wyk: **B** EAN ~ **688265**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Bonogren [121,83], Kefrenex [127,84], Setinin [133,27], Ketiapor® [134,37], Kventiax® [134,55], Ketiapt® [135,73], Pinexet [140,25], Kwetaplex [145,87]

<b>Kwetaplex XR:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>50 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100% <b>13,75</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>5,85</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Quetiapine</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: N05AH04	wyk: B   EAN ~ 965335 Adamed Sp. z o.o.
Odpowiedniki: Kvelux SR [13,75], Kwetaplex XR [13,75]		
<b>Kwetaplex XR:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>150 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx	100% <b>71,35</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>7,94</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Quetiapine</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: N05AH04	wyk: B   EAN ~ 000894 Adamed Sp. z o.o.
Odpowiedniki: Kventiax <sup>®</sup> SR [70,61], Kettlept <sup>®</sup> Retard [70,94], Kwetaplex XR [71,35]		
<b>Kwetaplex XR:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>200 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx	100% <b>93,50</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>7,88</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Quetiapine</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: N05AH04	wyk: B   EAN ~ 965373 Adamed Sp. z o.o.
Odpowiedniki: Bonogren SR [85,48], Symquel <sup>®</sup> XR [88,92], Kventiax <sup>®</sup> SR [92,35], Kvelux SR [92,58], Kettlept <sup>®</sup> Retard [92,80], Kwetaplex XR [93,50]		
<b>Kwetaplex XR:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>300 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx	100% <b>135,56</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>7,14</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Quetiapine</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: N05AH04	wyk: B   EAN ~ 965403 Adamed Sp. z o.o.
Odpowiedniki: Bonogren SR [125,26], Symquel <sup>®</sup> XR [128,70], Kventiax <sup>®</sup> SR [133,85], Kvelux SR [134,19], Kettlept <sup>®</sup> Retard [134,54], Kwetaplex XR [135,56]		
<b>Kwetaplex XR:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>400 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx	100% <b>177,63</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>6,40</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Quetiapine</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: N05AH04	wyk: B   EAN ~ 965441 Adamed Sp. z o.o.
Odpowiedniki: Symquel <sup>®</sup> XR [X], Bonogren SR [166,18], Kventiax <sup>®</sup> SR [168,47], Kvelux SR [175,80], Kettlept <sup>®</sup> Retard [176,26], Kwetaplex XR [177,63]		
<b>Kwetina:</b> tabl. powl. <b>25 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100% <b>7,32</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>4,97</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Quetiapine</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z ołpieniem (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: N05AH04	wyk: B   EAN ~ 149885 Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA
Odpowiedniki: Kefrenex [X], Kwetina [7,32], Kventiax <sup>®</sup> [7,82], Bonogren [8,15], Pinexet [8,25], Etiagen [8,36], ApoTiapina [8,47], Kettlept <sup>®</sup> [8,47], Kwetaplex [8,56], Kretel [8,58], Setinin [8,90]		
<b>Kwetina:</b> tabl. powl. <b>100 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx	100% <b>48,28</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>7,07</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Quetiapine</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: N05AH04	wyk: B   EAN ~ 149887 Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA
Odpowiedniki: Bonogren [44,28], Kefrenex [46,86], Etiagen [48,06], Kwetina [48,28], Setinin [48,66], Kventiax <sup>®</sup> [49,08], Kettlept <sup>®</sup> [50,16], Ketipinor <sup>®</sup> [51,37], Pinexet [51,71], ApoTiapina [51,72], Kwetaplex [52,86], Kretel [54,46]		
<b>Kwetina:</b> tabl. powl. <b>200 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx	100% <b>91,21</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>5,59</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Quetiapine</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: N05AH04	wyk: B   EAN ~ 149888 Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA
Odpowiedniki: Bonogren [84,34], Kefrenex [88,34], Etiagen [90,75], Kwetina [91,21], Setinin [91,97], Kventiax <sup>®</sup> [92,82], Kettlept <sup>®</sup> [93,83], Ketipinor <sup>®</sup> [95,21], Pinexet [96,92], ApoTiapina [98,08], Kwetaplex [100,36], Kretel [102,65]		
<b>Kwikaton:</b> tabl. <b>50 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>15,83</b> Limit <b>14,62</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,60</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Vildagliptin</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: A10BH02	wyk: B   EAN ~ 145755 Stada Arzneimittel AG
Odpowiedniki: Vigilita [15,61], Kwikaton [15,83], Gliptivil [21,33], Anvidis [28,00], Galvus <sup>®</sup> [67,73]		
<b>Kwikaton:</b> tabl. <b>50 mg</b> - 56 szt.	Rx	100% <b>30,32</b> Limit <b>29,23</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>9,86</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Vildagliptin</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: A10BH02	wyk: B   EAN ~ 145757 Stada Arzneimittel AG
Odpowiedniki: Vigilita [29,63], Kwikaton [30,32], Anvidis [41,07], Gliptivil [41,07], Galvus <sup>®</sup> [133,92]		
<b>Lacipil<sup>®</sup>:</b> tabl. powl. <b>2 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>8,19</b> Limit <b>4,04</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,36</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Lacidipine</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: C08CA09	wyk: B   EAN ~ 650521 GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Odpowiedniki: Lapixen <sup>®</sup> [8,19], Lacipil <sup>®</sup> [8,19]		
<b>Lacipil<sup>®</sup>:</b> tabl. powl. <b>4 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>15,72</b> Limit <b>8,09</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>10,06</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Lacidipine</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: C08CA09	wyk: B   EAN ~ 650620 GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Odpowiedniki: Lacydyna [13,13], Lapixen <sup>®</sup> [15,72], Lacipil <sup>®</sup> [15,72]		
<b>Lacipil<sup>®</sup>:</b> tabl. powl. <b>6 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>23,43</b> Limit <b>12,13</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>14,94</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Lacidipine</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: C08CA09	wyk: B   EAN ~ 625697 GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Odpowiedniki: Lacydyna [20,65], Lapixen <sup>®</sup> [23,40], Lacipil <sup>®</sup> [23,43]		
<b>Lacosamide Accord:</b> tabl. powl. <b>50 mg</b> - 14 szt. ◆	Rx	100% <b>12,81</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>5,44</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Lacosamide</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana u chorych poniżej 16 rż. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: N03AX18	wyk: B   EAN ~ 743324 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Odpowiedniki: Vimpat [X], Epilantin [12,09], Trelema [12,09], Lacosamide Neuraxpharm [12,47], Lacosamide Teva [12,53], Lacosamide Glenmark [12,60], Lacosamide Accord [12,81]		
<b>Lacosamide Accord:</b> tabl. powl. <b>100 mg</b> - 56 szt. ◆	Rx	100% <b>86,92</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>5,59</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Lacosamide</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana u chorych poniżej 16 rż. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: N03AX18	wyk: B   EAN ~ 743331 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Odpowiedniki: Vimpat [X], Epilantin [80,78], Trelema [80,78], Lacosamide Neuraxpharm [84,13], Lacosamide Teva [84,53], Lacosamide Glenmark [85,21], Lacosamide Accord [86,92]		







Lacosamide Teva: tabl. powł. <b>150 mg</b> - 56 szt. ◆	Rx	100%	<b>122,73</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lacosamide</i>		ATC: N03AX18	wyk: B EAN ~ 358365
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana u chorych poniżej 16 rż. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Teva B.V.			
Odpowiedniki: Vimpat [X], Epilintan [117,09], Trelema [117,09], Zilibra [120,78], Lacosamide Neuraxpharm [122,13], Lacosamide Teva [122,73], Lacosamide Glenmark [123,73], Lacosamide Accord [126,30]			

Lacosamide Teva: tabl. powł. <b>200 mg</b> - 56 szt. ◆	Rx	100%	<b>160,52</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,98</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lacosamide</i>		ATC: N03AX18	wyk: B EAN ~ 358372
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana u chorych poniżej 16 rż. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Teva B.V.			
Odpowiedniki: Vimpat [X], Epilintan [153,01], Trelema [153,01], Zilibra [158,21], Lacosamide Neuraxpharm [159,71], Lacosamide Teva [160,52], Lacosamide Glenmark [161,86], Lacosamide Accord [165,27]			

Lacydyna: tabl. powł. <b>4 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>13,13</b>
		Limit	<b>8,09</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>7,47</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lacidipine</i>		ATC: C08CA09	wyk: B EAN ~ 105563
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
RIVOPHARM UK LTD			
Odpowiedniki: Lacydyna [13,13], Lacipil® [15,72], Lapixen® [15,72]			

Lacydyna: tabl. powł. <b>6 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>20,65</b>
		Limit	<b>12,13</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>12,16</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lacidipine</i>		ATC: C08CA09	wyk: B EAN ~ 105549
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
RIVOPHARM UK LTD			
Odpowiedniki: Lacydyna [20,65], Lapixen® [23,40], Lacipil® [23,43]			

Lafactin: kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde <b>37,5 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>12,03</b>
		Limit	<b>10,92</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>4,39</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Venlafaxine</i>		ATC: N06AX16	wyk: B EAN ~ 137750
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Symfaksin ER® [10,37], Oriven [10,53], Faxigen XL [11,02], Efevelon SR [11,39], Lafactin [12,03], Velaxin® ER 37,5 [12,56], Venlectine [12,69], Alventa® [12,77], Venlafaxine Apotex [12,82], Faxelet ER [13,10], Axiven [13,37], Prefaxine [13,80]			

Lafactin: kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde <b>75 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>22,78</b>
		Limit	<b>21,84</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>7,49</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Venlafaxine</i>		ATC: N06AX16	wyk: B EAN ~ 137735
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Venlafaxine Bluefish XL [17,37], Alventa® - (IR) [17,75], Symfaksin ER® [19,46], Oriven [19,60], Faxigen XL [20,62], Lafactin [22,78], Alventa® [23,03], Efevelon SR [23,60], Velaxin® ER 75 [23,91], Venlectine [24,18], Venlafaxine Apotex [24,46], Faxelet ER [24,62], Axiven [25,04], Efectin® ER 75 [25,55], Prefaxine [26,50]			

Lafactin: kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde <b>150 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>42,60</b>
		Limit	<b>42,60</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>12,78</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Venlafaxine</i>		ATC: N06AX16	wyk: B EAN ~ 137716
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Venlafaxine Bluefish XL [31,86], Symfaksin ER® [32,21], Alventa® - (IR) [32,27], Oriven [32,80], Faxigen XL [38,30], Lafactin [42,60], Alventa® [43,10], Efevelon SR [44,25], Efectin® ER 150 [44,82], Velaxin® ER 150 [44,84], Venlectine [45,62], Axiven [46,26], Venlafaxine Apotex [46,77], Faxelet ER [47,11], Prefaxine [50,06]			

Lambrinex: tabl. powł. <b>10 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>7,12</b>
		Limit	<b>4,21</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>4,17</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Atorvastatin</i>		ATC: C10AA05	wyk: B EAN ~ 905508
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X			
S Lab Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medreg [4,58], Atorvastatin Genoptim [5,28], Atorvastatin Bluefish AB [5,50], Storvas CRT [6,04], Lambrinex [7,12], Torvacard® 10 [8,79], Atorvox [9,06], Atrox® 10 [9,49], Atoris® [9,56], Tulip® [9,60], Apo-Atorva [9,65], Atorvasterol® [9,81]			

Lambrinex: tabl. powł. <b>10 mg</b> - 60 szt.	Rx	100%	<b>9,98</b>
		Limit	<b>8,43</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>4,08</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Atorvastatin</i>		ATC: C10AA05	wyk: B EAN ~ 905539
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X			
S Lab Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Lambrinex [9,98], Atrox® 10 [10,69], Tulip® [18,67]			

Lambrinex: tabl. powł. <b>10 mg</b> - 90 szt.	Rx	100%	<b>14,49</b>
		Limit	<b>12,64</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>5,64</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Atorvastatin</i>		ATC: C10AA05	wyk: B EAN ~ 905533
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X			
S Lab Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Lambrinex [14,49], Atrox® 10 [14,84], Atoris® [27,65], Tulip® [27,83]			

Lambrinex: tabl. powł. <b>20 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>11,67</b>
		Limit	<b>8,43</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>5,77</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Atorvastatin</i>		ATC: C10AA05	wyk: B EAN ~ 905538
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X			
S Lab Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [8,20], Atorvastatin Medreg [8,26], Atorvastatin Aurovitas [8,89], Atorvastatin Bluefish AB [9,61], Atorvastatin Genoptim [9,88], Atorvagen [9,97], Storvas CRT [11,17], Lambrinex [11,67], Torvacard® 20 [12,94], Atoris® [13,71], Atrox® 20 [15,01], Atorvox [15,23], Tulip® [15,42], Apo-Atorva [17,75], Atorvasterol® [19,11]			

Lambrinex: tabl. powł. <b>20 mg</b> - 60 szt.	Rx	100%	<b>18,91</b>
		Limit	<b>16,86</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>7,11</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Atorvastatin</i>		ATC: C10AA05	wyk: B EAN ~ 905562
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X			
S Lab Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Atorvastatin Genoptim [17,29], Atrox® 20 [18,65], Lambrinex [18,91], Atoris® [25,28], Tulip® [28,43]			

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

Lambrinex: tabl. powł. 20 mg - 90 szt.	Rx	100%	27,27
		Limit	25,29
		30% <sup>(1)</sup>	9,57
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 905676

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

**Odpowiedniki:** Atorvastatin Aurovitas [24,43], Atorvastatin Genoptim [25,27], Atrox<sup>®</sup>20 [27,16], Lambrinex [27,27], Atoris<sup>®</sup> [39,46], Tulip<sup>®</sup> [41,80]

Lambrinex: tabl. powł. 40 mg - 30 szt.	Rx	100%	22,63
		Limit	16,86
		30% <sup>(1)</sup>	10,83
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 905782

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

**Odpowiedniki:** Attractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [15,27], Atorvastatin Medreg [15,38], Atorvastatin Aurovitas [16,06], Atorvastatin Bluefish AB [18,30], Atorvastatin Genoptim [18,81], Atorvagen [19,02], Storvas CRT [21,57], Lambrinex [22,63], Tulip<sup>®</sup> [23,91], Torvacard<sup>®</sup> 40 [24,03], Atoris<sup>®</sup> [26,75], Atorvox [27,97], Atrox<sup>®</sup> 40 [29,46], Apo-Atorva [32,04], Atorvastatrol<sup>®</sup> [37,58]

Lambrinex: tabl. powł. 40 mg - 60 szt.	Rx	100%	34,94
		Limit	33,72
		30% <sup>(1)</sup>	11,34
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 905805

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

**Odpowiedniki:** Olvastim [12,00], Atorvastatin Genoptim [32,62], Atrox<sup>®</sup> 40 [34,02], Lambrinex [34,94], Tulip<sup>®</sup> [38,57], Atoris<sup>®</sup> [48,61]

Lambrinex: tabl. powł. 40 mg - 90 szt.	Rx	100%	49,88
		Limit	49,88
		30% <sup>(1)</sup>	14,96
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 905867

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

**Odpowiedniki:** Atorvastatin Aurovitas [X], Atorvastatin Genoptim [47,25], Lambrinex [49,88], Atrox<sup>®</sup> 40 [50,68], Tulip<sup>®</sup> [55,59], Torvacard<sup>®</sup> 40 [68,07], Atoris<sup>®</sup> [72,77]

Lamegom: tabl. powł. 25 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	62,94
		Limit	62,94
		30% <sup>(1)</sup>	18,88
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Agomelatine** ATC: N06AX22 wyk: B EAN ~ 969935

(1) Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku, lub anhedonii(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

**Odpowiedniki:** Agomelatine Adamed [X], Agomelatine G.L. Pharma [62,11], Symago [62,94], Lamegom [62,94], Agomelatyna Egis [63,20], Sedival<sup>®</sup> [63,25], Agolek [64,28]

Lametta <sup>®</sup> : tabl. powł. 2,5 mg - 30 szt.	Rx	100%	56,72
		Limit	56,72
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Letrozole** ATC: L02BG04 wyk: A EAN ~ 061111

(1) Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii, Rak piersi w II rzucie hormonoterapii WP: Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D

**Odpowiedniki:** Letrozole Bluefish [55,81], Letrozole Aurovitas [56,61], Aromek<sup>™</sup> [56,72], Lametta<sup>®</sup> [56,72], Clazrole [61,54], Etruzil [61,54]

Lamilept: tabl. 100 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	25,50
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	9,72

INN: **Lamotrigine** ATC: N03AX09 wyk: B EAN ~ 038480

(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrębie OUN - postępowanie wspomagające; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

**Odpowiedniki:** Lamitrin<sup>®</sup> [20,15], Epirigrine 100 mg [24,57], Lamilept - (IR) [25,37], Symla [25,38], Lamilept [25,50], Lamotrix [27,43]

**Odpowiedniki:** Lamitrin<sup>®</sup> [20,15], Epirigrine 100 mg [24,57], Lamilept - (IR) [25,37], Symla [25,38], Lamilept [25,50], Lamotrix [27,43]

Lamilept - (IR): tabl. 100 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	25,37
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	9,59

INN: **Lamotrigine** ATC: N03AX09 wyk: B EAN ~ 149629

(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrębie OUN - postępowanie wspomagające; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

**Odpowiedniki:** Lamitrin<sup>®</sup> [20,15], Epirigrine 100 mg [24,57], Lamilept - (IR) [25,37], Symla [25,38], Lamilept [25,50], Lamotrix [27,43]

**Odpowiedniki:** Lamitrin<sup>®</sup> [20,15], Epirigrine 100 mg [24,57], Lamilept - (IR) [25,37], Symla [25,38], Lamilept [25,50], Lamotrix [27,43]

Lamitrin <sup>®</sup> : tabl. 100 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	20,15
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	4,37

INN: **Lamotrigine** ATC: N03AX09 wyk: B EAN ~ 346318

(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrębie OUN - postępowanie wspomagające; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

**Odpowiedniki:** Lamitrin<sup>®</sup> [20,15], Epirigrine 100 mg [24,57], Lamilept - (IR) [25,37], Symla [25,38], Lamilept [25,50], Lamotrix [27,43]

**Odpowiedniki:** Lamitrin<sup>®</sup> [20,15], Epirigrine 100 mg [24,57], Lamilept - (IR) [25,37], Symla [25,38], Lamilept [25,50], Lamotrix [27,43]

Lamitrin <sup>®</sup> : tabl. 100 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	37,95
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20

INN: **Lamotrigine** ATC: N03AX09 wyk: B EAN ~ 346325

(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrębie OUN - postępowanie wspomagające; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

**Odpowiedniki:** Lamitrin<sup>®</sup> [20,15], Epirigrine 100 mg [24,57], Lamilept - (IR) [25,37], Symla [25,38], Lamilept [25,50], Lamotrix [27,43]

**Odpowiedniki:** Lamitrin<sup>®</sup> [20,15], Epirigrine 100 mg [24,57], Lamilept - (IR) [25,37], Symla [25,38], Lamilept [25,50], Lamotrix [27,43]

Lamitrin <sup>®</sup> S: tabl. do przyg. zaw. doust. 25 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	18,47
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	5,49

INN: **Lamotrigine** ATC: N03AX09 wyk: B EAN ~ 787210

(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrębie OUN - postępowanie wspomagające; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

**Odpowiedniki:** Lamitrin<sup>®</sup> [20,15], Epirigrine 100 mg [24,57], Lamilept - (IR) [25,37], Symla [25,38], Lamilept [25,50], Lamotrix [27,43]

Lamitrin <sup>®</sup> S: tabl. do przyg. zaw. doust. 100 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	64,73
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20

INN: **Lamotrigine** ATC: N03AX09 wyk: B EAN ~ 787319

(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrębie OUN - postępowanie wspomagające; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

**Odpowiedniki:** Lamitrin<sup>®</sup> [20,15], Epirigrine 100 mg [24,57], Lamilept - (IR) [25,37], Symla [25,38], Lamilept [25,50], Lamotrix [27,43]



# ZOLPIC

Daj owcom odpocząć.

zolidem



<p><b>Lamotrix: tabl. 25 mg - 30 szt. ◆</b></p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>7,48</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(3)</sup></td><td>5,94</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	7,48		Limit	0,00		C <sup>(1)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	5,94		S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<p><b>Lanvis®: tabl. 40 mg - 25 szt.</b></p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>425,87</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>450,53</td></tr> <tr><td></td><td>B<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>B<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	425,87		Limit	450,53		B <sup>(1)</sup>	bezpł.		B <sup>(2)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
Rx	100%	7,48																																					
	Limit	0,00																																					
	C <sup>(1)</sup>	bezpł.																																					
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																																					
	R <sup>(3)</sup>	5,94																																					
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.																																					
Rx	100%	425,87																																					
	Limit	450,53																																					
	B <sup>(1)</sup>	bezpł.																																					
	B <sup>(2)</sup>	bezpł.																																					
	DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.																																					
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.																																					
<p>INN: <i>Lamotrigine</i>   ATC: N03AX09   wyk: B   EAN ~ 006419            (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrębie OUN - postępowanie wspomagające; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C            Neuraxpharm Arzneimittel GmbH</p>		<p>INN: <i>Tioguanine</i>   ATC: L01BB03   wyk: B   EAN ~ 185214            (1) Nowotwory złośliwe (2) Chemioterapia ICD10: C.56. (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C            Aspen Pharma Trading Limited</p>																																					
<p>Odpowiedniki: Lamilept [X], Symla [6,98], <b>Lamotrix [7,48]</b>, Lamitrin® [15,26]</p>		<p><b>Lanzul®: kaps. 30 mg - 28 szt.</b></p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>18,63</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>12,43</td></tr> <tr><td></td><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>12,42</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	18,63		Limit	12,43		50% <sup>(1)</sup>	12,42		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.																					
Rx	100%	18,63																																					
	Limit	12,43																																					
	50% <sup>(1)</sup>	12,42																																					
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																																					
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																																					
<p><b>Lamotrix: tabl. 50 mg - 30 szt. ◆</b></p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>14,15</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(3)</sup></td><td>7,86</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	14,15		Limit	0,00		C <sup>(1)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	7,86		S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<p>INN: <i>Lansoprazole</i>   ATC: A02BC03   wyk: B   EAN ~ 727032            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B            Krka Polska Sp. z o.o.</p>																			
Rx	100%	14,15																																					
	Limit	0,00																																					
	C <sup>(1)</sup>	bezpł.																																					
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																																					
	R <sup>(3)</sup>	7,86																																					
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.																																					
<p>INN: <i>Lamotrigine</i>   ATC: N03AX09   wyk: B   EAN ~ 006518            (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrębie OUN - postępowanie wspomagające; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C            Neuraxpharm Arzneimittel GmbH</p>		<p><b>Lanzul® S: kaps. 15 mg - 28 szt.</b></p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>9,61</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>6,22</td></tr> <tr><td></td><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>6,50</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	9,61		Limit	6,22		50% <sup>(1)</sup>	6,50		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.																					
Rx	100%	9,61																																					
	Limit	6,22																																					
	50% <sup>(1)</sup>	6,50																																					
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																																					
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																																					
<p>Odpowiedniki: Lamilept [X], Epirigine 50 mg [12,71], Symla [13,11], <b>Lamotrix [14,15]</b>, Lamitrin® [26,32]</p>		<p>INN: <i>Lansoprazole</i>   ATC: A02BC03   wyk: B   EAN ~ 869817            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B            Krka Polska Sp. z o.o.</p>																																					
<p><b>Lamotrix: tabl. 100 mg - 30 szt. ◆</b></p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>27,43</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(3)</sup></td><td>11,65</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	27,43		Limit	0,00		C <sup>(1)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	11,65		S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<p><b>Lapixen®: tabl. powł. 2 mg - 28 szt.</b></p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>8,19</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>4,04</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>5,36</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	8,19		Limit	4,04		30% <sup>(1)</sup>	5,36		S <sup>(2)</sup>	bezpł.						
Rx	100%	27,43																																					
	Limit	0,00																																					
	C <sup>(1)</sup>	bezpł.																																					
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																																					
	R <sup>(3)</sup>	11,65																																					
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.																																					
Rx	100%	8,19																																					
	Limit	4,04																																					
	30% <sup>(1)</sup>	5,36																																					
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																																					
<p>INN: <i>Lamotrigine</i>   ATC: N03AX09   wyk: B   EAN ~ 006617            (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrębie OUN - postępowanie wspomagające; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C            Neuraxpharm Arzneimittel GmbH</p>		<p>INN: <i>Lacidipine</i>   ATC: C08CA09   wyk: B   EAN ~ 134907            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C            Biofarm Sp. z o.o.</p>																																					
<p>Odpowiedniki: Lamitrin® [20,15], Epirigine 100 mg [24,57], Lamilept - (IR) [25,37], Symla [25,38], Lamilept [25,50], <b>Lamotrix [27,43]</b></p>		<p>Odpowiedniki: Lacipil® [8,19], <b>Lapixen® [8,19]</b></p>																																					
<p><b>Lamotrix: tabl. 100 mg - 90 szt. ◆</b></p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>71,02</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(3)</sup></td><td>17,29</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	71,02		Limit	0,00		C <sup>(1)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	17,29		S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<p><b>Lapixen®: tabl. powł. 2 mg - 56 szt.</b></p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>15,66</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>8,09</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>10,00</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	15,66		Limit	8,09		30% <sup>(1)</sup>	10,00		S <sup>(2)</sup>	bezpł.						
Rx	100%	71,02																																					
	Limit	0,00																																					
	C <sup>(1)</sup>	bezpł.																																					
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																																					
	R <sup>(3)</sup>	17,29																																					
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.																																					
Rx	100%	15,66																																					
	Limit	8,09																																					
	30% <sup>(1)</sup>	10,00																																					
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																																					
<p>INN: <i>Lamotrigine</i>   ATC: N03AX09   wyk: B   EAN ~ 961092            (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrębie OUN - postępowanie wspomagające; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C            Neuraxpharm Arzneimittel GmbH</p>		<p>INN: <i>Lacidipine</i>   ATC: C08CA09   wyk: B   EAN ~ 215205            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C            Biofarm Sp. z o.o.</p>																																					
<p>Odpowiedniki: Lamitrin® [20,15], Epirigine 100 mg [24,57], Lamilept - (IR) [25,37], Symla [25,38], Lamilept [25,50], <b>Lamotrix [27,43]</b></p>		<p>Odpowiedniki: Lacydyna [13,13], Lacipil® [15,72], <b>Lapixen® [15,72]</b></p>																																					
<p><b>Lantus®: inj. [roztw.] 100 j.m./ml - 5 wkł. 3 ml ◆</b></p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>196,31</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>154,96</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>87,84</td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	196,31		Limit	154,96		30% <sup>(1)</sup>	87,84		C <sup>(2)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.		S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<p><b>Lapixen®: tabl. powł. 4 mg - 28 szt.</b></p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>15,72</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>8,09</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>10,06</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	15,72		Limit	8,09		30% <sup>(1)</sup>	10,06		S <sup>(2)</sup>	bezpł.						
Rx	100%	196,31																																					
	Limit	154,96																																					
	30% <sup>(1)</sup>	87,84																																					
	C <sup>(2)</sup>	bezpł.																																					
	DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.																																					
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.																																					
Rx	100%	15,72																																					
	Limit	8,09																																					
	30% <sup>(1)</sup>	10,06																																					
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																																					
<p>INN: <i>Insulin glargine</i>   ATC: A10AE04   wyk: B   EAN ~ 895717            (1) Cukrzyca typu 1 u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia, Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 m-cy i z HbA1c ≥ 8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 m-cy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku 2-6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO) (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A            Sanofi-Aventis Deutschland GmbH</p>		<p>INN: <i>Lacidipine</i>   ATC: C08CA09   wyk: B   EAN ~ 134938            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C            Biofarm Sp. z o.o.</p>																																					
<p>Odpowiedniki: Lacydyna [13,13], Lacipil® [15,72], <b>Lapixen® [15,72]</b></p>		<p>Odpowiedniki: Lacydyna [13,13], Lacipil® [15,72], <b>Lapixen® [15,72]</b></p>																																					
<p><b>Lantus®: inj. [roztw.] 100 j.m./ml - 5 wstrzyk. 3 ml (SoloStar) ◆</b></p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>196,31</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>154,96</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>87,84</td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	196,31		Limit	154,96		30% <sup>(1)</sup>	87,84		C <sup>(2)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.		S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<p><b>Lapixen®: tabl. powł. 4 mg - 56 szt.</b></p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>30,78</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>16,17</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>19,46</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	30,78		Limit	16,17		30% <sup>(1)</sup>	19,46		S <sup>(2)</sup>	bezpł.						
Rx	100%	196,31																																					
	Limit	154,96																																					
	30% <sup>(1)</sup>	87,84																																					
	C <sup>(2)</sup>	bezpł.																																					
	DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.																																					
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.																																					
Rx	100%	30,78																																					
	Limit	16,17																																					
	30% <sup>(1)</sup>	19,46																																					
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																																					
<p>INN: <i>Insulin glargine</i>   ATC: A10AE04   wyk: B   EAN ~ 617555            (1) Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 m-cy i z HbA1c ≥ 8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 m-cy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku 2-6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO), Cukrzyca typu 1 u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A            Sanofi-Aventis Deutschland GmbH</p>		<p>INN: <i>Lacidipine</i>   ATC: C08CA09   wyk: B   EAN ~ 215212            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C            Biofarm Sp. z o.o.</p>																																					
<p>Odpowiedniki: Lacydyna [20,65], <b>Lapixen® [23,40]</b>, Lacipil® [23,43]</p>		<p>Odpowiedniki: Lacydyna [20,65], <b>Lapixen® [23,40]</b>, Lacipil® [23,43]</p>																																					
<p><b>Lapixen®: tabl. powł. 6 mg - 28 szt.</b></p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>23,40</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>12,13</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>14,91</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	23,40		Limit	12,13		30% <sup>(1)</sup>	14,91		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Lapixen®: tabl. powł. 6 mg - 56 szt.</b></p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>45,49</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>24,26</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>28,51</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	45,49		Limit	24,26		30% <sup>(1)</sup>	28,51		S <sup>(2)</sup>	bezpł.												
Rx	100%	23,40																																					
	Limit	12,13																																					
	30% <sup>(1)</sup>	14,91																																					
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																																					
Rx	100%	45,49																																					
	Limit	24,26																																					
	30% <sup>(1)</sup>	28,51																																					
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																																					
<p>INN: <i>Insulin glargine</i>   ATC: A10AE04   wyk: B   EAN ~ 617555            (1) Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 m-cy i z HbA1c ≥ 8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 m-cy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku 2-6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO), Cukrzyca typu 1 u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A            Sanofi-Aventis Deutschland GmbH</p>		<p>INN: <i>Lacidipine</i>   ATC: C08CA09   wyk: B   EAN ~ 215229            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C            Biofarm Sp. z o.o.</p>																																					
<p>Odpowiedniki: Lacydyna [20,65], <b>Lapixen® [23,40]</b>, Lacipil® [23,43]</p>		<p>Odpowiedniki: Lacydyna [20,65], <b>Lapixen® [23,40]</b>, Lacipil® [23,43]</p>																																					

**ADRENALINA WZF**

Adrenalinum

Zawsze pod ręką!

**Refundacja** od lipca 2015  
Poziom odpłatności 50%

ADR-WZF/131/06-2015

Latacom: krople do oczu [roztw.] (50 µg+ 5 mg)/ml - 1 but. 2,5 ml ◆	Rx	100%	41,79
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	13,34
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Latanoprost + Timolol</i> ATC: S01ED51 wyk: B EAN ~ 879687			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Latanoprost + Timolol Genoptim [30,76], Akistan Duo [31,83], Tilaprox [36,80], Xalacom® [40,08], Latacom [41,79], Xaloptic Combi [41,84]			
Latacom: krople do oczu [roztw.] (50 µg+ 5 mg)/ml - 3 but. 2,5 ml ◆	Rx	100%	85,61
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	8,00
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Latanoprost + Timolol</i> ATC: S01ED51 wyk: B EAN ~ 000948			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Xalacom® [84,87], Latacom [85,61], Xaloptic Combi [95,87]			
Latalux: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml - 1 but. 2,5 ml	Rx	100%	36,12
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,67
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Latanoprost</i> ATC: S01EE01 wyk: B EAN ~ 813582			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Bausch Health			
Odpowiedniki: Akistan [31,83], Latanoprost Genoptim [33,92], Latalux [36,12], Xalatan® [37,26], Rozaprost [38,06], Xaloptic [41,83]			
Latanoprost + Timolol Genoptim: krople do oczu [roztw.] (50 µg+ 5 mg)/ml - 1 but. 2,5 ml ◆	Rx	100%	30,76
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Latanoprost + Timolol</i> ATC: S01ED51 wyk: B EAN ~ 306649			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Synoptis Pharma Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Latanoprost + Timolol Genoptim [30,76], Akistan Duo [31,83], Tilaprox [36,80], Xalacom® [40,08], Latacom [41,79], Xaloptic Combi [41,84]			
Latanoprost Genoptim: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml - 1 but. 2,5 ml	Rx	100%	33,92
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,47
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Latanoprost</i> ATC: S01EE01 wyk: B EAN ~ 931873			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Synoptis Pharma Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Akistan [31,83], Latanoprost Genoptim [33,92], Latalux [36,12], Xalatan® [37,26], Rozaprost [38,06], Xaloptic [41,83]			
▼ Latuda: tabl. powł. 18,5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	230,76
		Limit	230,76
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lurasidone</i> ATC: N05AE05 wyk: B EAN ~ 110867			
(1) Schizofrenia u pacjentów od 13-go rż. po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii pozostałymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacji(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.			
▼ Latuda: tabl. powł. 37 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	230,76
		Limit	230,76
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lurasidone</i> ATC: N05AE05 wyk: B EAN ~ 110876			
(1) Schizofrenia u pacjentów od 13-go rż. po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii pozostałymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacji(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.			
▼ Latuda: tabl. powł. 74 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	230,76
		Limit	230,76
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lurasidone</i> ATC: N05AE05 wyk: B EAN ~ 108878			
(1) Schizofrenia u pacjentów od 13-go rż. po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii pozostałymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacji(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.			

Leflunomid Bluefish: tabl. powł. 10 mg - 30 szt.	Rx-z	100%	59,62
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,25
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Leflunomide</i> ATC: L04AA13 wyk: B EAN ~ 309138			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów WP: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Bluefish Pharmaceuticals			
Odpowiedniki: Leflunomide Zentiva [X], Leflunomid Egis [59,04], Leflunomid Bluefish [59,62], Leflunomide medac [60,76], Arava® 10 mg [64,20]			
Leflunomid Bluefish: tabl. powł. 20 mg - 30 szt.	Rx-z	100%	109,41
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Leflunomide</i> ATC: L04AA13 wyk: B EAN ~ 309145			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów WP: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Bluefish Pharmaceuticals			
Odpowiedniki: Leflunomide Zentiva [X], Leflunomide Orion [102,53], Arava® - (IR) [109,37], Arava® - (IR) [109,41], Leflunomid Bluefish [109,41], Leflunomide medac [115,13], Leflunomide Sandoz [115,13], Arava® 20 mg [120,86]			
Leflunomid Egis: tabl. powł. 10 mg - 30 szt.	Rx-z	100%	59,04
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	4,67
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Leflunomide</i> ATC: L04AA13 wyk: B EAN ~ 719198			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów WP: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Egis Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Leflunomide Zentiva [X], Leflunomid Egis [59,04], Leflunomid Bluefish [59,62], Leflunomide medac [60,76], Arava® 10 mg [64,20]			
Leflunomid Egis: tabl. powł. 15 mg - 30 szt.	Rx-z	100%	85,90
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Leflunomide</i> ATC: L04AA13 wyk: B EAN ~ 719203			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów WP: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Egis Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Leflunomid Egis [85,90], Leflunomide medac [88,47]			
Leflunomid Egis: tabl. powł. 20 mg - 30 szt.	Rx-z	100%	111,70
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Leflunomide</i> ATC: L04AA13 wyk: B EAN ~ 719207			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów WP: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Egis Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Leflunomid Egis [85,90], Leflunomide medac [88,47]			
Leflunomide medac: tabl. powł. 10 mg - 30 szt.	Rx-z	100%	60,76
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,39
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Leflunomide</i> ATC: L04AA13 wyk: B EAN ~ 010604			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów WP: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X medac GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce			
Odpowiedniki: Leflunomide Zentiva [X], Leflunomid Egis [59,04], Leflunomid Bluefish [59,62], Leflunomide medac [60,76], Arava® 10 mg [64,20]			
Leflunomide medac: tabl. powł. 15 mg - 30 szt.	Rx-z	100%	88,47
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,32
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Leflunomide</i> ATC: L04AA13 wyk: B EAN ~ 015388			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów WP: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X medac GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce			
Odpowiedniki: Leflunomid Egis [85,90], Leflunomide medac [88,47]			

<p><b>Leflunomide medac:</b> tabl. powł. 20 mg - 30 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>115,13</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	115,13	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>7,46</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>4,38</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	7,46	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	4,38	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	115,13																							
Limit	0,00																							
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																							
R <sup>(2)</sup>	3,20																							
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																							
100%	7,46																							
Limit	0,00																							
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																							
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																							
R <sup>(3)</sup>	4,38																							
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																							
<p>INN: <b>Leflunomide</b>   ATC: L04AA13   wyk: B   EAN ~ 010628 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów WP: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X medac GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce</p> <p>Odpowiedniki: Leflunomide Zentiva [X], Leflunomide Orion [102,53], Arava® - (IR) [109,37], Arava® - (IR) [109,41], Leflunomid Bluefish [109,41], Leflunomide Sandoz [115,13], <b>Leflunomide medac [115,13]</b>, Arava® 20 mg [120,86]</p>		<p>INN: <b>Levothyroxine sodium</b>   ATC: H03AA01   wyk: B   EAN ~ 107260 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Niedoczynnność tarczycy(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Althyxin® [6,33], <b>Letrox® 75 [7,46]</b>, Euthyrox® N 75 [8,75]</p>																						
<p><b>Leflunomide Orion:</b> tabl. powł. 20 mg - 30 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>102,53</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	102,53	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>8,53</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>3,71</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	8,53	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	3,71	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	102,53																							
Limit	0,00																							
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																							
R <sup>(2)</sup>	3,20																							
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																							
100%	8,53																							
Limit	0,00																							
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																							
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																							
R <sup>(3)</sup>	3,71																							
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																							
<p>INN: <b>Leflunomide</b>   ATC: L04AA13   wyk: B   EAN ~ 151046 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów WP: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Orion Pharma Poland Sp. o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Leflunomide Zentiva [X], Leflunomide Orion [102,53], Arava® - (IR) [109,37], Arava® - (IR) [109,41], Leflunomid Bluefish [109,41], Leflunomide medac [115,13], Leflunomide Sandoz [115,13], Arava® 20 mg [120,86]</p>		<p>INN: <b>Levothyroxine sodium</b>   ATC: H03AA01   wyk: B   EAN ~ 168910 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Niedoczynnność tarczycy(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Althyxin® [8,15], Eferox [8,17], <b>Letrox® 100 [8,53]</b>, Euthyrox® N 100 [9,38]</p>																						
<p><b>Leflunomide Sandoz:</b> tabl. powł. 20 mg - 30 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>115,13</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	115,13	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>10,00</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>4,44</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	10,00	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	4,44	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	115,13																							
Limit	0,00																							
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																							
R <sup>(2)</sup>	3,20																							
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																							
100%	10,00																							
Limit	0,00																							
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																							
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																							
R <sup>(3)</sup>	4,44																							
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																							
<p>INN: <b>Leflunomide</b>   ATC: L04AA13   wyk: B   EAN ~ 858651 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów WP: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Sandoz GmbH</p> <p>Odpowiedniki: Leflunomide Zentiva [X], Leflunomide Orion [102,53], Arava® - (IR) [109,37], Arava® - (IR) [109,41], Leflunomid Bluefish [109,41], Leflunomide medac [115,13], <b>Leflunomide Sandoz [115,13]</b>, Arava® 20 mg [120,86]</p>		<p>INN: <b>Levothyroxine sodium</b>   ATC: H03AA01   wyk: B   EAN ~ 107307 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Niedoczynnność tarczycy(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Althyxin® [9,97], <b>Letrox® 125 [10,00]</b>, Euthyrox® N 125 [10,90]</p>																						
<p><b>Lerivon®:</b> tabl. powł. 10 mg - 30 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>10,39</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>9,81</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>3,52</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	10,39	Limit	9,81	30% <sup>(1)</sup>	3,52	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>11,97</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>5,33</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	11,97	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	5,33	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	10,39																							
Limit	9,81																							
30% <sup>(1)</sup>	3,52																							
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																							
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																							
100%	11,97																							
Limit	0,00																							
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																							
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																							
R <sup>(3)</sup>	5,33																							
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																							
<p>INN: <b>Mianserin</b>   ATC: N06AX03   wyk: B   EAN ~ 157716 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C MSD Polska Sp. z o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Miansec [9,73], Miansegen [9,73], Deprexole® [9,81], <b>Lerivon® [10,39]</b></p>		<p>INN: <b>Levothyroxine sodium</b>   ATC: H03AA01   wyk: B   EAN ~ 820610 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Niedoczynnność tarczycy(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Althyxin® [11,79], <b>Letrox® 150 [11,97]</b>, Euthyrox® N 150 [12,41]</p>																						
<p><b>Lerivon®:</b> tabl. powł. 30 mg - 30 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>28,77</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>28,77</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>8,63</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	28,77	Limit	28,77	30% <sup>(1)</sup>	8,63	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>56,61</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>56,61</td></tr> <tr><td>B<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	56,61	Limit	56,61	B <sup>(1)</sup>	bezpł.	S <sup>(2)</sup>	bezpł.				
100%	28,77																							
Limit	28,77																							
30% <sup>(1)</sup>	8,63																							
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																							
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																							
100%	56,61																							
Limit	56,61																							
B <sup>(1)</sup>	bezpł.																							
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																							
<p>INN: <b>Mianserin</b>   ATC: N06AX03   wyk: B   EAN ~ 157822 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C MSD Polska Sp. z o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Miansegen [26,80], Miansec 30 [27,62], <b>Lerivon® [28,77]</b>, Deprexole® [29,22]</p>		<p>INN: <b>Letrozole</b>   ATC: L02BG04   wyk: A   EAN ~ 146614 (1) Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii, Rak piersi w II rzucie hormonoterapii WP: Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Eugia Pharma (Malta) Ltd.</p> <p>Odpowiedniki: Letrozole Bluefish [55,81], <b>Letrozole Aurovitas [56,61]</b>, Aromek™ [56,72], Lametta® [56,72], Clazrole [61,54], Etruzil [61,54]</p>																						
<p><b>Letizen:</b> tabl. powł. 10 mg - 20 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>10,38</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>8,97</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>4,10</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	10,38	Limit	8,97	30% <sup>(1)</sup>	4,10	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>204,47</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>204,47</td></tr> <tr><td>B<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	204,47	Limit	204,47	B <sup>(1)</sup>	bezpł.	S <sup>(2)</sup>	bezpł.				
100%	10,38																							
Limit	8,97																							
30% <sup>(1)</sup>	4,10																							
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																							
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																							
100%	204,47																							
Limit	204,47																							
B <sup>(1)</sup>	bezpł.																							
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																							
<p>INN: <b>Cetirizine dihydrochloride</b>   ATC: R06AE07   wyk: B   EAN ~ 869725 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke'go - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Krka Polska Sp. z o.o.</p>		<p>INN: <b>Letrozole</b>   ATC: L02BG04   wyk: A   EAN ~ 146613 (1) Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii, Rak piersi w II rzucie hormonoterapii WP: Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Eugia Pharma (Malta) Ltd.</p>																						
<p><b>Letrox® 50:</b> tabl. 50 µg - 50 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>7,14</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>6,15</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	7,14	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	6,15	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>55,81</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>55,81</td></tr> <tr><td>B<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	55,81	Limit	55,81	B <sup>(1)</sup>	bezpł.	S <sup>(2)</sup>	bezpł.		
100%	7,14																							
Limit	0,00																							
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																							
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																							
R <sup>(3)</sup>	6,15																							
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																							
100%	55,81																							
Limit	55,81																							
B <sup>(1)</sup>	bezpł.																							
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																							
<p>INN: <b>Levothyroxine sodium</b>   ATC: H03AA01   wyk: B   EAN ~ 374014 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Niedoczynnność tarczycy(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Althyxin® [4,24], Eferox [4,53], <b>Letrox® 50 [7,14]</b>, Euthyrox® N 50 [7,66]</p>		<p>INN: <b>Letrozole</b>   ATC: L02BG04   wyk: A   EAN ~ 079468 (1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii WP: Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Bluefish Pharmaceuticals</p> <p>Odpowiedniki: Letrozole Bluefish [55,81], Letrozole Aurovitas [56,61], Aromek™ [56,72], Lametta® [56,72], Clazrole [61,54], Etruzil [61,54]</p>																						



Naszym wyborem

**enarenal**  
 enalapryli maleas

<b>Leukeran®:</b> tabl. powł. 2 mg - 25 szt.	Rx	100%	81,28
		Limit	90,99
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Chlorambucil* ATC: L01AA02 wyk: A EAN ~ 345618  
 (1) Nowotwory złośliwe(2) Chemioterapia ICD10: C.8.(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Aspen Pharma Trading Limited

<b>Leuprostin:</b> implant 3,6 mg - 1 szt. ◆	Rx	100%	219,11
		Limit	188,52
		R <sup>(3)</sup>	33,79
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Leuprorelin acetate* ATC: L02AE02 wyk: B EAN ~ 836246  
 (1) Rak prostaty WP: Obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: N  
 Regiomedica GmbH

<b>Leuprostin:</b> implant 5 mg - 1 szt. ◆	Rx	100%	575,22
		Limit	565,55
		R <sup>(3)</sup>	19,27
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Leuprorelin acetate* ATC: L02AE02 wyk: B EAN ~ 836277  
 (1) Rak prostaty WP: Obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: N  
 Regiomedica GmbH

<b>Levebon:</b> tabl. powł. 500 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	31,07
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	9,90
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Levetiracetam* ATC: N03AX14 wyk: B EAN ~ 989379  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam Aurovitas [27,30], Polkepral [27,47], Levetiracetam Accord [27,48], Normeg [30,42], Levebon [31,07], Cezarius [32,26], Levetiracetam NeuroPharma [32,26], Trund [32,26], Vetrira [38,47], Kepra® [94,41]

<b>Levebon:</b> tabl. powł. 1000 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	58,70
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	13,52
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Levetiracetam* ATC: N03AX14 wyk: B EAN ~ 989805  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam Aurovitas [51,15], Levetiracetam Accord [51,52], Polkepral [51,52], Normeg [57,40], Levebon [58,70], Cezarius [61,07], Levetiracetam NeuroPharma [61,07], Trund [61,07], Vetrira [73,46]

<b>Levemir® Penfill®:</b> inj. [roztw.] 100 j/ml - 5 wkł. 3 ml ◆	Rx	100%	207,19
		Limit	154,96
		30% <sup>(1)</sup>	98,72
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Insulin detemir* ATC: A10AE05 wyk: B EAN ~ 005741  
 (1) Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 m-cy i z HbA1c  $\geq 8\%$  oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 m-cy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO). Cukrzyca typu 1 u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i powyżej(2) Kobiety w ciąży(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: A  
 Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

<b>Levetiracetam Accord:</b> roztw. doust. 100 mg/ml - 1 but. 300 ml+ 1 strzyk. 10 ml ◆	Rx	100%	73,45
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Levetiracetam* ATC: N03AX14 wyk: B EAN ~ 137450  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

<b>Levetiracetam Accord:</b> tabl. powł. 250 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	14,46
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	5,47
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Levetiracetam* ATC: N03AX14 wyk: B EAN ~ 921492  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam NeuroPharma [X], Levetiracetam Aurovitas [14,36], Polkepral [14,46], Levetiracetam Accord [14,46], Normeg [15,94], Trund [16,85], Cezarius [19,72], Vetrira [19,95], Kepra® [47,97]

<b>Levetiracetam Accord:</b> tabl. powł. 250 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	27,46
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	6,29
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Levetiracetam* ATC: N03AX14 wyk: B EAN ~ 921522  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam NeuroPharma [X], Levetiracetam Accord [27,46], Kepra® [94,41]

<b>Levetiracetam Accord:</b> tabl. powł. 500 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	27,48
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	6,31
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Levetiracetam* ATC: N03AX14 wyk: B EAN ~ 921577  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam Aurovitas [27,30], Polkepral [27,47], Levetiracetam Accord [27,48], Normeg [30,42], Levebon [31,07], Cezarius [32,26], Levetiracetam NeuroPharma [32,26], Trund [32,26], Vetrira [38,47], Kepra® [94,41]

<b>Levetiracetam Accord:</b> tabl. powł. 500 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	51,52
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	6,34
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Levetiracetam* ATC: N03AX14 wyk: B EAN ~ 921591  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Normeg [51,15], Polkepral [51,52], Levetiracetam Accord [51,52], Levetiracetam NeuroPharma [61,07], Trund [61,07], Kepra® [186,26]

<b>Levetiracetam Accord:</b> tabl. powł. 750 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	39,53
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	6,17
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Levetiracetam* ATC: N03AX14 wyk: B EAN ~ 921652  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam Aurovitas [39,27], Polkepral [39,53], Levetiracetam Accord [39,53], Normeg [43,96], Levetiracetam NeuroPharma [46,71], Trund [46,71], Cezarius [55,30], Vetrira [56,01], Kepra® [140,37]

<b>Levetiracetam Accord:</b> tabl. powł. 750 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	74,57
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	6,78
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Levetiracetam* ATC: N03AX14 wyk: B EAN ~ 921676  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Normeg [74,05], Levetiracetam Accord [74,57], Levetiracetam NeuroPharma [88,92], Kepra® [277,10]

<b>Levetiracetam Accord: tabl. powł. 1000 mg - 50 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>51,52</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>6,34</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	51,52	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	6,34	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Levetiracetam NeuroPharma: roztw. doust. 100 mg/ml - 1 but. 300 ml ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>71,16</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	71,16	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	3,20	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	51,52																										
Limit	0,00																										
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	6,34																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
100%	71,16																										
Limit	0,00																										
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	3,20																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
INN: <i>Levetiracetam</i>   ATC: N03AX14   wyk: B   EAN ~ 921737 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.		INN: <i>Levetiracetam</i>   ATC: N03AX14   wyk: B   EAN ~ 958672 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Neuroxpharm Arzneimittel GmbH																									
Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam Aurovitas [51,15], Polkepral [51,52], Levetiracetam Accord [51,52], Normeg [57,40], Levebon [58,70], Cezarius [61,07], Levetiracetam NeuroPharma [61,07], Trund [61,07], Vetira [73,46]		Odpowiedniki: Trund [X], Levetiracetam NeuroPharma [71,16], Cezarius [74,42], Vetira [74,42], Keppra® [108,89]																									
<b>Levetiracetam Accord: tabl. powł. 1000 mg - 100 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>97,49</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>7,11</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	97,49	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	7,11	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Levetiracetam NeuroPharma: tabl. powł. 500 mg - 50 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>32,26</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>11,09</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	32,26	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	11,09	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	97,49																										
Limit	0,00																										
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	7,11																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
100%	32,26																										
Limit	0,00																										
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	11,09																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
INN: <i>Levetiracetam</i>   ATC: N03AX14   wyk: B   EAN ~ 921751 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.		INN: <i>Levetiracetam</i>   ATC: N03AX14   wyk: B   EAN ~ 958986 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Neuroxpharm Arzneimittel GmbH																									
Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Normeg [96,75], Polkepral [97,49], Levetiracetam Accord [97,49], Trund [115,82], Levetiracetam NeuroPharma [116,58]		Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam Aurovitas [27,30], Polkepral [27,47], Levetiracetam Accord [27,48], Normeg [30,42], Levebon [31,07], Cezarius [32,26], Trund [32,26], Levetiracetam NeuroPharma [32,26], Vetira [38,47], Keppra® [94,41]																									
<b>Levetiracetam Aurovitas: tabl. powł. 250 mg - 50 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>14,36</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>5,37</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	14,36	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	5,37	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Levetiracetam NeuroPharma: tabl. powł. 500 mg - 100 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>61,07</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>15,89</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	61,07	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	15,89	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	14,36																										
Limit	0,00																										
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	5,37																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
100%	61,07																										
Limit	0,00																										
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	15,89																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
INN: <i>Levetiracetam</i>   ATC: N03AX14   wyk: B   EAN ~ 097095 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.		INN: <i>Levetiracetam</i>   ATC: N03AX14   wyk: B   EAN ~ 959037 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Neuroxpharm Arzneimittel GmbH																									
Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam NeuroPharma [X], Levetiracetam Aurovitas [14,36], Levetiracetam Accord [14,46], Polkepral [14,46], Normeg [15,94], Trund [16,85], Cezarius [19,72], Vetira [19,95], Keppra® [47,97]		Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Normeg [51,15], Levetiracetam Accord [51,52], Polkepral [51,52], Trund [61,07], Levetiracetam NeuroPharma [61,07], Keppra® [186,26]																									
<b>Levetiracetam Aurovitas: tabl. powł. 500 mg - 50 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>27,30</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>6,13</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	27,30	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	6,13	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Levetiracetam NeuroPharma: tabl. powł. 750 mg - 50 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>46,71</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>13,35</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	46,71	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	13,35	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	27,30																										
Limit	0,00																										
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	6,13																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
100%	46,71																										
Limit	0,00																										
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	13,35																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
INN: <i>Levetiracetam</i>   ATC: N03AX14   wyk: B   EAN ~ 097106 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.		INN: <i>Levetiracetam</i>   ATC: N03AX14   wyk: B   EAN ~ 958856 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Neuroxpharm Arzneimittel GmbH																									
Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam Aurovitas [27,30], Polkepral [27,47], Levetiracetam Accord [27,48], Normeg [30,42], Levebon [31,07], Cezarius [32,26], Levetiracetam NeuroPharma [32,26], Trund [32,26], Vetira [38,47], Keppra® [94,41]		Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Normeg [51,15], Levetiracetam Accord [51,52], Polkepral [51,52], Trund [61,07], Levetiracetam NeuroPharma [61,07], Keppra® [140,37]																									
<b>Levetiracetam Aurovitas: tabl. powł. 750 mg - 50 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>39,27</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>5,91</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	39,27	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	5,91	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Levetiracetam NeuroPharma: tabl. powł. 750 mg - 100 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>88,92</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>21,13</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	88,92	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	21,13	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	39,27																										
Limit	0,00																										
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	5,91																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
100%	88,92																										
Limit	0,00																										
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	21,13																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
INN: <i>Levetiracetam</i>   ATC: N03AX14   wyk: B   EAN ~ 097118 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.		INN: <i>Levetiracetam</i>   ATC: N03AX14   wyk: B   EAN ~ 958894 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Neuroxpharm Arzneimittel GmbH																									
Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam Aurovitas [39,27], Levetiracetam Accord [39,53], Polkepral [39,53], Normeg [43,96], Levetiracetam NeuroPharma [46,71], Trund [46,71], Cezarius [55,30], Vetira [56,01], Keppra® [140,37]		Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Normeg [74,05], Levetiracetam Accord [74,57], Levetiracetam NeuroPharma [88,92], Keppra® [277,10]																									
<b>Levetiracetam Aurovitas: tabl. powł. 1000 mg - 50 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>51,15</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>5,97</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	51,15	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	5,97	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Levetiracetam NeuroPharma: tabl. powł. 1000 mg - 50 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>61,07</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>15,89</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	61,07	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	15,89	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	51,15																										
Limit	0,00																										
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	5,97																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
100%	61,07																										
Limit	0,00																										
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	15,89																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
INN: <i>Levetiracetam</i>   ATC: N03AX14   wyk: B   EAN ~ 097130 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.		INN: <i>Levetiracetam</i>   ATC: N03AX14   wyk: B   EAN ~ 959129 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Neuroxpharm Arzneimittel GmbH																									
Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam Aurovitas [51,15], Levetiracetam Accord [51,52], Polkepral [51,52], Normeg [57,40], Levebon [58,70], Cezarius [61,07], Levetiracetam NeuroPharma [61,07], Trund [61,07], Vetira [73,46]		Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam Aurovitas [51,15], Levetiracetam Accord [51,52], Polkepral [51,52], Normeg [57,40], Levebon [58,70], Cezarius [61,07], Trund [61,07], Levetiracetam NeuroPharma [61,07], Vetira [73,46]																									



<b>Levetiracetam NeuroPharma:</b> tabl. powł. <b>1000 mg</b> - 100 szt. ◆	Rx	100% <b>116,58</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>26,20</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Levetiracetam</b>   ATC: <b>N03AX14</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>959167</b> (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Neuropharm Arzneimittel GmbH		
Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Normeg [96,75], Levetiracetam Accord [97,49], Polkepral [97,49], Trund [115,82], Levetiracetam NeuroPharma [116,58]		
<b>Levomine:</b> tabl. powł. <b>0,03 mg+ 0,15 mg</b> - 63 szt.	Rx	100% <b>22,24</b> Limit <b>22,24</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>6,67</b>
INN: <b>Ethinylestradiol + Levonorgestrel</b>   ATC: <b>G03AA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>879465</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach   Kat. ciąży: <b>X</b> Sun-Farm Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Levomine [22,24], Microgynon® 21 [22,81]		
<b>Librexa:</b> implant <b>11,25 mg</b> - 1 amp.-stryk. ◆	Rx	100% <b>552,44</b> Limit <b>552,44</b> R <sup>(1)</sup> <b>9,60</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Leuprorelin acetate</b>   ATC: <b>L02AE02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>053658</b> (1) Rak prostaty WP: Obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>N</b> Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Leuprorelin acetate [552,44]		
<b>Lipancra® 16 000:</b> kaps. <b>16 000 j. Ph. Eur.</b> - 60 szt.	Rx	100% <b>48,38</b> Limit <b>48,38</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>14,51</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Pancreatin</b>   ATC: <b>A09AA02</b>   wyk: <b>EAN</b> ~ <b>723164</b> (1) Stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka lub zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową(2) Mukowiscydoza, Stan po resekcji trzustki(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Polfa Warszawa SA		
Odpowiedniki: Pancreatin [48,38]		
<b>Lipantor®:</b> kaps. <b>100 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>24,66</b> Limit <b>19,00</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>11,36</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Ciprofibrate</b>   ATC: <b>C10AB08</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>376612</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:C, T3:D</b> Sanofi Winthrop Industrie		
Odpowiedniki: Ciprofibrate [24,66]		
<b>Lipanthyl® 200M:</b> kaps. <b>200 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>23,84</b> Limit <b>19,00</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>10,54</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Fenofibrate</b>   ATC: <b>C10AB05</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>687947</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Mylan Healthcare Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Grofibrat® 200 [19,68], Biofibrat® [21,15], Lipanthyl® 200M [23,84]		
<b>Lipanthyl® 267M:</b> kaps. <b>267 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>32,02</b> Limit <b>25,36</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>14,27</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Fenofibrate</b>   ATC: <b>C10AB05</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>492817</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Mylan Healthcare Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Grofibrat® M [26,60], Biofibrat® [27,77], Fenardin® [27,96], Lipanthyl® 267M [32,02]		
<b>Lipanthyl® Supra 160:</b> tabl. powł. <b>160 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>24,41</b> Limit <b>19,00</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>11,11</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Fenofibrate</b>   ATC: <b>C10AB05</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>903917</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Mylan Healthcare Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Grofibrat® S [19,34], Fenardin® [21,43], Lipanthyl® Supra 160 [24,41]		
<b>Lipanthyl® Supra 215:</b> tabl. powł. <b>215 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>32,12</b> Limit <b>25,36</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>14,37</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Fenofibrate</b>   ATC: <b>C10AB05</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>431342</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Mylan Healthcare Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Grofibrat® S [25,36], Lipanthyl® Supra 215 [32,12]		

<b>LIPEGIS:</b> tabl. <b>10 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>23,34</b> Limit <b>14,23</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>13,38</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Ezetimibe</b>   ATC: <b>C10AX09</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>996902</b> (1) Leczenie uzupełniające w trakcie leczenia statyną lub łączone jednocześnie ze statyną albo leczenie w przypadku stwierdzenia nietolerancji co najmniej 2 statyn – jednej w najmniejszej początkowej dawce na dobę i drugiej w dowolnej dostępnej dawce przez okres leczenia nie krótszy niż 3 miesiące, w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego lub kolejnego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako co najmniej duże, wraz z działaniami mającymi na celu redukcję innych czynników ryzyka(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Egis Polska Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Ezoleta [14,23], LIPEGIS [23,34], Esetin [23,39]		
<b>Liprolog:</b> inj. [roztw.] <b>100 j.m./ml</b> - 10 wkł. 3 ml	Rx	100% <b>197,94</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>8,00</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Insulin lispro</b>   ATC: <b>A10AB04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>005536</b> (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Cukrzyca(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>A</b> Eli Lilly Polska Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Insulin lispro [197,94]		
<b>Liprolog Junior KwikPen:</b> inj. [roztw.] <b>100 j.m./ml</b> - 5 wstrzyk. 3 ml	Rx	100% <b>102,99</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>6,21</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Insulin lispro</b>   ATC: <b>A10AB04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>797312</b> (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Cukrzyca(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>A</b> Eli Lilly Polska Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Insulin lispro [102,99]		
<b>Liprolog KwikPen:</b> inj. [roztw.] <b>200 j.m./ml</b> - 5 wstrzyk. 3 ml	Rx	100% <b>197,94</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>8,00</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Insulin lispro</b>   ATC: <b>A10AC04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>549016</b> (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Cukrzyca(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>A</b> Eli Lilly Polska Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Insulin lispro [197,94]		
<b>Liprox®:</b> tabl. <b>20 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>14,64</b> Limit <b>3,50</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>12,19</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Lovastatin</b>   ATC: <b>C10AA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>842315</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczykowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Biofarm Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Liprox® [14,64], Lovasterol [15,04], Lovastin® [17,91]		
<b>Lirra:</b> roztw. doust. <b>0,5 mg/ml</b> - 1 but. 200 ml ◆	Rx	100% <b>22,82</b> Limit <b>22,78</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>6,87</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Levocetirizine dihydrochloride</b>   ATC: <b>R06AE09</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>024171</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke'go - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Lirra [22,82], Xyzal® - (IR) [23,04], Contrahist [24,44], Xyzal® [26,00]		
<b>Lirra:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>14,06</b> Limit <b>12,56</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,27</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Levocetirizine dihydrochloride</b>   ATC: <b>R06AE09</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>790807</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke'go - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Lirra [14,06], Nossin [14,09], Zenaro [15,56], Cezera [18,58], Zyx® [19,10], Contrahist [19,45], Xyzal® [31,87]		





Skuteczny przepływ

pentoxifylline  
**polfilin**  
 prolongatum

400 mg x 20 tabl. ♥ 400 mg x 60 tabl.

Lirra: tabl. powł. 5 mg - 56 szt.	Rx	100%	26,86
		Limit	25,12
		30% <sup>(1)</sup>	9,28
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>	ATC: R06AE09	wyk: B	EAN ~ 241133
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Lirra [26,86], Contrahist [27,38], Zyx® [34,18]			
Lirra: tabl. powł. 5 mg - 84 szt.	Rx	100%	38,68
		Limit	37,67
		30% <sup>(1)</sup>	12,31
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>	ATC: R06AE09	wyk: B	EAN ~ 241140
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Lirra [38,68], Zyx® [39,42], Contrahist [39,53]			
LisiHEXAL 5 mg: tabl. 5 mg - 30 szt.	Rx	100%	5,27
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,27
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lisinopril</i>	ATC: C09AA03	wyk: B	EAN ~ 013318
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: LisiHEXAL 5 mg [5,27], Lisinoratio 5 [8,10]			
LisiHEXAL 10 mg: tabl. 10 mg - 30 szt.	Rx	100%	9,64
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,26
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lisinopril</i>	ATC: C09AA03	wyk: B	EAN ~ 013417
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: LisiHEXAL 10 mg [9,64], Lisinoratio 10 [12,11]			
LisiHEXAL 20 - (IR): tabl. 20 mg - 30 szt.	Rx	100%	14,16
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	9,39
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lisinopril</i>	ATC: C09AA03	wyk: B	EAN ~ 365691
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
PharmaVita Sp. z o.o. sp. k.			
Odpowiedniki: Lisinoratio 20 - (IR) [14,04], LisiHEXAL 20 - (IR) [14,10], LisiHEXAL 20 - (IR) [14,16], LisiHEXAL 20 mg [18,73], Lisinoratio 20 [19,88]			
LisiHEXAL 20 - (IR): tabl. 20 mg - 30 szt.	Rx	100%	14,10
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	9,33
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lisinopril</i>	ATC: C09AA03	wyk: B	EAN ~ 357337
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Delfarma Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Lisinoratio 20 - (IR) [14,04], LisiHEXAL 20 - (IR) [14,10], LisiHEXAL 20 - (IR) [14,16], LisiHEXAL 20 mg [18,73], Lisinoratio 20 [19,88]			
LisiHEXAL 20 mg: tabl. 20 mg - 30 szt.	Rx	100%	18,73
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	13,96
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lisinopril</i>	ATC: C09AA03	wyk: B	EAN ~ 013516
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: Lisinoratio 20 - (IR) [14,04], LisiHEXAL 20 - (IR) [14,10], LisiHEXAL 20 - (IR) [14,16], LisiHEXAL 20 mg [18,73], Lisinoratio 20 [19,88]			
Lisinoratio 5: tabl. 5 mg - 30 szt.	Rx	100%	8,10
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	8,10
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lisinopril</i>	ATC: C09AA03	wyk: B	EAN ~ 939718
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Ratiopharm GmbH			
Odpowiedniki: LisiHEXAL 5 mg [5,27], Lisinoratio 5 [8,10]			
Lisinoratio 10: tabl. 10 mg - 30 szt.	Rx	100%	12,11
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	9,73
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lisinopril</i>	ATC: C09AA03	wyk: B	EAN ~ 939817
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Ratiopharm GmbH			
Odpowiedniki: LisiHEXAL 10 mg [9,64], Lisinoratio 10 [12,11]			
Lisinoratio 20: tabl. 20 mg - 30 szt.	Rx	100%	19,88
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	15,11
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lisinopril</i>	ATC: C09AA03	wyk: B	EAN ~ 939916
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Ratiopharm GmbH			
Odpowiedniki: Lisinoratio 20 - (IR) [14,04], LisiHEXAL 20 - (IR) [14,10], LisiHEXAL 20 - (IR) [14,16], LisiHEXAL 20 mg [18,73], Lisinoratio 20 [19,88]			
Lisinoratio 20 - (IR): tabl. 20 mg - 30 szt.	Rx	100%	14,04
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	9,27
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lisinopril</i>	ATC: C09AA03	wyk: B	EAN ~ 939916
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Ratiopharm GmbH			
Odpowiedniki: Lisinoratio 20 - (IR) [14,04], LisiHEXAL 20 - (IR) [14,10], LisiHEXAL 20 - (IR) [14,16], LisiHEXAL 20 mg [18,73], Lisinoratio 20 [19,88]			
Lisinoratio 20 - (IR): tabl. 20 mg - 30 szt.	Rx	100%	14,04
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	9,27
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lisinopril</i>	ATC: C09AA03	wyk: B	EAN ~ 142716
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Inpharm Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Lisinoratio 20 - (IR) [14,04], LisiHEXAL 20 - (IR) [14,10], LisiHEXAL 20 - (IR) [14,16], LisiHEXAL 20 mg [18,73], Lisinoratio 20 [19,88]			
Lisiprolo: tabl. 5 mg - 28 szt.	Rx	100%	8,05
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	8,05
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lisinopril</i>	ATC: C09AA03	wyk: B	EAN ~ 682409
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Ranopril® [5,24], Lisiprolo® [8,05]			
Lisiprolo: tabl. 10 mg - 28 szt.	Rx	100%	12,37
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	10,36
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lisinopril</i>	ATC: C09AA03	wyk: B	EAN ~ 682447
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Ranopril® [9,60], Lisiprolo® [12,37]			
Lisiprolo: tabl. 20 mg - 28 szt.	Rx	100%	20,03
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	15,57
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lisinopril</i>	ATC: C09AA03	wyk: B	EAN ~ 682461
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Ranopril® [17,39], Lisiprolo® [20,03]			
Lisiprolo HCT: tabl. 10/12,5 mg - 30 szt.	Rx	100%	15,09
		Limit	5,58
		R <sup>(2)</sup>	11,44
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
		INN: <i>Lisinopril + Hydrochlorothiazide</i>	ATC: C09BA03
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D			
Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.			

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

<b>Lisiprol® HCT:</b> tabl. 20/25 mg - 28 szt.	Rx	100% 20,94 Limit 10,43 R <sup>(1)</sup> 14,83 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Lisinopril + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09BA03   wyk: B   EAN ~ 167714 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.		
<b>Lisiprol® HCT:</b> tabl. 20/12,5 mg - 30 szt.	Rx	100% 22,29 Limit 11,17 R <sup>(1)</sup> 15,77 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Lisinopril + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09BA03   wyk: B   EAN ~ 708369 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.		
<b>Lithium carbonicum GSK:</b> tabl. 250 mg - 60 szt. ♦	Rx	100% 15,66 Limit 15,66 B <sup>(1)</sup> bezpl. DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Lithium carbonate</i>   ATC: N05AN01   wyk: B   EAN ~ 148714 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D GSK PSC Poland sp. z o.o.		
<b>Lonamo:</b> tabl. powł. 100 mg - 28 szt.	Rx	100% 30,25 Limit 29,23 30% <sup>(1)</sup> 9,79 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Sitagliptin</i>   ATC: A10BH01   wyk: B   EAN ~ 718265 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Egis Polska Sp. z o.o.		
<b>Lonamo:</b> tabl. powł. 100 mg - 56 szt.	Rx	100% 56,91 Limit 56,91 30% <sup>(1)</sup> 17,07 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Sitagliptin</i>   ATC: A10BH01   wyk: B   EAN ~ 718266 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Egis Polska Sp. z o.o.		
<b>Lonamo Duo:</b> tabl. powł. 50 / 1000 mg - 56 szt.	Rx	100% 41,87 Limit 29,23 30% <sup>(1)</sup> 21,41 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Sitagliptin + Metformin hydrochloride</i>   ATC: A10BD07   wyk: B   EAN ~ 718270 (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c $\geq 7\%$ (przez co najmniej 3 miesiące) (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Kat. ciąży: B Egis Polska Sp. z o.o.		
<b>Lonamo Duo:</b> tabl. powł. 50 / 850 mg - 56 szt.	Rx	100% 41,87 Limit 29,23 30% <sup>(1)</sup> 21,41 S <sup>(2)</sup> bezpl.
INN: <i>Sitagliptin + Metformin hydrochloride</i>   ATC: A10BD07   wyk: B   EAN ~ 718269 (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c $\geq 7\%$ (przez co najmniej 3 miesiące) (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Egis Polska Sp. z o.o.		
<b>Loperamid WZF:</b> tabl. 2 mg - 30 szt. ♦	Rx	100% 8,05 Limit 8,05 50% <sup>(1)</sup> 3,63 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Loperamide hydrochloride</i>   ATC: A07DA03   wyk: B   EAN ~ 038220 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Polfa Warszawa SA		
<b>Lophlex:</b> prosz. do przyg. zaw. doust. [smak neutralny] - 30 sasz. 28 g (840 g)	ŚZ	100% 1067,87 Limit 1067,87 R <sup>(1)</sup> 3,20
INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i>   ATC: V06CA   wyk: N   EAN ~ 365676 (1) Fenylketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 8 roku życia   Kat. ciąży: N Nutricia Polska Sp. z o.o.		
<b>Lophlex:</b> prosz. do przyg. zaw. doust. [smak owoców leśnych] - 30 sasz. 28 g (840 g)	ŚZ	100% 1067,87 Limit 1067,87 R <sup>(1)</sup> 3,20
INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i>   ATC: V06CA   wyk: N   EAN ~ 365672 (1) Fenylketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 8 roku życia   Kat. ciąży: N Nutricia Polska Sp. z o.o.		

<b>Lophlex:</b> prosz. do przyg. zaw. doust. [smak pomarańczowy] - 30 sasz. 28 g (840 g)	ŚZ	100% 1067,87 Limit 1067,87 R <sup>(1)</sup> 3,20
INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i>   ATC: V06CA   wyk: N   EAN ~ 365674 (1) Fenylketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 8 roku życia   Kat. ciąży: N Nutricia Polska Sp. z o.o.		
<b>Loratadyna Galena:</b> tabl. 10 mg - 30 szt.	Rx	100% 16,73 Limit 13,46 30% <sup>(1)</sup> 7,31 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Loratadine</i>   ATC: R06AX13   wyk: B   EAN ~ 795420 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 2 r.ż.; reakcja anafaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 2 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Galena"		
<b>Loratadyna Galena:</b> tabl. 10 mg - 60 szt.	Rx	100% 31,77 Limit 26,91 30% <sup>(1)</sup> 12,93 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Loratadine</i>   ATC: R06AX13   wyk: B   EAN ~ 670253 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 2 r.ż.; reakcja anafaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 2 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Galena"		
<b>Loratadyna Galena:</b> tabl. 10 mg - 90 szt.	Rx	100% 46,08 Limit 40,37 30% <sup>(1)</sup> 17,82 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Loratadine</i>   ATC: R06AX13   wyk: B   EAN ~ 670260 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 2 r.ż.; reakcja anafaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 2 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Galena"		
<b>Loratan:</b> kaps. miękkie 10 mg - 30 szt.	Rx	100% 17,08 Limit 13,46 30% <sup>(1)</sup> 7,66 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Loratadine</i>   ATC: R06AX13   wyk: B   EAN ~ 909049 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 2 r.ż.; reakcja anafaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 2 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA		
<b>Loratan:</b> syrop 5 mg/5 ml - 1 but. 125 ml	Rx	100% 16,51 Limit 14,24 30% <sup>(1)</sup> 6,54 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Loratadine</i>   ATC: R06AX13   wyk: B   EAN ~ 839018 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 2 r.ż.; reakcja anafaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 2 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA		
<b>Lorista®:</b> tabl. powł. 50 mg - 28 szt.	Rx	100% 13,79 Limit 10,70 30% <sup>(1)</sup> 6,30 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Losartan potassium</i>   ATC: C09CA01   wyk: B   EAN ~ 818914 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r.ż.; przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.		
<b>Lorista®:</b> tabl. powł. 50 mg - 28 szt.	Rx	100% 13,79 Limit 10,70 30% <sup>(1)</sup> 6,30 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Losartan potassium</i>   ATC: C09CA01   wyk: B   EAN ~ 818914 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r.ż.; przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.		



# ZOLPIC

Daj owcom odpocząć.  
zolidem



<b>Lorista®: tabl. powł. 50 mg - 56 szt.</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>26,91</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>21,40</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>11,93</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	26,91		Limit	21,40		30% <sup>(1)</sup>	11,93		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Losacor®: tabl. 50 mg - 30 szt.</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>15,61</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>11,46</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>7,59</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	15,61		Limit	11,46		30% <sup>(1)</sup>	7,59		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx	100%	26,91																															
	Limit	21,40																															
	30% <sup>(1)</sup>	11,93																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	15,61																															
	Limit	11,46																															
	30% <sup>(1)</sup>	7,59																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
INN: <b>Losartan potassium</b>   ATC: <b>C09CA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>649112</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>	Krka Polska Sp. z o.o.	INN: <b>Losartan potassium</b>   ATC: <b>C09CA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>055110</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>	Biofarm Sp. z o.o.																														
<b>Lorista®: tabl. powł. 50 mg - 84 szt.</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>34,44</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>32,10</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>11,97</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	34,44		Limit	32,10		30% <sup>(1)</sup>	11,97		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Losartan Genoptim: tabl. powł. 50 mg - 28 szt.</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>9,05</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>9,05</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>2,72</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	9,05		Limit	9,05		30% <sup>(1)</sup>	2,72		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx	100%	34,44																															
	Limit	32,10																															
	30% <sup>(1)</sup>	11,97																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	9,05																															
	Limit	9,05																															
	30% <sup>(1)</sup>	2,72																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
INN: <b>Losartan potassium</b>   ATC: <b>C09CA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>649129</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>	Krka Polska Sp. z o.o.	Odpowiedniki: Losartanum 123ratio [X], Presartan [12,26], Lakea® [14,05], Losartan Krka [14,81], Lozap® 50 [15,15], Losacor® [15,61], Xartan® [23,13]																															
<b>Lorista®: tabl. powł. 100 mg - 28 szt.</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>26,61</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>21,40</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>11,63</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	26,61		Limit	21,40		30% <sup>(1)</sup>	11,63		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Losartan Krka: tabl. powł. 50 mg - 30 szt.</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>14,81</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>11,46</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>6,79</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	14,81		Limit	11,46		30% <sup>(1)</sup>	6,79		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx	100%	26,61																															
	Limit	21,40																															
	30% <sup>(1)</sup>	11,63																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	14,81																															
	Limit	11,46																															
	30% <sup>(1)</sup>	6,79																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
INN: <b>Losartan potassium</b>   ATC: <b>C09CA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>638659</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>	Krka Polska Sp. z o.o.	Odpowiedniki: Losartanum 123ratio [X], Presartan [12,26], Lakea® [14,05], Losartan Krka [14,81], Lozap® 50 [15,15], Losacor® [15,61], Xartan® [23,13]																															
<b>Lorista® H: tabl. powł. 50/12,5 mg - 28 szt.</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>13,79</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>10,70</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>6,30</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	13,79		Limit	10,70		30% <sup>(1)</sup>	6,30		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Losartan Krka: tabl. powł. 50 mg - 30 szt.</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>13,98</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>10,70</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>6,49</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	13,98		Limit	10,70		30% <sup>(1)</sup>	6,49		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx	100%	13,79																															
	Limit	10,70																															
	30% <sup>(1)</sup>	6,30																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	13,98																															
	Limit	10,70																															
	30% <sup>(1)</sup>	6,49																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
INN: <b>Losartan potassium + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: <b>C09DA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>337392</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>	Krka Polska Sp. z o.o.	Odpowiedniki: Losartanum 123ratio [X], Presartan [12,26], Lakea® [14,05], Losartan Krka [14,81], Lozap® 50 [15,15], Losacor® [15,61], Xartan® [23,13]																															
<b>Lorista® H: tabl. powł. 50/12,5 mg - 56 szt.</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>26,91</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>21,40</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>11,93</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	26,91		Limit	21,40		30% <sup>(1)</sup>	11,93		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Losartan Krka: tabl. powł. 50 mg - 30 szt.</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>13,98</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>10,70</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>6,49</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	13,98		Limit	10,70		30% <sup>(1)</sup>	6,49		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx	100%	26,91																															
	Limit	21,40																															
	30% <sup>(1)</sup>	11,93																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	13,98																															
	Limit	10,70																															
	30% <sup>(1)</sup>	6,49																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
INN: <b>Losartan potassium + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: <b>C09DA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>686339</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>	Krka Polska Sp. z o.o.	Odpowiedniki: Losartanum 123ratio [X], Presartan [12,26], Lakea® [14,05], Losartan Krka [14,81], Lozap® 50 [15,15], Losacor® [15,61], Xartan® [23,13]																															
<b>Lorista® H: tabl. powł. 50/12,5 mg - 84 szt.</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>39,26</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>32,10</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>16,79</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	39,26		Limit	32,10		30% <sup>(1)</sup>	16,79		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Lotensin®: tabl. powł. 5 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>15,00</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>14,72</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	15,00		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	14,72		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx	100%	39,26																															
	Limit	32,10																															
	30% <sup>(1)</sup>	16,79																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	15,00																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	14,72																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
INN: <b>Losartan potassium + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: <b>C09DA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>686360</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>	Krka Polska Sp. z o.o.	INN: <b>Benazepril hydrochloride</b>   ATC: <b>C09AA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>118816</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b>	Mylan Healthcare Sp. z o.o.																														
<b>Lorista® HD: tabl. powł. 100/25 mg - 28 szt.</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>26,61</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>21,40</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>11,63</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	26,61		Limit	21,40		30% <sup>(1)</sup>	11,63		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Lotensin®: tabl. powł. 10 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>20,61</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>17,64</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	20,61		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	17,64		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx	100%	26,61																															
	Limit	21,40																															
	30% <sup>(1)</sup>	11,63																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	20,61																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	17,64																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
INN: <b>Losartan potassium + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: <b>C09DA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>645565</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>	Krka Polska Sp. z o.o.	Odpowiedniki: Losartanum 123ratio [X], Presartan [12,26], Lakea® [14,05], Losartan Krka [14,81], Lozap® 50 [15,15], Losacor® [15,61], Xartan® [23,13]																															
<b>Lorista® HL: tabl. powł. 100/12,5 mg - 28 szt.</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>26,77</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>21,40</td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>11,79</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	26,77		Limit	21,40		30% <sup>(1)</sup>	11,79		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Lotensin®: tabl. powł. 20 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>30,28</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>24,34</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	30,28		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	24,34		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx	100%	26,77																															
	Limit	21,40																															
	30% <sup>(1)</sup>	11,79																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	30,28																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	24,34																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
INN: <b>Losartan potassium + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: <b>C09DA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>816484</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>	Krka Polska Sp. z o.o.	INN: <b>Benazepril hydrochloride</b>   ATC: <b>C09AA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>119011</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b>	Mylan Healthcare Sp. z o.o.																														

**ADRENALINA WZF**

Adrenalinum

Zawsze pod ręką!

**Refundacja** od lipca 2015  
Poziom odpłatności 50%

ADR-WZF/131/06-2015

Lovasterol: tabl. 20 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	15,04
		Limit	3,50
		30% <sup>(1)</sup>	11,33
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Lovastatin* ATC: C10AA02 wyk: B EAN ~ 042215

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r.ż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Lozap® 50: tabl. powł. 50 mg - 30 szt.	Rx	100%	15,15
		Limit	11,46
		30% <sup>(1)</sup>	7,13
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Losartan potassium* ATC: C09CA01 wyk: B EAN ~ 573905

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r.ż.; przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r.ż.(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
Zentiva PL Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Losartanum 123ratio [X], Presartan [12,26], Lakea® [14,05], Losartan Krka [14,81], Lozap® 50 [15,15], Losacor® [15,61], Xartan® [23,13]

Lozap® HCT: tabl. powł. 50/12,5 mg - 30 szt.	Rx	100%	15,15
		Limit	11,46
		30% <sup>(1)</sup>	7,13
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Losartan potassium + Hydrochlorothiazide* ATC: C09DA01 wyk: B EAN ~ 611980

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
Zentiva PL Sp. z o.o.

Lumigan®: krople do oczu [roztw.] 0,3 mg/ml - 1 op. 3 ml	Rx	100%	39,91
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,67
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Bimatoprost* ATC: S01EE03 wyk: B EAN ~ 008469(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Allergan Sp. o.o.

Luminalum: tabl. 100 mg - 10 szt. ◆	Rx	100%	8,80
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,09
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Phenobarbital* ATC: N03AA02 wyk: B EAN ~ 260614

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA

Odpowiedniki: Luminalum Unia [6,91], Luminalum [8,80]

Luminalum Unia: tabl. 100 mg - 10 szt. ◆	Rx	100%	6,91
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Phenobarbital* ATC: N03AA02 wyk: B EAN ~ 812615

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
Zakłady Farmaceutyczne "UNIA" Spółdzielnia Pracy

Odpowiedniki: Luminalum Unia [6,91], Luminalum [8,80]

Luteina®: tabl. dopochwowa 50 mg - 30 szt.	Rx	100%	33,12
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	13,41
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Progesterone* ATC: G03DA04 wyk: B EAN ~ 569380

(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Profilaktyka i wspomaganie leczenia ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym, w przypadkach innych niż określone w ChPL(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
Adamed Sp. z o.o.

Luteina®: tabl. dopochwowa 100 mg - 30 szt.	Rx	100%	63,45
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	21,75
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Progesterone* ATC: G03DA04 wyk: B EAN ~ 076207

(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Profilaktyka i wspomaganie leczenia ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym, w przypadkach innych niż określone w ChPL(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:B, T2:C, T3:C  
Adamed Sp. z o.o.

Luteina®: tabl. dopochwowa 100 mg - 60 szt.	Rx	100%	122,12
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	39,19
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Progesterone* ATC: G03DA04 wyk: B EAN ~ 103231

(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Profilaktyka i wspomaganie leczenia ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym, w przypadkach innych niż określone w ChPL(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:B, T2:C, T3:C  
Adamed Sp. z o.o.

Luteina®: tabl. dopochwowa 200 mg - 30 szt.	Rx	100%	105,64
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	24,36
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Progesterone* ATC: G03DA04 wyk: B EAN ~ 107623

(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Profilaktyka i wspomaganie leczenia ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym, w przypadkach innych niż określone w ChPL(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:B, T2:C, T3:D  
Adamed Sp. z o.o.

Luteina® 50: tabl. podjęzykowe 50 mg - 30 szt. (blistry)	Rx	100%	16,91
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	12,31
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Progesterone* ATC: G03DA04 wyk: B EAN ~ 400235

(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:B, T2:C, T3:C  
Adamed Sp. z o.o.

Lyrica®: kaps. twarde 75 mg - 14 szt. ◆	Rx	100%	15,46
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,61
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Pregabalin* ATC: N03AX16 wyk: B EAN ~ 009282

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 r.ż.(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
Upjohn EESV

Lyrica®: kaps. twarde 75 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	52,19
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Pregabalin* ATC: N03AX16 wyk: B EAN ~ 009299

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 r.ż.(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
Upjohn EESV

Odpowiedniki: Pregabalin Sandoz [25,88], Preato [31,36], Lyrica® (IR) [52,19], Lyrica® [52,19]

Lyrica®: kaps. twarde 150 mg - 14 szt. ◆	Rx	100%	26,43
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,53
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Pregabalin* ATC: N03AX16 wyk: B EAN ~ 009350

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 r.ż.(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
Upjohn EESV

Lyrica®: kaps. twarde 150 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	103,04
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Pregabalin* ATC: N03AX16 wyk: B EAN ~ 009367

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 r.ż.(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
Upjohn EESV

Odpowiedniki: Pregabalin Sandoz [44,92], Preato [46,81], Lyrica® (IR) [98,78], Lyrica® (IR) [102,90], Lyrica® [103,04]



Naszym wyborem

enarenal

enalaprilii maleas

Lyrica® (IR): kaps. twarde 75 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	52,19	
		Limit	0,00	
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	
		R <sup>(2)</sup>	3,20	
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
INN: Pregabalin		ATC: N03AX16	wyk: B	EAN ~ 600543
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 r. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D				
Delfarma Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Pregabalin Sandoz [25,88], Preato [31,36], Lyrica® [52,19], Lyrica® (IR) [52,19]				
Lyrica® (IR): kaps. twarde 150 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	102,90	
		Limit	0,00	
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	
		R <sup>(2)</sup>	3,20	
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
INN: Pregabalin		ATC: N03AX16	wyk: B	EAN ~ 600550
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 r. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D				
Delfarma Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Pregabalin Sandoz [44,92], Preato [46,81], Lyrica® (IR) [98,78], Lyrica® (IR) [102,90], Lyrica® [103,04]				
Lyrica® (IR): kaps. twarde 150 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	98,78	
		Limit	0,00	
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	
		R <sup>(2)</sup>	3,20	
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
INN: Pregabalin		ATC: N03AX16	wyk: B	EAN ~ 274325
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 r. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D				
Inpharm Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Pregabalin Sandoz [44,92], Preato [46,81], Lyrica® (IR) [98,78], Lyrica® (IR) [102,90], Lyrica® [103,04]				
Macromax: tabl. powł. 500 mg - 3 szt.	Rx	100%	15,22	
		Limit	12,92	
		50% <sup>(1)</sup>	8,76	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
INN: Azithromycin		ATC: J01FA10	wyk: B	EAN ~ 713608
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowicydoza (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B				
Bausch Health				
Odpowiedniki: Nobaxin [10,00], Azithromycin Genoptim [10,85], Azitrox 500 [14,64], AzitroLek - (IR) [15,22], Macromax [15,22], AzitroLek - (IR) [15,80], Azycyna [17,29], Azimycin® [19,31], Azibiot® [19,75], AzitroLek [19,81], Sumamed® [24,39]				
Madopar® 62,5: kaps. 50 mg+ 12,5 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	27,86	
		Limit	20,10	
		R <sup>(1)</sup>	10,96	
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	
INN: Levodopa + Benserazide		ATC: N04BA02	wyk: B	EAN ~ 094912
(1) Choroba i zespół Parkinsona WP: Dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C				
Roche Polska Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Xevoben [21,39], Madopar® 62,5 [27,86]				
Madopar® 62,5: tabl. do przyg. zaw. doust. 50 mg+ 12,5 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	27,86	
		Limit	20,10	
		R <sup>(1)</sup>	10,96	
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	
INN: Levodopa + Benserazide		ATC: N04BA02	wyk: B	EAN ~ 748624
(1) Choroba i zespół Parkinsona WP: Dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C				
Roche Polska Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Xevoben [21,39], Madopar® 62,5 [27,86]				
Madopar® 125: kaps. 100 mg+ 25 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	53,15	
		Limit	40,21	
		R <sup>(1)</sup>	16,14	
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	
INN: Levodopa + Benserazide		ATC: N04BA02	wyk: B	EAN ~ 095018
(1) Choroba i zespół Parkinsona WP: Dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C				
Roche Polska Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Xevoben [40,21], Madopar® HBS [53,15], Madopar® 125 [53,15]				
Madopar® 125: tabl. do przyg. zaw. doust. 100 mg+ 25 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	53,15	
		Limit	40,21	
		R <sup>(1)</sup>	16,14	
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	
INN: Levodopa + Benserazide		ATC: N04BA02	wyk: B	EAN ~ 748723
(1) Choroba i zespół Parkinsona WP: Dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C				
Roche Polska Sp. z o.o.				

Madopar® 250: kaps. 200 mg+ 50 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	97,62	
		Limit	80,42	
		R <sup>(1)</sup>	20,76	
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	
INN: Levodopa + Benserazide		ATC: N04BA02	wyk: B	EAN ~ 095216
(1) Choroba i zespół Parkinsona WP: Dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C				
Roche Polska Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Xevoben [75,87], Madopar® 250 [97,62], Madopar® 250 [97,62]				
Madopar® 250: tabl. 200 mg+ 50 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	97,62	
		Limit	80,42	
		R <sup>(1)</sup>	20,76	
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	
INN: Levodopa + Benserazide		ATC: N04BA02	wyk: B	EAN ~ 095117
(1) Choroba i zespół Parkinsona WP: Dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C				
Roche Polska Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Xevoben [75,87], Madopar® 250 [97,62], Madopar® 250 [97,62]				
Madopar® HBS: kaps. 100 mg+ 25 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	53,15	
		Limit	40,21	
		R <sup>(1)</sup>	16,14	
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	
INN: Levodopa + Benserazide		ATC: N04BA02	wyk: B	EAN ~ 377510
(1) Choroba i zespół Parkinsona WP: Dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C				
Roche Polska Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Xevoben [40,21], Madopar® 125 [53,15], Madopar® HBS [53,15]				
Majamil® prolongatum: tabl. powł. o przedl. uwalnianiu 100 mg - 20 szt.	Rx	100%	10,99	
		Limit	10,22	
		50% <sup>(1)</sup>	5,29	
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	
INN: Diclofenac sodium		ATC: M01AB05	wyk: B	EAN ~ 033614
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:B, T2:B, T3:D				
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA				
Odpowiedniki: Majamil® prolongatum [10,99], Ofifen® SR 100 [16,69]				
Marelim: tabl. 180 mg - 120 szt.	Rx	100%	117,55	
		Limit	0,00	
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	
		R <sup>(2)</sup>	25,93	
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
INN: Mycophenolic acid		ATC: L04AA06	wyk: B	EAN ~ 227272
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D				
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Xevoben [21,39], Madopar® 62,5 [27,86]				
Marelim: tabl. 360 mg - 120 szt.	Rx	100%	236,03	
		Limit	0,00	
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	
		R <sup>(2)</sup>	49,58	
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
INN: Mycophenolic acid		ATC: L04AA06	wyk: B	EAN ~ 227319
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D				
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Xevoben [21,39], Madopar® 62,5 [27,86]				
Masultab: tabl. 200 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	58,38	
		Limit	0,00	
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	
		R <sup>(2)</sup>	3,20	
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
INN: Amisulpride		ATC: N05AL05	wyk: B	EAN ~ 201320
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B				
G.L. Pharma GmbH				
Odpowiedniki: Amisan [56,96], Masultab [58,38], Amipryd [59,75], Symamis [59,75], ApoSuprid [59,84], Solian® [60,62]				
Masultab: tabl. 400 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	110,46	
		Limit	0,00	
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	
		R <sup>(2)</sup>	3,20	
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
INN: Amisulpride		ATC: N05AL05	wyk: B	EAN ~ 201321
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B				
G.L. Pharma GmbH				
Odpowiedniki: Solian® - (IR) [110,34], Solian® - (IR) [110,34], Solian® - (IR) [110,46], Masultab [110,46], Amipryd [113,21], Symamis [113,21], ApoSuprid [113,37], Amisan [113,44], Solian® [114,92]				

**Loperamid WZF**  
Loperamidi hydrochloridum

Przerwij niekończące się wizyty

Nowe opakowanie:  
**2 mg x 15 tabl.**

<b>Matrifen®</b> : system transdermalny <b>12 µg/h</b> - 5 szt. (1,38 mg w plastrze) ◊ INN: <i>Fentanyl</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Takeda Pharma Sp. z o.o.	Rx-w	100%	19,78
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	4,14
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
ATC: <b>N02AB03</b>   wyk: <b>N</b>   EAN ~ <b>043163</b>			
<b>Matrifen®</b> : system transdermalny <b>25 µg/h</b> - 5 szt. (2,75 mg w plastrze) ◊ INN: <i>Fentanyl</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Nowotwory złośliwe, Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Takeda Pharma Sp. z o.o.	Rx-w	100%	38,41
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
ATC: <b>N02AB03</b>   wyk: <b>N</b>   EAN ~ <b>043279</b>			
<b>Matrifen®</b> : system transdermalny <b>50 µg/h</b> - 5 szt. (5,5 mg w plastrze) ◊ INN: <i>Fentanyl</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia, Nowotwory złośliwe, Neuralgia popółpaścowa przewlekła (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Takeda Pharma Sp. z o.o.	Rx-w	100%	72,12
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
ATC: <b>N02AB03</b>   wyk: <b>N</b>   EAN ~ <b>043385</b>			
<b>Matrifen®</b> : system transdermalny <b>75 µg/h</b> - 5 szt. (8,25 mg w plastrze) ◊ INN: <i>Fentanyl</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia, Nowotwory złośliwe, Neuralgia popółpaścowa przewlekła (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Takeda Pharma Sp. z o.o.	Rx-w	100%	104,51
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
ATC: <b>N02AB03</b>   wyk: <b>N</b>   EAN ~ <b>043224</b>			
<b>Matrifen®</b> : system transdermalny <b>100 µg/h</b> - 5 szt. (11 mg w plastrze) ◊ INN: <i>Fentanyl</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia, Nowotwory złośliwe, Neuralgia popółpaścowa przewlekła (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Takeda Pharma Sp. z o.o.	Rx-w	100%	136,22
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
ATC: <b>N02AB03</b>   wyk: <b>N</b>   EAN ~ <b>043330</b>			
<b>Maymetsi</b> : tabl. powł. <b>50/850 mg</b> - 56 szt. INN: <i>Sitagliptin + Metformin hydrochloride</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Odpowiedniki: Symetlip [30,73], Melsigletic [30,75], <b>Maymetsi</b> [38,76], Jamesi® [42,67]	Rx	100%	38,76
		Limit	29,23
		30% <sup>(1)</sup>	18,30
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
ATC: <b>A10BD07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>744571</b>			
<b>Maymetsi</b> : tabl. powł. <b>50/1000 mg</b> - 56 szt. INN: <i>Sitagliptin + Metformin hydrochloride</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Odpowiedniki: Symetlip [30,73], Melsigletic [30,75], <b>Maymetsi</b> [38,76], Combodiab [39,85], Eprocliv [43,94], Jamesi® [46,80]	Rx	100%	38,76
		Limit	29,23
		30% <sup>(1)</sup>	18,30
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
ATC: <b>A10BD07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>744557</b>			
<b>Maysiglu</b> : tabl. powł. <b>50 mg</b> - 28 szt. INN: <i>Sitagliptin</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Odpowiedniki: Sitagliptin Adamed [15,96], <b>Maysiglu</b> [19,50], Sitagliptin Bioton [19,61], Sitagliptin SUN [24,19]	Rx	100%	19,50
		Limit	14,62
		30% <sup>(1)</sup>	9,27
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
ATC: <b>A10BH01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>721466</b>			
<b>Maysiglu</b> : tabl. powł. <b>100 mg</b> - 28 szt. INN: <i>Sitagliptin</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Odpowiedniki: Jazeta [29,23], Lonamo [30,25], Symgliclin [30,32], Sigletic [30,34], Sitagliptin Adamed [30,34], Sitagliptin STADA [30,34], Sitagliptin Medical Valley [37,64], <b>Maysiglu</b> [38,21], Sitagliptin Bioton [39,93], Simlerid [43,94], JUZINA® [44,51], Sitagliptin SUN [46,80], Januvia® [80,57]	Rx	100%	38,21
		Limit	29,23
		30% <sup>(1)</sup>	17,75
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
ATC: <b>A10BH01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>972147</b>			

<b>Medikinet® 5 mg</b> : tabl. <b>5 mg</b> - 30 szt. ◊ INN: <i>Methylphenidate hydrochloride</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia   Kat. ciąży: <b>C</b> Medice Germany	Rx-w	100%	14,88
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	4,22
ATC: <b>N06BA04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>652181</b>			
<b>Medikinet® 10 mg</b> : tabl. <b>10 mg</b> - 30 szt. ◊ INN: <i>Methylphenidate hydrochloride</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia   Kat. ciąży: <b>C</b> Medice Germany	Rx-w	100%	27,71
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
ATC: <b>N06BA04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>652198</b>			
<b>Medikinet® 20 mg</b> : tabl. <b>20 mg</b> - 30 szt. ◊ INN: <i>Methylphenidate hydrochloride</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia   Kat. ciąży: <b>C</b> Medice Germany	Rx-w	100%	38,78
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
ATC: <b>N06BA04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>652204</b>			
<b>Medikinet® CR 10 mg</b> : kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde <b>10 mg</b> - 30 szt. ◊ INN: <i>Methylphenidate hydrochloride</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia   Kat. ciąży: <b>C</b> Medice Germany	Rx-w	100%	40,30
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	15,79
ATC: <b>N06BA04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>652235</b>			
<b>Medikinet® CR 20 mg</b> : kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde <b>20 mg</b> - 30 szt. ◊ INN: <i>Methylphenidate hydrochloride</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia   Kat. ciąży: <b>C</b> Medice Germany	Rx-w	100%	77,71
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	25,49
ATC: <b>N06BA04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>652242</b>			
<b>Medikinet® CR 30 mg</b> : kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde <b>30 mg</b> - 30 szt. ◊ INN: <i>Methylphenidate hydrochloride</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia   Kat. ciąży: <b>C</b> Medice Germany	Rx-w	100%	94,13
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	14,20
ATC: <b>N06BA04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>652259</b>			
<b>Medikinet® CR 40 mg</b> : kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde <b>40 mg</b> - 30 szt. ◊ INN: <i>Methylphenidate hydrochloride</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia   Kat. ciąży: <b>C</b> Medice Germany	Rx-w	100%	121,77
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	15,20
ATC: <b>N06BA04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>652266</b>			
<b>Medisorb A</b> : opatrunek leczniczy <b>10x10 cm</b> - 1 szt. INN: <i>Emplastrum alginatum et hydrofibrum</i> (1) Przewlekle owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: <b>N</b> Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna	WM	100%	9,84
		Limit	9,62
		30% <sup>(1)</sup>	3,11
		B <sup>(2)</sup>	0,22
ATC: <b>V20</b>   wyk: <b>E</b>   EAN ~ <b>844714</b>			
<b>Medisorb H</b> : opatrunek leczniczy <b>10x10 cm</b> - 1 szt. INN: <i>Emplastrum hydrocolloidosum</i> (1) Przewlekle owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: <b>N</b> Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna	WM	100%	7,45
		Limit	7,07
		30% <sup>(1)</sup>	2,50
		B <sup>(2)</sup>	0,38
ATC: <b>V20</b>   wyk: <b>E</b>   EAN ~ <b>844721</b>			



Skuteczny przepływ

pentoxifylline  
**polfilin**  
 prolongatum

400 mg x 20 tabl. ♥ 400 mg x 60 tabl.

<b>Medisorb H:</b> opatrunek leczniczy 15x15 cm - 1 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>15,70</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>15,70</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>4,71</td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	15,70	Limit	15,70	30% <sup>(1)</sup>	4,71	B <sup>(2)</sup>	bezpł.	<b>Megalia®:</b> zaw. doust. 40 mg/ml - 1 but. 240 ml	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>139,17</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>139,17</td></tr> <tr><td>R<sup>(1)</sup></td><td>6,40</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	139,17	Limit	139,17	R <sup>(1)</sup>	6,40	S <sup>(2)</sup>	bezpł.								
100%	15,70																										
Limit	15,70																										
30% <sup>(1)</sup>	4,71																										
B <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
100%	139,17																										
Limit	139,17																										
R <sup>(1)</sup>	6,40																										
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
INN: <i>Emplastrum hydrocolloidosum</i>   ATC: V20   wyk: EAN ~ 844745 (1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna Odpowiedniki: Medisorb H [15,70], Granuflex® [15,71], Granuflex® Extra Thin [15,90], Hydrocoll Thin [16,53], Hydrocoll [24,64]		INN: <i>Megestrol acetate</i>   ATC: L02AB01   wyk: B   EAN ~ 054519 (1) Nowotwory złośliwe(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Odpowiedniki: Megace® [139,17], Megalia® [139,17], Cachexan® [144,89] Vipharm SA																									
<b>Medisorb H:</b> opatrunek leczniczy 20x20 cm - 1 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>26,26</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>26,26</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>7,88</td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	26,26	Limit	26,26	30% <sup>(1)</sup>	7,88	B <sup>(2)</sup>	bezpł.	<b>Megastril:</b> zaw. doust. 40 mg/ml - 1 op. 240 ml	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>139,17</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>139,17</td></tr> <tr><td>R<sup>(1)</sup></td><td>6,40</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	139,17	Limit	139,17	R <sup>(1)</sup>	6,40	S <sup>(2)</sup>	bezpł.								
100%	26,26																										
Limit	26,26																										
30% <sup>(1)</sup>	7,88																										
B <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
100%	139,17																										
Limit	139,17																										
R <sup>(1)</sup>	6,40																										
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
INN: <i>Emplastrum hydrocolloidosum</i>   ATC: V20   wyk: EAN ~ 849290 (1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna Odpowiedniki: Medisorb H [26,26], Granuflex® [27,28], Hydrocoll [39,42]		INN: <i>Megestrol acetate</i>   ATC: L02AB01   wyk: B   EAN ~ 895977 (1) Nowotwory złośliwe(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X   Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA																									
<b>Medisorb Silver:</b> opatrunek chłonny ze srebrem [jałowy, samoprzylepny] 10x20 cm - 1 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>29,69</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>29,69</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>8,91</td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	29,69	Limit	29,69	30% <sup>(1)</sup>	8,91	B <sup>(2)</sup>	bezpł.	<b>Mel Forte:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 20 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>10,15</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>10,15</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>5,08</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	10,15	Limit	10,15	50% <sup>(1)</sup>	5,08	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.						
100%	29,69																										
Limit	29,69																										
30% <sup>(1)</sup>	8,91																										
B <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
100%	10,15																										
Limit	10,15																										
50% <sup>(1)</sup>	5,08																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
INN: <i>Emplastrum antimicrobionicum</i>   ATC: V20   wyk: EAN ~ 866860 (1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna		INN: <i>Meloxicam</i>   ATC: M01AC06   wyk: B   EAN ~ 228262 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA Odpowiedniki: Mel Forte [10,15], Troscam [10,22]																									
<b>Medisorb Silver:</b> opatrunek chłonny ze srebrem [jałowy, samoprzylepny] 10x10 cm - 1 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>16,09</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>14,85</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>5,70</td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td>1,24</td></tr> </table>	100%	16,09	Limit	14,85	30% <sup>(1)</sup>	5,70	B <sup>(2)</sup>	1,24	<b>Mel Forte:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 30 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>14,39</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>14,39</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>7,20</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	14,39	Limit	14,39	50% <sup>(1)</sup>	7,20	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.						
100%	16,09																										
Limit	14,85																										
30% <sup>(1)</sup>	5,70																										
B <sup>(2)</sup>	1,24																										
100%	14,39																										
Limit	14,39																										
50% <sup>(1)</sup>	7,20																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
INN: <i>Emplastrum antimicrobionicum</i>   ATC: V20   wyk: EAN ~ 866877 (1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna		INN: <i>Meloxicam</i>   ATC: M01AC06   wyk: B   EAN ~ 228279 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D   Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA																									
<b>Medisorb Silver PAD:</b> opatrunek chłonny ze srebrem, jałowy 10x10 cm - 1 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>16,09</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>14,85</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>5,70</td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td>1,24</td></tr> </table>	100%	16,09	Limit	14,85	30% <sup>(1)</sup>	5,70	B <sup>(2)</sup>	1,24	<b>Melodyn:</b> system transdermalny 35 µg/h - 5 szt. (20 mg w plastrze)	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>56,73</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>54,94</td></tr> <tr><td>B<sup>(1)</sup></td><td>1,79</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>4,99</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	56,73	Limit	54,94	B <sup>(1)</sup>	1,79	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	4,99	S <sup>(4)</sup>	bezpł.				
100%	16,09																										
Limit	14,85																										
30% <sup>(1)</sup>	5,70																										
B <sup>(2)</sup>	1,24																										
100%	56,73																										
Limit	54,94																										
B <sup>(1)</sup>	1,79																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	4,99																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
INN: <i>Emplastrum antimicrobionicum</i>   ATC: V20   wyk: EAN ~ 866891 (1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna		INN: <i>Buprenorphine</i>   ATC: N02AE01   wyk: B   EAN ~ 938056 (1) Nowotwory złośliwe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   G.L. Pharma Poland Sp. z o.o. Odpowiedniki: Melodyn [56,73], Transtec® 35 µg/h [59,19]																									
<b>Medisorb Silver PAD:</b> opatrunek chłonny ze srebrem, jałowy 10x20 cm - 1 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>29,69</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>29,69</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>8,91</td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	29,69	Limit	29,69	30% <sup>(1)</sup>	8,91	B <sup>(2)</sup>	bezpł.	<b>Melodyn:</b> system transdermalny 52,5 µg/h - 5 szt. (30 mg w plastrze)	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>82,41</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>82,41</td></tr> <tr><td>B<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	82,41	Limit	82,41	B <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	3,20	S <sup>(4)</sup>	bezpł.				
100%	29,69																										
Limit	29,69																										
30% <sup>(1)</sup>	8,91																										
B <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
100%	82,41																										
Limit	82,41																										
B <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	3,20																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
INN: <i>Emplastrum antimicrobionicum</i>   ATC: V20   wyk: EAN ~ 866884 (1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna		INN: <i>Buprenorphine</i>   ATC: N02AE01   wyk: B   EAN ~ 938087 (1) Nowotwory złośliwe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   G.L. Pharma Poland Sp. z o.o. Odpowiedniki: Melodyn [82,41], Transtec® 52,5 µg/h [84,97]																									
<b>Medrol®:</b> tabl. 4 mg - 30 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>9,64</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>4,53</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	9,64	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	4,53	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Melodyn:</b> system transdermalny 70 µg/h - 5 szt. (40 mg w plastrze)	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>107,44</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>107,44</td></tr> <tr><td>B<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	107,44	Limit	107,44	B <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	3,20	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	9,64																										
Limit	0,00																										
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	4,53																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
100%	107,44																										
Limit	107,44																										
B <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	3,20																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
INN: <i>Methylprednisolone</i>   ATC: H02AB04   wyk: B   EAN ~ 683123 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Pfizer Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Metylpred® [9,62], Meprelon [9,64], Medrol® [9,64]		INN: <i>Buprenorphine</i>   ATC: N02AE01   wyk: B   EAN ~ 938131 (1) Nowotwory złośliwe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   G.L. Pharma Poland Sp. z o.o. Odpowiedniki: Melodyn [107,44], Transtec® 70 µg/h [110,06]																									
<b>Medrol®:</b> tabl. 16 mg - 50 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>44,02</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>11,38</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	44,02	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	11,38	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Meloxistad®:</b> tabl. 15 mg - 20 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>10,22</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>10,22</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>5,11</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	10,22	Limit	10,22	50% <sup>(1)</sup>	5,11	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
100%	44,02																										
Limit	0,00																										
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(3)</sup>	11,38																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
100%	10,22																										
Limit	10,22																										
50% <sup>(1)</sup>	5,11																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
INN: <i>Methylprednisolone</i>   ATC: H02AB04   wyk: B   EAN ~ 683215 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Pfizer Polska Sp. z o.o.		INN: <i>Meloxicam</i>   ATC: M01AC06   wyk: B   EAN ~ 431168 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:C, T3:D   STADA Poland Sp. z o.o. Odpowiedniki: Remolexam [9,82], Meloxistad® [10,22], Aglan® 15 [11,55], Aspicam [12,87], Movalis® [13,79]																									
<b>Megace®:</b> zaw. doust. 40 mg/ml - 1 but. 240 ml	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>139,17</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>139,17</td></tr> <tr><td>R<sup>(1)</sup></td><td>6,40</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	139,17	Limit	139,17	R <sup>(1)</sup>	6,40	S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<b>Meloxistad®:</b> tabl. 15 mg - 20 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>10,22</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>10,22</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>5,11</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	10,22	Limit	10,22	50% <sup>(1)</sup>	5,11	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.						
100%	139,17																										
Limit	139,17																										
R <sup>(1)</sup>	6,40																										
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
100%	10,22																										
Limit	10,22																										
50% <sup>(1)</sup>	5,11																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
INN: <i>Megestrol acetate</i>   ATC: L02AB01   wyk: B   EAN ~ 437627 (1) Nowotwory złośliwe(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X   Bausch Health Odpowiedniki: Megalia® [139,17], Megace® [139,17], Cachexan® [144,89]																											

## W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

Memorion: tabl. powł. 5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	18,46
		Limit	18,46
		30% <sup>(1)</sup>	5,54
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Donepezil hydrochloride** ATC: N06DA02 wyk: B EAN ~ 139884  
(1) Choroba Alzheimerza WP: Ołpienie z ciałami Lewy'ego; ołpienie w przebiegu choroby Parkinsona  
(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Orion Pharma Poland Sp. o.o.

Odpowiedniki: Apo-Doperil [X], Donecili [X], Donepestan [X], Donepezil Polfarmex [X], Memorion [18,46], Pamigen [19,76], Donepezil Bluefish [19,83], Doneprion [20,33], Donecept [20,64], Donesyn [20,82], Donepex [22,17], Yasnal® [25,41], Cogiton® 5 [25,66]

Memorion: tabl. powł. 10 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	34,02
		Limit	34,02
		30% <sup>(1)</sup>	10,21
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Donepezil hydrochloride** ATC: N06DA02 wyk: B EAN ~ 140356  
(1) Choroba Alzheimerza WP: Ołpienie z ciałami Lewy'ego; ołpienie w przebiegu choroby Parkinsona  
(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Orion Pharma Poland Sp. o.o.

Odpowiedniki: Apo-Doperil [X], Donepestan [X], Donepezil Polfarmex [X], Donepezil Bluefish [32,71], Memorion [34,02], Doneprion [35,27], Donecili [37,35], Donecept - (IR) [37,52], Pamigen [37,54], Donepex [37,57], Donesyn [38,15], Donecept [38,95], Yasnal® [39,29], Cogiton® 10 [43,87]

Menopur®: inj. [prosz.+ rozp.] 600 j.m. - 1 fiol. prosz. + 1 amp.-strzyk. rozp. 1 ml	Rx	100%	698,84
		Limit	612,01
		R <sup>(1)</sup>	90,03

INN: **Menotropins** ATC: G03GA02 wyk: B EAN ~ 812981

(1) Kontrolowana hiperstimulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulootropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli; Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu kłomifenu, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulootropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) - refundacja do 3 cykli; Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH i FSH - refundacja do 3 cykli | Kat. ciąży: X Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.

Menopur®: inj. [prosz.+ rozp.] 1200 j.m. - 1 fiol.+ 2 amp.-strzyk.	Rx	100%	1399,71
		Limit	1223,99
		R <sup>(1)</sup>	178,92

INN: **Menotropins** ATC: G03GA02 wyk: B EAN ~ 812905

(1) Kontrolowana hiperstimulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulootropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli; Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu kłomifenu, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulootropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) - refundacja do 3 cykli; Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH i FSH - refundacja do 3 cykli | Kat. ciąży: X Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.

Mepilex: opatrunek leczniczy 10x21 cm - 1 szt.	WM	100%	28,54
		Limit	23,94
		30% <sup>(1)</sup>	11,78
		B <sup>(2)</sup>	4,60

INN: **Emplastrum microfibricum cellulosae** ATC: V20AA wyk: EAN ~ 504999  
(1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.

Mepilex: opatrunek leczniczy 12,5x12,5 cm - 1 szt.	WM	100%	22,90
		Limit	17,81
		30% <sup>(1)</sup>	10,43
		B <sup>(2)</sup>	5,09

INN: **Emplastrum microfibricum cellulosae** ATC: V20AA wyk: EAN ~ 446459

(1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.  
Odpowiedniki: Mepilex Border Flex [20,26], Mepilex EM [22,90], Mepilex [22,90]

Mepilex: opatrunek leczniczy 17,5x17,5 cm - 1 szt.	WM	100%	41,68
		Limit	34,91
		30% <sup>(1)</sup>	17,24
		B <sup>(2)</sup>	6,77

INN: **Emplastrum microfibricum cellulosae** ATC: V20AA wyk: EAN ~ 505019

(1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.  
Odpowiedniki: Mepilex EM [38,42], Mepilex [41,68]

Mepilex: opatrunek leczniczy 20x50 cm - 1 szt.	WM	100%	125,32
		Limit	113,99
		30% <sup>(1)</sup>	45,53
		B <sup>(2)</sup>	11,33

INN: **Emplastrum microfibricum cellulosae** ATC: V20AA wyk: EAN ~ 306441

(1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.  
Odpowiedniki: Kliniderm® Lite Foam Silicone [113,53], Mepilex [125,32]

Mepilex Ag: opatrunek leczniczy 6x8,5 cm - 1 szt.	WM	100%	9,37
		Limit	7,91
		30% <sup>(1)</sup>	3,83
		B <sup>(2)</sup>	1,46

INN: **Emplastrum antimicrobioticum** ATC: V20AA wyk: EAN ~ 027056

(1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.

Mepilex Ag: opatrunek leczniczy 10x21 cm - 1 szt.	WM	100%	33,63
		Limit	32,58
		30% <sup>(1)</sup>	10,82
		B <sup>(2)</sup>	1,05

INN: **Emplastrum antimicrobioticum** ATC: V20AA wyk: EAN ~ 941374

(1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.

Mepilex Ag: opatrunek leczniczy 12,5x12,5 cm - 1 szt.	WM	100%	26,39
		Limit	24,24
		30% <sup>(1)</sup>	9,42
		B <sup>(2)</sup>	2,15

INN: **Emplastrum antimicrobioticum** ATC: V20AA wyk: EAN ~ 941367

(1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.

Mepilex Ag: opatrunek leczniczy 17,5x17,5 cm - 1 szt.	WM	100%	47,51
		Limit	47,51
		30% <sup>(1)</sup>	14,25
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Emplastrum antimicrobioticum** ATC: V20AA wyk: EAN ~ 941381

(1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.

Mepilex Border Ag: opatrunek leczniczy 12,5x12,5 cm - 1 szt.	WM	100%	36,13
		Limit	24,24
		30% <sup>(1)</sup>	19,16
		B <sup>(2)</sup>	11,89

INN: **Emplastrum collagenosa** ATC: V20AA wyk: EAN ~ 816421

(1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.

Mepilex Border Ag: opatrunek leczniczy 17,5x17,5 cm - 1 szt.	WM	100%	67,55
		Limit	47,51
		30% <sup>(1)</sup>	34,29
		B <sup>(2)</sup>	20,04

INN: **Emplastrum collagenosa** ATC: V20AA wyk: EAN ~ 816483

(1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.

Mepilex Border Flex: opatrunek 12,5x12,5 cm - 1 szt.	WM	100%	20,26
		Limit	20,26
		30% <sup>(1)</sup>	6,08
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Emplastrum microfibricum cellulosae** ATC: V20AA wyk: EAN ~ 185641

(1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.

Mepilex Border Flex: opatrunek 15x15 cm - 1 szt.	WM	100%	28,41
		Limit	28,41
		30% <sup>(1)</sup>	8,52
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Emplastrum microfibricum cellulosae** ATC: V20AA wyk: EAN ~ 185665

(1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Mepilex Border Flex [28,41], Mepilex Border Flex Lite [28,84], Kliniderm Lite Foam Silicone Border [28,85], Kliniderm® Foam Border Silicone [28,85], Kliniderm® Foam Silicone [28,85], Kliniderm® Lite Foam Silicone [28,85], Aquacel® Foam [31,04], Aquacel® Extra [32,46]

Mepilex Border Flex Lite: opatrunek 7,5x7,5 cm - 1 szt.	WM	100%	7,97
		Limit	6,41
		30% <sup>(1)</sup>	3,48
		B <sup>(2)</sup>	1,56

INN: **Emplastrum microfibricum cellulosae** ATC: V20AA wyk: EAN ~ 249459

(1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Kliniderm Lite Foam Silicone Border [7,97], Mepilex Border Flex Lite [7,97]

Mepilex Border Flex Lite: opatrunek 10x10 cm - 1 szt.	WM	100%	13,52
		Limit	11,40
		30% <sup>(1)</sup>	5,54
		B <sup>(2)</sup>	2,12

INN: **Emplastrum microfibricum cellulosae** ATC: V20AA wyk: EAN ~ 249473

(1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.


Odpowiedniki: Kliniderm® Superabsorbent [12,48], UrgoSuperSuperabsorber [12,89], Kliniderm Lite Foam Silicone Border [13,52], Kliniderm® Foam Border Silicone [13,52], Kliniderm® Foam Silicone [13,52], Kliniderm® Lite Foam Silicone [13,52], Mepilex Border Flex Lite [13,52], Aquacel® Foam [14,73], Aquacel® Extra [15,36]





Mesoprol®: kaps. dojelitowe twarde 40 mg - 56 szt.	Rx	100%	33,13
		Limit	33,13
		50% <sup>(1)</sup>	16,57
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Esomeprazole</i>	ATC: A02BC05	wyk: E	EAN ~ 087680
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			
Mesoprol®: kaps. dojelitowe twarde 40 mg - 84 szt.	Rx	100%	48,04
		Limit	48,04
		50% <sup>(1)</sup>	24,02
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Esomeprazole</i>	ATC: A02BC05	wyk: E	EAN ~ 061955
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			
Mestinon: tabl. draż. 60 mg - 150 szt. ◆	Rx	100%	118,56
		Limit	118,56
		30% <sup>(1)</sup>	35,57
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,33
INN: <i>Pyridostigmine bromide</i>	ATC: N07AA02	wyk: B	EAN ~ 014421
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Miastenia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Mylan Healthcare Sp. z o.o.			
Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,15 ml ◆	Rx	100%	248,59
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,84
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Methotrexate</i>	ATC: L01BA01	wyk: A	EAN ~ 791286
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X medac GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce			
Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,45 ml ◆	Rx	100%	719,56
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	11,52
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Methotrexate</i>	ATC: L01BA01	wyk: A	EAN ~ 922765
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X medac GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce			
Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,5 ml ◆	Rx	100%	797,96
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	12,80
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Methotrexate</i>	ATC: L01BA01	wyk: A	EAN ~ 791521
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X medac GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce			
Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,55 ml ◆	Rx	100%	875,59
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	14,08
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Methotrexate</i>	ATC: L01BA01	wyk: A	EAN ~ 922772
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X medac GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce			
Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,35 ml ◆	Rx	100%	562,53
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	8,96
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Methotrexate</i>	ATC: L01BA01	wyk: A	EAN ~ 922758
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X medac GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce			

Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,4 ml ◆	Rx	100%	641,32
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	10,24
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Methotrexate</i>	ATC: L01BA01	wyk: A	EAN ~ 791477
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X medac GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce			
Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,3 ml ◆	Rx	100%	484,21
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,68
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Methotrexate</i>	ATC: L01BA01	wyk: A	EAN ~ 791392
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X medac GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce			
Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,25 ml ◆	Rx	100%	405,51
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,40
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Methotrexate</i>	ATC: L01BA01	wyk: A	EAN ~ 922741
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X medac GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce			
Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,2 ml ◆	Rx	100%	327,13
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,12
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Methotrexate</i>	ATC: L01BA01	wyk: A	EAN ~ 791347
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X medac GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce			
Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,6 ml ◆	Rx	100%	954,00
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	15,36
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Methotrexate</i>	ATC: L01BA01	wyk: A	EAN ~ 928125
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X medac GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce			
Metformax® 500: tabl. 500 mg - 30 szt.	Rx	100%	5,71
		Limit	3,89
		30% <sup>(1)</sup>	2,69
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	4,52
INN: <i>Metformin hydrochloride</i>	ATC: A10BA02	wyk: B	EAN ~ 126316
(1) Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca WP: Zespoły insulinopomocności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Metcrean [4,26], Metformin Bluefish [4,26], Zenofor [4,47], Avamina [4,51], Siofor® 500 [5,11], Formetic [5,13], Metformax® 500 [5,71], Glucophage® 500 mg [5,91], Metfogamma 500 [7,30]			
Metformax® 500: tabl. 500 mg - 60 szt.	Rx	100%	10,54
		Limit	7,79
		30% <sup>(1)</sup>	4,58
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,36
INN: <i>Metformin hydrochloride</i>	ATC: A10BA02	wyk: B	EAN ~ 935253
(1) Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca WP: Zespoły insulinopomocności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Avamina [7,66], Metcrean [7,66], Zenofor [8,07], Siofor® 500 [8,55], Formetic [9,36], Etfom 500 [10,54], Metformax® 500 [10,54]			



Naszym wyborem

**enarenal**  
 enalaprilii maleas

<b>Metformax® 850:</b> tabl. 850 mg - 30 szt.	Rx	100% 7,93 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 4,06 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 450718 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Metfogamma 850 [6,20], Metformin Bluefish [6,37], Metcrean [6,64], Avamina [6,97], Zenofo [6,99], Formetic [7,39], Siofor® 850 [7,40], Metformax® 850 [7,93], Glucophage® 850 mg [8,16]		
<b>Metformax® 850:</b> tabl. 850 mg - 60 szt.	Rx	100% 14,95 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 4,42 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 935260 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Avamina [12,50], Zenofo [13,07], Siofor® 850 [13,88], Formetic [13,93], Glucophage® 850 mg [13,94], Etfom 850 [14,95], Metformax® 850 [14,95]		
<b>Metformax® 850:</b> tabl. 850 mg - 90 szt.	Rx	100% 21,76 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 5,99 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 935277 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Avamina [16,95], Metcrean [17,79], Zenofo [18,91], Siofor® 850 [20,29], Formetic [20,57], Etfom 850 [21,76], Metformax® 850 [21,76]		
<b>Metformax® 1000:</b> tabl. powł. 1000 mg - 30 szt.	Rx	100% 8,67 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 4,08 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 053056 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Metformin Bluefish [7,33], Metfogamma 1000 [7,93], Zenofo [8,07], Avamina [8,36], Siofor® 1000 [8,55], Formetic [8,61], Glucophage® 1000 mg [8,63], Metformax® 1000 [8,67]		
<b>Metformax® 1000:</b> tabl. powł. 1000 mg - 60 szt.	Rx	100% 16,16 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 3,79 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 933181 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Glucophage® 1000 mg [X], Avamina [14,27], Metcrean [14,27], Metformax® 1000 - (IR) [15,07], Zenofo [15,13], Siofor® 1000 [16,16], Metformax® 1000 [16,16], Formetic [16,88], Etfom [17,36]		
<b>Metformax® 1000:</b> tabl. powł. 1000 mg - 90 szt.	Rx	100% 23,63 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 5,07 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 933198 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Avamina [19,69], Zenofo [22,01], Metformax® 1000 - (IR) [22,10], Siofor® 1000 [23,56], Metformax® 1000 [23,63], Formetic [23,95]		
<b>Metformax® 1000:</b> tabl. powł. 1000 mg - 120 szt.	Rx	100% 29,80 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 6,40 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 252069 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Metformax® 1000 - (IR) [28,53], Zenofo [28,53], Metformax® 1000 [29,80], Formetic [30,55], Siofor® 1000 [30,60], Etfom [30,94]		
<b>Metformax® 1000 - (IR):</b> tabl. powł. 1000 mg - 60 szt.	Rx	100% 15,07 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 3,20 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 142582 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Delfarma Sp. z o.o. Odpowiedniki: Glucophage® 1000 mg [X], Avamina [14,27], Metcrean [14,27], Metformax® 1000 - (IR) [15,07], Zenofo [15,13], Metformax® 1000 [16,16], Siofor® 1000 [16,16], Formetic [16,88], Etfom [17,36]		
<b>Metformax® 1000 - (IR):</b> tabl. powł. 1000 mg - 120 szt.	Rx	100% 28,53 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 6,40 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 142584 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Delfarma Sp. z o.o. Odpowiedniki: Zenofo [28,53], Metformax® 1000 - (IR) [28,53], Metformax® 1000 [29,80], Formetic [30,55], Siofor® 1000 [30,60], Etfom [30,94]		
<b>Metformax® Combi:</b> tabl. powł. 50/1000 mg - 60 szt.	Rx	100% 49,90 Limit 31,32 30% <sup>(1)</sup> 27,98 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Stagliptin + Metformin hydrochloride</i> ATC: A10BD07 wyk: B EAN ~ 148326 (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą; cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c $\geq$ 7% (przez co najmniej 3 miesiące)(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: JUZIMETTE® [44,75], Metformax® Combi [49,90]		
<b>Metformax® SR 500:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu 500 mg - 30 szt.	Rx	100% 9,48 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 8,79 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 652112 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Zenofo SR [6,57], Etfom SR [6,76], Metcrean XR [6,86], Siofor® XR 500 mg [7,71], Symformin XR [7,81], Avamina SR [9,31], Glucophage® XR [9,32], Metformax® SR 500 [9,48]		
<b>Metformax® SR 500:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu 500 mg - 60 szt.	Rx	100% 18,58 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 13,99 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 933167 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Diabufor XR [10,85], Ranmet XR [10,85], Zenofo SR [12,29], Etfom SR [12,68], Metcrean XR [12,89], Symformin XR [14,89], Avamina SR [17,25], Metformax® SR 500 [18,58], Glucophage® XR [18,87]		
<b>Metformax® SR 500:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu 500 mg - 90 szt.	Rx	100% 27,69 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 19,21 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 933174 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Metcrean XR [19,14], Avamina SR [22,91], Metformax® SR 500 [27,69]		
<b>Metformax® SR 750:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu 750 mg - 30 szt.	Rx	100% 11,46 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 8,82 S <sup>(3)</sup> bezpl.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: A10BA02 wyk: B EAN ~ 140489 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Zenofo SR [9,43], Etfom SR [9,69], Siofor® XR 750 mg [10,82], Symformin XR [11,26], Metformax® SR 750 [11,46], Avamina SR [13,07], Glucophage® XR [13,67]		

<b>Metformax® SR 750:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>750 mg</b> - 60 szt.	Rx	100%	<b>22,57</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>14,09</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: <b>A10BA02</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>140490</b>			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Diabufor XR [16,01], Ranmet XR [16,01], Zenofor SR [18,27], Etfom SR [18,84], Symformin XR [22,16], <b>Metformax® SR 750 [22,57]</b> , Avamina SR [24,11], Glucophage® XR [28,12]			
<b>Metformax® SR 1000:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>1000 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>14,79</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>10,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: <b>A10BA02</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>140491</b>			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Glucophage® XR [X], Zenofor SR [12,29], Etfom SR [12,68], Siofor® XR 1000 mg [14,27], <b>Metformax® SR 1000 [14,79]</b> , Symformin XR [14,86], Avamina SR [16,50]			
<b>Metformax® SR 1000:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>1000 mg</b> - 60 szt.	Rx	100%	<b>28,92</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>16,55</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: <b>A10BA02</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>140492</b>			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Diabufor XR [21,05], Ranmet XR [21,05], Zenofor SR [24,04], Etfom SR [24,81], <b>Metformax® SR 1000 [28,92]</b> , Symformin XR [29,21], Avamina SR [32,48], Glucophage® XR [37,21]			
<b>Metformax® SR Combi:</b> tabl. o zmodyf. uwalnianiu <b>50/1000 mg</b> - 60 szt.	Rx	100%	<b>68,54</b>
		Limit	<b>31,32</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>41,96</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Sitagliptin + Metformin hydrochloride</i> ATC: <b>A10BD07</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>148865</b>			
(1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c ≥ 7% (przez co najmniej 3 miesiące)(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.			
<b>Metformin Bluefish:</b> tabl. powł. <b>500 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>4,26</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,57</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: <b>A10BA02</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>705474</b>			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Bluefish Pharmaceuticals			
Odpowiedniki: Metcrean [4,26], <b>Metformin Bluefish [4,26]</b> , Zenofor [4,47], Avamina [4,51], Siofor® 500 [5,11], Formetic [5,13], Metformax® 500 [5,71], Glucophage® 500 mg [5,91], Metfogamma 500 [7,30]			
<b>Metformin Bluefish:</b> tabl. powł. <b>850 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>6,37</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: <b>A10BA02</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>705726</b>			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Bluefish Pharmaceuticals			
Odpowiedniki: Metfogamma 850 [6,20], <b>Metformin Bluefish [6,37]</b> , Metcrean [6,64], Avamina [6,97], Zenofor [6,99], Formetic [7,39], Siofor® 850 [7,40], Metformax® 850 [7,93], Glucophage® 850 mg [8,16]			
<b>Metformin Bluefish:</b> tabl. powł. <b>1000 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>7,33</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> ATC: <b>A10BA02</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>705894</b>			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Bluefish Pharmaceuticals			
Odpowiedniki: <b>Metformin Bluefish [7,33]</b> , Metfogamma 1000 [7,93], Zenofor [8,07], Avamina [8,36], Siofor® 1000 [8,55], Formetic [8,61], Glucophage® 1000 mg [8,63], Metformax® 1000 [8,67]			
<b>Methadone Hydrochloride Molteni:</b> syrop <b>1 mg/ml</b> - 1 but. 10 ml	Rx-w	100%	<b>6,19</b>
		Limit	<b>2,29</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>6,19</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Methadone hydrochloride</i> ATC: <b>N02AC, N07BC02</b> wyk: <b>N</b> EAN ~ <b>719013</b>			
(1) Nowotwory złośliwe(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o.			

<b>Methadone Hydrochloride Molteni:</b> syrop <b>1 mg/ml</b> - 1 but. 20 ml	Rx-w	100%	<b>7,12</b>
		Limit	<b>4,58</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>5,74</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Methadone hydrochloride</i> ATC: <b>N02AC, N07BC02</b> wyk: <b>N</b> EAN ~ <b>718917</b>			
(1) Nowotwory złośliwe(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o.			
<b>Methadone Hydrochloride Molteni:</b> syrop <b>1 mg/ml</b> - 1 but. 100 ml	Rx-w	100%	<b>22,88</b>
		Limit	<b>22,88</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Methadone hydrochloride</i> ATC: <b>N02AC, N07BC02</b> wyk: <b>N</b> EAN ~ <b>792016</b>			
(1) Nowotwory złośliwe(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o.			
<b>Methofill:</b> inj. [roztw.] <b>50 mg/ml</b> - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml	Rx	100%	<b>75,04</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Methotrexate</i> ATC: <b>L01BA01</b> wyk: <b>A</b> EAN ~ <b>731079</b>			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.			
<b>Methofill:</b> inj. [roztw.] <b>50 mg/ml</b> - 1 amp.-strzyk. 0,45 ml	Rx	100%	<b>68,05</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Methotrexate</i> ATC: <b>L01BA01</b> wyk: <b>A</b> EAN ~ <b>731062</b>			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.			
<b>Methofill:</b> inj. [roztw.] <b>50 mg/ml</b> - 1 amp.-strzyk. 0,6 ml	Rx	100%	<b>88,98</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Methotrexate</i> ATC: <b>L01BA01</b> wyk: <b>A</b> EAN ~ <b>731116</b>			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.			
<b>Methofill:</b> inj. [roztw.] <b>50 mg/ml</b> - 1 amp.-strzyk. 0,15 ml	Rx	100%	<b>24,87</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>4,86</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Methotrexate</i> ATC: <b>L01BA01</b> wyk: <b>A</b> EAN ~ <b>730881</b>			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.			
<b>Methofill:</b> inj. [roztw.] <b>50 mg/ml</b> - 1 amp.-strzyk. 0,2 ml	Rx	100%	<b>32,39</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>4,64</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Methotrexate</i> ATC: <b>L01BA01</b> wyk: <b>A</b> EAN ~ <b>730911</b>			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.			
<b>Methofill:</b> inj. [roztw.] <b>50 mg/ml</b> - 1 amp.-strzyk. 0,3 ml	Rx	100%	<b>46,92</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,70</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Methotrexate</i> ATC: <b>L01BA01</b> wyk: <b>A</b> EAN ~ <b>730966</b>			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.			
<b>Methofill:</b> inj. [roztw.] <b>50 mg/ml</b> - 1 amp.-strzyk. 0,25 ml	Rx	100%	<b>39,63</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>4,15</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Methotrexate</i> ATC: <b>L01BA01</b> wyk: <b>A</b> EAN ~ <b>730959</b>			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.			



<b>Methofill:</b> inj. [roztw.] <b>50 mg/ml</b> - 1 amp.-strzyk. 0,4 ml ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>61,09</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	61,09	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Methofill:</b> inj. [roztw.] <b>50 mg/ml</b> - 8 amp.-strzyk. 0,4 ml ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>431,86</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>6,83</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	431,86	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	6,83	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	61,09																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	3,20																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	431,86																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	6,83																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Methotrexate</i>   ATC: L01BA01   wyk: A   EAN ~ 731024 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	Accord Healthcare Polska Sp. z o. o.	INN: <i>Methotrexate</i>   ATC: L01BA01   wyk: A   EAN ~ 731048 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	Accord Healthcare Polska Sp. z o. o.																				
<b>Methofill:</b> inj. [roztw.] <b>50 mg/ml</b> - 1 amp.-strzyk. 0,35 ml ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>54,11</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	54,11	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Methofill:</b> inj. [roztw.] <b>50 mg/ml</b> - 8 amp.-strzyk. 0,5 ml ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>536,59</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>8,53</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	536,59	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	8,53	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	54,11																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	3,20																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	536,59																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	8,53																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Methotrexate</i>   ATC: L01BA01   wyk: A   EAN ~ 731000 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	Accord Healthcare Polska Sp. z o. o.	INN: <i>Methotrexate</i>   ATC: L01BA01   wyk: A   EAN ~ 731093 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	Accord Healthcare Polska Sp. z o. o.																				
<b>Methofill:</b> inj. [roztw.] <b>50 mg/ml</b> - 4 amp.-strzyk. 0,6 ml ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>327,13</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>5,12</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	327,13	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	5,12	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Methofill:</b> inj. [roztw.] <b>50 mg/ml</b> - 8 amp.-strzyk. 0,2 ml ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>222,41</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,41</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	222,41	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,41	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	327,13																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	5,12																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	222,41																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	3,41																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Methotrexate</i>   ATC: L01BA01   wyk: A   EAN ~ 731123 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	Accord Healthcare Polska Sp. z o. o.	INN: <i>Methotrexate</i>   ATC: L01BA01   wyk: A   EAN ~ 730935 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	Accord Healthcare Polska Sp. z o. o.																				
<b>Methofill:</b> inj. [roztw.] <b>50 mg/ml</b> - 4 amp.-strzyk. 0,15 ml ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>88,98</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	88,98	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Methofill:</b> inj. [roztw.] <b>50 mg/ml</b> - 8 amp.-strzyk. 0,15 ml ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>169,59</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	169,59	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	88,98																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	3,20																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	169,59																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	3,20																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Methotrexate</i>   ATC: L01BA01   wyk: A   EAN ~ 730898 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	Accord Healthcare Polska Sp. z o. o.	INN: <i>Methotrexate</i>   ATC: L01BA01   wyk: A   EAN ~ 730904 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	Accord Healthcare Polska Sp. z o. o.																				
<b>Methofill:</b> inj. [roztw.] <b>50 mg/ml</b> - 4 amp.-strzyk. 0,5 ml ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>274,77</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>4,27</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	274,77	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	4,27	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Methofill:</b> inj. [roztw.] <b>50 mg/ml</b> - 8 amp.-strzyk. 0,6 ml ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>641,32</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>10,24</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	641,32	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	10,24	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	274,77																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	4,27																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	641,32																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	10,24																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Methotrexate</i>   ATC: L01BA01   wyk: A   EAN ~ 731086 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	Accord Healthcare Polska Sp. z o. o.	INN: <i>Methotrexate</i>   ATC: L01BA01   wyk: A   EAN ~ 731030 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	Accord Healthcare Polska Sp. z o. o.																				
<b>Methofill:</b> inj. [roztw.] <b>50 mg/ml</b> - 4 amp.-strzyk. 0,3 ml ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>169,59</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	169,59	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Methofill:</b> inj. [roztw.] <b>50 mg/ml</b> - 8 amp.-strzyk. 0,3 ml ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>327,13</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>5,12</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	327,13	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	5,12	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	169,59																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	3,20																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	327,13																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	5,12																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Methotrexate</i>   ATC: L01BA01   wyk: A   EAN ~ 730973 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	Accord Healthcare Polska Sp. z o. o.	INN: <i>Methotrexate</i>   ATC: L01BA01   wyk: A   EAN ~ 730980 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	Accord Healthcare Polska Sp. z o. o.																				
<b>Methofill:</b> inj. [roztw.] <b>50 mg/ml</b> - 4 amp.-strzyk. 0,4 ml ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>222,41</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,41</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	222,41	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,41	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Methofill SD:</b> inj. [roztw.] <b>15 mg</b> - 8 wstrzyk. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>354,42</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>5,12</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	354,42	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	5,12	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	222,41																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	3,41																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	354,42																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	5,12																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Methotrexate</i>   ATC: L01BA01   wyk: A   EAN ~ 731031 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	Accord Healthcare Polska Sp. z o. o.	INN: <i>Methotrexate</i>   ATC: L04AX03   wyk: A   EAN ~ 346867 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	Accord Healthcare Polska Sp. z o. o.																				
<b>Methofill:</b> inj. [roztw.] <b>50 mg/ml</b> - 4 amp.-strzyk. 0,2 ml ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>116,17</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	116,17	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Methofill SD:</b> inj. [roztw.] <b>20 mg</b> - 8 wstrzyk. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>396,14</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>6,83</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	396,14	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	6,83	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	116,17																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	3,20																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	396,14																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	6,83																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Methotrexate</i>   ATC: L01BA01   wyk: A   EAN ~ 730928 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	Accord Healthcare Polska Sp. z o. o.	INN: <i>Methotrexate</i>   ATC: L04AX03   wyk: A   EAN ~ 346928 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	Accord Healthcare Polska Sp. z o. o.																				



Skuteczny przepływ

pentoxifylline  
**polfilin**  
 prolongatum

400 mg x 20 tabl. ♥ 400 mg x 60 tabl.

<b>Methofill SD:</b> inj. [roztw.] 25 mg - 8 wstrzyk. ◆	Rx	100% 491,94 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 8,53 S <sup>(4)</sup> bezpl.	<b>Metsigletic:</b> tabl. powl. 50/1000 mg - 56 szt.	Rx	100% 30,75 Limit 29,23 30% <sup>(1)</sup> 8,75 S <sup>(2)</sup> bezpl.		
INN: <i>Methotrexate</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: L04AX03	wyk: A	EAN ~ 346980	INN: <i>Sitagliptin + Metformin hydrochloride</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: A10BD07	wyk: B	EAN ~ 145117
Accord Healthcare Polska Sp. z o. o.				Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			
<b>Methofill SD:</b> inj. [roztw.] 30 mg - 8 wstrzyk. ◆	Rx	100% 587,74 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 10,24 S <sup>(4)</sup> bezpl.	<b>Metypred®:</b> tabl. 4 mg - 30 szt.	Rx	100% 9,62 Limit 0,00 C <sup>(1)</sup> bezpl. DZ <sup>(2)</sup> bezpl. R <sup>(3)</sup> 4,51 S <sup>(4)</sup> bezpl.		
INN: <i>Methotrexate</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: L04AX03	wyk: A	EAN ~ 347048	INN: <i>Methylprednisolone</i> (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: H02AB04	wyk: B	EAN ~ 316519
Accord Healthcare Polska Sp. z o. o.				Orion Pharma Poland Sp. o. o.			
<b>Methotrexat-Ebewe®:</b> inf. [konc. do przyg. roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 50 ml ◆	Lz	100% 400,68 Limit 300,51 B <sup>(1)</sup> bezpl.	<b>Metypred®:</b> tabl. 16 mg - 30 szt.	Rx	100% 33,22 Limit 0,00 C <sup>(1)</sup> bezpl. DZ <sup>(2)</sup> bezpl. R <sup>(3)</sup> 6,83 S <sup>(4)</sup> bezpl.		
INN: <i>Methotrexate</i> (1) Chemioterapia ICD10: C.41.   Kat. ciąży: X	ATC: L01BA01	wyk: A	EAN ~ 333936	INN: <i>Methylprednisolone</i> (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: H02AB04	wyk: B	EAN ~ 316618
EBEWE PHARMA GmbH				Orion Pharma Poland Sp. o. o.			
<b>Metmin:</b> aerozol do nosa 50 µg/dawkę - 1 but. (140 dawek)	Rx	100% 16,50 Limit 15,01 50% <sup>(1)</sup> 9,00 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(4)</sup> bezpl.	<b>Mevalia PKU Motion Red Fruits 10:</b> płyn 10 g/70 ml - 30 sasz. po 70 ml	Ś	100% 540,65 Limit 532,72 R <sup>(1)</sup> 11,13		
INN: <i>Mometasono furoate</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: R01AD09	wyk: B	EAN ~ 141004	INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i> (1) Fenylketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 3 roku życia   Kat. ciąży: N	ATC: V06CA	wyk: B	EAN ~ 021323
Adamed Sp. z o. o.				PKU Maestro			
Odpowiedniki: Pronasal [15,01], Metmin [16,50], Momester [17,41]				Odpowiedniki: Mevalia PKU Motion Tropical 10 [540,65], Mevalia PKU Motion Red Fruits 10 [540,65]			
<b>Metocard®:</b> tabl. 50 mg - 30 szt.	Rx	100% 7,48 Limit 0,00 C <sup>(1)</sup> bezpl. DZ <sup>(2)</sup> bezpl. R <sup>(3)</sup> 5,71 S <sup>(4)</sup> bezpl.	<b>Mevalia PKU Motion Red Fruits 20:</b> płyn 20 g/140 ml - 30 sasz. po 140 ml	Ś	100% 1065,43 Limit 1065,43 R <sup>(1)</sup> 3,20		
INN: <i>Metoprolol tartrate</i> (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ekstrasystolie pochodzenia komorowego u dzieci do 18 rż.(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D	ATC: C07AB02	wyk: B	EAN ~ 034420	INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i> (1) Fenylketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 3 roku życia   Kat. ciąży: N	ATC: V06CA	wyk: B	EAN ~ 021309
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA				PKU Maestro			
Odpowiedniki: Metoprolol Medreg [8,67], Metocard® [10,61]				Odpowiedniki: Mevalia PKU Motion Tropical 20 [1065,43], Mevalia PKU Motion Yellow Fruits 20 [1065,43], Mevalia PKU Motion Red Fruits 20 [1065,43]			
<b>Metocard®:</b> tabl. 100 mg - 30 szt.	Rx	100% 10,61 Limit 0,00 C <sup>(1)</sup> bezpl. DZ <sup>(2)</sup> bezpl. R <sup>(3)</sup> 4,63 S <sup>(4)</sup> bezpl.	<b>Mevalia PKU Motion Tropical 10:</b> płyn 10 g/70 ml - 30 sasz. po 70 ml	Ś	100% 540,65 Limit 532,72 R <sup>(1)</sup> 11,13		
INN: <i>Metoprolol tartrate</i> (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ekstrasystolie pochodzenia komorowego u dzieci do 18 rż.(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D	ATC: C07AB02	wyk: B	EAN ~ 034529	INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i> (1) Fenylketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 3 roku życia   Kat. ciąży: N	ATC: V06CA	wyk: B	EAN ~ 021286
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA				PKU Maestro			
Odpowiedniki: Metoprolol Medreg [8,67], Metocard® [10,61]				Odpowiedniki: Mevalia PKU Motion Red Fruits 10 [540,65], Mevalia PKU Motion Tropical 10 [540,65]			
<b>Metoprolol Medreg:</b> tabl. powl. 100 mg - 30 szt.	Rx	100% 8,67 Limit 0,00 C <sup>(1)</sup> bezpl. DZ <sup>(2)</sup> bezpl. R <sup>(3)</sup> 3,20 S <sup>(4)</sup> bezpl.	<b>Mevalia PKU Motion Tropical 20:</b> płyn 20 g/140 ml - 30 sasz. po 140 ml	Ś	100% 1065,43 Limit 1065,43 R <sup>(1)</sup> 3,20		
INN: <i>Metoprolol tartrate</i> (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ekstrasystolie pochodzenia komorowego u dzieci do 18 rż.(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: C07AB02	wyk: B	EAN ~ 645248	INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i> (1) Fenylketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 3 roku życia   Kat. ciąży: N	ATC: V06CA	wyk: B	EAN ~ 015476
MedReg sro				PKU Maestro			
Odpowiedniki: Metoprolol Medreg [8,67], Metocard® [10,61]				Odpowiedniki: Mevalia PKU Motion Red Fruits 20 [1065,43], Mevalia PKU Motion Yellow Fruits 20 [1065,43], Mevalia PKU Motion Tropical 20 [1065,43]			
<b>Metsigletic:</b> tabl. powl. 50/850 mg - 56 szt.	Rx	100% 30,75 Limit 29,23 30% <sup>(1)</sup> 8,75 S <sup>(2)</sup> bezpl.	<b>Mevalia PKU Motion Yellow Fruits 20:</b> płyn 20 g/140 ml - 30 sasz. po 140 ml	Ś	100% 1065,43 Limit 1065,43 R <sup>(1)</sup> 3,20		
INN: <i>Sitagliptin + Metformin hydrochloride</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: A10BD07	wyk: B	EAN ~ 145104	INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i> (1) Fenylketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 3 roku życia   Kat. ciąży: N	ATC: V06CA	wyk: B	EAN ~ 024331
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA				PKU Maestro			
Odpowiedniki: Symetlip [30,73], Metsigletic [30,75], Maymetsi [38,76], Jamesi® [42,67]				Odpowiedniki: Mevalia PKU Motion Red Fruits 20 [1065,43], Mevalia PKU Motion Tropical 20 [1065,43], Mevalia PKU Motion Yellow Fruits 20 [1065,43]			
<b>Mextra Superabsorbent:</b> opatrunek specjalistyczny 10x10 cm - 1 szt.	WM	100% 13,02 Limit 11,85 30% <sup>(1)</sup> 4,73 B <sup>(2)</sup> 1,17	<b>Mextra Superabsorbent:</b> opatrunek specjalistyczny 12,5x17,5 cm - 1 szt.	WM	100% 26,05 Limit 25,92 30% <sup>(1)</sup> 7,91		
INN: <i>Emplastrum microfibricum cellulosa</i> (1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N	ATC: V20AA	wyk: B	EAN ~ 179527	INN: <i>Emplastrum microfibricum cellulosa</i> (1) Przewlekłe owrzodzenia   Kat. ciąży: N	ATC: V20AA	wyk: B	EAN ~ 179428
Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o. o.				Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o. o.			

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

**Mextra Superabsorbent:** opatrunek specjalistyczny 17,5x22,5 cm - 1 szt.

WM	100%	38,96
	Limit	38,96
	30% <sup>(1)</sup>	11,69

INN: *Emplastrum microfibricum cellulosae* | ATC: V20AA | wyk: B | EAN ~ 179442  
(1) Przewlekłe owrzodzenia | Kat. ciąży: N | Mólnyckie Health Care Polska Sp. z o.o.

**Miansec:** tabl. powł. 10 mg - 30 szt. ◆

Rx	100%	9,73
	Limit	9,73
	30% <sup>(1)</sup>	2,92
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Mianserin* | ATC: N06AX03 | wyk: B | EAN ~ 796618  
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Odpowiedniki: Miansegen [9,73], Miansec [9,73], Deprexole<sup>®</sup> [9,81], Lerivon<sup>®</sup> [10,39]

**Miansec:** tabl. powł. 10 mg - 90 szt. ◆

Rx	100%	26,76
	Limit	26,76
	30% <sup>(1)</sup>	8,03
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Mianserin* | ATC: N06AX03 | wyk: B | EAN ~ 796625  
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Odpowiedniki: Miansegen [25,95], Miansec [26,76], Deprexole<sup>®</sup> [27,07]

**Miansec 30:** tabl. powł. 30 mg - 20 szt. ◆

Rx	100%	18,94
	Limit	18,94
	30% <sup>(1)</sup>	5,68
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Mianserin* | ATC: N06AX03 | wyk: B | EAN ~ 124311  
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Odpowiedniki: Miansegen [17,81], Miansec 30 [18,94]

**Miansec 30:** tabl. powł. 30 mg - 30 szt. ◆

Rx	100%	27,62
	Limit	27,62
	30% <sup>(1)</sup>	8,29
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Mianserin* | ATC: N06AX03 | wyk: B | EAN ~ 494965  
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Odpowiedniki: Miansegen [26,80], Miansec 30 [27,62], Lerivon<sup>®</sup> [28,77], Deprexole<sup>®</sup> [29,22]

**Miansegen:** tabl. powł. 10 mg - 30 szt. ◆

Rx	100%	9,73
	Limit	9,73
	30% <sup>(1)</sup>	2,92
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Mianserin* | ATC: N06AX03 | wyk: B | EAN ~ 883813  
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Mylan Ireland Limited

Odpowiedniki: Miansec [9,73], Miansegen [9,73], Deprexole<sup>®</sup> [9,81], Lerivon<sup>®</sup> [10,39]

**Miansegen:** tabl. powł. 30 mg - 30 szt. ◆

Rx	100%	26,80
	Limit	26,80
	30% <sup>(1)</sup>	8,04
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Mianserin* | ATC: N06AX03 | wyk: B | EAN ~ 764242  
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Mylan Ireland Limited

Odpowiedniki: Miansegen [26,80], Miansec 30 [27,62], Lerivon<sup>®</sup> [28,77], Deprexole<sup>®</sup> [29,22]

**Miansegen:** tabl. powł. 60 mg - 30 szt. ◆

Rx	100%	49,46
	Limit	49,46
	30% <sup>(1)</sup>	14,84
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Mianserin* | ATC: N06AX03 | wyk: B | EAN ~ 064525  
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Mylan Ireland Limited

Odpowiedniki: Miansegen [49,46], Deprexole<sup>®</sup> [49,75]

**MicardisPlus:** tabl. 80/12,5 mg - 28 szt.

Rx	100%	38,59
	Limit	21,40
	30% <sup>(1)</sup>	23,61
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Telmisartan + Hydrochlorothiazide* | ATC: C09DA07 | wyk: B | EAN ~ 020026  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Toptelmi HCT [23,61], Telmisartan + HCT Genoptim [25,51], Telmix Plus [27,46], Tezeo HCT [29,52], Tolucombi [30,55], Actelsar HCT [31,00], Telmisartan HCT EGIS [31,00], Gisartan [31,12], Znacodar Combi [31,12], Polsart Plus [31,65], Telmizek HCT [33,98], PritorPlus<sup>®</sup> [35,35], MicardisPlus [38,59]

**MicardisPlus:** tabl. 80/25 mg - 28 szt.

Rx	100%	39,36
	Limit	21,40
	30% <sup>(1)</sup>	24,38
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Telmisartan + Hydrochlorothiazide* | ATC: C09DA07 | wyk: B | EAN ~ 653027  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Toptelmi HCT [23,61], Telmisartan + HCT Genoptim [25,51], Telmix Plus [27,46], Tezeo HCT [29,52], Tolucombi [30,55], Actelsar HCT [31,00], Telmisartan HCT EGIS [31,00], Gisartan [31,12], Znacodar Combi [31,12], Polsart Plus [31,65], Telmizek HCT [33,98], PritorPlus<sup>®</sup> [35,35], MicardisPlus [39,36]

**Micardis<sup>®</sup>:** tabl. 80 mg - 28 szt.

Rx	100%	33,56
	Limit	21,40
	30% <sup>(1)</sup>	18,58
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Telmisartan* | ATC: C09CA07 | wyk: B | EAN ~ 440825  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r.: przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.: leczenie renooprotektywne u dzieci do 18 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tolura - (IR) [X], Tolura - (IR) [20,22], Telmisartan EGIS - (IR) [21,31], Tezeo - (IR) [21,34], Telmabax [22,53], Telmisartan Mylan [22,65], Telmisartan Bluefish [22,75], Telmisartan EGIS - (IR) [22,99], Znacodar [24,59], Telmisartan Genoptim [24,76], Pritor<sup>®</sup> [24,98], Toptelmi [25,85], Tezeo [25,97], Telmisartan EGIS [26,19], Actelsar [26,88], Tolura [28,26], Telmix [30,52], Telmizek [32,79], Polsart [33,36], Micardis<sup>®</sup> [33,56]

**Microdacyn<sup>®</sup> 60 Hydrogel:** żel - 1 but. 250 g

WM	100%	77,13
	Limit	77,13
	30% <sup>(1)</sup>	23,14
	B <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Emplastrum hydropolymerosa* | ATC: | wyk: B | EAN ~ 698965  
(1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: | KIKGEL

**Microdacyn<sup>®</sup> 60 Hydrogel:** żel - 1 but. 120 g

WM	100%	48,41
	Limit	37,02
	30% <sup>(1)</sup>	22,50
	B <sup>(2)</sup>	11,39

INN: *Emplastrum hydropolymerosa* | ATC: | wyk: B | EAN ~ 698958  
(1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: | KIKGEL

**Microgynon<sup>®</sup> 21:** tabl. powł. 0,03 mg + 0,15 mg - 63 szt.

Rx	100%	22,81
	Limit	22,81
	30% <sup>(1)</sup>	6,84

INN: *Ethinylestradiol + Levonorgestrel* | ATC: G03AA07 | wyk: B | EAN ~ 060023  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach | Kat. ciąży: X | Bayer Sp. z o.o.

**Milukante:** tabl. do rozgr. i żucia 4 mg - 28 szt.

Rx	100%	15,46
	Limit	9,30
	30% <sup>(1)</sup>	8,06
	C <sup>(2)</sup>	bezpł.
	DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Montelukast* | ATC: R03DC03 | wyk: B | EAN ~ 668144  
(1) Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B | Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Montelukast Bluefish [X], Montelukast Aurovitas [9,18], Romilast [10,31], Orilukast [10,47], Monkasta [13,68], Montelukast Sandoz [13,68], Promonta 4 mg [13,68], Astmodil [15,46], Milukante [15,46]

**Milukante:** tabl. do rozgr. i żucia 5 mg - 28 szt.

Rx	100%	19,27
	Limit	11,63
	30% <sup>(1)</sup>	10,02
	C <sup>(2)</sup>	bezpł.
	DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Montelukast* | ATC: R03DC03 | wyk: B | EAN ~ 668120  
(1) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B | Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Montelukast Bluefish [X], Montelukast Aurovitas [11,27], Romilast [12,62], Orilukast [12,64], Montelukast Sandoz [13,83], Promonta 5 mg [17,15], Monkasta [17,28], Astmodil [18,82], Milukante [19,27]



# ZOLPIC

Daj owcom odpocząć.  
zolpidem



Milukante: tabl. powł. 10 mg - 28 szt.	Rx	100%	29,61
		Limit	23,25
		30% <sup>(1)</sup>	12,01
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Montelukast* | ATC: R03DC03 | wyk: B | EAN ~ 668137  
 (1) Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Adamed Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Montelukast Aurovitas [21,22], Montelukast Medreg [22,45], Montelukast Bluefish [23,07], Asmenol [23,25], Montelukast Sandoz [23,25], Romilast [23,42], Orielukast [25,65], Monkasta [26,01], Promonta 10 mg [26,34], Astmodil [27,02], **Milukante [29,61]**

Milupa PKU 1: granulaty 1233 kJ/100 g - 1 puszka 500 g	Ś	100%	331,82
		Limit	331,82
		R <sup>(1)</sup>	3,20

INN: *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* | ATC: V06CA | wyk: B | EAN ~ 644418  
 (1) Fenylketonuria | Kat. ciąży: N  
 Nutricia Polska Sp. z o.o.

Milupa PKU 1 mix: prosz. 2155 kJ/100 g - 1 puszka 400 g	Ś	100%	140,24
		Limit	140,24
		R <sup>(1)</sup>	3,20

INN: *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* | ATC: V06CA | wyk: B | EAN ~ 595304  
 (1) Fenylketonuria | Kat. ciąży: N  
 Nutricia Polska Sp. z o.o.

Milupa PKU 2-mix: prosz. 1881 kJ/100 g - 1 puszka 400 g	Ś	100%	370,21
		Limit	370,21
		R <sup>(1)</sup>	3,20

INN: *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* | ATC: V06CA | wyk: B | EAN ~ 340287  
 (1) Fenylketonuria | Kat. ciąży: N  
 Nutricia Polska Sp. z o.o.

Milupa PKU 2 Prima: granulaty - 1 puszka 500 g	Ś	100%	395,60
		Limit	395,60
		R <sup>(1)</sup>	3,20

INN: *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* | ATC: V06CA | wyk: B | EAN ~ 644425  
 (1) Fenylketonuria | Kat. ciąży: N  
 Nutricia Polska Sp. z o.o.

Milupa PKU 2 Secunda: granulaty - 1 puszka 500 g	Ś	100%	459,37
		Limit	459,37
		R <sup>(1)</sup>	3,20

INN: *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* | ATC: V06CA | wyk: B | EAN ~ 644432  
 (1) Fenylketonuria | Kat. ciąży: N  
 Nutricia Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Milupa PKU 2 Prima [395,60], Milupa PKU 2 Secunda [459,37], Milupa PKU 3 Advanta [466,85]

Milupa PKU 2 SHAKE: prosz. do przyg. płynu doust. [smak choco] - 10 sasz. 50 g	Ś	100%	298,68
		Limit	298,68
		R <sup>(1)</sup>	3,20

INN: *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* | ATC: V06CA | wyk: B | EAN ~ 599234  
 (1) Fenylketonuria | Kat. ciąży: N  
 Nutricia Polska Sp. z o.o.

Milupa PKU 2 SHAKE: prosz. do przyg. płynu doust. [smak truskawkowy] - 10 sasz. 50 g	Ś	100%	298,68
		Limit	298,68
		R <sup>(1)</sup>	3,20

INN: *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* | ATC: V06CA | wyk: B | EAN ~ 599227  
 (1) Fenylketonuria | Kat. ciąży: N  
 Nutricia Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Milupa PKU 2 SHAKE [298,68], Milupa PKU 2 SHAKE [298,68]

Milupa PKU 3: tabl. powł. - 60 sasz. po 10 szt.	Ś	100%	533,30
		Limit	533,30
		R <sup>(1)</sup>	3,20

INN: *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* | ATC: V06CA | wyk: B | EAN ~ 340331  
 (1) Fenylketonuria | Kat. ciąży: N  
 Nutricia Polska Sp. z o.o.

Milupa PKU 3 Advanta: granulaty - 1 puszka 500 g	Ś	100%	466,85
		Limit	466,85
		R <sup>(1)</sup>	3,20

INN: *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* | ATC: V06CA | wyk: B | EAN ~ 644449  
 (1) Fenylketonuria | Kat. ciąży: N  
 Nutricia Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Milupa PKU 2 Prima [395,60], Milupa PKU 2 Secunda [459,37], Milupa PKU 3 Advanta [466,85]

Milupa PKU 3 Tempora: prosz. do przyg. płynu doust. - 10 sasz. 45 g	Ś	100%	426,94
		Limit	426,94
		R <sup>(1)</sup>	3,20

INN: *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* | ATC: V06CA | wyk: B | EAN ~ 340294  
 (1) Fenylketonuria | Kat. ciąży: N  
 Nutricia Polska Sp. z o.o.

Milurit®: tabl. 100 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	9,02
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Allopurinol* | ATC: M04AA01 | wyk: B | EAN ~ 163212  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 PROTERAPIA Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Dnor [8,64], Argadopin [8,65], Allupol® [8,81], **Milurit® [9,02]**

Milurit®: tabl. 300 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	15,57
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Allopurinol* | ATC: M04AA01 | wyk: B | EAN ~ 414819  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 PROTERAPIA Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Dnor [14,74], Argadopin [14,75], Allupol® [15,46], **Milurit® [15,57]**

Minirin® Melt: liof. doustny 60 µg - 30 szt.	Rx	100%	97,10
		Limit	92,35
		30% <sup>(1)</sup>	32,46
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	7,95
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Desmopressin acetate* | ATC: H01BA02 | wyk: B | EAN ~ 068494  
 (1) Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6 rż. z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego WP: Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rż. z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Moczówka prosta przysadkowa (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.

Minirin® Melt: liof. doustny 120 µg - 30 szt.	Rx	100%	184,69
		Limit	184,69
		30% <sup>(1)</sup>	55,41
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Desmopressin acetate* | ATC: H01BA02 | wyk: B | EAN ~ 068548  
 (1) Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6 rż. z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego WP: Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rż. z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Moczówka prosta przysadkowa (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.

Minirin® Melt: liof. doustny 240 µg - 30 szt.	Rx	100%	370,98
		Limit	369,38
		30% <sup>(1)</sup>	112,41
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	8,00
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Desmopressin acetate* | ATC: H01BA02 | wyk: B | EAN ~ 068579  
 (1) Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6 rż. z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego WP: Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rż. z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Moczówka prosta przysadkowa (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.

Miravil: tabl. powł. 50 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	13,64
		Limit	13,64
		30% <sup>(1)</sup>	4,09
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Sertraline* | ATC: N06AB06 | wyk: B | EAN ~ 804344  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Orion Pharma Poland Sp. o.o.  
 Odpowiedniki: ApoSerta/Sertraline Aurovitas [11,80], Sastium [11,92], Sertralina Krka [12,56], **Miravil [13,64]**, Sertranorm [13,73], Setalof [14,07], Aserin® 50 [15,07], Stimulon® [17,27]

Miravil: tabl. powł. 100 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	25,60
		Limit	25,60
		30% <sup>(1)</sup>	7,68
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Sertraline* | ATC: N06AB06 | wyk: B | EAN ~ 804368  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Orion Pharma Poland Sp. o.o.  
 Odpowiedniki: ApoSerta/Sertraline Aurovitas [21,88], Sastium [22,13], Sertralina Krka [23,49], **Miravil [25,60]**, Sertranorm [25,93], Setalof [28,22], Aserin® 100 [29,41]



<b>Mixtard® 30 Penfill®:</b> inj. [zaw.] 100 j.m./ml - 5 wkł. 3 ml  INN: <i>Insulin isophanic human + Insulin monocomponent</i> (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Cukrzyca(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.	Rx	100%	96,88	<b>Momecutan:</b> maść 1 mg/g - 1 tuba 100 g  INN: <i>Mometasono furoate</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sun-Farm Sp. z o.o.	Rx	100%	33,31
		Limit	0,00			Limit	33,31
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.			50% <sup>(1)</sup>	16,66
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	4,00			S <sup>(3)</sup>	bezpł.
ATC: A10AD01	wyk: B	EAN ~ 238323	ATC: D07AC13	wyk: B	EAN ~ 236199		
<b>Mixtard® 50 Penfill®:</b> inj. [zaw.] 100 j.m./ml - 5 wkł. 3 ml  INN: <i>Insulin isophanic human + Insulin monocomponent</i> (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Cukrzyca(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.	Rx	100%	96,88	<b>Momecutan:</b> maść 1 mg/g - 1 tuba 50 g  INN: <i>Mometasono furoate</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sun-Farm Sp. z o.o.	Rx	100%	20,64
		Limit	0,00			Limit	16,66
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.			50% <sup>(1)</sup>	12,31
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	4,00			S <sup>(3)</sup>	bezpł.
ATC: A10AD01	wyk: B	EAN ~ 348121	ATC: D07AC13	wyk: B	EAN ~ 137441		
<b>Mizetam:</b> tabl. 10/40 mg - 30 szt.  INN: <i>Ezetimibe + Atorvastatine</i> (1) Leczenie wspomagające do stosowania wraz z dietą u pacjentów dorosłych z pierwotną hipercholesterolemią (heterozygotyczną i homozygotyczną rodzinną i nierodzinną) lub mieszaną hiperlipidemią już kontrolowaną za pomocą atorwastatyny i ezetymibu, które są podawane w takich samych dawkach, Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym, tj. jako leczenie substytucyjne u pacjentów z chorobą niedokrwinną serca i ostrym zespołem wieńcowym w wywiadzie, u których uzyskano kontrolę choroby stosując jednocześnie pojedyncze substancje czynne w osobnych produktach leczniczych, ale w takich samych dawkach, jak w produkcie złożonym(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA Odpowiedniki: Atozet [X], Mizetam [25,56]	Rx	100%	25,56	<b>Momecutan:</b> roztw. na skórę 1 mg/g - 1 but. 100 ml  INN: <i>Mometasono furoate</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sun-Farm Sp. z o.o.	Rx	100%	29,90
		Limit	14,23			Limit	29,90
		30% <sup>(1)</sup>	14,04			50% <sup>(1)</sup>	14,95
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
						S <sup>(3)</sup>	bezpł.
ATC: C10BA05	wyk: B	EAN ~ 142152	ATC: D07AC13	wyk: B	EAN ~ 129638		
<b>Mizetam:</b> tabl. 10/20 mg - 30 szt.  INN: <i>Ezetimibe + Atorvastatine</i> (1) Leczenie wspomagające do stosowania wraz z dietą u pacjentów dorosłych z pierwotną hipercholesterolemią (heterozygotyczną i homozygotyczną rodzinną i nierodzinną) lub mieszaną hiperlipidemią już kontrolowaną za pomocą atorwastatyny i ezetymibu, które są podawane w takich samych dawkach, Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym, tj. jako leczenie substytucyjne u pacjentów z chorobą niedokrwinną serca i ostrym zespołem wieńcowym w wywiadzie, u których uzyskano kontrolę choroby stosując jednocześnie pojedyncze substancje czynne w osobnych produktach leczniczych, ale w takich samych dawkach, jak w produkcie złożonym(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA Odpowiedniki: Atozet [X], Mizetam [25,56]	Rx	100%	25,56	<b>Momecutan:</b> roztw. na skórę 1 mg/g - 1 but. 50 ml  INN: <i>Mometasono furoate</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sun-Farm Sp. z o.o.	Rx	100%	16,41
		Limit	14,23			Limit	15,57
		30% <sup>(1)</sup>	14,04			50% <sup>(1)</sup>	8,63
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
						S <sup>(3)</sup>	bezpł.
ATC: C10BA05	wyk: B	EAN ~ 142156	ATC: D07AC13	wyk: B	EAN ~ 108798		
<b>Mizetam:</b> tabl. 10/10 mg - 30 szt.  INN: <i>Ezetimibe + Atorvastatine</i> (1) Leczenie wspomagające do stosowania wraz z dietą u pacjentów dorosłych z pierwotną hipercholesterolemią (heterozygotyczną i homozygotyczną rodzinną i nierodzinną) lub mieszaną hiperlipidemią już kontrolowaną za pomocą atorwastatyny i ezetymibu, które są podawane w takich samych dawkach, Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym, tj. jako leczenie substytucyjne u pacjentów z chorobą niedokrwinną serca i ostrym zespołem wieńcowym w wywiadzie, u których uzyskano kontrolę choroby stosując jednocześnie pojedyncze substancje czynne w osobnych produktach leczniczych, ale w takich samych dawkach, jak w produkcie złożonym(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA Odpowiedniki: Pronasal [15,01], Metmin [16,50], Momester [17,41]	Rx	100%	25,56	<b>Momecutan Fettcreme:</b> krem 1 mg/g - 1 op. 50 g  INN: <i>Mometasono furoate</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sun-Farm Sp. z o.o.	Rx	100%	17,73
		Limit	14,23			Limit	16,66
		30% <sup>(1)</sup>	14,04			50% <sup>(1)</sup>	9,40
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
						S <sup>(3)</sup>	bezpł.
ATC: C10BA05	wyk: B	EAN ~ 142160	ATC: D07AC13	wyk: B	EAN ~ 097059		
<b>Mobemid®:</b> tabl. powł. 150 mg - 30 szt. ◆  INN: <i>Moclobemide</i> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Bausch Health Odpowiedniki: Moklar [16,38], Mobemid® [18,10], Aurorix® [22,10]	Rx	100%	18,10	<b>Momester:</b> aerozol do nosa 50 µg/dawkę - 1 but. (140 dawek)  INN: <i>Mometasono furoate</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA Odpowiedniki: Pronasal [15,01], Metmin [16,50], Momester [17,41]	Rx	100%	17,41
		Limit	16,38			Limit	15,01
		30% <sup>(1)</sup>	6,63			50% <sup>(1)</sup>	9,91
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
						S <sup>(3)</sup>	bezpł.
ATC: N06AG02	wyk: B	EAN ~ 966813	ATC: R01AD09	wyk: B	EAN ~ 195366		
<b>Modulen® IBD:</b> prosz. - 1 op. 400 g  INN: <i>Dieta kompletna zawierająca TGF-beta 2</i> (1) Indukcja remisji u dzieci i młodzieży powyżej 5 r. z czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna   Kat. ciąży: Nestle Polska SA	Ś	100%	65,71	<b>Monkasta:</b> tabl. do rozgr. i żucia 4 mg - 28 szt.  INN: <i>Montelukast</i> (1) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma(2) Kobiety w ciąży(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Krka Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Montelukast Bluefish [X], Montelukast Aurovitas [9,18], Romilast [10,31], Orielukast [10,47], Montelukast Sandoz [13,68], Promonta 4 mg [13,68], Monkasta [13,68], Astmodil [15,46], Milukante [15,46]	Rx	100%	13,68
		Limit	65,71			Limit	9,30
		R <sup>(1)</sup>	3,20			30% <sup>(1)</sup>	7,17
						C <sup>(2)</sup>	bezpł.
						DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
ATC: N06AG02	wyk: B	EAN ~ 966813	ATC: R03DC03	wyk: B	EAN ~ 662685		
<b>Moklar:</b> tabl. powł. 150 mg - 30 szt. ◆  INN: <i>Moclobemide</i> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Neuzapharm Arzneimittel GmbH Odpowiedniki: Moklar [16,38], Mobemid® [18,10], Aurorix® [22,10]	Rx	100%	16,38	<b>Monkasta:</b> tabl. do rozgr. i żucia 5 mg - 28 szt.  INN: <i>Montelukast</i> (1) Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc(2) Kobiety w ciąży(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Krka Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Montelukast Bluefish [X], Montelukast Aurovitas [11,27], Romilast [12,62], Orielukast [12,64], Montelukast Sandoz [13,83], Promonta 5 mg [17,15], Monkasta [17,28], Astmodil [18,82], Milukante [19,27]	Rx	100%	17,28
		Limit	16,38			Limit	11,63
		30% <sup>(1)</sup>	4,91			30% <sup>(1)</sup>	9,14
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.			C <sup>(2)</sup>	bezpł.
						DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
ATC: N06AG02	wyk: B	EAN ~ 953714	ATC: R03DC03	wyk: B	EAN ~ 662647		



Naszym wyborem

**enarenal**  
 enalapryli maleas

<b>Monkasta:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>26,01</b>
		Limit	<b>23,25</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>9,74</b>
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Montelukast** ATC: **R03DC03** wyk: **B** EAN ~ **671243**  
 (1) Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Krka Polska Sp. z o.o.**  
 Odpowiedniki: Montelukast Aurovitas [21,22], Montelukast Medreg [22,45], Montelukast Bluefish [23,07], Asmenol [23,25], Montelukast Sandoz [23,25], Romilast [23,42], Orielukast [25,65], **Monkasta [26,01]**, Promonta 10 mg [26,34], Astmodil [27,02], Milukante [29,61]

<b>Mononit 10:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx	100%	<b>6,13</b>
		Limit	<b>5,10</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>4,23</b>
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Isosorbide mononitrate** ATC: **C01DA14** wyk: **B** EAN ~ **010516**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** **Sanofi-Aventis Sp. z o.o.**

<b>Mononit 20:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx	100%	<b>10,76</b>
		Limit	<b>10,19</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>3,77</b>
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Isosorbide mononitrate** ATC: **C01DA14** wyk: **B** EAN ~ **010622**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** **Sanofi-Aventis Sp. z o.o.**

<b>Mononit 40 :</b> tabl. powł. <b>40 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>10,19</b>
		Limit	<b>10,19</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>3,20</b>
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Isosorbide mononitrate** ATC: **C01DA14** wyk: **B** EAN ~ **010714**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** **Sanofi-Aventis Sp. z o.o.**

<b>Mononit retard 60:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>60 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>16,18</b>
		Limit	<b>15,29</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>5,69</b>
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Isosorbide mononitrate** ATC: **C01DA14** wyk: **B** EAN ~ **011529**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** **Sanofi-Aventis Sp. z o.o.**

<b>Mononit retard 100:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>100 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>23,31</b>
		Limit	<b>23,31</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>8,00</b>
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Isosorbide mononitrate** ATC: **C01DA14** wyk: **B** EAN ~ **011727**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** **Sanofi-Aventis Sp. z o.o.**

<b>Monoprost®:</b> krople do oczu [roztw.] <b>50 µg/ml</b> - 30 minim.	Rx	100%	<b>41,58</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>6,80</b>
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Latanoprost** ATC: **S01EE01** wyk: EAN ~ **019693**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** **Thea Polska Sp. z o.o.**

<b>Monoprost®:</b> krople do oczu [roztw.] <b>50 µg/ml</b> - 90 minim.	Rx	100%	<b>113,93</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>9,60</b>
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Latanoprost** ATC: **S01EE01** wyk: EAN ~ **019709**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** **Thea Polska Sp. z o.o.**

<b>Montelukast Aurovitas:</b> tabl. do rozgr. i żucia <b>4 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>9,18</b>
		Limit	<b>9,18</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>2,75</b>
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Montelukast** ATC: **R03DC03** wyk: **B** EAN ~ **099407**  
 (1) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.**  
 Odpowiedniki: Montelukast Bluefish [X], **Montelukast Aurovitas [9,18]**, Romilast [10,31], Orielukast [10,47], Monkasta [13,68], Montelukast Sandoz [13,68], Promonta 4 mg [13,68], Astmodil [15,46], Milukante [15,46]

<b>Montelukast Aurovitas:</b> tabl. do rozgr. i żucia <b>5 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>11,27</b>
		Limit	<b>11,27</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>3,38</b>
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Montelukast** ATC: **R03DC03** wyk: **B** EAN ~ **099385**  
 (1) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.**  
 Odpowiedniki: Montelukast Bluefish [X], **Montelukast Aurovitas [11,27]**, Romilast [12,62], Orielukast [12,64], Montelukast Sandoz [13,83], Promonta 5 mg [17,15], Monkasta [17,28], Astmodil [18,82], Milukante [19,27]

<b>Montelukast Aurovitas:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>21,22</b>
		Limit	<b>21,22</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>6,37</b>
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Montelukast** ATC: **R03DC03** wyk: **B** EAN ~ **108825**  
 (1) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.**

Odpowiedniki: **Montelukast Aurovitas [21,22]**, Montelukast Medreg [22,45], Montelukast Bluefish [23,07], Asmenol [23,25], Montelukast Sandoz [23,25], Romilast [23,42], Orielukast [25,65], Monkasta [26,01], Promonta 10 mg [26,34], Astmodil [27,02], Milukante [29,61]

<b>Montelukast Bluefish:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>23,07</b>
		Limit	<b>23,07</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>6,92</b>
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Montelukast** ATC: **R03DC03** wyk: **B** EAN ~ **871858**  
 (1) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Bluefish Pharmaceuticals**

Odpowiedniki: Montelukast Aurovitas [21,22], Montelukast Medreg [22,45], **Montelukast Bluefish [23,07]**, Asmenol [23,25], Montelukast Sandoz [23,25], Romilast [23,42], Orielukast [25,65], Monkasta [26,01], Promonta 10 mg [26,34], Astmodil [27,02], Milukante [29,61]

<b>Montelukast Medreg:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>22,45</b>
		Limit	<b>22,45</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>6,74</b>
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Montelukast** ATC: **R03DC03** wyk: **B** EAN ~ **132923**  
 (1) Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **MedReg sro**

Odpowiedniki: Montelukast Aurovitas [21,22], **Montelukast Medreg [22,45]**, Montelukast Bluefish [23,07], Asmenol [23,25], Montelukast Sandoz [23,25], Romilast [23,42], Orielukast [25,65], Monkasta [26,01], Promonta 10 mg [26,34], Astmodil [27,02], Milukante [29,61]

<b>Montelukast Sandoz:</b> tabl. do rozgr. i żucia <b>4 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>13,68</b>
		Limit	<b>9,30</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>7,17</b>
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Montelukast** ATC: **R03DC03** wyk: **B** EAN ~ **803743**  
 (1) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Sandoz GmbH**

Odpowiedniki: Montelukast Bluefish [X], Montelukast Aurovitas [9,18], Romilast [10,31], Orielukast [10,47], Monkasta [13,68], Promonta 4 mg [13,68], **Montelukast Sandoz [13,68]**, Astmodil [15,46], Milukante [15,46]

<b>Montelukast Sandoz:</b> tabl. do rozgr. i żucia <b>5 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>13,83</b>
		Limit	<b>11,63</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>5,69</b>
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Montelukast** ATC: **R03DC03** wyk: **B** EAN ~ **803767**  
 (1) Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Sandoz GmbH**

Odpowiedniki: Montelukast Bluefish [X], Montelukast Aurovitas [11,27], Romilast [12,62], Orielukast [12,64], **Montelukast Sandoz [13,83]**, Promonta 5 mg [17,15], Monkasta [17,28], Astmodil [18,82], Milukante [19,27]

<b>Montelukast Sandoz:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>23,25</b>
		Limit	<b>23,25</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>6,98</b>
		C <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(4)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Montelukast</b>   ATC: <b>R03DC03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>780266</b>			
(1) Astma, Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: Montelukast Aurovitas [21,22], Montelukast Medreg [22,45], Montelukast Bluefish [23,07], Asmenol [23,25], <b>Montelukast Sandoz [23,25]</b> , Romilast [23,42], Oriukast [25,65], Monkasta [26,01], Promonta 10 mg [26,34], Astmodil [27,02], Milukante [29,61]			
<b>Montelukast Sandoz:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 60 szt.	Rx	100%	<b>49,85</b>
		Limit	<b>49,82</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>14,98</b>
		C <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(4)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Montelukast</b>   ATC: <b>R03DC03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>703481</b>			
(1) Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: Montelukast Sandoz - (IR) [42,18], <b>Montelukast Sandoz [49,85]</b>			
<b>Montelukast Sandoz - (IR):</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>22,69</b>
		Limit	<b>22,69</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>6,81</b>
		C <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(4)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Montelukast</b>   ATC: <b>R03DC03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>145701</b>			
(1) Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma, Przewłoka obturacyjna choroba płuc (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Delfarma Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Montelukast Sandoz - (IR) [22,64], <b>Montelukast Sandoz - (IR) [22,69]</b>			
<b>Montelukast Sandoz - (IR):</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>22,64</b>
		Limit	<b>22,64</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>6,79</b>
		C <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(4)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Montelukast</b>   ATC: <b>R03DC03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>147202</b>			
(1) Astma, Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Inpharm Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: <b>Montelukast Sandoz - (IR) [22,64]</b> , Montelukast Sandoz - (IR) [22,69]			
<b>Montelukast Sandoz - (IR):</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 60 szt.	Rx	100%	<b>42,18</b>
		Limit	<b>42,18</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>12,65</b>
		C <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(4)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Montelukast</b>   ATC: <b>R03DC03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>147203</b>			
(1) Astma, Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Inpharm Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: <b>Montelukast Sandoz - (IR) [42,18]</b> , Montelukast Sandoz [49,85]			
<b>Morphini sulfas WZF:</b> inj. [roztw.] <b>10 mg/ml</b> - 10 amp. 1 ml	Rx-w	100%	<b>19,45</b>
		Limit	<b>12,93</b>
		B <sup>(1)</sup>	<b>5,87</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(3)</sup>	<b>8,75</b>
		S <sup>(4)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Morphine sulphate</b>   ATC: <b>N02AA01</b>   wyk: <b>N</b>   EAN ~ <b>404919</b>			
(1) Nowotwory złośliwe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Polfa Warszawa SA			
<b>Morphini sulfas WZF:</b> inj. [roztw.] <b>20 mg/ml</b> - 10 amp. 1 ml	Rx-w	100%	<b>25,86</b>
		Limit	<b>25,86</b>
		B <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(3)</sup>	<b>2,88</b>
		S <sup>(4)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Morphine sulphate</b>   ATC: <b>N02AA01</b>   wyk: <b>N</b>   EAN ~ <b>405015</b>			
(1) Nowotwory złośliwe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Polfa Warszawa SA			
<b>Movalis®:</b> tabl. <b>15 mg</b> - 10 szt.	Rx	100%	<b>7,96</b>
		Limit	<b>5,11</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>5,41</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Meloxicam</b>   ATC: <b>M01AC06</b>   wyk: <b>EAN</b> ~ <b>464425</b>			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:C, T3:D</b>   Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Meloxicad® [X], Aglan® 15 [5,48], Opokan forte [5,68], <b>Movalis® [7,96]</b>			
<b>Movalis®:</b> tabl. <b>15 mg</b> - 20 szt.	Rx	100%	<b>13,79</b>
		Limit	<b>10,22</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>8,68</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Meloxicam</b>   ATC: <b>M01AC06</b>   wyk: <b>EAN</b> ~ <b>464418</b>			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:C, T3:D</b>   Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Remolexam [9,82], Meloxicad® [10,22], Aglan® 15 [11,55], Aspicaam [12,87], <b>Movalis® [13,79]</b>			
<b>MST Continus®:</b> tabl. o zmodyf. uwalnianiu <b>10 mg</b> - 60 szt.	Rx-w	100%	<b>17,66</b>
		Limit	<b>13,56</b>
		B <sup>(1)</sup>	<b>4,10</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(3)</sup>	<b>7,30</b>
		S <sup>(4)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Morphine sulphate</b>   ATC: <b>N02AA01</b>   wyk: <b>N</b>   EAN ~ <b>476237</b>			
(1) Nowotwory złośliwe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia, Neuralgia popółpaścowa przewłoka (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Mundipharma Polska Sp. z o.o.			
<b>MST Continus®:</b> tabl. o zmodyf. uwalnianiu <b>30 mg</b> - 60 szt.	Rx-w	100%	<b>46,69</b>
		Limit	<b>40,67</b>
		B <sup>(1)</sup>	<b>6,02</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(3)</sup>	<b>9,22</b>
		S <sup>(4)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Morphine sulphate</b>   ATC: <b>N02AA01</b>   wyk: <b>N</b>   EAN ~ <b>476336</b>			
(1) Nowotwory złośliwe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia, Neuralgia popółpaścowa przewłoka (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Mundipharma Polska Sp. z o.o.			
<b>MST Continus®:</b> tabl. o zmodyf. uwalnianiu <b>60 mg</b> - 60 szt.	Rx-w	100%	<b>88,26</b>
		Limit	<b>81,33</b>
		B <sup>(1)</sup>	<b>6,93</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(3)</sup>	<b>10,77</b>
		S <sup>(4)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Morphine sulphate</b>   ATC: <b>N02AA01</b>   wyk: <b>N</b>   EAN ~ <b>476435</b>			
(1) Nowotwory złośliwe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Neuralgia popółpaścowa przewłoka, Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Mundipharma Polska Sp. z o.o.			
<b>MST Continus®:</b> tabl. o zmodyf. uwalnianiu <b>100 mg</b> - 60 szt.	Rx-w	100%	<b>142,70</b>
		Limit	<b>135,55</b>
		B <sup>(1)</sup>	<b>7,15</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(3)</sup>	<b>13,55</b>
		S <sup>(4)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Morphine sulphate</b>   ATC: <b>N02AA01</b>   wyk: <b>N</b>   EAN ~ <b>476534</b>			
(1) Nowotwory złośliwe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Neuralgia popółpaścowa przewłoka, Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Mundipharma Polska Sp. z o.o.			
<b>MST Continus®:</b> tabl. o zmodyf. uwalnianiu <b>200 mg</b> - 60 szt.	Rx-w	100%	<b>271,10</b>
		Limit	<b>271,10</b>
		B <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(3)</sup>	<b>12,80</b>
		S <sup>(4)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Morphine sulphate</b>   ATC: <b>N02AA01</b>   wyk: <b>N</b>   EAN ~ <b>476633</b>			
(1) Nowotwory złośliwe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Neuralgia popółpaścowa przewłoka, Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Mundipharma Polska Sp. z o.o.			



<b>Multisure GK: test paskowy - 50 szt.</b>	WM	100%	<b>37,66</b>
		Limit	<b>37,66</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>11,30</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		EAN ~ 760507	

INN: *Glukoza we krwi* ATC: wyk: RAN ~ 760507  
 (1)Cukrzyca(2)Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | Kat. ciąży: N  
 DIATHER  
 Odpowiedniki: DIAVUE ToGo [35,43], OKmeter Core [35,43], Wellion SymPhar [36,63], G-BIO [37,55], Multisure GK [37,66], Everchek [37,77], Examedin® Fast [38,12], GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A [38,23], Cera-Chek 1 Code [38,33], VivaChek Ino [38,33], VivaChek Ino [38,33], One Touch Select Plus [38,35], GlucoCard 01 Sensor [38,66], Glucosense® [38,77], EverCare [38,80], GensuCare [38,80], Optium Xido [38,88], Contour Plus [39,09], Contour TS [39,09], iXell® [39,15], Abra [39,27], Accu-Chek® Performa [39,27], Diagnostic Gold Strip [39,49], Glucomax® [39,55]

<b>Mycofit/Mycophenolate Mofetil Accord: kaps. twarde 250 mg - 100 szt.</b>	Rx	100%	<b>79,02</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Mycophenolate mofetil* ATC: L04AA06 wyk: B EAN ~ 754472  
 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Steroidozależny zespół nerczycowy; cyklosporynozależny zespół nerczycowy; nefropatia toczniowa; zapalenie naczyń; toczeń rumieniowaty układowy; twardzina układowa; stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; neuropatia zapalna; miopatia zapalna; steroidooporny zespół nerczycowy; nefropatia IgA; choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego(3)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Mycophenolate mofetil Sandoz 250 mg kapsułki twarde [78,45], Mycofit/Mycophenolate Mofetil Accord [79,02], Myfenax [82,85], CellCept® [126,18]

<b>Mycofit/Mycophenolate Mofetil Accord: tabl. powł. 500 mg - 50 szt.</b>	Rx	100%	<b>79,02</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Mycophenolate mofetil* ATC: L04AA06 wyk: B EAN ~ 750993  
 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Steroidozależny zespół nerczycowy; cyklosporynozależny zespół nerczycowy; nefropatia toczniowa; zapalenie naczyń; toczeń rumieniowaty układowy; twardzina układowa; stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; neuropatia zapalna; miopatia zapalna; steroidooporny zespół nerczycowy; nefropatia IgA; choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego(3)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Mycofit/Mycophenolate Mofetil Accord [79,02], Myfenax [82,85], Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane [86,46], CellCept® [126,18]

<b>Myconafine: tabl. 250 mg - 14 szt. (1 blister)</b>	Rx	100%	<b>24,07</b>
		Limit	<b>24,07</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>12,04</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Terbinafine* ATC: D01BA02 wyk: B EAN ~ 041904  
 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Aristo Pharma Sp. z o.o.

<b>Myconafine: tabl. 250 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	<b>49,17</b>
		Limit	<b>49,17</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>24,59</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Terbinafine* ATC: D01BA02 wyk: B EAN ~ 419050  
 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Aristo Pharma Sp. z o.o.

<b>Mycophenolate mofetil Sandoz 250 mg kapsułki twarde: kaps. twarde 250 mg - 100 szt.</b>	Rx	100%	<b>78,45</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Mycophenolate mofetil* ATC: L04AA06 wyk: B EAN ~ 007456  
 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Steroidozależny zespół nerczycowy; cyklosporynozależny zespół nerczycowy; nefropatia toczniowa; zapalenie naczyń; toczeń rumieniowaty układowy; twardzina układowa; stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; neuropatia zapalna; miopatia zapalna; steroidooporny zespół nerczycowy; nefropatia IgA; choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego(3)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Sandoz GmbH  
 Odpowiedniki: Mycophenolate mofetil Sandoz 250 mg kapsułki twarde [78,45], Mycofit/Mycophenolate Mofetil Accord [79,02], Myfenax [82,85], CellCept® [126,18]

<b>Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane: tabl. powł. 500 mg - 50 szt.</b>	Rx	100%	<b>86,46</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>10,64</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Mycophenolate mofetil* ATC: L04AA06 wyk: B EAN ~ 715268  
 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Steroidozależny zespół nerczycowy; cyklosporynozależny zespół nerczycowy; nefropatia toczniowa; zapalenie naczyń; toczeń rumieniowaty układowy; twardzina układowa; stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; neuropatia zapalna; miopatia zapalna; steroidooporny zespół nerczycowy; nefropatia IgA; choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego(3)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Sandoz GmbH  
 Odpowiedniki: Mycofit/Mycophenolate Mofetil Accord [79,02], Myfenax [82,85], Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane [86,46], CellCept® [126,18]

<b>Mycosolon®: maść (2,5 mg+ 20 mg)/g - 1 tuba 15 g</b>	Rx	100%	<b>24,25</b>
		Limit	<b>24,25</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>12,13</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Mazipredone + Miconazole nitrate* ATC: D01AC52 wyk: B EAN ~ 129812  
 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

<b>Mycosyst®: kaps. 50 mg - 7 szt.</b>	Rx	100%	<b>10,87</b>
		Limit	<b>10,38</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>5,68</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Fluconazole* ATC: J02AC01 wyk: B EAN ~ 980512  
 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Mycosyst® [10,87], Fluxazol [11,36], Fluconazole Genoptim [11,41], Flumycon® [11,66], Fluconazole Polfarmex [12,23], Flucofast® [13,64]

<b>Mycosyst®: kaps. 100 mg - 7 szt.</b>	Rx	100%	<b>21,30</b>
		Limit	<b>20,77</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>10,92</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Fluconazole* ATC: J02AC01 wyk: B EAN ~ 642533  
 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Fluconazole Aurovitas [18,96], Fluconazolium Aflofarm [19,01], Mycosyst® [21,30], Fluxazol [21,33], Fluconazole Genoptim [21,65], Flumycon® [22,16], Fluconazole Polfarmex [23,47], Flucofast® [26,32]

<b>Mycosyst®: kaps. 100 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	<b>83,77</b>
		Limit	<b>83,06</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>42,24</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Fluconazole* ATC: J02AC01 wyk: B EAN ~ 980611  
 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Fluconazole Aurovitas [65,80], Fluconazole Genoptim [75,04], Flumycon® [78,66], Fluconazole Polfarmex [83,48], Mycosyst® [83,77], Flucofast® [95,32]

<b>Mycosyst®: kaps. 200 mg - 7 szt.</b>	Rx	100%	<b>41,53</b>
		Limit	<b>41,53</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>20,77</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Fluconazole* ATC: J02AC01 wyk: B EAN ~ 118914  
 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Fluconazole Aurovitas [35,23], Fluconazolium Aflofarm [35,35], Fluxazol [39,98], Mycosyst® [41,53], Flumycon® [41,67], Flucofast® [42,67], Fluconazole Polfarmex [43,38], Fluconazole Genoptim [44,76]

<b>Myfenax: kaps. twarde 250 mg - 100 szt.</b>	Rx-z	100%	<b>82,85</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>7,03</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: *Mycophenolate mofetil* ATC: L04AA06 wyk: B EAN ~ 638185  
 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Steroidozależny zespół nerczycowy; cyklosporynozależny zespół nerczycowy; nefropatia toczniowa; zapalenie naczyń; toczeń rumieniowaty układowy; twardzina układowa; stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; neuropatia zapalna; miopatia zapalna; steroidooporny zespół nerczycowy; nefropatia IgA; choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego(3)Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Mycophenolate mofetil Sandoz 250 mg kapsułki twarde [78,45], Mycofit/Mycophenolate Mofetil Accord [79,02], Myfenax [82,85], CellCept® [126,18]



<p><b>Myfenax:</b> tabl. powł. <b>500 mg</b> - 50 szt.</p> <p>INN: <i>Mycophenolate mofetil</i>   ATC: L04AA06   wyk: B   EAN ~ 638208            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Sieroidozależny zespół nerczycowy; cyklosporynozależny zespół nerczycowy; nefropatia toczniowa; zapalenie naczyń; toczń rumieniowaty układowy; twardzina układowa; stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; neuropatia zapalna; miopatia zapalna; steroidooporny zespół nerczycowy; nefropatia IgA; choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności: cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C            Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Mycofit/Mycophenolate Mofetil Accord [79,02], Myfenax [82,85], Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane [86,46], CellCept® [126,18]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx-z</td><td>100%</td><td>82,85</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>7,03</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx-z	100%	82,85		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	7,03		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Nalgessin Forte:</b> tabl. powł. <b>550 mg</b> - 10 szt.</p> <p>INN: <i>Naproxen</i>   ATC: M01AE02   wyk: B   EAN ~ 023782            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:B, T2:B, T3:D            Krka Polska Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>7,69</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>5,62</td></tr> <tr><td></td><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>4,88</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	7,69		Limit	5,62		50% <sup>(1)</sup>	4,88		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx-z	100%	82,85																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	7,03																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	7,69																															
	Limit	5,62																															
	50% <sup>(1)</sup>	4,88																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
<p><b>Myleran®:</b> tabl. powł. <b>2 mg</b> - 25 szt.</p> <p>INN: <i>Busulfan</i>   ATC: L01AB01   wyk: A   EAN ~ 277919            (1) Nowotwory złośliwe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D            Aspen Pharma Trading Limited</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>212,92</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>212,92</td></tr> <tr><td></td><td>B<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	212,92		Limit	212,92		B <sup>(1)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Nalgessin Forte:</b> tabl. powł. <b>550 mg</b> - 20 szt.</p> <p>INN: <i>Naproxen</i>   ATC: M01AE02   wyk: B   EAN ~ 023799            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:B, T2:B, T3:D            Odpowiedniki: Nalgessin Forte [14,59], Anapran® [19,07]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>14,59</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>11,24</td></tr> <tr><td></td><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>8,97</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	14,59		Limit	11,24		50% <sup>(1)</sup>	8,97		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx	100%	212,92																															
	Limit	212,92																															
	B <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	14,59																															
	Limit	11,24																															
	50% <sup>(1)</sup>	8,97																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
<p><b>Myleran®:</b> tabl. powł. <b>2 mg</b> - 100 szt.</p> <p>INN: <i>Busulfan</i>   ATC: L01AB01   wyk: A   EAN ~ 277926            (1) Chemioterapia ICD10: C.4.   Kat. ciąży: D            Aspen Pharma Trading Limited</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>377,78</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>377,78</td></tr> <tr><td></td><td>B<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	377,78		Limit	377,78		B <sup>(1)</sup>	bezpł.	<p><b>Nalgessin Forte:</b> tabl. powł. <b>550 mg</b> - 30 szt.</p> <p>INN: <i>Naproxen</i>   ATC: M01AE02   wyk: B   EAN ~ 023805            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:B, T2:B, T3:D            Krka Polska Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>21,51</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>16,86</td></tr> <tr><td></td><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>13,08</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	21,51		Limit	16,86		50% <sup>(1)</sup>	13,08		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.						
Rx	100%	377,78																															
	Limit	377,78																															
	B <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	21,51																															
	Limit	16,86																															
	50% <sup>(1)</sup>	13,08																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
<p><b>Nabuton VP:</b> tabl. <b>500 mg</b> - 20 szt.</p> <p>INN: <i>Nabumetone</i>   ATC: M01AX01   wyk: B   EAN ~ 962419            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:C, T3:D            Bausch Health</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>14,51</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>5,11</td></tr> <tr><td></td><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>11,96</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	14,51		Limit	5,11		50% <sup>(1)</sup>	11,96		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Nalgessin Forte:</b> tabl. powł. <b>550 mg</b> - 60 szt.</p> <p>INN: <i>Naproxen</i>   ATC: M01AE02   wyk: B   EAN ~ 023836            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:B, T2:B, T3:D            Odpowiedniki: Nalgessin Forte [41,25], Anapran® [42,46]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>41,25</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>33,73</td></tr> <tr><td></td><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>24,39</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	41,25		Limit	33,73		50% <sup>(1)</sup>	24,39		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.			
Rx	100%	14,51																															
	Limit	5,11																															
	50% <sup>(1)</sup>	11,96																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	41,25																															
	Limit	33,73																															
	50% <sup>(1)</sup>	24,39																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
<p><b>Nabuton VP:</b> tabl. <b>500 mg</b> - 60 szt.</p> <p>INN: <i>Nabumetone</i>   ATC: M01AX01   wyk: B   EAN ~ 962426            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:C, T3:D            Bausch Health</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>41,87</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>15,33</td></tr> <tr><td></td><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>34,21</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	41,87		Limit	15,33		50% <sup>(1)</sup>	34,21		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Namaxir:</b> inj. [roztw.] <b>7,5 mg</b> - 4 amp.-strzyk. ◆</p> <p>INN: <i>Methotrexate</i>   ATC: L01BA01   wyk: A   EAN ~ 252700            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X            Actavis Group PTC ehf.</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>82,76</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	82,76		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	3,20		S <sup>(3)</sup>	bezpł.			
Rx	100%	41,87																															
	Limit	15,33																															
	50% <sup>(1)</sup>	34,21																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	82,76																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	3,20																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
<p><b>Naclof®:</b> krople do oczu <b>1 mg/ml</b> - 1 but. 5 ml</p> <p>INN: <i>Diclofenac sodium</i>   ATC: S01BC03   wyk: B   EAN ~ 145317            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:B, T2:B, T3:D            Thea Polska Sp. z o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Naclof® [11,21], Difadol® 0,1% [12,23]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>11,21</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>10,70</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(1)</sup></td><td>3,71</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	11,21		Limit	10,70		R <sup>(1)</sup>	3,71		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Namaxir:</b> inj. [roztw.] <b>10 mg</b> - 4 amp.-strzyk. ◆</p> <p>INN: <i>Methotrexate</i>   ATC: L01BA01   wyk: A   EAN ~ 252724            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X            Actavis Group PTC ehf.</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>109,60</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	109,60		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	3,20		S <sup>(3)</sup>	bezpł.			
Rx	100%	11,21																															
	Limit	10,70																															
	R <sup>(1)</sup>	3,71																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	109,60																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	3,20																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
<p><b>Naklofen®:</b> inj. [roztw.] <b>75 mg/3 ml</b> - 5 amp. 3 ml</p> <p>INN: <i>Diclofenac sodium</i>   ATC: M01AB05   wyk: B   EAN ~ 241910            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:B, T2:B, T3:D            Krka Polska Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>8,80</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>8,80</td></tr> <tr><td></td><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>4,40</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	8,80		Limit	8,80		50% <sup>(1)</sup>	4,40		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Namaxir:</b> inj. [roztw.] <b>15 mg</b> - 4 amp.-strzyk. ◆</p> <p>INN: <i>Methotrexate</i>   ATC: L01BA01   wyk: A   EAN ~ 252762            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X            Actavis Group PTC ehf.</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>164,03</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	164,03		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	3,20		S <sup>(3)</sup>	bezpł.			
Rx	100%	8,80																															
	Limit	8,80																															
	50% <sup>(1)</sup>	4,40																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	164,03																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	3,20																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
<p><b>Nakom®:</b> tabl. <b>250/25 mg</b> - 100 szt.</p> <p>INN: <i>Levodopa + Carbidopa</i>   ATC: N04BA02   wyk: B   EAN ~ 175215            (1) Choroba i zespół Parkinsona WP: Dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C            Sandoz GmbH</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>80,90</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>80,90</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(1)</sup></td><td>4,44</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	80,90		Limit	80,90		R <sup>(1)</sup>	4,44		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Namaxir:</b> inj. [roztw.] <b>20 mg</b> - 4 amp.-strzyk. ◆</p> <p>INN: <i>Methotrexate</i>   ATC: L01BA01   wyk: A   EAN ~ 252809            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X            Actavis Group PTC ehf.</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>218,99</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,41</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	218,99		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	3,41		S <sup>(3)</sup>	bezpł.			
Rx	100%	80,90																															
	Limit	80,90																															
	R <sup>(1)</sup>	4,44																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	218,99																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	3,41																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
<p><b>Nakom® Mite:</b> tabl. <b>100/25 mg</b> - 100 szt.</p> <p>INN: <i>Levodopa + Carbidopa</i>   ATC: N04BA02   wyk: B   EAN ~ 175314            (1) Choroba i zespół Parkinsona WP: Dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C            Sandoz GmbH</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>49,37</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>40,21</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(1)</sup></td><td>12,36</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	49,37		Limit	40,21		R <sup>(1)</sup>	12,36		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Namaxir:</b> inj. [roztw.] <b>25 mg</b> - 4 amp.-strzyk. ◆</p> <p>INN: <i>Methotrexate</i>   ATC: L01BA01   wyk: A   EAN ~ 252847            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X            Actavis Group PTC ehf.</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>273,51</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>4,27</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	273,51		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	4,27		S <sup>(3)</sup>	bezpł.			
Rx	100%	49,37																															
	Limit	40,21																															
	R <sup>(1)</sup>	12,36																															
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	273,51																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	4,27																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

Naproxen 250 Hasco: tabl. 250 mg - 30 szt.	Rx	100%	10,59
		Limit	7,67
		50% <sup>(1)</sup>	6,76
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Naproxen</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA	ATC: M01AE02	wyk: B	EAN ~ 040529
Odpowiedniki: Naproxen Polfarmex [X], Naproxen Genoptim [8,59], Naproxen 250 Hasco [10,59], Apo-Napro [10,64]			
Naproxen 250 Hasco: tabl. 250 mg - 50 szt.	Rx	100%	17,29
		Limit	12,78
		50% <sup>(1)</sup>	10,90
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Naproxen</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA	ATC: M01AE02	wyk: B	EAN ~ 040536
Odpowiedniki: Naproxen 250 Hasco [17,29], Naproxen Polfarmex [22,54]			
Naproxen 500 Hasco: tabl. 500 mg - 15 szt.	Rx	100%	10,59
		Limit	7,67
		50% <sup>(1)</sup>	6,76
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Naproxen</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA	ATC: M01AE02	wyk: B	EAN ~ 644179
Odpowiedniki: Naproxen Genoptim [16,34], Naproxen 500 Hasco [19,54], Naproxen Polfarmex [20,00], Apo-Napro [20,72]			
Naproxen 500 Hasco: tabl. 500 mg - 30 szt.	Rx	100%	19,54
		Limit	15,33
		50% <sup>(1)</sup>	11,88
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Naproxen</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA	ATC: M01AE02	wyk: B	EAN ~ 644186
Odpowiedniki: Naproxen Genoptim [16,34], Naproxen 500 Hasco [19,54], Naproxen Polfarmex [20,00], Apo-Napro [20,72]			
Naproxen Genoptim: tabl. 250 mg - 30 szt.	Rx	100%	8,59
		Limit	7,67
		50% <sup>(1)</sup>	4,76
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Naproxen</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:C, T3:D Synoptis Pharma Sp. z o.o.	ATC: M01AE02	wyk: B	EAN ~ 139009
Odpowiedniki: Naproxen Polfarmex [X], Naproxen Genoptim [8,59], Naproxen 250 Hasco [10,59], Apo-Napro [10,64]			
Naproxen Genoptim: tabl. 500 mg - 30 szt.	Rx	100%	16,34
		Limit	15,33
		50% <sup>(1)</sup>	8,68
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Naproxen</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:C, T3:D Synoptis Pharma Sp. z o.o.	ATC: M01AE02	wyk: B	EAN ~ 139014
Odpowiedniki: Naproxen Genoptim [16,34], Naproxen 500 Hasco [19,54], Naproxen Polfarmex [20,00], Apo-Napro [20,72]			
Naproxen Hasco: czopki 250 mg - 10 szt.	Rx	100%	11,76
		Limit	8,85
		50% <sup>(1)</sup>	7,34
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Naproxen</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA	ATC: M01AE02	wyk: B	EAN ~ 914319
Odpowiedniki: Naproxen 250 Hasco [10,59], Naproxen 500 Hasco [19,54], Naproxen Polfarmex [20,00], Apo-Napro [20,72]			
Naproxen Hasco: czopki 500 mg - 10 szt.	Rx	100%	18,27
		Limit	17,70
		50% <sup>(1)</sup>	9,42
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Naproxen</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA	ATC: M01AE02	wyk: B	EAN ~ 914418

Naproxen Polfarmex: tabl. 500 mg - 20 szt.	Rx	100%	15,05
		Limit	10,22
		50% <sup>(1)</sup>	9,94
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Naproxen</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:B, T2:B, T3:D Polfarmex S.A.	ATC: M01AE02	wyk: B	EAN ~ 466818
Odpowiedniki: Naproxen Polfarmex [15,05], Anapran® EC [21,68]			
Naproxen Polfarmex: tabl. 500 mg - 30 szt.	Rx	100%	20,00
		Limit	15,33
		50% <sup>(1)</sup>	12,34
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Naproxen</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:B, T2:B, T3:D Polfarmex S.A.	ATC: M01AE02	wyk: B	EAN ~ 860685
Odpowiedniki: Naproxen Genoptim [16,34], Naproxen 500 Hasco [19,54], Naproxen Polfarmex [20,00], Apo-Napro [20,72]			
Nasometin: aerozol do nosa 50 µg/dawkę - 1 but. 18 g (140 dawek)	Rx	100%	15,01
		Limit	15,01
		50% <sup>(1)</sup>	7,51
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Mometasone furoate</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sandoz GmbH	ATC: R01AD09	wyk:	EAN ~ 031275
Odpowiedniki: Nasometin [15,01], Nasometin 100 µg/dawkę [15,01], Nasometin 200 µg/dawkę [15,01]			
Naxalgan: kaps. twarde 75 mg - 60 szt. ♦	Rx	100%	55,54
		Limit	0,00
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Pregabalin</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Vipharm SA	ATC: N03AX16	wyk: B	EAN ~ 137822
Odpowiedniki: Naxalgan [55,54], Naxalgan 150 mg [55,54], Naxalgan 75 mg [55,54]			
Naxalgan: kaps. twarde 150 mg - 60 szt. ♦	Rx	100%	105,17
		Limit	0,00
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Pregabalin</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Vipharm SA	ATC: N03AX16	wyk: B	EAN ~ 137829
Odpowiedniki: Naxalgan [55,54], Naxalgan 150 mg [55,54], Naxalgan 75 mg [55,54]			
Nebbud: zaw. do nebulizacji 0,125 mg/ml - 20 amp. 2 ml	Rx	100%	66,11
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Budesonide</i> (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	ATC: R01AD05	wyk: B	EAN ~ 107925
Odpowiedniki: BDS N [X], Nebbud [66,11], Benodil [66,26]			
Nebbud: zaw. do nebulizacji 0,25 mg/ml - 20 amp. 2 ml	Rx	100%	58,11
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20
		R <sup>(4)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Budesonide</i> (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli (4) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, Astma (5) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	ATC: R01AD05	wyk: B	EAN ~ 005696
Odpowiedniki: BDS N [58,11], Nebbud [58,11], Benodil [58,80]			



# ZOLPIC

Daj owcom odpocząć.  
zolidem



<b>Nebbud:</b> zaw. do nebulizacji <b>0,5 mg/ml</b> - 20 amp. 2 ml  INN: <i>Budesonide</i>   ATC: <b>R01AD05</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>005733</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma (5) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Nebbud [81,59], Benodil [81,66], BDS N [81,76]	Rx	100%	<b>81,59</b>
		Limit	<b>81,59</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>24,48</b>
		C <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
<b>Nebicard:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 28 szt. ◆  INN: <i>Nebivolol</i>   ATC: <b>C07AB12</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>068518</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b> Biofarm Sp. z o.o. Odpowiedniki: Nebivolol Genoptim [11,69], Ivineb [12,07], Nebivolol Aurovitas [12,14], NebivoLek [13,55], Daneb [14,21], Nebispes [15,96], Nebinad [16,19], Nebicard [16,48], Nebilet® [16,56], Nebilenin [17,31], Nedal® [18,34]	Rx	100%	<b>16,48</b>
		Limit	<b>12,14</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>7,54</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
<b>Nebicard:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 56 szt. ◆  INN: <i>Nebivolol</i>   ATC: <b>C07AB12</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>068520</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b> Biofarm Sp. z o.o. Odpowiedniki: NebivoLek [23,06], Nebicard [25,12]	Rx	100%	<b>25,12</b>
		Limit	<b>24,28</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>6,81</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
<b>Nebicard:</b> tabl. <b>10 mg</b> - 28 szt. ◆  INN: <i>Nebivolol</i>   ATC: <b>C07AB12</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>139035</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b> Biofarm Sp. z o.o. Odpowiedniki: NebivoLek [23,06], Nebicard [25,12]	Rx	100%	<b>23,09</b>
		Limit	<b>23,09</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>5,97</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
<b>Nebicard:</b> tabl. <b>10 mg</b> - 56 szt. ◆  INN: <i>Nebivolol</i>   ATC: <b>C07AB12</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>139037</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b> Biofarm Sp. z o.o. Odpowiedniki: NebivoLek [23,06], Nebicard [25,12]	Rx	100%	<b>43,39</b>
		Limit	<b>43,39</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>11,95</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
<b>Nebilenin:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 28 szt. ◆  INN: <i>Nebivolol</i>   ATC: <b>C07AB12</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>689774</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b> Adamed Sp. z o.o. Odpowiedniki: Nebivolol Genoptim [11,69], Ivineb [12,07], Nebivolol Aurovitas [12,14], NebivoLek [13,55], Daneb [14,21], Nebispes [15,96], Nebinad [16,19], Nebicard [16,48], Nebilet® [16,56], Nebilenin [17,31], Nedal® [18,34]	Rx	100%	<b>17,31</b>
		Limit	<b>12,14</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>7,53</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
<b>Nebilet®:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 28 szt. ◆  INN: <i>Nebivolol</i>   ATC: <b>C07AB12</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>670185</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b> Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Nebivolol Genoptim [11,69], Ivineb [12,07], Nebivolol Aurovitas [12,14], NebivoLek [13,55], Daneb [14,21], Nebispes [15,96], Nebinad [16,19], Nebicard [16,48], Nebilet® [16,56], Nebilenin [17,31], Nedal® [18,34]	Rx	100%	<b>16,56</b>
		Limit	<b>12,14</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>7,62</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
<b>Nebinad:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 28 szt. ◆  INN: <i>Nebivolol</i>   ATC: <b>C07AB12</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>648719</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b> RECORDATI Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Nebivolol Genoptim [11,69], Ivineb [12,07], Nebivolol Aurovitas [12,14], NebivoLek [13,55], Daneb [14,21], Nebispes [15,96], Nebinad [16,19], Nebicard [16,48], Nebilet® [16,56], Nebilenin [17,31], Nedal® [18,34]	Rx	100%	<b>16,19</b>
		Limit	<b>12,14</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>7,25</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
<b>Nebispes:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 28 szt. ◆  INN: <i>Nebivolol</i>   ATC: <b>C07AB12</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>673865</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b> Bausch Health Odpowiedniki: Nebivolol Genoptim [11,69], Ivineb [12,07], Nebivolol Aurovitas [12,14], NebivoLek [13,55], Daneb [14,21], Nebispes [15,96], Nebinad [16,19], Nebicard [16,48], Nebilet® [16,56], Nebilenin [17,31], Nedal® [18,34]	Rx	100%	<b>15,96</b>
		Limit	<b>12,14</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>7,02</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
<b>NebivoLek:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 28 szt. ◆  INN: <i>Nebivolol</i>   ATC: <b>C07AB12</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>653300</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b> Sandoz GmbH Odpowiedniki: Nebivolol Genoptim [11,69], Ivineb [12,07], Nebivolol Aurovitas [12,14], NebivoLek [13,55], Daneb [14,21], Nebispes [15,96], Nebinad [16,19], Nebicard [16,48], Nebilet® [16,56], Nebilenin [17,31], Nedal® [18,34]	Rx	100%	<b>13,55</b>
		Limit	<b>12,14</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>4,61</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
<b>NebivoLek:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 56 szt. ◆  INN: <i>Nebivolol</i>   ATC: <b>C07AB12</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>703597</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b> Sandoz GmbH Odpowiedniki: NebivoLek [23,06], Nebicard [25,12]	Rx	100%	<b>23,06</b>
		Limit	<b>23,06</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>5,97</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
<b>Nebivolol Aurovitas:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 28 szt. ◆  INN: <i>Nebivolol</i>   ATC: <b>C07AB12</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>135704</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b> Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Nebivolol Genoptim [11,69], Ivineb [12,07], Nebivolol Aurovitas [12,14], NebivoLek [13,55], Daneb [14,21], Nebispes [15,96], Nebinad [16,19], Nebicard [16,48], Nebilet® [16,56], Nebilenin [17,31], Nedal® [18,34]	Rx	100%	<b>12,14</b>
		Limit	<b>12,14</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
<b>Nebivolol Genoptim:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 28 szt. ◆  INN: <i>Nebivolol</i>   ATC: <b>C07AB12</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>369552</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b> Synoptis Pharma Sp. z o.o. Odpowiedniki: Nebivolol Genoptim [11,69], Ivineb [12,07], Nebivolol Aurovitas [12,14], NebivoLek [13,55], Daneb [14,21], Nebispes [15,96], Nebinad [16,19], Nebicard [16,48], Nebilet® [16,56], Nebilenin [17,31], Nedal® [18,34]	Rx	100%	<b>11,69</b>
		Limit	<b>11,69</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
<b>Nebivolol Krka:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 30 szt. ◆  INN: <i>Nebivolol</i>   ATC: <b>C07AB12</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>971617</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b> Krka Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Nebivolol Krka [12,81], Nebivor® [13,31]	Rx	100%	<b>12,81</b>
		Limit	<b>12,81</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
<b>Nebivor®:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 30 szt. ◆  INN: <i>Nebivolol</i>   ATC: <b>C07AB12</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>640997</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b> Orion Pharma Poland Sp. o.o. Odpowiedniki: Nebivolol Krka [12,81], Nebivor® [13,31]	Rx	100%	<b>13,31</b>
		Limit	<b>13,01</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>3,50</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
<b>Nebivor®:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 100 szt. ◆  INN: <i>Nebivolol</i>   ATC: <b>C07AB12</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>641000</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b> Orion Pharma Poland Sp. o.o. Odpowiedniki: Nebivolol Genoptim [X], Nebivor® [40,60]	Rx	100%	<b>40,60</b>
		Limit	<b>40,60</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>10,67</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
<b>Nedal®:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 28 szt. ◆  INN: <i>Nebivolol</i>   ATC: <b>C07AB12</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>642809</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b> Polfa Warszawa SA Odpowiedniki: Nebivolol Genoptim [11,69], Ivineb [12,07], Nebivolol Aurovitas [12,14], NebivoLek [13,55], Daneb [14,21], Nebispes [15,96], Nebinad [16,19], Nebicard [16,48], Nebilet® [16,56], Nebilenin [17,31], Nedal® [18,34]	Rx	100%	<b>18,34</b>
		Limit	<b>12,14</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>8,46</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
<b>Neocate Syneo:</b> prosz. - op. 400 g  INN: <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>   ATC: <b>V06DF</b>   wyk: <b>EAN ~ 654677</b> (1) Postępowanie dietetyczne w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych u pacjentów do ukończenia 18 roku życia   Kat. ciąży: <b>E</b> Nutricia Polska Sp. z o.o.	Ś	100%	<b>158,52</b>
		Limit	<b>150,00</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>11,72</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>







Naszym wyborem

enarenal  
enalaprilii maleas

▼Neoparin Forte: inj. [roztw.] 120 mg/0,8 ml - 10 amp.-strzyk.	Rx	100%	234,23
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	34,47
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Enoxaparin sodium* | ATC: B01AB05 | wyk: B | EAN ~ 161126

(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 rż. - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepujących u kobiet ciężarnych po wszczęciu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub orlezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

SciencePharma Sp. z o.o. Sp. k.

▼Neoparin Forte: inj. [roztw.] 150 mg/ml - 10 amp.-strzyk.	Rx	100%	289,55
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	39,85
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Enoxaparin sodium* | ATC: B01AB05 | wyk: B | EAN ~ 161164

(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 rż. - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepujących u kobiet ciężarnych po wszczęciu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub orlezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

SciencePharma Sp. z o.o. Sp. k.

▼Neotigason: kaps. 10 mg - 30 szt.	Rx	100%	55,54
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	8,84
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Acitretin* | ATC: D05BB02 | wyk: B | EAN ~ 854462

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Actavis Group PTC ehf.

Odpowiedniki: Acitren [55,54], Neotigason [55,54]

▼Neotigason: kaps. 10 mg - 100 szt.	Rx	100%	163,21
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Acitretin* | ATC: D05BB02 | wyk: B | EAN ~ 697021

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Actavis Group PTC ehf.

Odpowiedniki: Acitren [163,21], Neotigason [163,21]

▼Neotigason: kaps. 25 mg - 100 szt.	Rx	100%	389,36
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,62
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Acitretin* | ATC: D05BB02 | wyk: B | EAN ~ 696925

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Actavis Group PTC ehf.

Odpowiedniki: Acitren [389,36], Neotigason [389,36]

Neurontin® 100: kaps. 100 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	22,82
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	9,13
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Gabapentin* | ATC: N03AX12 | wyk: B | EAN ~ 769216

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Pacdzka oporna na leczenie WP: Ból inny niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Upjohn EESV

Odpowiedniki: Gabacol [X], Gabapentin Aurovitas [17,37], Gabapentin Teva 100 mg [21,38], Neurontin® 100 [22,82]

Neurontin® 300: kaps. 300 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	63,16
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	15,68
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Gabapentin* | ATC: N03AX12 | wyk: B | EAN ~ 769315

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Pacdzka oporna na leczenie WP: Ból inny niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Upjohn EESV

Odpowiedniki: Gabacol [X], Gabapentin Teva - (IR) [46,50], Gabapentin Aurovitas [47,25], Gabapentin Teva 300 mg [50,68], Neurontin® 300 [63,16]

Neurontin® 400: kaps. 400 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	81,59
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	17,22
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Gabapentin* | ATC: N03AX12 | wyk: B | EAN ~ 769414

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Pacdzka oporna na leczenie WP: Ból inny niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Upjohn EESV

Odpowiedniki: Gabacol [X], Gabapentin Aurovitas [61,21], Gabapentin Teva 400 mg [67,28], Neurontin® 400 [81,59]

Neurontin® 600: tabl. powł. 600 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	117,30
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	19,50
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Gabapentin* | ATC: N03AX12 | wyk: B | EAN ~ 017422

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Pacdzka oporna na leczenie WP: Ból inny niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Upjohn EESV

Odpowiedniki: Gabapentin Teva 600 mg [100,47], Neurontin® 600 [117,30]

Neurontin® 800: tabl. powł. 800 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	135,39
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	4,98
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Gabapentin* | ATC: N03AX12 | wyk: B | EAN ~ 017521

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Pacdzka oporna na leczenie WP: Ból inny niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Upjohn EESV

Odpowiedniki: Gabapentin Teva 800 mg [133,90], Neurontin® 800 [135,39]

Neurotop® Retard : tabl. o przedl. uwalnianiu 300 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	17,01
		Limit	17,01
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Carbamazepine* | ATC: N03AF01 | wyk: B | EAN ~ 244515

(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerywanymi w obrębie OUN; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające; neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach innych niż określone w ChPL (5) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D

G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.

Neurotop® Retard : tabl. o przedl. uwalnianiu 600 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	32,16
		Limit	32,16
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Carbamazepine* | ATC: N03AF01 | wyk: B | EAN ~ 244614

(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacdzka WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerywanymi w obrębie OUN; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające; neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach innych niż określone w ChPL (5) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D

G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.

**Loperamid WZF**  
Loperamidi hydrochloridum

Przerwij niekończące się wizyty

Nowe opakowanie:  
**2 mg x 15 tabl.**

Nimesil®: granulaty do przyg. zaw. <b>100 mg</b> - 30 sasz. 2 g ◆	Rx	100%	18,09
		Limit	18,09
		50% <sup>(1)</sup>	9,05
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Nimesulide</i>	ATC: <b>M01AX17</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>040338</b>
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:D, T2:D, T3:X</b>			
Menarini International Oper. Luxemburg S.A.			
Nimvastid: kaps. twarde <b>1,5 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx-z	100%	14,90
		Limit	4,70
		30% <sup>(1)</sup>	11,61
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>700646</b>
(1) Choroba Alzheimerza WP: Ołpęnienie z ciałami Lewy'ego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Rivastigmin NeuroPharma [9,32], Ristidic [12,60], Nimvastid [14,90], Rivastigmin Orion [15,28], Rivaldo [21,55], Exelon® [134,00]			
Nimvastid: kaps. twarde <b>3 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx-z	100%	24,94
		Limit	9,39
		30% <sup>(1)</sup>	18,37
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>700684</b>
(1) Choroba Alzheimerza WP: Ołpęnienie z ciałami Lewy'ego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Exelon® [X], Rivastigmin NeuroPharma [18,06], Rivastigmin Orion [21,27], Ristidic [24,47], Nimvastid [24,94], Rivaldo [28,51]			
Nimvastid: kaps. twarde <b>3 mg</b> - 56 szt. ◆	Rx-z	100%	49,06
		Limit	18,79
		30% <sup>(1)</sup>	35,91
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>700707</b>
(1) Choroba Alzheimerza WP: Ołpęnienie z ciałami Lewy'ego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Rivastigmin NeuroPharma [35,29], Rivastigmin Orion [39,41], Ristidic [48,12], Nimvastid [49,06], Rivaldo [49,21], Exelon® [279,31]			
Nimvastid: kaps. twarde <b>4,5 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx-z	100%	37,12
		Limit	14,09
		30% <sup>(1)</sup>	27,26
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>700738</b>
(1) Choroba Alzheimerza WP: Ołpęnienie z ciałami Lewy'ego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Exelon® [X], Rivastigmin Orion [X], Rivastigmin NeuroPharma [26,81], Ristidic [35,28], Nimvastid [37,12], Rivaldo [37,25]			
Nimvastid: kaps. twarde <b>4,5 mg</b> - 56 szt. ◆	Rx-z	100%	72,67
		Limit	28,18
		30% <sup>(1)</sup>	52,94
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>700752</b>
(1) Choroba Alzheimerza WP: Ołpęnienie z ciałami Lewy'ego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Rivastigmin NeuroPharma [52,04], Rivastigmin Orion [55,58], Ristidic [71,95], Nimvastid [72,67], Rivaldo [72,91], Exelon® [288,53]			
Nimvastid: kaps. twarde <b>6 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx-z	100%	49,06
		Limit	18,79
		30% <sup>(1)</sup>	35,91
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>700790</b>
(1) Choroba Alzheimerza WP: Ołpęnienie z ciałami Lewy'ego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Exelon® [X], Rivastigmin Orion [X], Rivastigmin NeuroPharma [35,29], Ristidic [48,12], Nimvastid [49,06], Rivaldo [49,21]			
Nimvastid: kaps. twarde <b>6 mg</b> - 56 szt. ◆	Rx-z	100%	95,77
		Limit	37,57
		30% <sup>(1)</sup>	69,47
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>700844</b>
(1) Choroba Alzheimerza WP: Ołpęnienie z ciałami Lewy'ego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Exelon® [X], Rivastigmin NeuroPharma [68,26], Rivastigmin Orion [70,89], Ristidic [93,90], Nimvastid [95,77], Rivaldo [96,10]			

Nimvastid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>1,5 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx-z	100%	14,90
		Limit	4,70
		30% <sup>(1)</sup>	11,61
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>700660</b>
(1) Choroba Alzheimerza WP: Ołpęnienie z ciałami Lewy'ego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Krka Polska Sp. z o.o.			
Nimvastid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>3 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx-z	100%	24,94
		Limit	9,39
		30% <sup>(1)</sup>	18,37
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>700691</b>
(1) Choroba Alzheimerza WP: Ołpęnienie z ciałami Lewy'ego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Krka Polska Sp. z o.o.			
Nimvastid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>3 mg</b> - 56 szt. ◆	Rx-z	100%	48,45
		Limit	18,79
		30% <sup>(1)</sup>	35,30
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>700721</b>
(1) Choroba Alzheimerza WP: Ołpęnienie z ciałami Lewy'ego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Krka Polska Sp. z o.o.			
Nimvastid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>4,5 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx-z	100%	37,12
		Limit	14,09
		30% <sup>(1)</sup>	27,26
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>700745</b>
(1) Choroba Alzheimerza WP: Ołpęnienie z ciałami Lewy'ego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Krka Polska Sp. z o.o.			
Nimvastid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>4,5 mg</b> - 56 szt. ◆	Rx-z	100%	71,83
		Limit	28,18
		30% <sup>(1)</sup>	52,10
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>700769</b>
(1) Choroba Alzheimerza WP: Ołpęnienie z ciałami Lewy'ego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Krka Polska Sp. z o.o.			
Nimvastid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>6 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx-z	100%	49,06
		Limit	18,79
		30% <sup>(1)</sup>	35,91
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>700806</b>
(1) Choroba Alzheimerza WP: Ołpęnienie z ciałami Lewy'ego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Krka Polska Sp. z o.o.			
Nimvastid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>6 mg</b> - 56 szt. ◆	Rx-z	100%	94,70
		Limit	37,57
		30% <sup>(1)</sup>	68,40
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>700851</b>
(1) Choroba Alzheimerza WP: Ołpęnienie z ciałami Lewy'ego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Krka Polska Sp. z o.o.			
Nironovo SR: tabl. o przedl. uwalnianiu <b>2 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	40,60
		Limit	29,27
		30% <sup>(1)</sup>	20,11
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ropinirole</i>	ATC: <b>N04BC04</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>990085</b>
(1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Aparxon PR [29,93], Ceurolex SR [32,28], Aropilo SR [34,57], Repirol SR [37,31], Requip-Modutab [37,99], Ropodrin [38,57], ApoRopin [39,72], Rolpryna SR [40,29], Nironovo SR [40,60], Polpix SR [40,63]			
Nironovo SR: tabl. o przedl. uwalnianiu <b>4 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	77,35
		Limit	58,54
		30% <sup>(1)</sup>	36,37
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ropinirole</i>	ATC: <b>N04BC04</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>990092</b>
(1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Rolpryna SR -(IR) [54,97], Aparxon PR [56,36], Aropilo SR [66,44], Ceurolex SR [70,22], Repirol SR [70,79], Requip-Modutab [72,65], Ropodrin [73,30], ApoRopin [75,59], Rolpryna SR [76,74], Nironovo SR [77,35], Polpix SR [77,43]			
Nironovo SR: tabl. o przedl. uwalnianiu <b>8 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	148,37
		Limit	117,09
		30% <sup>(1)</sup>	66,41
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ropinirole</i>	ATC: <b>N04BC04</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>990108</b>
(1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Rolpryna SR -(IR) [103,59], Aparxon PR [111,19], Aropilo SR [123,10], Ceurolex SR [134,54], Repirol SR [136,03], Requip-Modutab [138,38], Ropodrin [140,27], ApoRopin [144,85], Rolpryna SR [147,14], Nironovo SR [148,37], Polpix SR [148,53]			



<b>Nitrendypina EGIS: tabl. 10 mg - 30 szt. (2 blistry)</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>5,84</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>4,33</td></tr> <tr><td>R<sup>(1)</sup></td><td>4,71</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	5,84	Limit	4,33	R <sup>(1)</sup>	4,71	S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<b>Nodofree Combi: krople do oczu [roztw.] (20 mg+ 5 mg/ml) - 1 but. 5 ml</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>26,49</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	26,49	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
100%	5,84																						
Limit	4,33																						
R <sup>(1)</sup>	4,71																						
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
100%	26,49																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	3,20																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Nitrendipine</i>   ATC: C08CA08   wyk: B   EAN ~ 694778 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układającą - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	Egis Polska Sp. z o.o.	INN: <i>Dorzolamide + Timolol</i>   ATC: S01ED51   wyk: B   EAN ~ 340674 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	Polfa Warszawa SA																				
<b>Nitrendypina EGIS: tabl. 10 mg - 60 szt. (4 blistry)</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>10,80</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>8,67</td></tr> <tr><td>R<sup>(1)</sup></td><td>5,33</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	10,80	Limit	8,67	R <sup>(1)</sup>	5,33	S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<b>Nodofree Combi: krople do oczu [roztw.] (20 mg+ 5 mg/ml) - 3 but. 5 ml</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>71,76</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>8,00</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	71,76	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	8,00	S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
100%	10,80																						
Limit	8,67																						
R <sup>(1)</sup>	5,33																						
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
100%	71,76																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	8,00																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Nitrendipine</i>   ATC: C08CA08   wyk: B   EAN ~ 694785 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układającą - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	Egis Polska Sp. z o.o.	(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	Polfa Warszawa SA																				
<b>Nitrendypina EGIS: tabl. 20 mg - 30 szt. (2 blistry)</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>8,75</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>8,67</td></tr> <tr><td>R<sup>(1)</sup></td><td>3,28</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	8,75	Limit	8,67	R <sup>(1)</sup>	3,28	S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<b>Nodofree Combi: krople do oczu [roztw.] (20 mg+ 5 mg/ml) - 1 but. 5 ml</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>22,90</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>8,44</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	22,90	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	8,44	S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
100%	8,75																						
Limit	8,67																						
R <sup>(1)</sup>	3,28																						
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
100%	22,90																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	8,44																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Nitrendipine</i>   ATC: C08CA08   wyk: B   EAN ~ 694761 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układającą - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	Egis Polska Sp. z o.o.	(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	Polfa Warszawa SA																				
<b>Nitrendypina EGIS: tabl. 20 mg - 60 szt. (4 blistry)</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>16,55</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>16,55</td></tr> <tr><td>R<sup>(1)</sup></td><td>6,40</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	16,55	Limit	16,55	R <sup>(1)</sup>	6,40	S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<b>Nodofree Combi: krople do oczu [roztw.] (20 mg/ml) - 1 but. 5 ml</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>54,86</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>7,21</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	54,86	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	7,21	S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
100%	16,55																						
Limit	16,55																						
R <sup>(1)</sup>	6,40																						
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
100%	54,86																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	7,21																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Nitrendipine</i>   ATC: C08CA08   wyk: B   EAN ~ 694754 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układającą - leczenie pierwszoliniowe (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	Egis Polska Sp. z o.o.	(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	Polfa Warszawa SA																				
<b>Nitromint®: aerozol podjęzykowy 400 µg/dawkę - 1 poj. 11 g (200 dawek)</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>18,29</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>18,29</td></tr> <tr><td>R<sup>(1)</sup></td><td>3,41</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	18,29	Limit	18,29	R <sup>(1)</sup>	3,41	S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<b>Nodofree Combi: krople do oczu [roztw.] 20 mg/ml - 3 but. 5 ml</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>30,41</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>7,12</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	30,41	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	7,12	S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
100%	18,29																						
Limit	18,29																						
R <sup>(1)</sup>	3,41																						
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
100%	30,41																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	7,12																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Glyceryl trinitrate</i>   ATC: C01DA02   wyk: A   EAN ~ 156825 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	PROTERAPIA Sp. z o.o.	(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	Polfa Warszawa SA																				
<b>Noacid: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt.</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>8,37</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>6,22</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>5,26</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	8,37	Limit	6,22	50% <sup>(1)</sup>	5,26	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Nodofree Combi: krople do oczu [roztw.] (20 mg+ 5 mg/ml) - 1 but. 5 ml</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>71,98</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>8,00</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	71,98	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	8,00	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	8,37																						
Limit	6,22																						
50% <sup>(1)</sup>	5,26																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	71,98																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	8,00																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Pantoprazole</i>   ATC: A02BC02   wyk: B   EAN ~ 645640 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B	Egis Polska Sp. z o.o.	(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	EAN ~ 067267																				
Odpowiedniki: Pamył 20 mg [6,32], Pantoprazole Genoptim [6,80], Ozzion [6,91], Pantoprazole Bluefish [7,13], Panrazol [7,23], Gerdin 20 mg [7,36], Panprazox [8,05], Noacid [8,37], Ranloc [9,02], Nolpaza® 20 mg tabletki dojelitowe [9,07], Controloc® 20 [9,80], Panzol [10,03], IPP 20 [10,14], Contix [10,48], Anesteloc® 20 [11,29]		Odpowiedniki: Otidorix [26,39], Nodofree Combi [26,49], Nodofree Combi [30,41], Rozacom [30,98], Cosopt® [32,35]	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA																				
<b>Noacid: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt.</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>16,00</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>12,43</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>9,79</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	16,00	Limit	12,43	50% <sup>(1)</sup>	9,79	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Nodofree Combi: krople do oczu [roztw.] (20 mg+ 5 mg/ml) - 3 but. 5 ml</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>41,02</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>11,17</td></tr> <tr><td>R<sup>(1)</sup></td><td>36,25</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	41,02	Limit	11,17	R <sup>(1)</sup>	36,25	S <sup>(2)</sup>	bezpł.		
100%	16,00																						
Limit	12,43																						
50% <sup>(1)</sup>	9,79																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	41,02																						
Limit	11,17																						
R <sup>(1)</sup>	36,25																						
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Pantoprazole</i>   ATC: A02BC02   wyk: B   EAN ~ 645732 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B	Egis Polska Sp. z o.o.	(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	EAN ~ 707782																				
Odpowiedniki: Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [11,61], Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [11,63], Pamył 40 mg [12,71], Pantoprazole Genoptim [12,71], Ozzion [12,93], Pantoprazole Bluefish [13,25], Gerdin 40 mg [13,46], Panrazol [13,71], Panprazox [15,37], Contix [15,47], Noacid [16,00], Ranloc [17,37], Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe [17,49], Controloc® 40 [17,52], Panzol [19,53], IPP 40 [19,66], Anesteloc® 40 [19,74]		Odpowiedniki: Otidorix [26,39], Nodofree Combi [26,49], Nodofree Combi [30,41], Rozacom [30,98], Cosopt® [32,35]	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA																				
<b>Nodofree: krople do oczu [roztw.] 20 mg/ml - 1 but. 5 ml</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>19,84</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>5,38</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	19,84	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	5,38	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Noliprel® Bi-Forte: tabl. 10/2,5 mg - 30 szt.</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>26,67</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>5,58</td></tr> <tr><td>R<sup>(1)</sup></td><td>24,29</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	26,67	Limit	5,58	R <sup>(1)</sup>	24,29	S <sup>(2)</sup>	bezpł.		
100%	19,84																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	5,38																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	26,67																						
Limit	5,58																						
R <sup>(1)</sup>	24,29																						
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Dorzolamide</i>   ATC: S01EC03   wyk: B   EAN ~ 344306 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	Polfa Warszawa SA	(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D	Servier Polska Sp. z o.o.																				
Odpowiedniki: Dorzolamid STADA [X], Dorzostill [X], Otidorix [X], Vizidor [19,67], Nodofree [19,84], Trusopt® [21,36], Nodom [22,90], Rozalin [24,04]		Odpowiedniki: Tertensif® Bi-Kombi [41,02], Noliprel® Bi-Forte [41,02]																					
<b>Nodofree: krople do oczu [roztw.] 20 mg/ml - 3 but. 5 ml</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>54,85</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>7,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	54,85	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	7,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Noliprel® Forte: tabl. powł. 5/1,25 mg - 30 szt.</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>26,67</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>5,58</td></tr> <tr><td>R<sup>(1)</sup></td><td>24,29</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	26,67	Limit	5,58	R <sup>(1)</sup>	24,29	S <sup>(2)</sup>	bezpł.		
100%	54,85																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	7,20																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	26,67																						
Limit	5,58																						
R <sup>(1)</sup>	24,29																						
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Dorzolamide</i>   ATC: S01EC03   wyk: B   EAN ~ 344313 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	Polfa Warszawa SA	(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D	Servier Polska Sp. z o.o.																				
Odpowiedniki: Vizidor [54,31], Nodofree [54,85], Nodom [54,86], Rozalin [56,31]		Odpowiedniki: Tertensif® Kombi [26,67], Noliprel® Forte [26,67]																					



<b>Nolpaza® 20 mg tabletki dojelitowe: tabl. dojelitowe 20 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	9,07
		Limit	6,22
		50% <sup>(1)</sup>	5,96
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Pantoprazole** ATC: **A02BC02** wyk: **B** EAN ~ **075003**  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Pamył 20 mg [6,32], Pantoprazole Genoptim [6,80], Ozion [6,91], Pantoprazole Bluefish [7,13], Panrazol [7,23], Gerdin 20 mg [7,36], Panprazol [8,05], Noacid [8,37], Ranloc [9,02], **Nolpaza® 20 mg tabletki dojelitowe [9,07]**, Controloc® 20 [9,80], Panzol [10,03], IPP 20 [10,14], Contix [10,48], Anesteloc® 20 [11,29]

<b>Nolpaza® 20 mg tabletki dojelitowe: tabl. dojelitowe 20 mg</b> - 56 szt. ◆	Rx	100%	17,36
		Limit	12,43
		50% <sup>(1)</sup>	11,15
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Pantoprazole** ATC: **A02BC02** wyk: **B** EAN ~ **075041**  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Pantoprazole Genoptim [12,71], Panrazol [13,36], Ozion [13,82], Panzol [13,90], Anesteloc® 20 [14,22], IPP 20 [14,70], **Nolpaza® 20 mg tabletki dojelitowe [17,36]**

<b>Nolpaza® 20 mg tabletki dojelitowe: tabl. dojelitowe 20 mg</b> - 90 szt. ◆	Rx	100%	21,46
		Limit	19,98
		50% <sup>(1)</sup>	11,47
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Pantoprazole** ATC: **A02BC02** wyk: **B** EAN ~ **845521**  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [11,61], Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [11,63], Pamył 40 mg [12,71], Pantoprazole Genoptim [12,71], Ozion [12,93], Pantoprazole Bluefish [13,25], Gerdin 40 mg [13,46], Panrazol [13,71], Panprazol [15,37], Contix [15,47], Noacid [16,00], Ranloc [17,37], **Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe [17,49]**, Controloc® 40 [17,52], Panzol [19,53], IPP 40 [19,66], Anesteloc® 40 [19,74]

<b>Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe: tabl. dojelitowe 40 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	17,49
		Limit	12,43
		50% <sup>(1)</sup>	11,28
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Pantoprazole** ATC: **A02BC02** wyk: **B** EAN ~ **075089**  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [11,61], Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [11,63], Pamył 40 mg [12,71], Pantoprazole Genoptim [12,71], Ozion [12,93], Pantoprazole Bluefish [13,25], Gerdin 40 mg [13,46], Panrazol [13,71], Panprazol [15,37], Contix [15,47], Noacid [16,00], Ranloc [17,37], **Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe [17,49]**, Controloc® 40 [17,52], Panzol [19,53], IPP 40 [19,66], Anesteloc® 40 [19,74]

<b>Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe: tabl. dojelitowe 40 mg</b> - 56 szt. ◆	Rx	100%	33,44
		Limit	24,87
		50% <sup>(1)</sup>	21,01
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Pantoprazole** ATC: **A02BC02** wyk: **B** EAN ~ **075126**  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [21,78], Pantoprazole Genoptim [22,03], IPP 40 [25,00], Anesteloc® 40 [25,49], Ozion [26,33], **Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe [33,44]**

<b>Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe: tabl. dojelitowe 40 mg</b> - 90 szt. ◆	Rx	100%	40,44
		Limit	39,97
		50% <sup>(1)</sup>	20,46
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Pantoprazole** ATC: **A02BC02** wyk: **B** EAN ~ **845552**  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Krka Polska Sp. z o.o.

<b>Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR): tabl. dojelitowe 40 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	11,61
		Limit	11,61
		50% <sup>(1)</sup>	5,81
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Pantoprazole** ATC: **A02BC02** wyk: **B** EAN ~ **145978**  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [11,61], Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [11,63], Pamył 40 mg [12,71], Pantoprazole Genoptim [12,71], Ozion [12,93], Pantoprazole Bluefish [13,25], Gerdin 40 mg [13,46], Panrazol [13,71], Panprazol [15,37], Contix [15,47], Noacid [16,00], Ranloc [17,37], Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe [17,49], Controloc® 40 [17,52], Panzol [19,53], IPP 40 [19,66], Anesteloc® 40 [19,74]

<b>Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR): tabl. dojelitowe 40 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	11,63
		Limit	11,63
		50% <sup>(1)</sup>	5,82
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Pantoprazole** ATC: **A02BC02** wyk: **B** EAN ~ **144896**  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Pharmapoint SA

Odpowiedniki: Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [11,61], **Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [11,63]**, Pamył 40 mg [12,71], Pantoprazole Genoptim [12,71], Ozion [12,93], Pantoprazole Bluefish [13,25], Gerdin 40 mg [13,46], Panrazol [13,71], Panprazol [15,37], Contix [15,47], Noacid [16,00], Ranloc [17,37], Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe [17,49], Controloc® 40 [17,52], Panzol [19,53], IPP 40 [19,66], Anesteloc® 40 [19,74]

<b>Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR): tabl. dojelitowe 40 mg</b> - 56 szt. ◆	Rx	100%	21,73
		Limit	21,73
		50% <sup>(1)</sup>	10,87
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Pantoprazole** ATC: **A02BC02** wyk: **B** EAN ~ **145979**  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Delfarma Sp. z o.o.

<b>Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR): tabl. dojelitowe 40 mg</b> - 56 szt. ◆	Rx	100%	21,78
		Limit	21,78
		50% <sup>(1)</sup>	10,89
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Pantoprazole** ATC: **A02BC02** wyk: **B** EAN ~ **144897**  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Pharmapoint SA

Odpowiedniki: **Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [21,78]**, Pantoprazole Genoptim [22,03], IPP 40 [25,00], Anesteloc® 40 [25,49], Ozion [26,33], **Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe [33,44]**

<b>Normeg: tabl. powł. 250 mg</b> - 50 szt. ◆	Rx	100%	15,94
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	6,95
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: **Levetiracetam** ATC: **N03AX14** wyk: **B** EAN ~ **998135**  
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Zentiva PL Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam NeuroPharma [X], Levetiracetam Aurovitas [14,36], Levetiracetam Accord [14,46], Polkepral [14,46], **Normeg [15,94]**, Trund [16,85], Cezarius [19,72], Vetrina [19,95], Kepra® [47,97]

<b>Normeg: tabl. powł. 500 mg</b> - 50 szt. ◆	Rx	100%	30,42
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	9,25
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: **Levetiracetam** ATC: **N03AX14** wyk: **B** EAN ~ **998180**  
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Zentiva PL Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam Aurovitas [27,30], Polkepral [27,47], Levetiracetam Accord [27,48], **Normeg [30,42]**, Levebon [31,07], Cezarius [32,26], Levetiracetam NeuroPharma [32,26], Trund [32,26], Vetrina [38,47], Kepra® [94,41]

<b>Normeg: tabl. powł. 500 mg</b> - 100 szt. ◆	Rx	100%	51,15
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	5,97
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: **Levetiracetam** ATC: **N03AX14** wyk: **B** EAN ~ **099820**  
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Zentiva PL Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], **Normeg [51,15]**, Levetiracetam Accord [51,52], Polkepral [51,52], Levetiracetam NeuroPharma [61,07], Trund [61,07], Kepra® [186,26]

<b>Normeg: tabl. powł. 750 mg</b> - 50 szt. ◆	Rx	100%	43,96
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	10,60
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: **Levetiracetam** ATC: **N03AX14** wyk: **B** EAN ~ **998258**  
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Zentiva PL Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam Aurovitas [39,27], Levetiracetam Accord [39,53], Polkepral [39,53], **Normeg [43,96]**, Levetiracetam NeuroPharma [46,71], Trund [46,71], Cezarius [55,30], Vetrina [56,01], Kepra® [140,37]

## W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

Normeg: tabl. powł. 750 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	74,05	
		Limit	0,00	
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
		R <sup>(3)</sup>	6,26	
INN: <i>Levetiracetam</i>		ATC: N03AX14	wyk: B	EAN ~ 099827
(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zentiva PL Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Normeg [74,05], Levetiracetam Accord [74,57], Levetiracetam NeuroPharma [88,92], Keppra® [277,10]				
Normeg: tabl. powł. 1000 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	57,40	
		Limit	0,00	
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
		R <sup>(3)</sup>	12,22	
INN: <i>Levetiracetam</i>		ATC: N03AX14	wyk: B	EAN ~ 998302
(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zentiva PL Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam Aurovitas [51,15], Levetiracetam Accord [51,52], Polkepral [51,52], Normeg [57,40], Levebon [58,70], Cezarius [61,07], Levetiracetam NeuroPharma [61,07], Trund [61,07], Vetira [73,46]				
Normeg: tabl. powł. 1000 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	96,75	
		Limit	0,00	
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
		R <sup>(3)</sup>	7,11	
INN: <i>Levetiracetam</i>		ATC: N03AX14	wyk: B	EAN ~ 099835
(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zentiva PL Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Normeg [96,75], Levetiracetam Accord [97,49], Polkepral [97,49], Trund [115,82], Levetiracetam NeuroPharma [116,58]				
Normodipine®: tabl. 5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	7,34	
		Limit	7,34	
		30% <sup>(1)</sup>	2,20	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.	
INN: <i>Amlodipine</i>		ATC: C08CA01	wyk: B	EAN ~ 993017
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Almiden [X], Amlodipine Aurobindo [X], Finamlox [X], Amlodipine Aurovitas [6,15], Amlodipine Bluefish [6,86], Amlomyl [7,02], Normodipine® [7,34], Amlonor® [7,56], ApoAmlor 5 [7,78], Cardilopin [7,99], Agen® 5 [8,03], Adipine [8,21], Vilpin® [8,26], Alneta [8,48], Tenox® [8,48], Aldan® [8,64], Amlopin® [9,23], Amlozek® [13,79]				
Normodipine®: tabl. 10 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	13,58	
		Limit	13,58	
		30% <sup>(1)</sup>	4,07	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.	
INN: <i>Amlodipine</i>		ATC: C08CA01	wyk: B	EAN ~ 993116
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Almiden [X], Amlodipine Aurobindo [X], Finamlox [X], Amlodipine Aurovitas [11,03], Amlodipine Bluefish [11,72], Amlomyl [12,00], Normodipine® [13,58], Adipine [13,62], Amlonor® [14,55], Amlopin® - (IR) [14,68], Amlopin® - (IR) [14,68], Amlopin® - (IR) [14,73], Cardilopin [14,85], Agen® 10 [14,90], ApoAmlor 10 [14,98], Vilpin® [15,65], Aldan® [15,88], Alneta [15,88], Tenox® [15,88], Amlopin® [17,54], Amlozek® [20,26]				
Nossin: tabl. powł. 5 mg - 28 szt.	Rx	100%	14,09	
		Limit	12,56	
		30% <sup>(1)</sup>	5,30	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.	
INN: <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>		ATC: R06AE09	wyk: B	EAN ~ 060589
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke'go - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Apotec Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce				
Odpowiedniki: Lirra [14,06], Nossin [14,09], Zenaro [15,56], Cezera [18,58], Zyxx® [19,10], Contrahist [19,45], Xyzal® [31,87]				
Novo-Helisen® Depot Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego: inj. podsk. [zaw.] [podtrz. 708 Dermatophagoides farinae50%+725 Dermatophagoides pteronyssinus50%] - 2 fiol. 4,5 ml (stęż. 3)	Rx	100%	1162,09	
		Limit	0,00	
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	
		R <sup>(2)</sup>	33,60	
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.	
INN: <i>Allergen extracts</i>		ATC: V01AA	wyk: B	EAN ~ 076687
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sun-Farm Sp. z o.o.				
Novo-Helisen® Depot Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego: inj. podsk. [zaw.] [począł. 708 Dermatophagoides farinae50%+725 Dermatophagoides pteronyssinus50%] - 3 fiol. 4,5 ml (stęż. 1-3)	Rx	100%	409,55	
		Limit	0,00	
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	
		R <sup>(2)</sup>	19,41	
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.	
INN: <i>Allergen extracts</i>		ATC: V01AA	wyk: B	EAN ~ 000111
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sun-Farm Sp. z o.o.				
Novo-Helisen® Depot Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego: inj. podsk. [zaw.] [podtrz. 708 Dermatophagoides farinae50%+725 Dermatophagoides pteronyssinus50%] - 1 fiol. 4,5 ml (stęż. 3)	Rx	100%	589,33	
		Limit	0,00	
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	
		R <sup>(2)</sup>	25,08	
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.	
INN: <i>Allergen extracts</i>		ATC: V01AA	wyk: B	EAN ~ 104706
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sun-Farm Sp. z o.o.				
NovoMix® 30 Penfill®: inj. [zaw.] 100 j./ml - 5 wkł. 3 ml	Rx	100%	135,05	
		Limit	0,00	
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
		R <sup>(3)</sup>	38,27	
INN: <i>Insulin aspart</i>		ATC: A10AD05	wyk: B	EAN ~ 879915
(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Cukrzyca(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Fiasp® [129,32], NovoRapid® Penfill® [131,50], NovoMix® 50 Penfill® [135,05], NovoMix® 30 Penfill® [135,05]				
NovoMix® 50 Penfill®: inj. [zaw.] 100 j./ml - 5 wkł. 3 ml	Rx	100%	135,05	
		Limit	0,00	
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
		R <sup>(3)</sup>	38,27	
INN: <i>Insulin aspart</i>		ATC: A10AD05	wyk: B	EAN ~ 614981
(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Cukrzyca(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Fiasp® [129,32], NovoRapid® Penfill® [131,50], NovoMix® 30 Penfill® [135,05], NovoMix® 50 Penfill® [135,05]				
NovoRapid®: inj. [roztw.] 100 j./ml - 1 fiol. 10 ml	Rx	100%	80,99	
		Limit	0,00	
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
		R <sup>(3)</sup>	17,00	
INN: <i>Insulin aspart</i>		ATC: A10AB05	wyk: B	EAN ~ 136966
(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Cukrzyca(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Fiasp® [80,99], NovoRapid® [80,99]				
NovoRapid® Penfill®: inj. [roztw.] 100 j./ml - 5 wkł. 3 ml	Rx	100%	131,50	
		Limit	0,00	
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
		R <sup>(3)</sup>	34,72	
INN: <i>Insulin aspart</i>		ATC: A10AB05	wyk: B	EAN ~ 451814
(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Cukrzyca(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Fiasp® [129,32], NovoRapid® Penfill® [131,50], NovoMix® 30 Penfill® [135,05], NovoMix® 50 Penfill® [135,05]				
Nutramigen® 1 LGG Complete: prosz. do przyg. roztw. - 1 op. 400 g	Sz	100%	56,35	
		Limit	28,30	
		30% <sup>(1)</sup>	36,54	
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.	
INN: <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>		ATC: V06DF	wyk:	EAN ~ 038819
(1) Alergia na białka mleka krowiego (BMK), objawy alergii na BMK lub podejrzenie alergii na BMK ze względu na występujące objawy, jak również nietolerancja laktozy, nietolerancja sacharozy, a także nadwrażliwość na inne białka (np. białka sojowe)   Kat. ciąży: Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Nutramigen® 1 LGG Complete [56,35], Nutramigen® 2 LGG Complete [62,29], Neocate® Junior [129,72]				
Nutramigen® 2 LGG Complete: prosz. do przyg. roztw. - 1 op. 400 g	Sz	100%	62,29	
		Limit	56,69	
		30% <sup>(1)</sup>	22,61	
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.	
INN: <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>		ATC: V06DF	wyk:	EAN ~ 038826
(1) Alergia na białka mleka krowiego (BMK), objawy alergii na BMK lub podejrzenie alergii na BMK ze względu na występujące objawy, jak również nietolerancja laktozy, nietolerancja sacharozy, a także nadwrażliwość na inne białka (np. białka sojowe)   Kat. ciąży: Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Nutramigen® 1 LGG Complete [56,35], Nutramigen® 2 LGG Complete [62,29], Neocate® Junior [129,72]				



<b>Nutramigen® PURAMINO:</b> prosz. do przyg. zaw. odżywczej - 1 puszka 400 g	Sz	100%	<b>109,86</b>
		Limit	<b>109,86</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>3,20</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>

INN: **Dieta eliminacyjna mlekozastępcza** ATC: V06DF wyk: EAN ~ 027554  
 (1) Stosowanie dietetyczne u niemowląt od urodzenia i dzieci z ciężką postacią alergii na białko mleka krowiego oraz nietolerancją różnego rodzaju żywności, w których zastosowanie w postępowaniu dietetycznym hydrolyzatów o znacznym stopniu hydrolyzy nie przyniosło efektu, a także w alergii na białko sojowe i w przypadkach, gdy wskazane jest zastosowanie mieszanki elementarnej zwyčajnej | Kat. ciąży: N  
 Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o.o.

<b>Nutramigen® PURAMINO JUNIOR:</b> proszek - 1 puszka 400 g	Sz	100%	<b>127,60</b>
		Limit	<b>127,60</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>3,20</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>

INN: **Dieta eliminacyjna mlekozastępcza** ATC: V06DF wyk: EAN ~ 037201  
 (1) Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia w ciężkiej alergii na białko mleka krowiego, w alergii wielopokarmowej i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna | Kat. ciąży: N  
 Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o.o.

<b>Oestrogel:</b> żel przezskórny <b>0,75 mg/dawkę</b> - 1 poj. 80 g	Rx	100%	<b>45,66</b>
		Limit	<b>40,10</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>17,59</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Estradiol** ATC: G03CA03 wyk: B EAN ~ 145655  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Transseksualizm (F64.0)(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
 Besins Healthcare S.A.

<b>Oftensin®:</b> krople do oczu [roztw.] <b>2,5 mg/ml</b> - 1 but. 5 ml	Rx	100%	<b>5,51</b>
		Limit	<b>5,51</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>1,65</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Timolol** ATC: S01ED01 wyk: B EAN ~ 073610  
 (1) Jaskra(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

<b>Oftensin®:</b> krople do oczu [roztw.] <b>5 mg/ml</b> - 1 but. 5 ml	Rx	100%	<b>5,51</b>
		Limit	<b>5,51</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>1,65</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Timolol** ATC: S01ED01 wyk: B EAN ~ 073719  
 (1) Jaskra(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: **Oftensin®** [5,51], **Cusimolol®** 0,5% [6,54]

<b>Oftidorix:</b> krople do oczu [roztw.] <b>(20 mg+ 5 mg)/ml</b> - 1 but. 5 ml	Rx	100%	<b>26,39</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Dorzolamide + Timolol** ATC: S01ED51 wyk: B EAN ~ 866144  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Bausch Health

Odpowiedniki: **Oftidorix** [26,39], **Nodofree Combi** [26,49], **Nodom Combi** [30,41], **Rozacom** [30,98], **Cosop®** [32,35]

<b>OKmeter Core:</b> test diagnostyczny do szybkich oznaczeń - 50 szt.	WM	100%	<b>35,43</b>
		Limit	<b>35,43</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>10,63</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>

INN: **Glukoza we krwi** ATC: V07AD wyk: EAN ~ 561836  
 (1) Cukrzyca(2) Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięcie insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | Kat. ciąży: N  
 Biovico Sp. z o.o.

Odpowiedniki: **DIABUE ToGo** [35,43], **OKmeter Core** [35,43], **Wellion SymPhar** [36,63], **G-BIO** [37,55], **Multisure GK** [37,66], **Everchek** [37,77], **Examedin® Fast** [38,12], **GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A** [38,23], **Cera-Chek 1 Code** [38,33], **VivaChek Ino** [38,33], **VivaChek Ino** [38,33], **One Touch Select Plus** [38,35], **GlucoCard 01 Sensor** [38,66], **Glucosense®** [38,77], **EverCare** [38,80], **GensuCare** [38,80], **Optium Xido** [38,88], **Contour Plus** [39,09], **Contour TS** [39,09], **iXell®** [39,15], **Abra** [39,27], **Accu-Chek® Performa** [39,27], **Diagnostic Gold Strip** [39,49], **Glucomaxx®** [39,55]

<b>Olanzapina Mylan:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>42,83</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** ATC: N05AH03 wyk: B EAN ~ 697526  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Mylan Pharmaceuticals Ltd

Odpowiedniki: **Olanzin** - (IR) [X], **Ranofren** [33,38], **Zalasta®** - (IR) [35,25], **Zalasta®** - (IR) [35,27], **Olanzarán** [39,75], **Olanzapina Mylan** [42,83], **Olazax** [44,55], **Olpinat®** [44,78], **Olanzin** [45,56], **Olanzapine Apotex** [47,73], **Zalasta®** [48,38], **Egolanza** [49,36], **Olzapin** [50,51]

<b>Olanzapina Mylan:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>80,36</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** ATC: N05AH03 wyk: B EAN ~ 697649  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Mylan Pharmaceuticals Ltd

Odpowiedniki: **Olanzin** - (IR) [X], **Zalasta®** - (IR) [60,09], **Zalasta®** - (IR) [65,24], **Zalasta®** - (IR) [76,23], **Olanzapine Mylan** - (IR) [77,32], **Olanzarán** [79,67], **Olanzapina Mylan** [80,36], **Olazax** [83,79], **Olpinat®** [86,54], **Egolanza** - (IR) [89,74], **Egolanza** - (IR) [90,20], **Olanzin** [90,34], **Zalasta®** [91,44], **Olzapin** [92,44], **Egolanza** [93,41], **Olanzapine Apotex** [93,71], **Ranofren** [99,50]

<b>Olanzapina Mylan:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 98 szt.	Rx	100%	<b>231,21</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>10,45</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** ATC: N05AH03 wyk: B EAN ~ 926870  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Mylan Pharmaceuticals Ltd

Odpowiedniki: **Olanzapina Mylan** [231,21], **Olanzapine Apotex** [308,49]

<b>Olanzapina Mylan:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>5 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>42,83</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** ATC: N05AH03 wyk: B EAN ~ 136451  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Viatris Ltd

Odpowiedniki: **Olanzapine Apotex** [18,00], **Olanzapine Bluefish** [30,99], **Anzorin** [39,05], **Zopriodoxin** [42,26], **Olanzapina Mylan** [42,83], **Olazax Disperzi** [44,55], **Zalasta®** [48,38], **Zolaxa Rapid** [48,40], **Olanzapine Lekam** [50,96], **Zolafren® Swift** [52,07]

<b>Olanzapina Mylan:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>10 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>80,36</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** ATC: N05AH03 wyk: B EAN ~ 136475  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Viatris Ltd

Odpowiedniki: **Olanzapine Bluefish** [56,65], **Anzorin** [72,80], **Olanzarán** [79,67], **Zopriodoxin** [79,96], **Olanzapina Mylan** [80,36], **Olazax Disperzi** [83,79], **Zalasta®** [91,44], **Olanzapine Apotex** [93,71], **Zolaxa Rapid** [95,65], **Olanzapine Lekam** [96,61], **Zolafren® Swift** [98,85]

<b>Olanzapina Mylan:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>15 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>106,65</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>4,48</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** ATC: N05AH03 wyk: B EAN ~ 113649  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Viatris Ltd

Odpowiedniki: **Olanzapine Bluefish** [80,37], **Anzorin** [104,01], **Olanzapina Mylan** [106,65], **Olazax Disperzi** [121,07], **Zopriodoxin** [125,21], **Zalasta®** [132,56], **Olanzapine Lekam** [140,30], **Zolaxa Rapid** [142,22], **Zolafren® Swift** [143,66]

<b>Olanzapina Mylan:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>20 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>139,07</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>5,97</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** ATC: N05AH03 wyk: B EAN ~ 113651  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Viatris Ltd

Odpowiedniki: **Anzorin** [135,18], **Olanzapina Mylan** [139,07], **Zopriodoxin** [145,49], **Olazax Disperzi** [158,31], **Zalasta®** [173,61], **Olanzapine Apotex** [174,94], **Olanzapine Lekam** [183,96], **Zolafren® Swift** [188,43], **Zolaxa Rapid** [188,44]

<b>Olanzapine +pharma:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>48,51</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** ATC: N05AH03 wyk: B EAN ~ 014006  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 +pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: **Olanzin** [23,76], **Olanzin** - (IR) [38,90], **Olanzapine +pharma** [48,51], **Zolaxa** [51,14], **Zolafren®** [51,98], **Olzapin** [54,06], **Zolafren®** [55,78]

<b>Olanzapine +pharma: tabl. 10 mg - 30 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>91,44</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	91,44	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Olanzapine Apotex: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>174,94</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>5,97</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	174,94	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	5,97	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	91,44																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	3,20																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	174,94																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	5,97																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 014007 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C +pharma Polska Sp. z o.o.		INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 793402 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce																					
<b>Olanzapine Apotex: tabl. powł. 5 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>47,73</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>5,00</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	47,73	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	5,00	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Olanzapine Bluefish: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>30,99</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	30,99	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	47,73																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	5,00																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	30,99																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	3,20																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 793341 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce		INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 865901 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Bluefish Pharmaceuticals																					
<b>Olanzapine Apotex: tabl. powł. 5 mg - 98 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>159,38</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>5,23</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	159,38	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	5,23	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Olanzapine Bluefish: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>56,65</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	56,65	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	159,38																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	5,23																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	56,65																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	3,20																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 230586 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce		INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 865956 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Bluefish Pharmaceuticals																					
<b>Olanzapine Apotex: tabl. powł. 10 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>93,71</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>5,05</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	93,71	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	5,05	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Olanzapine Bluefish: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>80,37</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>4,48</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	80,37	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	4,48	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	93,71																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	5,05																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	80,37																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	4,48																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 793365 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce		INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 866021 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Bluefish Pharmaceuticals																					
<b>Olanzapine Apotex: tabl. powł. 10 mg - 98 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>308,49</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>10,45</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	308,49	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	10,45	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Olanzapine Lekam: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>50,96</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>8,23</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	50,96	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	8,23	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	308,49																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	10,45																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	50,96																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	8,23																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 230593 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce		INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 866021 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Bluefish Pharmaceuticals																					
<b>Olanzapine Apotex: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 98 szt. (blist.) ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>154,23</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>5,23</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	154,23	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	5,23	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Olanzapine Lekam: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>96,61</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>7,95</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	96,61	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	7,95	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	154,23																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	5,23																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	96,61																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	7,95																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 230609 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce		INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 763443 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.																					
<b>Olanzapine Apotex: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>93,71</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>5,05</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	93,71	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	5,05	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Olanzapine Lekam: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>140,30</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>6,99</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	140,30	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	6,99	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	93,71																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	5,05																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	140,30																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	6,99																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 793389 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce		INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 763467 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.																					
<b>Olanzapine Apotex: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 98 szt. (blist.) ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>296,47</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>10,45</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	296,47	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	10,45	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Olanzapine Lekam: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>140,30</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>6,99</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	140,30	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	6,99	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	296,47																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	10,45																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	140,30																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	6,99																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 230616 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce		INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 763481 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.																					



Naszym wyborem **enarenal**  
enalapryli maleas

<b>Olanzapine Lekam:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>20 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>183,96</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>6,21</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** ATC: **N05AH03** wyk: **B** EAN ~ **763498**  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Anzolin [135,18], Olanzapina Mylan [139,07], Zopriodoxin [145,49], Olazax Disperzi [158,31], Zalasta® [173,61], Olanzapine Apotex [174,94], **Olanzapine Lekam [183,96]**, Zolafren® Swift [188,43], Zolaxa Rapid [188,44]

<b>Olanzapine Mylan - (IR):</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>77,32</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** ATC: **N05AH03** wyk: **B** EAN ~ **860045**  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Olanzin - (IR) [X], Zalasta® - (IR) [60,09], Zalasta® - (IR) [65,24], Zalasta® - (IR) [76,23], **Olanzapine Mylan - (IR) [77,32]**, Olanzarar [79,67], Olanzapina Mylan [80,36], Olazax [83,79], Olpinat® [86,54], Egolanza - (IR) [89,74], Egolanza - (IR) [90,20], Olanzin [90,34], Zalasta® [91,44], Olzapin [92,44], Egolanza [93,41], Olanzapine Apotex [93,71], Ranofren [99,50]

<b>Olanzarar:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>39,75</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** ATC: **N05AH03** wyk: **B** EAN ~ **766895**  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Aristo Pharma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Olanzin - (IR) [X], Ranofren [33,38], Zalasta® - (IR) [35,25], Zalasta® - (IR) [35,27], **Olanzarar [39,75]**, Olanzapina Mylan [42,83], Olazax [44,55], Olpinat® [44,78], Olanzin [45,56], Olanzapine Apotex [47,73], Zalasta® [48,38], Egolanza [49,36], Olzapin [50,51]

<b>Olanzarar:</b> tabl. <b>10 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>79,67</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** ATC: **N05AH03** wyk: **B** EAN ~ **766901**  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Aristo Pharma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Olanzin - (IR) [X], Zalasta® - (IR) [60,09], Zalasta® - (IR) [65,24], Zalasta® - (IR) [76,23], Olanzapine Mylan - (IR) [77,32], **Olanzarar [79,67]**, Olanzapina Mylan [80,36], Olazax [83,79], Olpinat® [86,54], Egolanza - (IR) [89,74], Egolanza - (IR) [90,20], Olanzin [90,34], Zalasta® [91,44], Olzapin [92,44], Egolanza [93,41], Olanzapine Apotex [93,71], Ranofren [99,50]

<b>Olanzarar:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>10 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>79,67</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** ATC: **N05AH03** wyk: **B** EAN ~ **767052**  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Aristo Pharma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Olanzapine Bluefish [56,65], Anzolin [72,80], **Olanzarar [79,67]**, Zopriodoxin [79,96], Olanzapina Mylan [80,36], Olazax Disperzi [83,79], Zalasta® [91,44], Olanzapine Apotex [93,71], Zolaxa Rapid [95,65], Olanzapine Lekam [96,61], Zolafren® Swift [98,85]

<b>Olanzin:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>45,56</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** ATC: **N05AH03** wyk: **B** EAN ~ **637126**  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Actavis Group PTC ehf.

Odpowiedniki: Olanzin - (IR) [X], Ranofren [33,38], Zalasta® - (IR) [35,25], Zalasta® - (IR) [35,27], Olanzarar [39,75], Olanzapina Mylan [42,83], Olazax [44,55], Olpinat® [44,78], **Olanzin [45,56]**, Olanzapine Apotex [47,73], Zalasta® [48,38], Egolanza [49,36], Olzapin [50,51]

<b>Olanzin:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>90,34</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** ATC: **N05AH03** wyk: **B** EAN ~ **637218**  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Actavis Group PTC ehf.

Odpowiedniki: Olanzin - (IR) [X], Zalasta® - (IR) [60,09], Zalasta® - (IR) [65,24], Zalasta® - (IR) [76,23], Olanzapine Mylan - (IR) [77,32], Olanzarar [79,67], Olanzapina Mylan [80,36], Olazax [83,79], Olpinat® [86,54], Egolanza - (IR) [89,74], Egolanza - (IR) [90,20], **Olanzin [90,34]**, Zalasta® [91,44], Olzapin [92,44], Egolanza [93,41], Olanzapine Apotex [93,71], Ranofren [99,50]

<b>Olanzin - (IR):</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>38,90</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** ATC: **N05AH03** wyk: **B** EAN ~ **136974**  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Olanzin [23,76], **Olanzin - (IR) [38,90]**, Olanzapine +pharma [48,51], Zolaxa [51,14], Zolafren® [51,98], Olzapin [54,06], Zolafren® [55,78]

<b>Olanzin - (IR):</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>73,12</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** ATC: **N05AH03** wyk: **B** EAN ~ **136978**  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Olanzin [45,20], **Olanzin - (IR) [73,12]**, Olanzapine +pharma [91,44], Zolaxa [97,35], Olzapin [98,42], Zolafren® [105,97], Zolafren® [105,97]

<b>Olazax:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>44,55</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** ATC: **N05AH03** wyk: **B** EAN ~ **782239**  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Neuroxpharm Arzneimittel GmbH

Odpowiedniki: Olanzin - (IR) [X], Ranofren [33,38], Zalasta® - (IR) [35,25], Zalasta® - (IR) [35,27], Olanzarar [39,75], Olanzapina Mylan [42,83], **Olazax [44,55]**, Olpinat® [44,78], Olanzin [45,56], Olanzapine Apotex [47,73], Zalasta® [48,38], Egolanza [49,36], Olzapin [50,51]

<b>Olazax:</b> tabl. <b>10 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>83,79</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** ATC: **N05AH03** wyk: **B** EAN ~ **782246**  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Neuroxpharm Arzneimittel GmbH

Odpowiedniki: Olanzin - (IR) [X], Zalasta® - (IR) [60,09], Zalasta® - (IR) [65,24], Zalasta® - (IR) [76,23], Olanzapine Mylan - (IR) [77,32], Olanzarar [79,67], Olanzapina Mylan [80,36], **Olazax [83,79]**, Olpinat® [86,54], Egolanza - (IR) [89,74], Egolanza - (IR) [90,20], Olanzin [90,34], Zalasta® [91,44], Olzapin [92,44], Egolanza [93,41], Olanzapine Apotex [93,71], Ranofren [99,50]

<b>Olazax Disperzi:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>5 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>44,55</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** ATC: **N05AH03** wyk: **B** EAN ~ **782253**  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Neuroxpharm Arzneimittel GmbH

Odpowiedniki: Olanzapine Apotex [18,00], Olanzapine Bluefish [30,99], Anzolin [39,05], Zopriodoxin [42,26], Olanzapina Mylan [42,83], **Olazax Disperzi [44,55]**, Zalasta® [48,38], Zolaxa Rapid [48,40], Olanzapine Lekam [50,96], Zolafren® Swift [52,07]

<b>Olazax Disperzi:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>10 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>83,79</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** ATC: **N05AH03** wyk: **B** EAN ~ **782260**  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Neuroxpharm Arzneimittel GmbH

Odpowiedniki: Olanzapine Apotex [18,00], Anzolin [72,80], Olanzarar [79,67], Olanzapina Mylan [80,36], **Olazax Disperzi [83,79]**, Zalasta® [91,44], Olanzapine Apotex [93,71], Zolaxa Rapid [95,65], Olanzapine Lekam [96,61], Zolafren® Swift [98,85]

<b>Olazax Disperzi:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>15 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>121,07</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>4,48</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** ATC: **N05AH03** wyk: **B** EAN ~ **094539**  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Neuroxpharm Arzneimittel GmbH

Odpowiedniki: Olanzapine Bluefish [80,37], Anzolin [104,01], Olanzapina Mylan [106,65], **Olazax Disperzi [121,07]**, Zopriodoxin [125,21], Zalasta® [132,56], Olanzapine Lekam [140,30], Zolaxa Rapid [142,22], Zolafren® Swift [143,66]



<b>Olazax Disperzi:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>20 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>158,31</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>5,97</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 925186 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Neuroxpharm Arzneimittel GmbH			
<b>Olafen® 75:</b> inj. [roztw.] ( <b>37,5 mg+ 10 mg/ml</b> ) - 5 amp. 2 ml	Rx	100% <b>12,39</b> Limit <b>8,80</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>7,99</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Diclofenac sodium + Lidocaine hydrochloride</i>   ATC: M01AB05   wyk: B   EAN ~ 161119 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:B, T2:B, T3:D   Teva B.V.			
<b>Olafen® SR 75:</b> tabl. powł. o przedl. uwalnianiu <b>75 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>15,37</b> Limit <b>11,50</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>9,62</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Diclofenac sodium</i>   ATC: M01AB05   wyk: B   EAN ~ 974122 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:B, T2:B, T3:D   Teva B.V.			
<b>Olafen® UNO:</b> tabl. o zmodyf. uwalnianiu <b>150 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>23,43</b> Limit <b>23,00</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>11,93</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Diclofenac sodium</i>   ATC: M01AB05   wyk: B   EAN ~ 457120 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:B, T2:B, T3:D   Ratiopharm GmbH			
<b>Olafen® UNO:</b> tabl. o zmodyf. uwalnianiu <b>150 mg</b> - 60 szt.	Rx	100% <b>32,32</b> Limit <b>32,32</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>16,16</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Diclofenac sodium</i>   ATC: M01AB05   wyk: B   EAN ~ 457137 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:B, T2:B, T3:D   Ratiopharm GmbH			
<b>Olpinat®:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>44,78</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 781782 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Vipharm SA			
<b>Olpinat®:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>86,54</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 781805 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Vipharm SA			
<b>Olzapin:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>50,51</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>7,78</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 335343 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.			
<b>Olzapin:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100% <b>54,06</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>8,05</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 422265 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.			
<b>Olzapin:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 56 szt. ◆	Rx	100% <b>96,49</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>7,83</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 335350 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.			
<b>Olzapin:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx	100% <b>102,54</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>7,32</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 422272 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.			
<b>Olzapin:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 90 szt. ◆	Rx	100% <b>149,13</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>6,30</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 065942 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.			
<b>Olzapin:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 120 szt. ◆	Rx	100% <b>174,58</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>6,40</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 144258 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.			
<b>Olzapin:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>92,44</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,78</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 335367 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.			
<b>Olzapin:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100% <b>98,42</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 422241 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.			
<b>Olzapin:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 56 szt. ◆	Rx	100% <b>183,72</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>5,97</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 335374 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.			


**ZAKODOWANY DO WALKI  
Z ZAKAŻENIEM**

<b>Olzapin:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx	100% <b>195,52</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>6,40</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Olanzapine</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: <b>N05AH03</b> wyk: B EAN ~ <b>422258</b>	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
<b>Olzapin:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 90 szt. ◆	Rx	100% <b>286,81</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>9,60</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Olanzapine</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: <b>N05AH03</b> wyk: B EAN ~ <b>066000</b>	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
<b>Olzapin:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 120 szt. ◆	Rx	100% <b>336,18</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>12,80</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Olanzapine</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: <b>N05AH03</b> wyk: B EAN ~ <b>144265</b>	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
<b>Olzapin:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 112 szt. ◆	Rx	100% <b>349,89</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>11,95</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Olanzapine</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	ATC: <b>N05AH03</b> wyk: B EAN ~ <b>231910</b>	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
<b>Olzapin:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 112 szt. ◆	Rx	100% <b>181,39</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>5,97</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Olanzapine</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	ATC: <b>N05AH03</b> wyk: B EAN ~ <b>231927</b>	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
<b>Omeprazole Genoptim:</b> kaps. <b>20 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>10,75</b> Limit <b>10,75</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>5,38</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Omeprazole</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: <b>A02BC01</b> wyk: B EAN ~ <b>668779</b>	Synoptis Pharma Sp. z o.o.
<b>Omeprazole Genoptim:</b> kaps. <b>40 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>19,68</b> Limit <b>19,68</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>9,84</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Omeprazole</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: <b>A02BC01</b> wyk: B EAN ~ <b>271442</b>	Synoptis Pharma Sp. z o.o.
<b>Omnice Ocas® 0,4 :</b> tabl. powł. o przedl. uwalnianiu <b>0,4 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>25,18</b> Limit <b>19,21</b> R <sup>(1)</sup> <b>9,17</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Tamsulosin hydrochloride</b> (1) Przerost gruczołu krokowego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N	ATC: <b>G04CA02</b> wyk: B EAN ~ <b>219070</b>	Astellas Pharma Sp. z o.o.

<b>Omnice® 0,4:</b> kaps. o zmod. uwalnianiu <b>0,4 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>24,85</b> Limit <b>19,21</b> R <sup>(1)</sup> <b>8,84</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Tamsulosin hydrochloride</b> (1) Przerost gruczołu krokowego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N	ATC: <b>G04CA02</b> wyk: B EAN ~ <b>716418</b>	Astellas Pharma Sp. z o.o.
<b>Omsal:</b> kaps. o przedl. uwalnianiu <b>0,4 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>23,81</b> Limit <b>19,21</b> R <sup>(1)</sup> <b>7,80</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Tamsulosin hydrochloride</b> (1) Przerost gruczołu krokowego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N	ATC: <b>G04CA02</b> wyk: B EAN ~ <b>586196</b>	Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.
<b>Ondansetron Bluefish:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>4 mg</b> - 10 szt.	Rx	100% <b>18,26</b> Limit <b>18,26</b> B <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>4,70</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Ondansetron hydrochloride</b> (1) Chemioterapia ICD10: C.0.09.(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Nowotwory złośliwe(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B	ATC: <b>A04AA01</b> wyk: B EAN ~ <b>777044</b>	Bluefish Pharmaceuticals
<b>Ondansetron Bluefish:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>8 mg</b> - 10 szt.	Rx	100% <b>29,65</b> Limit <b>29,65</b> B <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Ondansetron hydrochloride</b> (1) Chemioterapia ICD10: C.0.09.(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Nowotwory złośliwe(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B	ATC: <b>A04AA01</b> wyk: B EAN ~ <b>777150</b>	Bluefish Pharmaceuticals
<b>One Touch Select Plus:</b> test paskowy - 50 szt.	WM	100% <b>38,35</b> Limit <b>38,35</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>11,51</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b>
INN: <b>Glukoza we krwi</b> (1) Cukrzyca(2) Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej   Kat. ciąży: N	ATC: <b>V07AD</b> wyk: B EAN ~ <b>701275</b>	LifeScan Poland - Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
<b>Ontpria:</b> prosz. do inhal. [kaps. twarde] <b>18 µg/dawkę</b> - 30 szt. (+ inhal.) ◆	Rx	100% <b>95,44</b> Limit <b>95,44</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>28,63</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Tiotropium</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Ciężka postać POCChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV <sub>1</sub> <50% oraz ujemną próbą rozkurczową(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:D, T2:C, T3:C	ATC: <b>R03BB04</b> wyk: B EAN ~ <b>145627</b>	Zentiva PL Sp. z o.o.
<b>Ontozry:</b> tabl. powł. <b>12,5/25 mg</b> - op. 28 szt. (14 x 25 mg + 14 x 12,5 mg) ◆	Rx	100% <b>495,23</b> Limit <b>495,23</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Cenobamate</b> (1) Leczenie wspomagające napadów ogniskowych ulegających albo nieulegających wtórnemu uogólnieniu u dorosłych pacjentów z padaczką z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej jednej próby terapii dodanej(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	ATC: <b>N03AX25</b> wyk: B EAN ~ <b>145916</b>	Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.
<b>Ontozry:</b> tabl. powł. <b>50 mg</b> - op. 28 szt. ◆	Rx	100% <b>495,23</b> Limit <b>495,23</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Cenobamate</b> (1) Leczenie wspomagające napadów ogniskowych ulegających albo nieulegających wtórnemu uogólnieniu u dorosłych pacjentów z padaczką z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej jednej próby terapii dodanej(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	ATC: <b>N03AX25</b> wyk: B EAN ~ <b>145896</b>	Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.



▼Ontozry: tabl. powł. 100 mg - op. 28 szt. ◆	Rx	100%	495,23
		Limit	495,23
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		EAN ~ 145899	

INN: *Cenobamate* | ATC: N03AX25 | wyk: EAN ~ 145899  
 (1) Leczenie wspomagające napadów ogniskowych ulegających albo nieulegających wtórnemu uogólnieniu u dorosłych pacjentów z padaczką z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej jednej próby terapii dodanej (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

▼Ontozry: tabl. powł. 150 mg - op. 28 szt. ◆	Rx	100%	495,23
		Limit	495,23
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		EAN ~ 145906	

INN: *Cenobamate* | ATC: N03AX25 | wyk: EAN ~ 145906  
 (1) Leczenie wspomagające napadów ogniskowych ulegających albo nieulegających wtórnemu uogólnieniu u dorosłych pacjentów z padaczką z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej jednej próby terapii dodanej (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

▼Ontozry: tabl. powł. 200 mg - op. 28 szt. ◆	Rx	100%	495,23
		Limit	495,23
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		EAN ~ 145909	

INN: *Cenobamate* | ATC: N03AX25 | wyk: EAN ~ 145909  
 (1) Leczenie wspomagające napadów ogniskowych ulegających albo nieulegających wtórnemu uogólnieniu u dorosłych pacjentów z padaczką z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej jednej próby terapii dodanej (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

Opacorden®: tabl. powł. 200 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	32,49
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,76
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Amiodarone hydrochloride* | ATC: C01BD01 | wyk: B | EAN ~ 086818  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Opamid: tabl. powł. o przedł. uwalnianiu 1,5 mg - 30 szt.	Rx	100%	9,37
		Limit	9,18
		30% <sup>(1)</sup>	2,94
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		EAN ~ 770182	

INN: *Indapamide* | ATC: C03BA11 | wyk: B | EAN ~ 770182  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

Orion Pharma Poland Sp. o.o.

Odpowiedniki: Ipres long 1,5 [X], Indapamide SR Genoptim [8,02], Symapamid SR [8,10], Rawel® SR [8,14], Indix SR [8,30], Opamid [9,37], Indapen® SR [11,52], Diuresin® SR [11,53], Tertensin® SR [13,48]

Opokan forte: tabl. 15 mg - 10 szt.	Rx	100%	5,68
		Limit	5,11
		50% <sup>(1)</sup>	3,13
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Meloxicam* | ATC: M01AC06 | wyk: B | EAN ~ 612406  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:D, T2:D, T3:X

Alofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Meloxistad® [X], Aglan® 15 [5,48], Opokan forte [5,68], Movalis® [7,96]

Opokan forte: tabl. 15 mg - 30 szt.	Rx	100%	14,39
		Limit	14,39
		50% <sup>(1)</sup>	7,20
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Meloxicam* | ATC: M01AC06 | wyk: B | EAN ~ 612420  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:D, T2:D, T3:X

Alofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Opokan forte [14,39], Aglan® 15 [15,26], Aspicaam [18,25]

Oprymeas: tabl. o przedł. uwalnianiu 0,26 mg+ 0,52 mg+ 1,05 mg - 21 szt.	Rx	100%	26,18
		Limit	23,05
		30% <sup>(1)</sup>	10,05
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		EAN ~ 238773	

INN: *Pramipexole* | ATC: N04BC05 | wyk: B | EAN ~ 238773  
 (1) Leczenie objawów idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „on-off”) (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Krka Polska Sp. z o.o.

Oprymeas: tabl. o przedł. uwalnianiu 1,05 mg - 30 szt.	Rx	100%	58,93
		Limit	56,45
		30% <sup>(1)</sup>	19,42
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		EAN ~ 238582	

INN: *Pramipexole* | ATC: N04BC05 | wyk: B | EAN ~ 238582  
 (1) Leczenie objawów idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „on-off”) (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Krka Polska Sp. z o.o.

Oprymeas: tabl. o przedł. uwalnianiu 1,57 mg - 30 szt.	Rx	100%	84,68
		Limit	84,68
		30% <sup>(1)</sup>	25,40
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		EAN ~ 238629	

INN: *Pramipexole* | ATC: N04BC05 | wyk: B | EAN ~ 238629  
 (1) Leczenie objawów idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „on-off”) (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Krka Polska Sp. z o.o.

Oprymeas: tabl. o przedł. uwalnianiu 2,1 mg - 30 szt.	Rx	100%	111,69
		Limit	111,69
		30% <sup>(1)</sup>	33,51
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		EAN ~ 238667	

INN: *Pramipexole* | ATC: N04BC05 | wyk: B | EAN ~ 238667  
 (1) Leczenie objawów idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „on-off”) (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Krka Polska Sp. z o.o.

Optilamid: krople do oczu [zaw.] 10 mg/ml - 1 but. 5 ml ◆	Rx	100%	30,41
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,12
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Brinzolamide* | ATC: S01EC04 | wyk: B | EAN ~ 223571  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Brinzolamide Genoptim [29,04], Optilamid [30,41], Azopt [33,43]

Optilamid: krople do oczu [zaw.] 10 mg/ml - 3 but. 5 ml ◆	Rx	100%	79,56
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	8,09
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Brinzolamide* | ATC: S01EC04 | wyk: B | EAN ~ 223588  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Optium Xido: test paskowy - 50 szt.	WM	100%	38,88
		Limit	38,88
		30% <sup>(1)</sup>	11,66
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Glukoza we krwi* | ATC: | wyk: | EAN ~ 707249  
 (1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | Kat. ciąży: N

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.

Odpowiedniki: DIAVUE ToGo [35,43], OKmeter Core [35,43], Wellion SymPhar [36,63], G-BIO [37,55], Multisure GK [37,66], Everchek [37,77], Examedin® Fast [38,12], GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A [38,23], Cera-Chek 1 Code [38,33], VivaChek Ino [38,33], VivaChek Ino [38,33], One Touch Select Plus [38,35], GlucoCard 01 Sensor [38,66], Glucose® [38,77], EverCare [38,80], GensuCare [38,80], Optium Xido [38,88], Contour Plus [39,09], Contour TS [39,09], iXell® [39,15], Abra [39,27], Accu-Chek® Performa [39,27], Diagnostic Gold Strip [39,49], Glucomaxx® [39,55]

Oramorph: krople doust. [roztw.] 20 mg/ml - 1 but. 20 ml ◆	Rx-w	100%	25,65
		Limit	23,61
		30% <sup>(1)</sup>	9,12
		B <sup>(2)</sup>	2,04
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Morphine sulphate* | ATC: N02AA01 | wyk: N | EAN ~ 143690  
 (1) Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgialgia, Neuralgia popółpaścowa przewlekła (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o.

Orgalutran: inj. [roztw.] 0,25 mg/0,5 ml - 1 amp.-strzyk.	Rx-z	100%	125,15
		Limit	97,10
		50% <sup>(1)</sup>	76,60
		EAN ~ 880911	

INN: *Ganirelix* | ATC: H01CC01 | wyk: B | EAN ~ 880911  
 (1) Zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, poddawanych kontrolowanej hiperstimulacji jajników w programach wspomaganego rozrodu - refundacja do 3 cykli | Kat. ciąży: X

N.V. Organon, The Netherlands

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

▼Orgovyx: tabl. powł. 120 mg - 30 szt. ◆		Rx-z	100%	448,96				100%	31,55
			Limit	448,96				Limit	31,55
			B <sup>(1)</sup>	bezpł.				30% <sup>(1)</sup>	9,47
INN: <i>Relugolix</i>		ATC: L02BX04	wyk:	EAN ~ 578527	Oriven: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde 37,5 mg - 98 szt. ◆		Rx	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
(1) Nowotwory złośliwe - zaawansowana postać hormonozależnego raka gruczołu krokowego u pacjentów dorosłych   Kat. ciąży: X					ACCORD Healthcare Polska Sp. z o.o.				
Orilukast: tabl. do rozgr. i żucia 4 mg - 28 szt.		Rx	100%	10,47	INN: <i>Venlafaxine</i>		ATC: N06AX16	wyk: B	EAN ~ 795819
			Limit	9,30	(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C				
			30% <sup>(1)</sup>	3,96	Orion Pharma Poland Sp. o.o.				
			C <sup>(2)</sup>	bezpł.			Rx	100%	19,60
			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.				Limit	19,60
			S <sup>(3)</sup>	bezpł.				30% <sup>(1)</sup>	5,88
INN: <i>Montelukast</i>		ATC: R03DC03	wyk: B	EAN ~ 893188	Oriven: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde 75 mg - 28 szt. ◆		Rx	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
(1) Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli(2) Kobiety w ciąży(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B					Orion Pharma Poland Sp. o.o.				
Orilukast: tabl. do rozgr. i żucia 5 mg - 28 szt.		Rx	100%	12,64	INN: <i>Venlafaxine</i>		ATC: N06AX16	wyk: B	EAN ~ 795789
			Limit	11,63	(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C				
			30% <sup>(1)</sup>	4,50	Orion Pharma Poland Sp. o.o.				
			C <sup>(2)</sup>	bezpł.			Rx	100%	56,88
			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.				Limit	56,88
			S <sup>(3)</sup>	bezpł.				30% <sup>(1)</sup>	17,06
INN: <i>Montelukast</i>		ATC: R03DC03	wyk: B	EAN ~ 893263	Oriven: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde 75 mg - 98 szt. ◆		Rx	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
(1) Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma(2) Kobiety w ciąży(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B					Orion Pharma Poland Sp. o.o.				
Orilukast: tabl. 10 mg - 28 szt.		Rx	100%	25,65	INN: <i>Venlafaxine</i>		ATC: N06AX16	wyk: B	EAN ~ 795796
			Limit	23,25	(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C				
			30% <sup>(1)</sup>	9,38	Orion Pharma Poland Sp. o.o.				
			C <sup>(2)</sup>	bezpł.			Rx	100%	32,80
			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.				Limit	32,80
			S <sup>(3)</sup>	bezpł.				30% <sup>(1)</sup>	9,84
INN: <i>Montelukast</i>		ATC: R03DC03	wyk: B	EAN ~ 893294	Oriven: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde 150 mg - 28 szt. ◆		Rx	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
(1) Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc(2) Kobiety w ciąży(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B					Orion Pharma Poland Sp. o.o.				
Oritop: tabl. powł. 25 mg - 60 szt. ◆		Rx	100%	0,00	INN: <i>Venlafaxine</i>		ATC: N06AX16	wyk: B	EAN ~ 795826
			DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C				
			R <sup>(2)</sup>	7,12	Orion Pharma Poland Sp. o.o.				
			S <sup>(3)</sup>	bezpł.			Rx	100%	98,09
								Limit	98,09
								30% <sup>(1)</sup>	29,43
INN: <i>Topiramate</i>		ATC: N03AX11	wyk: B	EAN ~ 715084	Oriven: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde 150 mg - 98 szt. ◆		Rx	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka oporna na leczenie WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C					Orion Pharma Poland Sp. o.o.				
Oritop: tabl. powł. 50 mg - 60 szt. ◆		Rx	100%	40,05	INN: <i>Venlafaxine</i>		ATC: N06AX16	wyk: B	EAN ~ 795833
			Limit	0,00	(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C				
			DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	Orion Pharma Poland Sp. o.o.				
			R <sup>(2)</sup>	6,32			Rx	100%	36,84
			S <sup>(3)</sup>	bezpł.				Limit	36,84
								30% <sup>(1)</sup>	11,05
INN: <i>Topiramate</i>		ATC: N03AX11	wyk: B	EAN ~ 715145	Orizon: roztw. doust. 1 mg/ml - 1 but. 100 ml ◆		Rx	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka oporna na leczenie WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C					Orion Pharma Poland Sp. o.o.				
Oritop: tabl. powł. 100 mg - 60 szt. ◆		Rx	100%	71,07	INN: <i>Risperidone</i>		ATC: N05AX08	wyk: B	EAN ~ 690138
			Limit	0,00	(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C				
			DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	Orion Pharma Poland Sp. o.o.				
			R <sup>(2)</sup>	3,20			Rx	100%	40,84
			S <sup>(3)</sup>	bezpł.				Limit	0,00
								DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
INN: <i>Topiramate</i>		ATC: N03AX11	wyk: B	EAN ~ 715169	Orizon: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde 37,5 mg - 28 szt. ◆		Rx	R <sup>(2)</sup>	6,93
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka oporna na leczenie WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C					Orion Pharma Poland Sp. o.o.				
Oriven: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde 37,5 mg - 28 szt. ◆		Rx	100%	10,53	INN: <i>Risperidone</i>		ATC: N05AX08	wyk: B	EAN ~ 831258
			Limit	10,53	(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C				
			30% <sup>(1)</sup>	3,16	Orion Pharma Poland Sp. o.o.				
			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.			Rx	100%	9,32
			S <sup>(3)</sup>	bezpł.				Limit	0,00
								DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
INN: <i>Venlafaxine</i>		ATC: N06AX16	wyk: B	EAN ~ 795802	Orizon: tabl. powł. 1 mg - 20 szt. ◆		Rx	R <sup>(2)</sup>	5,10
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C					Orion Pharma Poland Sp. o.o.				
Orizon: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde 37,5 mg - 98 szt. ◆		Rx	100%	9,32	INN: <i>Risperidone</i>		ATC: N05AX08	wyk: B	EAN ~ 831258
			Limit	0,00	(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C				
			DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	Orion Pharma Poland Sp. o.o.				
			R <sup>(2)</sup>	5,10			Rx	100%	9,32
			S <sup>(3)</sup>	bezpł.				Limit	0,00
								DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
Odpowiedniki: Symfaksin ER <sup>®</sup> [10,37], Oriven [10,53], Faxigen XL [11,02], Efevelon SR [11,39], Lafactin [12,03], Velaxin <sup>®</sup> ER 37,5 [12,56], Venlectine [12,69], Alventa <sup>®</sup> [12,77], Venlafaxine Apotex [12,82], Faxelet ER [13,10], Axyven [13,37], Prefaxine [13,80]									
Odpowiedniki: Venlafaxine Bluefish XL [17,37], Alventa <sup>®</sup> - (IR) [17,75], Symfaksin ER <sup>®</sup> [19,46], Oriven [19,60], Faxigen XL [20,62], Lafactin [22,78], Alventa <sup>®</sup> [23,03], Efevelon SR [23,60], Velaxin <sup>®</sup> ER 75 [23,91], Venlectine [24,18], Venlafaxine Apotex [24,46], Faxelet ER [24,62], Axyven [25,04], Efectin <sup>®</sup> ER 75 [25,55], Prefaxine [26,50]									
Odpowiedniki: Montelukast Bluefish [X], Montelukast Aurovitas [9,18], Romilast [10,31], Orilukast [10,47], Monkasta [13,68], Montelukast Sandoz [13,68], Promonta 4 mg [13,68], Astmodil [15,46], Milukante [15,46]									
Odpowiedniki: Venlafaxine Bluefish XL [17,37], Alventa <sup>®</sup> - (IR) [17,75], Symfaksin ER <sup>®</sup> [19,46], Oriven [19,60], Faxigen XL [20,62], Lafactin [22,78], Alventa <sup>®</sup> [23,03], Efevelon SR [23,60], Velaxin <sup>®</sup> ER 75 [23,91], Venlectine [24,18], Venlafaxine Apotex [24,46], Faxelet ER [24,62], Axyven [25,04], Efectin <sup>®</sup> ER 75 [25,55], Prefaxine [26,50]									
Odpowiedniki: Montelukast Bluefish [X], Montelukast Aurovitas [11,27], Romilast [12,62], Orilukast [12,64], Montelukast Sandoz [13,83], Promonta 5 mg [17,15], Monkasta [17,28], Astmodil [18,82], Milukante [19,27]									
Odpowiedniki: Venlafaxine Bluefish XL [31,86], Symfaksin ER <sup>®</sup> [32,21], Alventa <sup>®</sup> - (IR) [32,27], Oriven [32,80], Faxigen XL [38,30], Lafactin [42,60], Alventa <sup>®</sup> [43,10], Efevelon SR [44,25], Efectin <sup>®</sup> ER 150 [44,82], Velaxin <sup>®</sup> ER 150 [44,84], Venlectine [45,62], Axyven [46,26], Venlafaxine Apotex [46,77], Faxelet ER [47,11], Prefaxine [50,06]									
Odpowiedniki: Oritop [22,39], Topamax <sup>®</sup> [35,74]									
Odpowiedniki: Orizon [40,84], Risperolept <sup>®</sup> [44,27]									



# ZOLPIC

Daj owcom odpocząć.  
zolpidem



<p><b>Orizon:</b> tabl. powł. <b>1 mg</b> - 60 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Risperidone</i>   ATC: N05AX08   wyk: B   EAN ~ 831265 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Orion Pharma Poland Sp. o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Orizon [22,81], Risperon [27,96]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>22,81</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,74</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	22,81		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	3,74		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Ospamox®:</b> tabl. powł. <b>500 mg</b> - 20 szt.</p> <p>INN: <i>Amoxicillin</i>   ATC: J01CA04   wyk: B   EAN ~ 788453 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Sandoz GmbH</p> <p>Odpowiedniki: Ospamox® [10,86], Amotaks® [16,27], Amotaks® Dis [16,27]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>10,86</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	10,86		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	3,20		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx	100%	22,81																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	3,74																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	10,86																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	3,20																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
<p><b>Orizon:</b> tabl. powł. <b>2 mg</b> - 60 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Risperidone</i>   ATC: N05AX08   wyk: B   EAN ~ 831272 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Orion Pharma Poland Sp. o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Orizon [42,84], Risperon [52,46]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>42,84</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	42,84		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	3,20		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Ospamox®:</b> prosz. do przyg. zaw. doust. <b>500 mg/5 ml</b> - 1 but. 100 ml</p> <p>INN: <i>Amoxicillin</i>   ATC: J01CA04   wyk: B   EAN ~ 781874 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Sandoz GmbH</p> <p>Odpowiedniki: Ospamox® [34,70], Amotaks® [38,72]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>34,70</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	34,70		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	3,20		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx	100%	42,84																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	3,20																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	34,70																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	3,20																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
<p><b>Orizon:</b> tabl. powł. <b>3 mg</b> - 60 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Risperidone</i>   ATC: N05AX08   wyk: B   EAN ~ 831289 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Orion Pharma Poland Sp. o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Orizon [62,02], Risperon [72,15]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>62,02</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,84</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	62,02		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	3,84		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Ospamox®:</b> tabl. powł. <b>750 mg</b> - 16 szt.</p> <p>INN: <i>Amoxicillin</i>   ATC: J01CA04   wyk: B   EAN ~ 293223 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Sandoz GmbH</p> <p>Odpowiedniki: Ospamox® [12,60], Amotaks® Dis [16,61]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>12,60</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	12,60		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	3,20		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx	100%	62,02																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	3,84																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	12,60																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	3,20																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
<p><b>Orizon:</b> tabl. powł. <b>4 mg</b> - 60 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Risperidone</i>   ATC: N05AX08   wyk: B   EAN ~ 831296 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Orion Pharma Poland Sp. o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Orizon [78,05], Risperon [100,14]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>78,05</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>5,12</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	78,05		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	5,12		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Ospamox®:</b> tabl. powł. <b>750 mg</b> - 20 szt.</p> <p>INN: <i>Amoxicillin</i>   ATC: J01CA04   wyk: B   EAN ~ 788477 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Sandoz GmbH</p> <p>Odpowiedniki: Ospamox® [15,39], Amotaks® Dis [19,70]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>15,39</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	15,39		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	3,20		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx	100%	78,05																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	5,12																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	15,39																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	3,20																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
<p><b>Orungal®:</b> kaps. <b>100 mg</b> - 4 szt.</p> <p>INN: <i>Itraconazole</i>   ATC: J02AC02   wyk: B   EAN ~ 004317 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia grzybicze u pacjentów po przeszczepie szpiku - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Orungal® [12,85], Itrax [13,31], Trioxal® [15,11]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>12,85</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>11,87</td></tr> <tr><td></td><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>6,92</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	12,85		Limit	11,87		50% <sup>(1)</sup>	6,92		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Ospamox®:</b> tabl. powł. <b>1000 mg</b> - 16 szt.</p> <p>INN: <i>Amoxicillin</i>   ATC: J01CA04   wyk: B   EAN ~ 293322 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Sandoz GmbH</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>18,89</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	18,89		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	3,20		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx	100%	12,85																															
	Limit	11,87																															
	50% <sup>(1)</sup>	6,92																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	18,89																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	3,20																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
<p><b>Orungal®:</b> kaps. <b>100 mg</b> - 28 szt.</p> <p>INN: <i>Itraconazole</i>   ATC: J02AC02   wyk: B   EAN ~ 004331 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia grzybicze u pacjentów po przeszczepie szpiku - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Orungal® [60,64], Itrax [79,47], Trioxal® [85,82]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>60,64</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>60,64</td></tr> <tr><td></td><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>30,32</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	60,64		Limit	60,64		50% <sup>(1)</sup>	30,32		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Ospamox®:</b> tabl. powł. <b>1000 mg</b> - 20 szt.</p> <p>INN: <i>Amoxicillin</i>   ATC: J01CA04   wyk: B   EAN ~ 778041 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Sandoz GmbH</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>23,29</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	23,29		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	3,20		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx	100%	60,64																															
	Limit	60,64																															
	50% <sup>(1)</sup>	30,32																															
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	23,29																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	3,20																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
<p><b>Ospamox®:</b> tabl. powł. <b>500 mg</b> - 16 szt.</p> <p>INN: <i>Amoxicillin</i>   ATC: J01CA04   wyk: B   EAN ~ 293124 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Sandoz GmbH</p> <p>Odpowiedniki: Ospamox® [8,95], Hiconcil [9,40], Amotaks® [14,21], Amotaks® Dis [14,21]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>8,95</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	8,95		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	3,20		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Ospen® 750:</b> zaw. doust. <b>0,75 mln j.m./5 ml</b> - 1 but. 60 ml</p> <p>INN: <i>Phenoxymethylpenicillin</i>   ATC: J01CE02   wyk: B   EAN ~ 363216 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku - profilaktyka; zakażenia u pacjentów z zaburzeniami odporności - profilaktyka; zakażenia u pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego - profilaktyka(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Sandoz GmbH</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>24,24</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>8,80</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	24,24		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	8,80		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx	100%	8,95																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	3,20																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	24,24																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	8,80																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
<p><b>Ospamox®:</b> prosz. do przyg. zaw. doust. <b>500 mg/5 ml</b> - 1 but. 60 ml</p> <p>INN: <i>Amoxicillin</i>   ATC: J01CA04   wyk: B   EAN ~ 702361 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Sandoz GmbH</p> <p>Odpowiedniki: Ospamox® [23,52], Amotaks® [26,16]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>23,52</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,49</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	23,52		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	3,49		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Ospen® 750:</b> zaw. doust. <b>0,75 mln j.m./5 ml</b> - 1 but. 150 ml</p> <p>INN: <i>Phenoxymethylpenicillin</i>   ATC: J01CE02   wyk: B   EAN ~ 363223 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku - profilaktyka; zakażenia u pacjentów z zaburzeniami odporności - profilaktyka; zakażenia u pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego - profilaktyka(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Sandoz GmbH</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>57,11</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>13,71</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	57,11		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	13,71		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
Rx	100%	23,52																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	3,49																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															
Rx	100%	57,11																															
	Limit	0,00																															
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																															
	R <sup>(2)</sup>	13,71																															
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																															

Oспен® 1000: tabl. powł. 1 mln j.m. - 12 szt.	Rx	100%	10,31
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Phenoxyethylpenicillin* ATC: J01CE02 wyk: B EAN ~ 070916  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku - profilaktyka; zakażenia u pacjentów z zaburzeniami odporności - profilaktyka; zakażenia u pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego - profilaktyka (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży:

Sandoz GmbH

Oспен® 1000: tabl. powł. 1 mln j.m. - 30 szt.	Rx	100%	34,99
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Phenoxyethylpenicillin* ATC: J01CE02 wyk: B EAN ~ 070923  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku - profilaktyka; zakażenia u pacjentów z zaburzeniami odporności - profilaktyka; zakażenia u pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego - profilaktyka (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży:

Sandoz GmbH

Oспен® 1500: tabl. powł. 1,5 mln j.m. - 12 szt.	Rx	100%	14,52
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Phenoxyethylpenicillin* ATC: J01CE02 wyk: B EAN ~ 071012  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku - profilaktyka; zakażenia u pacjentów z zaburzeniami odporności - profilaktyka; zakażenia u pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego - profilaktyka (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

Sandoz GmbH

Oспен® 1500: tabl. powł. 1,5 mln j.m. - 30 szt.	Rx	100%	49,75
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Phenoxyethylpenicillin* ATC: J01CE02 wyk: B EAN ~ 071029  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku - profilaktyka; zakażenia u pacjentów z zaburzeniami odporności - profilaktyka; zakażenia u pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego - profilaktyka (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

Sandoz GmbH

Ostemax® 70 comfort: tabl. 70 mg - 4 szt.	Rx	100%	12,50
		Limit	12,50
		30% <sup>(1)</sup>	3,19
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Alendronic acid* ATC: M05BA04 wyk: B EAN ~ 108171  
 (1) Osteoporoza (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Ostenil® 70: tabl. 70 mg - 4 szt.	Rx	100%	12,52
		Limit	12,50
		30% <sup>(1)</sup>	3,77
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Alendronic acid* ATC: M05BA04 wyk: B EAN ~ 087418  
 (1) Osteoporoza (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Ostenil® 70: tabl. 70 mg - 6 szt.	Rx	100%	18,21
		Limit	18,21
		30% <sup>(1)</sup>	5,46
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Alendronic acid* ATC: M05BA04 wyk: B EAN ~ 087425  
 (1) Osteoporoza (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Ostolek: tabl. powł. 70 mg - 4 szt.	Rx	100%	12,39
		Limit	12,39
		30% <sup>(1)</sup>	3,72
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Alendronic acid* ATC: M05BA04 wyk: B EAN ~ 032517  
 (1) Osteoporoza (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Alendronic Acid Genoptim [8,32], Alendronat Bluefish [9,44], Alendrogen [10,63], Alendran 70 [12,30], Ostolek [12,39], Ostemax® 70 comfort [12,50], Ostenil® 70 [12,52]

Ovaleap: inj. [roztw.] 300 j.m./0,5 ml - 1 wkł. (+10 igieł)	Rx-z	100%	314,50
		Limit	305,99
		R <sup>(1)</sup>	11,71
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Follitropin alfa* ATC: G03GA05 wyk: EAN ~ 088125

(1) Kontrolowana hiperstimulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli; Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu kłomifenu, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) - refundacja do 3 cykli; Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH, FSH w skojarzeniu z hormonem leutinizującym LH - refundacja do 3 cykli | Kat. ciąży: C Theramex Ireland Limited

Ovaleap: inj. [roztw.] 900 j.m./1,5 ml - 1 wkł. (+20 igieł)	Rx-z	100%	918,00
		Limit	918,00
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Follitropin alfa* ATC: G03GA05 wyk: EAN ~ 088149

(1) Kontrolowana hiperstimulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli; Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu kłomifenu, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) - refundacja do 3 cykli; Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH, FSH w skojarzeniu z hormonem leutinizującym LH - refundacja do 3 cykli | Kat. ciąży: C Theramex Ireland Limited

Oxepilax: tabl. powł. 300 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	49,97
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	8,93
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Oxcarbazepine* ATC: N03AF02 wyk: B EAN ~ 057480

(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Karbagen [46,80], Trileptal® [49,97], Oxepilax [49,97]

Oxepilax: tabl. powł. 600 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	97,63
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	12,36
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Oxcarbazepine* ATC: N03AF02 wyk: B EAN ~ 105749

(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Karbagen [88,47], Trileptal® [94,42], Oxepilax [97,63]

Oxis® Turbuhaler®: prosz. do inhal. 4,5 µg/dawkę - 1 poj. (60 dawek)	Rx	100%	40,89
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	15,01
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Formoterol* ATC: R03AC13 wyk: A EAN ~ 445219

(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Astma, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Oxis® Turbuhaler®: prosz. do inhal. 9 µg/dawkę - 1 poj. (60 dawek)	Rx	100%	54,86
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Formoterol* ATC: R03AC13 wyk: A EAN ~ 445318

(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Oxodil Combo: prosz. do inhal. podzielony (160 µg+ 4,5 µg)/dawkę dostarczoną - 1 inhal. 60 dawek	Rx	100%	57,60
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	13,81
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Budesonide + Formoterol* ATC: R03AK07 wyk: A EAN ~ 062097

(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA



Naszym wyborem

enarenal  
enalaprilil maleas

Oxidil Combo: prosz. do inhal. podzielony (160 µg+ 4,5 µg)/dawkę dostarczoną - 2 inhal. 60 dawek	Rx	100%	109,68
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	18,89
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Budesonide + Formoterol* | ATC: R03AK07 | wyk: A | EAN ~ 062098

(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Oxidil Combo: prosz. do inhal. podzielony (320 µg+ 9 µg)/dawkę dostarczoną - 1 inhal. 60 dawek	Rx	100%	110,83
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	20,04
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Budesonide + Formoterol* | ATC: R03AK07 | wyk: A | EAN ~ 062099

(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Oxidil PPH: prosz. do inhal. [kaps.] 12 µg/dawkę - 60 szt.	Rx	100%	61,89
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	6,93
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Formoterol* | ATC: R03AC13 | wyk: A | EAN ~ 849000

(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Astma (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Forastmin® [60,81], Foradil® [61,26], Zafiron® [61,73], Oxodil PPH [61,89]

Oxidil PPH: prosz. do inhal. [kaps.] 12 µg/dawkę - 120 szt.	Rx	100%	116,32
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	6,40
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Formoterol* | ATC: R03AC13 | wyk: A | EAN ~ 996681

(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Astma (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Forastmin® [116,28], Zafiron® [116,32], Oxodil PPH [116,32]

Oxybutyninum Aflofarm: tabl. 5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	9,27
		Limit	8,78
		30% <sup>(1)</sup>	3,12
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Oxybutynin* | ATC: G04BD04 | wyk: B | EAN ~ 142718

(1) Stwardnienie rozsiane (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Oxybutyninum Aflofarm [9,27], Driptan® [14,60], Driptane® [22,12]

Oxybutyninum Aflofarm: tabl. 5 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	17,55
		Limit	17,55
		30% <sup>(1)</sup>	5,27
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Oxybutynin* | ATC: G04BD04 | wyk: B | EAN ~ 142719

(1) Stwardnienie rozsiane (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Oxybutyninum Aflofarm [17,55], Driptane® [21,88]

■ OxyContin®: tabl. o przedl. uwalnianiu 5 mg - 60 szt. ◆	Rx-w	100%	24,34
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	9,89
		R <sup>(3)</sup>	9,89
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Oxycodone hydrochloride* | ATC: N02AA05 | wyk: N | EAN ~ 643905

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Nowotwory złośliwe, Neuralgia popółpaścowa przewłokła (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B | Mundipharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Oxycodone [21,84], Reltebon [23,54], OxyContin® [24,34]

■ OxyContin®: tabl. o przedl. uwalnianiu 10 mg - 60 szt. ◆	Rx-w	100%	45,36
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	13,25
		R <sup>(3)</sup>	13,25
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Oxycodone hydrochloride* | ATC: N02AA05 | wyk: N | EAN ~ 643943

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Neuralgia popółpaścowa przewłokła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B | Mundipharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Accordeon [X], Reltebon [39,74], Oxycodone [41,06], OxyContin® [45,36]

■ OxyContin®: tabl. o przedl. uwalnianiu 20 mg - 60 szt. ◆	Rx-w	100%	86,10
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	18,68
		R <sup>(3)</sup>	18,68
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Oxycodone hydrochloride* | ATC: N02AA05 | wyk: N | EAN ~ 644001

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Nowotwory złośliwe, Neuralgia popółpaścowa przewłokła (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B | Mundipharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Accordeon [X], Oxycodone [77,49], Reltebon [79,15], OxyContin® [86,10]

■ OxyContin®: tabl. o przedl. uwalnianiu 40 mg - 60 szt. ◆	Rx-w	100%	164,28
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	26,46
		R <sup>(3)</sup>	26,46
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Oxycodone hydrochloride* | ATC: N02AA05 | wyk: N | EAN ~ 644025

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia, Neuralgia popółpaścowa przewłokła, Nowotwory złośliwe (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B | Mundipharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Oxycodone [147,05], Reltebon [158,44], OxyContin® [164,28]

■ OxyContin®: tabl. o przedl. uwalnianiu 80 mg - 60 szt. ◆	Rx-w	100%	316,89
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	41,26
		R <sup>(3)</sup>	41,26
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Oxycodone hydrochloride* | ATC: N02AA05 | wyk: N | EAN ~ 644049

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia, Neuralgia popółpaścowa przewłokła (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B | Mundipharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Oxycodone [282,46], Reltebon [316,89], OxyContin® [316,89]

■ Oxycodone: tabl. o przedl. uwalnianiu 5 mg - 60 szt. ◆	Rx-w	100%	21,84
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,39
		R <sup>(3)</sup>	7,39
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Oxycodone hydrochloride* | ATC: N02AA05 | wyk: N | EAN ~ 839469

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Neuralgia popółpaścowa przewłokła (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia, Nowotwory złośliwe (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B | G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Oxycodone [21,84], Reltebon [23,54], OxyContin® [24,34]

■ Oxycodone: tabl. o przedl. uwalnianiu 10 mg - 60 szt. ◆	Rx-w	100%	41,06
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	8,95
		R <sup>(3)</sup>	8,95
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Oxycodone hydrochloride* | ATC: N02AA05 | wyk: N | EAN ~ 839643

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, Nowotwory złośliwe, Neuralgia popółpaścowa przewłokła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B | G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Accordeon [X], Reltebon [39,74], Oxycodone [41,06], OxyContin® [45,36]

**Loperamid WZF**  
Loperamidi hydrochloridum

Przerwij niekończące się wizyty

Nowe opakowanie:  
**2 mg x 15 tabl.**

■ <b>Oxydolor:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>20 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx-w	100%	<b>77,49</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>10,07</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Oxycodone hydrochloride* ATC: N02AA05 wyk: N EAN ~ 839780  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia, Nowotwory złośliwe, Neuralgia popółpaścowa przewlekła (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Accordeon [X], Oxydolor [77,49], Reltebon [79,15], OxyContin® [86,10]

■ <b>Oxydolor:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>40 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx-w	100%	<b>147,05</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>9,23</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Oxycodone hydrochloride* ATC: N02AA05 wyk: N EAN ~ 840038  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia, Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Oxydolor [147,05], Reltebon [158,44], OxyContin® [164,28]

■ <b>Oxydolor:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>80 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx-w	100%	<b>282,46</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>6,83</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Oxycodone hydrochloride* ATC: N02AA05 wyk: N EAN ~ 840182  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia, Nowotwory złośliwe (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Oxydolor [282,46], OxyContin® [316,89], Reltebon [316,89]

■ <b>Oxyduo:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>5 mg+ 2,5 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx-w	100%	<b>47,45</b>
		Limit	<b>43,24</b>
		B <sup>(1)</sup>	<b>4,21</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Oxycodone hydrochloride + Naloxone hydrochloride* ATC: N02AA55 wyk: EAN ~ 660418  
(1) Ból w przebiegu chorób nowotworowych - u pacjentów, u których występują zaparcia poopiodowe (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Oxyduo [47,45], Targin [47,47]

■ <b>Oxyduo:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>10 mg+ 5 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx-w	100%	<b>90,09</b>
		Limit	<b>86,48</b>
		B <sup>(1)</sup>	<b>3,61</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Oxycodone hydrochloride + Naloxone hydrochloride* ATC: N02AA55 wyk: EAN ~ 660425  
(1) Ból w przebiegu chorób nowotworowych - u pacjentów, u których występują zaparcia poopiodowe (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Oxyduo [90,09], Targin [99,29]

■ <b>Oxyduo:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>20 mg+ 10 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx-w	100%	<b>180,24</b>
		Limit	<b>172,96</b>
		B <sup>(1)</sup>	<b>7,28</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Oxycodone hydrochloride + Naloxone hydrochloride* ATC: N02AA55 wyk: EAN ~ 660432  
(1) Ból w przebiegu chorób nowotworowych - u pacjentów, u których występują zaparcia poopiodowe (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Targin [171,98], Oxyduo [180,24]

■ <b>Oxyduo:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>40 mg+ 20 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx-w	100%	<b>348,50</b>
		Limit	<b>345,92</b>
		B <sup>(1)</sup>	<b>2,58</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Oxycodone hydrochloride + Naloxone hydrochloride* ATC: N02AA55 wyk: EAN ~ 660449  
(1) Ból w przebiegu chorób nowotworowych - u pacjentów, u których występują zaparcia poopiodowe (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Targin [331,97], Oxyduo [348,50]

■ <b>Oxylaxon:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>5 mg+ 2,5 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx-w	100%	<b>25,27</b>
		Limit	<b>21,62</b>
		B <sup>(1)</sup>	<b>3,65</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Oxycodone hydrochloride + Naloxone hydrochloride* ATC: N02AA05 wyk: EAN ~ 138156  
(1) Ból w przebiegu chorób nowotworowych - u pacjentów, u których występują zaparcia poopiodowe (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.

■ <b>Oxylaxon:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>10 mg+ 5 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx-w	100%	<b>43,24</b>
		Limit	<b>43,24</b>
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Oxycodone hydrochloride + Naloxone hydrochloride* ATC: N02AA05 wyk: EAN ~ 138167  
(1) Ból w przebiegu chorób nowotworowych - u pacjentów, u których występują zaparcia poopiodowe (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.

■ <b>Oxylaxon:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>20 mg+ 10 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx-w	100%	<b>81,67</b>
		Limit	<b>81,67</b>
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Oxycodone hydrochloride + Naloxone hydrochloride* ATC: N02AA05 wyk: EAN ~ 138178  
(1) Ból w przebiegu chorób nowotworowych - u pacjentów, u których występują zaparcia poopiodowe (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.

■ <b>Oxylaxon:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>40 mg+ 20 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx-w	100%	<b>155,04</b>
		Limit	<b>155,04</b>
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Oxycodone hydrochloride + Naloxone hydrochloride* ATC: N02AA05 wyk: EAN ~ 138189  
(1) Ból w przebiegu chorób nowotworowych - u pacjentów, u których występują zaparcia poopiodowe (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.

▼ <b>Ozempic®:</b> inj. [roztw.] <b>0,25 mg</b> - 1 wstrzyk. 1,5 ml (+4 igły)	Rx	100%	<b>403,45</b>
		Limit	<b>394,08</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>127,59</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Semaglutide* ATC: A10BJ06 wyk: EAN ~ 138990  
(1) Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c  $\geq 7,5\%$ , z otyłością definiowaną jako BMI  $\geq 30$  kg/m<sup>2</sup> oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatie, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek  $\geq 55$  lat dla mężczyzn,  $\geq 60$  lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

▼ <b>Ozempic®:</b> inj. [roztw.] <b>0,5 mg</b> - 1 wstrzyk. 1,5 ml (+4 igły)	Rx	100%	<b>403,45</b>
		Limit	<b>394,08</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>127,59</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Semaglutide* ATC: A10BJ06 wyk: EAN ~ 138991  
(1) Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c  $\geq 7,5\%$ , z otyłością definiowaną jako BMI  $\geq 30$  kg/m<sup>2</sup> oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatie, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek  $\geq 55$  lat dla mężczyzn,  $\geq 60$  lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

▼ <b>Ozempic®:</b> inj. [roztw.] <b>1 mg</b> - 1 wstrzyk. 3 ml (+4 igły)	Rx	100%	<b>403,45</b>
		Limit	<b>394,08</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>127,59</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Semaglutide* ATC: A10BJ06 wyk: EAN ~ 138995  
(1) Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c  $\geq 7,5\%$ , z otyłością definiowaną jako BMI  $\geq 30$  kg/m<sup>2</sup> oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatie, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek  $\geq 55$  lat dla mężczyzn,  $\geq 60$  lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Oziclide MR: tabl. o zmodyf. uwalnianiu <b>60 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>15,62</b>
		Limit	<b>9,83</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>8,99</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Gliclazide* ATC: A10BB09 wyk: B EAN ~ 226299  
(1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Gliclazide Zentiva [X], Clazicon [12,09], Diagen [12,09], Salson [12,36], Szymazide MR [13,05], Gliclada® [15,50], Oziclide MR [15,62], Diaprel® MR [23,50]





ZAKODOWANY DO WALKI  
Z ZAKAŻENIEM

Oziclide MR: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 60 mg - 60 szt.		Rx	100% 30,42 Limit 19,65 R <sup>(1)</sup> 17,17 S <sup>(2)</sup> bezpl.	(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające - w przypadkach innych niż określone w ChPL; nowotwory złośliwe - premedykacja - w przypadkach innych niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:D, T2:C, T3:C Adamed Sp. z o.o.
INN: <i>Gliclazide</i>	ATC: A10BB09	wyk: B	EAN ~ 226305	
(1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Symazide MR 60 [23,55], Salsol [23,90], Gliclada® [30,20], Oziclide MR [30,42]				
Ozzion: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt. ◆		Rx	100% 6,91 Limit 6,22 50% <sup>(1)</sup> 3,80 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Pantoprazole</i>	ATC: A02BC02	wyk: B	EAN ~ 892761	
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Zentiva PL Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Pamył 20 mg [6,32], Pantoprazole Genotim [6,80], Ozzion [6,91], Pantoprazole Bluefish [7,13], Panrazol [7,23], Gerdin 20 mg [7,36], Panprazolox [8,05], Noacid [8,37], Ranloc [9,02], Nolpaza® 20 mg tabletki dojelitowe [9,07], Controloc® 20 [9,80], Panzol [10,03], IPP 20 [10,14], Contix [10,48], Anesteloc® 20 [11,29]				
Ozzion: tabl. dojelitowe 20 mg - 56 szt. ◆		Rx	100% 13,82 Limit 12,43 50% <sup>(1)</sup> 7,61 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Pantoprazole</i>	ATC: A02BC02	wyk: B	EAN ~ 186371	
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Zentiva PL Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Pantoprazole Genotim [12,71], Panrazol [13,36], Ozzion [13,82], Panzol [13,90], Anesteloc® 20 [14,22], IPP 20 [14,70], Nolpaza® 20 mg tabletki dojelitowe [17,36]				
Ozzion: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt. ◆		Rx	100% 12,93 Limit 12,43 50% <sup>(1)</sup> 6,72 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Pantoprazole</i>	ATC: A02BC02	wyk: B	EAN ~ 892853	
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Zentiva PL Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [11,61], Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [11,63], Pamył 40 mg [12,71], Pantoprazole Genotim [12,71], Ozzion [12,93], Pantoprazole Bluefish [13,25], Gerdin 40 mg [13,46], Panrazol [13,71], Panprazolox [15,37], Contix [15,47], Noacid [16,00], Ranloc [17,37], Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe [17,49], Controloc® 40 [17,52], Panzol [19,53], IPP 40 [19,66], Anesteloc® 40 [19,74]				
Ozzion: tabl. dojelitowe 40 mg - 56 szt. ◆		Rx	100% 26,33 Limit 24,87 50% <sup>(1)</sup> 13,90 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Pantoprazole</i>	ATC: A02BC02	wyk: B	EAN ~ 186418	
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Zentiva PL Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [21,78], Pantoprazole Genotim [22,03], IPP 40 [25,00], Anesteloc® 40 [25,49], Ozzion [26,33], Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe [33,44]				
Pabi-Dexamethason: tabl. 0,5 mg - 20 szt. (blister)		Rx	100% 11,65 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 6,14 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Dexamethasone</i>	ATC: H02AB02	wyk: B	EAN ~ 400786	
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające - w przypadkach innych niż określone w ChPL; nowotwory złośliwe - premedykacja - w przypadkach innych niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:D, T2:C, T3:C Adamed Sp. z o.o.				
Pabi-Dexamethason: tabl. 1 mg - 20 szt.		Rx	100% 22,56 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 8,72 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Dexamethasone</i>	ATC: H02AB02	wyk: B	EAN ~ 400785	
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające - w przypadkach innych niż określone w ChPL; nowotwory złośliwe - premedykacja - w przypadkach innych niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:D, T2:C, T3:C Adamed Sp. z o.o.				
Pabi-Dexamethason: tabl. 4 mg - 20 szt.		Rx	100% 64,28 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 5,13 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Dexamethasone</i>	ATC: H02AB02	wyk: B	EAN ~ 100727	
Pabi-Dexamethason: tabl. 8 mg - 20 szt.		Rx	100% 121,84 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 10,24 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Dexamethasone</i>	ATC: H02AB02	wyk: B	EAN ~ 100731	
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające - w przypadkach innych niż określone w ChPL; nowotwory złośliwe - premedykacja - w przypadkach innych niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:D, T2:C, T3:C Adamed Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Dexamethasone Krka - (IR) [121,06], Dexamethasone Krka [121,82], Pabi-Dexamethason [121,84]				
Pabi-Dexamethason: tabl. 20 mg - 20 szt.		Rx	100% 288,13 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 25,60 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: <i>Dexamethasone</i>	ATC: H02AB02	wyk: B	EAN ~ 100735	
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające - w przypadkach innych niż określone w ChPL; nowotwory złośliwe - premedykacja - w przypadkach innych niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:D, T2:C, T3:C Adamed Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Dexamethasone Krka - (IR) [285,68], Pabi-Dexamethason [288,13]				
Padołten: tabl. powł. 37,5/325 mg - 30 szt. ◆		Rx	100% 8,24 Limit 7,10 30% <sup>(1)</sup> 3,27 B <sup>(2)</sup> 1,14 DZ <sup>(3)</sup> bezpl. S <sup>(4)</sup> bezpl.	
INN: <i>Tramadol hydrochloride + Paracetamol</i>	ATC: N02AX52	wyk: B	EAN ~ 806287	
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Padołten [8,24], Poltram® Combo [8,33], Tramapar [8,33], Doreta [25,42]				
Padołten: tabl. powł. 37,5/325 mg - 60 szt. ◆		Rx	100% 15,56 Limit 14,20 30% <sup>(1)</sup> 5,62 B <sup>(2)</sup> 1,36 DZ <sup>(3)</sup> bezpl. S <sup>(4)</sup> bezpl.	
INN: <i>Tramadol hydrochloride + Paracetamol</i>	ATC: N02AX52	wyk: B	EAN ~ 806294	
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Padołten [15,56], Doreta [15,63], Poltram® Combo [15,76], Tramapar [15,76]				
Padołten: tabl. powł. 37,5/325 mg - 90 szt. ◆		Rx	100% 22,67 Limit 21,30 30% <sup>(1)</sup> 7,76 B <sup>(2)</sup> 1,37 DZ <sup>(3)</sup> bezpl. S <sup>(4)</sup> bezpl.	
INN: <i>Tramadol hydrochloride + Paracetamol</i>	ATC: N02AX52	wyk: B	EAN ~ 806300	
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.				
Odpowiedniki: Doreta [22,67], Padołten [22,67], Poltram® Combo [22,96]				
Palexia retard: tabl. o przedł. uwalnianiu 50 mg - 60 szt. ◆		Rx-w	100% 115,15 Limit 103,03 B <sup>(1)</sup> 12,12 S <sup>(2)</sup> bezpl.	
INN: <i>Tapentadol</i>	ATC: N02AX06	wyk: B	EAN ~ 865567	
(1) Przewlekły ból o dużym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych - u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli bólu po zastosowaniu morfiny o zmodyfikowanym lub przedłużonym uwalnianiu lub u których nie jest tolerowana (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C STADA Poland Sp. z o.o.				
Palexia retard: tabl. o przedł. uwalnianiu 100 mg - 60 szt. ◆		Rx-w	100% 220,65 Limit 206,07 B <sup>(1)</sup> 14,58 S <sup>(2)</sup> bezpl.	
INN: <i>Tapentadol</i>	ATC: N02AX06	wyk: B	EAN ~ 865598	
(1) Przewlekły ból o dużym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych - u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli bólu po zastosowaniu morfiny o zmodyfikowanym lub przedłużonym uwalnianiu lub u których nie jest tolerowana (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C STADA Poland Sp. z o.o.				



Skuteczny przepływ

pentoxifylline  
**polfilin**  
 prolongatum

400 mg x 20 tabl. ♥ 400 mg x 60 tabl.

<b>○ Palexia retard:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>150 mg</b> - 60 szt. ◆ INN: <i>Tapentadol</i>   ATC: N02AX06   wyk: B   EAN ~ 865635 (1) Przewlekły ból o dużym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych - u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli bólu po zastosowaniu morfiny o zmodyfikowanym lub przedłużonym uwalnianiu lub u których nie jest tolerowana (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   STADA Poland Sp. z o.o.	Rx-w	100%	324,49
		Limit	309,10
		B <sup>(1)</sup>	15,39
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

<b>○ Palexia retard:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>200 mg</b> - 60 szt. ◆ INN: <i>Tapentadol</i>   ATC: N02AX06   wyk: B   EAN ~ 865666 (1) Przewlekły ból o dużym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych - u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli bólu po zastosowaniu morfiny o zmodyfikowanym lub przedłużonym uwalnianiu lub u których nie jest tolerowana (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   STADA Poland Sp. z o.o.	Rx-w	100%	412,13
		Limit	412,13
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

<b>○ Palexia retard:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>250 mg</b> - 60 szt. ◆ INN: <i>Tapentadol</i>   ATC: N02AX06   wyk: B   EAN ~ 865697 (1) Przewlekły ból o dużym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych - u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli bólu po zastosowaniu morfiny o zmodyfikowanym lub przedłużonym uwalnianiu lub u których nie jest tolerowana (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   STADA Poland Sp. z o.o.	Rx-w	100%	485,98
		Limit	485,98
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

<b>Palgotal:</b> tabl. powł. <b>75 mg+ 650 mg</b> - 30 szt. ◆ INN: <i>Tramadol hydrochloride + Paracetamol</i>   ATC: N02AJ13   wyk: B   EAN ~ 195076 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Zentiva PL Sp. z o.o.	Rx	100%	15,36
		Limit	14,20
		30% <sup>(1)</sup>	5,42
		B <sup>(2)</sup>	1,16
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.

<b>Palgotal:</b> tabl. powł. <b>75 mg+ 650 mg</b> - 60 szt. ◆ INN: <i>Tramadol hydrochloride + Paracetamol</i>   ATC: N02AJ13   wyk: B   EAN ~ 148206 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Zentiva PL Sp. z o.o.	Rx	100%	29,09
		Limit	28,39
		30% <sup>(1)</sup>	9,22
		B <sup>(2)</sup>	0,70
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.

<b>Palgotal:</b> tabl. powł. <b>75 mg+ 650 mg</b> - 90 szt. ◆ INN: <i>Tramadol hydrochloride + Paracetamol</i>   ATC: N02AJ13   wyk: B   EAN ~ 148207 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Zentiva PL Sp. z o.o.	Rx	100%	41,97
		Limit	41,97
		30% <sup>(1)</sup>	12,59
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.

<b>Palifren long:</b> inj. [zaw. o przedl. uwalnianiu] <b>50 mg</b> - 1 amp.-strzyk.+2 igły ◆ INN: <i>Paliperidone</i>   ATC: N05AX13   wyk: B   EAN ~ 009089 (1) Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia rysperydonem lub paliperidone, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego   Kat. ciąży: C   Adamed Sp. z o.o.	Rx	100%	243,50
		Limit	243,50
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

<b>Palifren long:</b> inj. [zaw. o przedl. uwalnianiu] <b>75 mg</b> - 1 amp.-strzyk.+2 igły ◆ INN: <i>Paliperidone</i>   ATC: N05AX13   wyk: B   EAN ~ 009072 (1) Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia rysperydonem lub paliperidone, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego   Kat. ciąży: C   Adamed Sp. z o.o.	Rx	100%	365,03
		Limit	365,03
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

<b>Palifren long:</b> inj. [zaw. o przedl. uwalnianiu] <b>100 mg</b> - 1 amp.-strzyk.+2 igły ◆ INN: <i>Paliperidone</i>   ATC: N05AX13   wyk: B   EAN ~ 009065 (1) Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia rysperydonem lub paliperidone, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego   Kat. ciąży: C   Adamed Sp. z o.o.	Rx	100%	485,50
		Limit	485,50
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

<b>Palifren long:</b> inj. [zaw. o przedl. uwalnianiu] <b>150 mg</b> - 1 amp.-strzyk.+2 igły ◆ INN: <i>Paliperidone</i>   ATC: N05AX13   wyk: B   EAN ~ 009058 (1) Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia rysperydonem lub paliperidone, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego   Kat. ciąży: C   Adamed Sp. z o.o.	Rx	100%	729,08
		Limit	729,08
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

<b>Paliperidone Teva:</b> inj. [zaw. o przedl. uwalnianiu] <b>75 mg</b> - 1 amp.-strz. 0,75 ml ◆ INN: <i>Paliperidone</i>   ATC: N05AX13   wyk: B   EAN ~ 147542 (1) Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia rysperydonem lub paliperidone, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego   Kat. ciąży: C   Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	Rx	100%	365,03
		Limit	365,03
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

<b>Paliperidone Teva:</b> inj. [zaw. o przedl. uwalnianiu] <b>100 mg</b> - 1 amp.-strz. 1 ml ◆ INN: <i>Paliperidone</i>   ATC: N05AX13   wyk: B   EAN ~ 147546 (1) Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia rysperydonem lub paliperidone, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego   Kat. ciąży: C   Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	Rx	100%	485,50
		Limit	485,50
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

<b>Paliperidone Teva:</b> inj. [zaw. o przedl. uwalnianiu] <b>150 mg</b> - 1 amp.-strz. 1,5 ml ◆ INN: <i>Paliperidone</i>   ATC: N05AX13   wyk: B   EAN ~ 147547 (1) Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia rysperydonem lub paliperidone, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego   Kat. ciąży: C   Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	Rx	100%	729,08
		Limit	729,08
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

<b>Pamifos®:</b> inf. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] <b>30 mg</b> - 2 fiol. + 2 rozp. szkło ◆ INN: <i>Pamidronate disodium</i>   ATC: M05BA03   wyk: B   EAN ~ 661671 (1) Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X   Vipharm SA	Rx	100%	213,03
		Limit	208,60
		R <sup>(1)</sup>	7,63
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

<b>Pamifos®:</b> inf. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] <b>60 mg</b> - 1 fiol.+ rozp. ◆ INN: <i>Pamidronate disodium</i>   ATC: M05BA03   wyk: B   EAN ~ 661688 (1) Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X   Vipharm SA	Rx	100%	312,90
		Limit	312,90
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

<b>Pamifos®:</b> inf. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] <b>90 mg</b> - 1 fiol.+ rozp. ◆ INN: <i>Pamidronate disodium</i>   ATC: M05BA03   wyk: B   EAN ~ 661695 (1) Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X   Vipharm SA	Rx	100%	6,32
		Limit	6,22
		50% <sup>(1)</sup>	3,21
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

<b>Pantoprazole</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Viatris Ltd <b>Odpowiedniki:</b> Pamył 20 mg [6,32], Pantoprazole Genoptim [6,80], Ozion [6,91], Pantoprazole Bluefish [7,13], Panazol [7,23], Gerdin 20 mg [7,36], Panprazol [8,05], Noacid [8,37], Ranloc [9,02], Nolpaza® 20 mg tabletki dojelitowe [9,07], Controloc® 20 [9,80], Panzol [10,03], IPP 20 [10,14], Contix [10,48], Anesteloc® 20 [11,29]	Rx	100%	12,71
		Limit	12,43
		50% <sup>(1)</sup>	6,50
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

<b>Pantoprazole</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Viatris Ltd <b>Odpowiedniki:</b> Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [11,61], Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [11,63], Pantoprazole Genoptim [12,71], Pamył 40 mg [12,71], Ozion [12,93], Pantoprazole Bluefish [13,25], Gerdin 40 mg [13,46], Panazol [13,71], Panprazol [15,37], Contix [15,47], Noacid [16,00], Ranloc [17,37], Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe [17,49], Controloc® 40 [17,52], Panzol [19,53], IPP 40 [19,66], Anesteloc® 40 [19,74]	Rx	100%	12,71
		Limit	12,43
		50% <sup>(1)</sup>	6,50
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

<b>Pantoprazole</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B   Viatris Ltd <b>Odpowiedniki:</b> Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [11,61], Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [11,63], Pantoprazole Genoptim [12,71], Pamył 40 mg [12,71], Ozion [12,93], Pantoprazole Bluefish [13,25], Gerdin 40 mg [13,46], Panazol [13,71], Panprazol [15,37], Contix [15,47], Noacid [16,00], Ranloc [17,37], Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe [17,49], Controloc® 40 [17,52], Panzol [19,53], IPP 40 [19,66], Anesteloc® 40 [19,74]	Rx	100%	12,71
		Limit	12,43
		50% <sup>(1)</sup>	6,50
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

<b>Panprazox: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx 100% <b>8,05</b> Limit <b>6,22</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>4,94</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Pantoprazole Genoptim: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx 100% <b>6,80</b> Limit <b>6,22</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>3,69</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Pantoprazole</b>   ATC: <b>A02BC02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>817184</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA		INN: <b>Pantoprazole</b>   ATC: <b>A02BC02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>139759</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Synoptis Pharma Sp. z o.o.	
<b>Panprazox: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx 100% <b>15,37</b> Limit <b>12,43</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>9,16</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Pantoprazole Genoptim: tabl. dojelitowe 20 mg - 56 szt. ◆</b>	Rx 100% <b>12,71</b> Limit <b>12,43</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>6,50</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Pantoprazole</b>   ATC: <b>A02BC02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>817320</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA		INN: <b>Pantoprazole</b>   ATC: <b>A02BC02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>017927</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Synoptis Pharma Sp. z o.o.	
<b>Panprazol: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx 100% <b>7,23</b> Limit <b>6,22</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>4,12</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Pantoprazole Genoptim: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx 100% <b>12,71</b> Limit <b>12,43</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>6,50</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Pantoprazole</b>   ATC: <b>A02BC02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>698974</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Actavis Group PTC ehf.		INN: <b>Pantoprazole</b>   ATC: <b>A02BC02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>035631</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Synoptis Pharma Sp. z o.o.	
<b>Panprazol: tabl. dojelitowe 20 mg - 56 szt. ◆</b>	Rx 100% <b>13,36</b> Limit <b>12,43</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>7,15</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Pantoprazole Genoptim: tabl. dojelitowe 40 mg - 56 szt. ◆</b>	Rx 100% <b>22,03</b> Limit <b>22,03</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>11,02</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Pantoprazole</b>   ATC: <b>A02BC02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>698981</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Actavis Group PTC ehf.		INN: <b>Pantoprazole</b>   ATC: <b>A02BC02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>017934</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Synoptis Pharma Sp. z o.o.	
<b>Panprazol: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx 100% <b>13,71</b> Limit <b>12,43</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>7,50</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Panzol: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx 100% <b>10,03</b> Limit <b>6,22</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>6,92</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Pantoprazole</b>   ATC: <b>A02BC02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>699209</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Actavis Group PTC ehf.		INN: <b>Pantoprazole</b>   ATC: <b>A02BC02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>652334</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce	
<b>Pantoprazole Bluefish: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx 100% <b>7,13</b> Limit <b>6,22</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>4,02</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Panzol: tabl. dojelitowe 20 mg - 56 szt. ◆</b>	Rx 100% <b>13,90</b> Limit <b>12,43</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>7,69</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Pantoprazole</b>   ATC: <b>A02BC02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>793907</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Bluefish Pharmaceuticals		INN: <b>Pantoprazole</b>   ATC: <b>A02BC02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>069681</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce	
<b>Pantoprazole Bluefish: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx 100% <b>13,25</b> Limit <b>12,43</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>7,04</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Panzol: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx 100% <b>19,53</b> Limit <b>12,43</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>13,32</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Pantoprazole</b>   ATC: <b>A02BC02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>794188</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Bluefish Pharmaceuticals		INN: <b>Pantoprazole</b>   ATC: <b>A02BC02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>652372</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce	



# ZOLPIC

Daj owcom odpocząć.  
zolpidem



Parogon : tabl. powł. 20 mg - 30 szt.	Rx	100%	19,16
		Limit	14,11
		30% <sup>(1)</sup>	9,28
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Paroxetine** ATC: **N06AB05** wyk: **B** EAN ~ 425877  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** Mylan Ireland Limited  
 Odpowiedniki: Paroxetine Aurovitas [13,55], Paroxinor [13,78], Xetanor 20 mg [16,36], Arketis [17,79], Parogon [19,16], Rextin® [19,39], Paxtin 20 [19,50]

Parogon : tabl. powł. 20 mg - 60 szt.	Rx	100%	36,81
		Limit	28,22
		30% <sup>(1)</sup>	17,06
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Paroxetine** ATC: **N06AB05** wyk: **B** EAN ~ 425884  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** Mylan Ireland Limited  
 Odpowiedniki: Paroxetine Aurovitas [25,60], Parogon [36,81]

Paroxetine Aurovitas: tabl. powł. 20 mg - 30 szt.	Rx	100%	13,55
		Limit	13,55
		30% <sup>(1)</sup>	4,07
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Paroxetine** ATC: **N06AB05** wyk: **B** EAN ~ 132361  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Paroxetine Aurovitas [13,55], Paroxinor [13,78], Xetanor 20 mg [16,36], Arketis [17,79], Parogon [19,16], Rextin® [19,39], Paxtin 20 [19,50]

Paroxetine Aurovitas: tabl. powł. 20 mg - 60 szt.	Rx	100%	25,60
		Limit	25,60
		30% <sup>(1)</sup>	7,68
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Paroxetine** ATC: **N06AB05** wyk: **B** EAN ~ 132364  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Paroxetine Aurovitas [25,60], Parogon [36,81]

Paroxinor: tabl. powł. 20 mg - 30 szt.	Rx	100%	13,78
		Limit	13,78
		30% <sup>(1)</sup>	4,13
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Paroxetine** ATC: **N06AB05** wyk: **B** EAN ~ 798346  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Orion Pharma Poland Sp. o.o.  
 Odpowiedniki: Paroxetine Aurovitas [13,55], Paroxinor [13,78], Xetanor 20 mg [16,36], Arketis [17,79], Parogon [19,16], Rextin® [19,39], Paxtin 20 [19,50]

Paxtin 20: tabl. powł. 20 mg - 30 szt.	Rx	100%	19,50
		Limit	14,11
		30% <sup>(1)</sup>	9,62
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Paroxetine** ATC: **N06AB05** wyk: **B** EAN ~ 010189  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** Sandoz GmbH  
 Odpowiedniki: Paroxetine Aurovitas [13,55], Paroxinor [13,78], Xetanor 20 mg [16,36], Arketis [17,79], Parogon [19,16], Rextin® [19,39], Paxtin 20 [19,50]

Paxtin 40: tabl. powł. 40 mg - 30 szt.	Rx	100%	37,50
		Limit	28,22
		30% <sup>(1)</sup>	17,75
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Paroxetine** ATC: **N06AB05** wyk: **B** EAN ~ 010202  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** Sandoz GmbH

PecFent: aeroszol do nosa 100 µg/dawkę - 1 but. 1,55 ml ◊	Rx-w	100%	164,41
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Fentanyl** ATC: **N02AB03** wyk: **N** EAN ~ 955503  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków WP: Ból przebijający u dzieci z chorobą nowotworową, które w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawane są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o.

PecFent: aeroszol do nosa 100 µg/dawkę - 4 but. 1,55 ml ◊	Rx-w	100%	624,49
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Fentanyl** ATC: **N02AB03** wyk: **N** EAN ~ 955527  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków WP: Ból przebijający u dzieci z chorobą nowotworową, które w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawane są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o.

PecFent: aeroszol do nosa 400 µg/dawkę - 1 but. 1,55 ml ◊	Rx-w	100%	164,41
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Fentanyl** ATC: **N02AB03** wyk: **N** EAN ~ 955541  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków WP: Ból przebijający u dzieci z chorobą nowotworową, które w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawane są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o.

PecFent: aeroszol do nosa 400 µg/dawkę - 4 but. 1,55 ml ◊	Rx-w	100%	624,49
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Fentanyl** ATC: **N02AB03** wyk: **N** EAN ~ 955558  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków WP: Ból przebijający u dzieci z chorobą nowotworową, które w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawane są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o.

Pegorel: tabl. powł. 75 mg - 28 szt.	Rx	100%	22,95
		Limit	22,95
		30% <sup>(1)</sup>	6,89
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Clopidogrel** ATC: **B01AC04** wyk: **B** EAN ~ 793730  
 (1) Miażdżycza objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom. Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania. Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** S Lab Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Clopidogrel Teva [X], Trombex [X], Clopidogrel Genoptim [14,40], Zyllit® - (IR) [21,32], Zyllit® - (IR) [21,35], Clopidogrel Bluefish [21,75], Agregex - (IR) [21,80], Agregex - (IR) [22,36], Agregex - (IR) [22,38], Grepid [22,95], Pegorel [22,95], Clopidogrel KRKA [23,52], Zyllit® [23,52], Clopidogrel Apotex [25,70], Clopidogrel Aurovitas [25,76], Agregex [25,80], Clopidix [26,33], Flavocorin® [27,08], Areplex® [34,83]

Penester®: tabl. powł. 5 mg - 30 szt.	Rx	100%	29,58
		Limit	26,72
		R <sup>(1)</sup>	6,06
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Finasteride** ATC: **G04CB01** wyk: **B** EAN ~ 077267  
 (1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **N** Zentiva PL Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Finahit [X], Finaride [X], Finasteridum Bluefish [22,20], Finasterid Stada [24,01], Finamef - (IR) [26,17], Uronexyr [27,24], Finaran [28,33], Symasteride [28,38], Finpro [28,45], Penester® [29,58], Hyplafin [29,82], Antiprost [29,85], Adaster [29,86], Androster [30,02], Finamef [30,07], Apo-Fina [30,11], Finaster® [30,19]

Penester®: tabl. powł. 5 mg - 90 szt.	Rx	100%	79,74
		Limit	79,74
		R <sup>(1)</sup>	9,60
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Finasteride** ATC: **G04CB01** wyk: **B** EAN ~ 077274  
 (1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **N** Zentiva PL Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Finahit [X], Finasteridum Bluefish [58,50], Finasterid Stada [62,95], Symasteride [73,12], Penester® [79,74], Finaster® [80,15], Apo-Fina [80,81], Adaster [81,49], Androster [81,97], Finamef [82,11]

Penlac: tabl. powł. 1 g - 14 szt.	Rx	100%	27,29
		Limit	27,29
		50% <sup>(1)</sup>	13,65
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Amoxicillin + Clavulanic acid</i> ATC: J01CR02 wyk: B EAN ~ 144151			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności-profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Zentiva PL Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Amoksyklaw® - (IR) [X], Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas [25,22], Amoksyklaw® - (IR) [26,86], Co-amoxiclav Bluefish [27,29], Penlac [27,29], Amoksyklaw® - (IR) [27,45], Ramoclav [28,48], Augmentin® - (IR) [29,11], Augmentin® - (IR) [29,16], Augmentin® - (IR) [29,23], Auglavin PPH [31,00], Polamoklav [31,00], Amoksyklaw® [31,35], Augmentin® - (IR) [32,30], Augmentin® - (IR) [32,32], Augmentin® [34,92], Taromentin® [40,04]			
Penlac: tabl. powł. 1 g - 20 szt.	Rx	100%	36,84
		Limit	36,84
		50% <sup>(1)</sup>	18,42
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Amoxicillin + Clavulanic acid</i> ATC: J01CR02 wyk: B EAN ~ 144444			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności-profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Zentiva PL Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Penlac [36,84], Augmentin® [42,29], Amoksyklaw® [42,84]			
Pentasa®: czopki 1 g - 28 szt.	Rx	100%	165,26
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	89,43
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Mesalazine</i> ATC: A07EC02 wyk: B EAN ~ 656813			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.			
Pentasa®: granulat o przedl. uwalnianiu 1 g - 50 sasz.	Rx	100%	152,65
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	81,30
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Mesalazine</i> ATC: A07EC02 wyk: B EAN ~ 855315			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.			
Pentasa®: granulat o przedl. uwalnianiu 2 g - 60 sasz.	Rx	100%	350,71
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	179,46
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Mesalazine</i> ATC: A07EC02 wyk: B EAN ~ 974184			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, Choroba Leśniowskiego-Crohna(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.			
Pentasa®: granulat o przedl. uwalnianiu 4 g - 30 sasz.	Rx	100%	348,56
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	177,31
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Mesalazine</i> ATC: A07EC02 wyk: B EAN ~ 273989			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, Choroba Leśniowskiego-Crohna(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.			
Pentasa®: tabl. o przedl. uwalnianiu 500 mg - 100 szt.	Rx	100%	150,56
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	79,21
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Mesalazine</i> ATC: A07EC02 wyk: B EAN ~ 662111			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, Choroba Leśniowskiego-Crohna(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.			
Pentasa®: tabl. o przedl. uwalnianiu 1 g - 60 szt.	Rx	100%	177,07
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	91,45
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Mesalazine</i> ATC: A07EC02 wyk: B EAN ~ 974375			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, Choroba Leśniowskiego-Crohna(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.			
Pentasa®: zaw. doodbytnicza 1 g/100 ml - 7 but. 100 ml	Rx	100%	89,49
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	56,34
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Mesalazine</i> ATC: A07EC02 wyk: B EAN ~ 818815			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.			
Perazin 25: tabl. 25 mg - 20 szt. ◆	Rx	100%	3,55
		Limit	2,06
		B <sup>(1)</sup>	1,49
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Perazine</i> ATC: N05AB10 wyk: B EAN ~ 858415			
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA			
Odpowiedniki: Perazin 25 [3,55], Pernazinum® [4,10]			
Perazin 25: tabl. 25 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	5,16
		Limit	5,16
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Perazine</i> ATC: N05AB10 wyk: B EAN ~ 914838			
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA			
Perazin 50: tabl. 50 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	6,01
		Limit	6,01
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Perazine</i> ATC: N05AB10 wyk: B EAN ~ 033422			
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA			
Perazin 100: tabl. 100 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	11,33
		Limit	11,33
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Perazine</i> ATC: N05AB10 wyk: B EAN ~ 858514			
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA			
Odpowiedniki: Perazin 100 [11,33], Pernazinum® [13,61]			
Perazin 200: tabl. 200 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	21,42
		Limit	21,42
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Perazine</i> ATC: N05AB10 wyk: B EAN ~ 033453			
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA			
Pernazinum®: tabl. 25 mg - 20 szt. ◆	Rx	100%	4,10
		Limit	2,06
		B <sup>(1)</sup>	2,04
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Perazine</i> ATC: N05AB10 wyk: B EAN ~ 202614			
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Perazin 25 [3,55], Pernazinum® [4,10]			
Pernazinum®: tabl. 25 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	7,23
		Limit	6,19
		B <sup>(1)</sup>	1,04
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Perazine</i> ATC: N05AB10 wyk: B EAN ~ 543914			
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Sp. z o.o.			
Pernazinum®: tabl. 100 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	13,61
		Limit	12,38
		B <sup>(1)</sup>	1,23
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Perazine</i> ATC: N05AB10 wyk: B EAN ~ 199518			
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Perazin 100 [11,33], Pernazinum® [13,61]			



<b>Petinimid®: kaps. 250 mg - 100 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>62,65</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Ethosuximide</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	ATC: N03AD01 wyk: B EAN ~ 244911 G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.	
<b>Phenyl-Free® 1: prosz. do przyg. zaw. odżywczej 2093 kJ/100 g - 1 op. 454 g</b>	ŚZ	100% <b>154,50</b> Limit <b>154,50</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b>
INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i> (1) Fenylketonuria   Kat. ciąży: N	ATC: V06CA wyk: EAN ~ 102138 Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o.o.	
<b>Phenyl Free® 2: prosz. do przyg. zaw. odżywczej 1717 kJ/100 g - 1 puszka 454 g</b>	ŚZ	100% <b>146,74</b> Limit <b>146,74</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b>
INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i> (1) Fenylketonuria   Kat. ciąży: N	ATC: V06CA wyk: EAN ~ 100066 Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o.o.	
<b>Phenyl Free® 2 HP: prosz. do przyg. zaw. odżywczej 1633 kJ/100 g - 1 puszka 454 g</b>	ŚZ	100% <b>210,93</b> Limit <b>210,93</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b>
INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i> (1) Fenylketonuria   Kat. ciąży: N	ATC: V06CA wyk: EAN ~ 100127 Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o.o.	
<b>Phenytoinum WZF: tabl. 100 mg - 60 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>15,66</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>2,88</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Phenytoin</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D	ATC: N03AB02 wyk: B EAN ~ 093519 Pofa Warszawa SA	
<b>PIC Insupen Original 0,25x5 mm (31G): igły - 100 szt.</b>	WM	100% <b>18,89</b> Limit <b>18,89</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,67</b>
INN: (1) Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta   Kat. ciąży:	ATC: wyk: EAN ~ 005094 Artsana S.p.A.	
<b>PIC Insupen Original 0,30x8 mm (30G): igły - 100 szt.</b>	WM	100% <b>18,89</b> Limit <b>18,89</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,67</b>
INN: (1) Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta   Kat. ciąży:	ATC: wyk: EAN ~ 004578 Artsana S.p.A.	
<b>Pilocarpinum WZF 2%: krople do oczu [roztw.] 20 mg/ml - 2 but. 5 ml ◆</b>	Rx	100% <b>19,24</b> Limit <b>19,24</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,77</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Pilocarpine hydrochloride</i> (1) Jaskra(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: S01EB01 wyk: A EAN ~ 237524 Pofa Warszawa SA	
<b>Pinexet: tabl. powł. 25 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>8,25</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>5,31</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Quetiapine</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z otyłością(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA	ATC: N05AH04 wyk: B EAN ~ 788583	
Odpowiedniki: Kefrenex [X], Kwetina [7,32], Kventiax® [7,82], Bonogren [8,15], Pinexet [8,25], Etiagen [8,36], ApoTiapina [8,47], Kettlept® [8,47], Kwetaplex [8,56], Kretel [8,58], Setinin [8,90]		
<b>Pinexet: tabl. powł. 100 mg - 60 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>51,71</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>9,45</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Quetiapine</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA	ATC: N05AH04 wyk: B EAN ~ 788590	
Odpowiedniki: Bonogren [44,28], Kefrenex [46,86], Etiagen [48,06], Kwetina [48,28], Setinin [48,66], Kventiax® [49,08], Kettlept® [50,16], Ketipino® [51,37], Pinexet [51,71], ApoTiapina [51,72], Kwetaplex [52,86], Kretel [54,46]		

<b>Pinexet: tabl. powł. 200 mg - 60 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>96,92</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>10,17</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Quetiapine</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA	ATC: N05AH04 wyk: B EAN ~ 788651	
Odpowiedniki: Bonogren [84,34], Kefrenex [88,34], Etiagen [90,75], Kwetina [91,21], Setinin [91,97], Kventiax® [92,82], Kettlept® [93,83], Ketipino® [95,21], Pinexet [96,92], ApoTiapina [98,08], Kwetaplex [100,36], Kretel [102,65]		
<b>Pinexet: tabl. powł. 300 mg - 60 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>140,25</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>10,65</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Quetiapine</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA	ATC: N05AH04 wyk: B EAN ~ 788675	
Odpowiedniki: Bonogren [121,83], Kefrenex [127,84], Setinin [133,27], Ketipino® [134,37], Kventiax® [134,55], Kettlept® [135,73], Pinexet [140,25], Kwetaplex [145,87]		
<b>Piramil 2,5 mg: tabl. 2,5 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>6,99</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>4,61</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Ramipril</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroby nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Sandoz GmbH	ATC: C09AA05 wyk: B EAN ~ 212170	
Odpowiedniki: Ramipril Aurovitas [X], Ampril 2,5 mg [5,58], Vivace [6,24], Axtill® [6,31], Piramil 2,5 mg [6,99]		
<b>Piramil 5 mg: tabl. 5 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>11,38</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>6,61</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Ramipril</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroby nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Sandoz GmbH	ATC: C09AA05 wyk: B EAN ~ 212248	
Odpowiedniki: Ampril 5 mg [9,87], Piramil 5 mg - (IR) [10,99], Piramil 5 mg - (IR) [10,99], Piramil 5 mg - (IR) [11,00], Piramil 5 mg - (IR) [11,00], Ramipril Aurovitas [11,27], Piramil 5 mg [11,38], Vivace [11,60], Axtill® [11,74]		
<b>Piramil 5 mg - (IR): tabl. 5 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>11,00</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>6,40</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Ramipril</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroby nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Inpharm Sp. z o.o.	ATC: C09AA05 wyk: B EAN ~ 133826	
Odpowiedniki: Ampril 5 mg [9,87], Piramil 5 mg - (IR) [10,99], Piramil 5 mg - (IR) [10,99], Piramil 5 mg - (IR) [11,00], Piramil 5 mg - (IR) [11,00], Ramipril Aurovitas [11,27], Piramil 5 mg [11,38], Vivace [11,60], Axtill® [11,74]		
<b>Piramil 5 mg - (IR): tabl. 5 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>11,00</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>6,40</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Ramipril</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroby nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Inpharm Sp. z o.o.	ATC: C09AA05 wyk: B EAN ~ 147930	
Odpowiedniki: Ampril 5 mg [9,87], Piramil 5 mg - (IR) [10,99], Piramil 5 mg - (IR) [10,99], Piramil 5 mg - (IR) [11,00], Piramil 5 mg - (IR) [11,00], Ramipril Aurovitas [11,27], Piramil 5 mg [11,38], Vivace [11,60], Axtill® [11,74]		
<b>Piramil 5 mg - (IR): tabl. 5 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>10,99</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>6,40</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Ramipril</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroby nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Medezin	ATC: C09AA05 wyk: B EAN ~ 144078	
Odpowiedniki: Ampril 5 mg [9,87], Piramil 5 mg - (IR) [10,99], Piramil 5 mg - (IR) [10,99], Piramil 5 mg - (IR) [11,00], Piramil 5 mg - (IR) [11,00], Ramipril Aurovitas [11,27], Piramil 5 mg [11,38], Vivace [11,60], Axtill® [11,74]		

<b>Piramil 5 mg - (IR): tabl. 5 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	10,99
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,40
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Ramipril</b>		ATC: <b>C09AA05</b>	wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>136990</b>
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>			
Delfarma Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Amril 5 mg [9,87], Piramil 5 mg - (IR) [10,99], <b>Piramil 5 mg - (IR) [10,99]</b> , Piramil 5 mg - (IR) [11,00], Piramil 5 mg - (IR) [11,00], Ramipril Aurovitas [11,27], Piramil 5 mg [11,38], Vivace [11,60], Axtil <sup>®</sup> [11,74]			

<b>Piramil 10 mg: tabl. 10 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100%	20,13
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	11,95
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Ramipril</b>		ATC: <b>C09AA05</b>	wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>661756</b>
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>			
Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Tritace <sup>®</sup> 10 - (IR) [X], Ramacor <sup>®</sup> [15,95], Ramipril Genotim [17,84], Tritace <sup>®</sup> 10 - (IR) [19,44], Tritace <sup>®</sup> 10 - (IR) [19,54], Tritace <sup>®</sup> 10 - (IR) [19,54], Tritace <sup>®</sup> 10 - (IR) [19,54], Tritace <sup>®</sup> 10 - (IR) [19,54], Tritace <sup>®</sup> 10 - (IR) [19,65], Tritace <sup>®</sup> 10 - (IR) [19,68], Vivace - (IR) [19,91], Vivace - (IR) [20,08], Piramil 10 mg [20,13], Vivace - (IR) [20,25], Polpri <sup>®</sup> [20,85], Polpri <sup>®</sup> [22,18], Tritace <sup>®</sup> 10 [22,20]			

<b>Piramil 10 mg - (IR): tabl. 10 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	16,06
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	12,80
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Ramipril</b>		ATC: <b>C09AA05</b>	wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>144301</b>
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> Medezin			
Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Tritace <sup>®</sup> 10 - (IR) [X], Ramacor <sup>®</sup> [15,95], Ramipril Genotim [17,84], Tritace <sup>®</sup> 10 - (IR) [19,44], Tritace <sup>®</sup> 10 - (IR) [19,54], Tritace <sup>®</sup> 10 - (IR) [19,54], Tritace <sup>®</sup> 10 - (IR) [19,54], Tritace <sup>®</sup> 10 - (IR) [19,65], Tritace <sup>®</sup> 10 - (IR) [19,68], Vivace - (IR) [19,91], Vivace - (IR) [20,08], Piramil 10 mg [20,13], Vivace - (IR) [20,25], Polpri <sup>®</sup> [20,85], Polpri <sup>®</sup> [22,18], Tritace <sup>®</sup> 10 [22,20]			

<b>Piramil 10 mg - (IR): tabl. 10 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	16,17
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	12,80
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Ramipril</b>		ATC: <b>C09AA05</b>	wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>344603</b>
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>			
Inpharm Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Piramil 10 mg - (IR) [16,06], Piramil 10 mg - (IR) [16,06], Amril 10 mg - (IR) [16,17], Piramil 10 mg - (IR) [16,17], Amril 10 mg - (IR) [16,20], Piramil 10 mg - (IR) [16,98], Amril 10 mg [18,35], Ramipril Aurovitas [21,33], Vivace [22,01], Axtil <sup>®</sup> [22,39]			

<b>Piramil 10 mg - (IR): tabl. 10 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	16,98
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	12,80
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Ramipril</b>		ATC: <b>C09AA05</b>	wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>147781</b>
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>			
Inpharm Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Piramil 10 mg - (IR) [16,06], Piramil 10 mg - (IR) [16,06], Amril 10 mg - (IR) [16,17], Piramil 10 mg - (IR) [16,17], Amril 10 mg - (IR) [16,20], Piramil 10 mg - (IR) [16,98], Amril 10 mg [18,35], Ramipril Aurovitas [21,33], Vivace [22,01], Axtil <sup>®</sup> [22,39]			

<b>Piramil 10 mg - (IR): tabl. 10 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	16,06
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	12,80
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Ramipril</b>		ATC: <b>C09AA05</b>	wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>136991</b>
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>			
Delfarma Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Piramil 10 mg - (IR) [16,06], Piramil 10 mg - (IR) [16,06], Amril 10 mg - (IR) [16,17], Piramil 10 mg - (IR) [16,17], Amril 10 mg - (IR) [16,20], Piramil 10 mg - (IR) [16,98], Amril 10 mg [18,35], Ramipril Aurovitas [21,33], Vivace [22,01], Axtil <sup>®</sup> [22,39]			

<b>Piramil 10 mg - (IR): tabl. 10 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	16,06
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	12,80
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Ramipril</b>		ATC: <b>C09AA05</b>	wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>136991</b>
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>			
Delfarma Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Piramil 10 mg - (IR) [16,06], Piramil 10 mg - (IR) [16,06], Amril 10 mg - (IR) [16,17], Piramil 10 mg - (IR) [16,17], Amril 10 mg - (IR) [16,20], Piramil 10 mg - (IR) [16,98], Amril 10 mg [18,35], Ramipril Aurovitas [21,33], Vivace [22,01], Axtil <sup>®</sup> [22,39]			

<b>PKU Anamix junior: prosz. [smak czekoladowy] - 30 sasz. 36 g</b>	Sz	100%	652,98
		Limit	652,98
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		wyk:	EAN ~ <b>648225</b>
INN: <b>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</b>		ATC: <b>V06CA</b>	
(1) Fenylketonuria   Kat. ciąży: <b>N</b>			
Nutricia Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98]			

<b>PKU Anamix junior: prosz. [smak neutralny] - 30 sasz. 36 g</b>	Sz	100%	652,98
		Limit	652,98
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		wyk:	EAN ~ <b>648263</b>
INN: <b>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</b>		ATC: <b>V06CA</b>	
(1) Fenylketonuria   Kat. ciąży: <b>N</b>			
Nutricia Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98]			

<b>PKU Anamix junior: prosz. [smak owoce leśne] - 30 sasz. 36 g</b>	Sz	100%	652,98
		Limit	652,98
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		wyk:	EAN ~ <b>648201</b>
INN: <b>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</b>		ATC: <b>V06CA</b>	
(1) Fenylketonuria   Kat. ciąży: <b>N</b>			
Nutricia Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98]			

<b>PKU Anamix junior: prosz. [smak pomarańczowy] - 30 sasz. 36 g</b>	Sz	100%	652,98
		Limit	652,98
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		wyk:	EAN ~ <b>648249</b>
INN: <b>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</b>		ATC: <b>V06CA</b>	
(1) Fenylketonuria   Kat. ciąży: <b>N</b>			
Nutricia Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98]			

<b>PKU Anamix junior: prosz. [smak waniliowy] - 30 sasz. 36 g</b>	Sz	100%	652,98
		Limit	652,98
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		wyk:	EAN ~ <b>648287</b>
INN: <b>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</b>		ATC: <b>V06CA</b>	
(1) Fenylketonuria   Kat. ciąży: <b>N</b>			
Nutricia Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98]			

<b>PKU Cooler 10 Yellow: płyn 10 g - 30 toreb. 87 ml</b>	Sz	100%	630,50
		Limit	624,88
		R <sup>(1)</sup>	8,82
		wyk:	EAN ~ <b>059895</b>
INN: <b>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</b>		ATC:	
(1) Fenylketonuria   Kat. ciąży:			
Nestle Polska SA			
Odpowiedniki: PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98]			

<b>PKU Cooler 15 Yellow: płyn 15 g - 30 toreb. 130 ml</b>	Sz	100%	937,31
		Limit	937,31
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		wyk:	EAN ~ <b>059901</b>
INN: <b>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</b>		ATC: <b>V06CA</b>	
(1) Fenylketonuria   Kat. ciąży:			
Nestle Polska SA			
Odpowiedniki: PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98]			

<b>PKU Cooler 20 Yellow: płyn 20 g - 30 toreb. 174 ml</b>	Sz	100%	1243,83
		Limit	1243,83
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		wyk:	EAN ~ <b>059918</b>
INN: <b>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</b>		ATC: <b>V06CA</b>	
(1) Fenylketonuria   Kat. ciąży:			
Nestle Polska SA			
Odpowiedniki: PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98], PKU Anamix junior [652,98]			

<b>PKU Gel: prosz. [smak malinowy] - 30 sasz. 24 g</b>	Sz	100%	584,75
		Limit	584,75
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		wyk:	EAN ~ <b>051455</b>
INN: <b>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</b>		ATC:	
(1) Fenylketonuria   Kat. ciąży: <b>N</b>			
Nestle Polska SA			
Odpowiedniki: PKU Gel [584,75], PKU Gel [584,75]			

<b>PKU Gel: prosz. [smak neutralny] - 30 sasz. 24 g</b>	Sz	100%	584,75
		Limit	584,75
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		wyk:	EAN ~ <b>051448</b>
INN: <b>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</b>		ATC:	
(1) Fenylketonuria   Kat. ciąży: <b>N</b>			
Nestle Polska SA			
Odpowiedniki: PKU Gel [584,75], PKU Gel [584,75]			

<b>PKU Gel: prosz. [smak pomarańczowy] - 30 sasz. 24 g</b>	Sz	100%	584,75
		Limit	584,75
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		wyk:	EAN ~ <b>051462</b>
INN: <b>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</b>		ATC:	
(1) Fenylketonuria   Kat. ciąży: <b>N</b>			
Nestle Polska SA			
Odpowiedniki: PKU Gel [584,75], PKU Gel [584,75]			

<b>PKU Lophlex LQ: płyn doust. [Citrus] - 30 wor. 125 ml</b>	Sz	100%	1069,00
		Limit	1069,00
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		wyk:	EAN ~ <b>647747</b>
INN: <b>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</b>		ATC: <b>V06CA</b>	
(1) Fenylketonuria   Kat. ciąży: <b>N</b>			
Nutricia Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: PKU Lophlex LQ [1069,00], PKU Lophlex LQ [1069,00], PKU Lophlex LQ [1069,00], PKU Lophlex LQ [1069,00], PKU Lophlex LQ [1069,00]			



ZAKODOWANY DO WALKI  
Z ZAKAŻENIEM

PKU Lophlex LQ: płyn doust. [Citrus] - 60 wor. 62,5 ml	Ś	100% Limit R <sup>(1)</sup>	1069,00 1069,00 3,20
INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i>   ATC: V06CA (1) Fenylketonuria   Kat. ciąży: N	wyk:	EAN ~ 647754 Nutricia Polska Sp. z o.o.	
Odpowiedniki: PKU Lophlex LQ [1069,00], PKU Lophlex LQ [1069,00], PKU Lophlex LQ [1069,00], PKU Lophlex LQ [1069,00]			
PKU Lophlex LQ: płyn doust. [Berries] - 30 wor. 125 ml	Ś	100% Limit R <sup>(1)</sup>	1069,00 1069,00 3,20
INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i>   ATC: V06CA (1) Fenylketonuria   Kat. ciąży: N	wyk:	EAN ~ 647686 Nutricia Polska Sp. z o.o.	
Odpowiedniki: PKU Lophlex LQ [1069,00], PKU Lophlex LQ [1069,00], PKU Lophlex LQ [1069,00], PKU Lophlex LQ [1069,00]			
PKU Lophlex LQ: płyn doust. [Berries] - 60 wor. 62,5 ml	Ś	100% Limit R <sup>(1)</sup>	1069,00 1069,00 3,20
INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i>   ATC: V06CA (1) Fenylketonuria   Kat. ciąży: N	wyk:	EAN ~ 647693 Nutricia Polska Sp. z o.o.	
Odpowiedniki: PKU Lophlex LQ [1069,00], PKU Lophlex LQ [1069,00], PKU Lophlex LQ [1069,00], PKU Lophlex LQ [1069,00]			
PKU Lophlex LQ: płyn doust. [Tropical] - 30 wor. 125 ml	Ś	100% Limit R <sup>(1)</sup>	1069,00 1069,00 3,20
INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i>   ATC: V06CA (1) Fenylketonuria   Kat. ciąży: N	wyk:	EAN ~ 647778 Nutricia Polska Sp. z o.o.	
Odpowiedniki: PKU Lophlex LQ [1069,00], PKU Lophlex LQ [1069,00], PKU Lophlex LQ [1069,00], PKU Lophlex LQ [1069,00]			
PKU Lophlex LQ: płyn doust. [Tropical] - 60 wor. 62,5 ml	Ś	100% Limit R <sup>(1)</sup>	1069,00 1069,00 3,20
INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i>   ATC: V06CA (1) Fenylketonuria   Kat. ciąży: N	wyk:	EAN ~ 647785 Nutricia Polska Sp. z o.o.	
Odpowiedniki: PKU Lophlex LQ [1069,00], PKU Lophlex LQ [1069,00], PKU Lophlex LQ [1069,00], PKU Lophlex LQ [1069,00]			
PKU Lophlex LQ: płyn doust. [Orange] - 30 wor. 125 ml	Ś	100% Limit R <sup>(1)</sup>	1069,00 1069,00 3,20
INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i>   ATC: V06CA (1) Fenylketonuria   Kat. ciąży: N	wyk:	EAN ~ 647716 Nutricia Polska Sp. z o.o.	
Odpowiedniki: PKU Lophlex LQ [1069,00], PKU Lophlex LQ [1069,00], PKU Lophlex LQ [1069,00], PKU Lophlex LQ [1069,00]			
PKU Lophlex LQ: płyn doust. [Orange] - 60 wor. 62,5 ml	Ś	100% Limit R <sup>(1)</sup>	1069,00 1069,00 3,20
INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i>   ATC: V06CA (1) Fenylketonuria   Kat. ciąży: N	wyk:	EAN ~ 647723 Nutricia Polska Sp. z o.o.	
Odpowiedniki: PKU Lophlex LQ [1069,00], PKU Lophlex LQ [1069,00], PKU Lophlex LQ [1069,00], PKU Lophlex LQ [1069,00]			
PKU Lophlex Select: płyn doust. (herbata brzoskwiowa) 125 ml - op. 30 x 125 ml	Ś	100% Limit R <sup>(1)</sup>	1069,00 1069,00 3,20
INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i>   ATC: V06CA (1) Fenylketonuria   Kat. ciąży: N	wyk:	EAN ~ 591631 Nutricia Polska Sp. z o.o.	
PKU Lophlex Select: płyn doust. (herbata miętowa) 125 ml - op. 30 x 125 ml	Ś	100% Limit R <sup>(1)</sup>	1069,00 1069,00 3,20
INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i>   ATC: V06CA (1) Fenylketonuria   Kat. ciąży: N	wyk:	EAN ~ 591648 Nutricia Polska Sp. z o.o.	
PKU Sphere 15 o smaku czekoladowym: proszek 15 g - 30 sasz. 27 g	Ś	100% Limit R <sup>(1)</sup>	1618,47 1614,03 7,64
INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i>   ATC: V06CA (1) Fenylketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 4 roku życia, u których dobową tolerancją fenylalaniny pozwala na zastosowanie preparatów glikomakropeptydowych   Kat. ciąży: N	wyk:	EAN ~ 941621 Nestle Polska SA	
PKU Sphere 15 o smaku czerwonych owoców: proszek 15 g - 1 op. 27 g	Ś	100% Limit R <sup>(1)</sup>	1618,47 1614,03 7,64
INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i>   ATC: V06CA (1) Fenylketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 4 roku życia, u których dobową tolerancją fenylalaniny pozwala na zastosowanie preparatów glikomakropeptydowych   Kat. ciąży: N	wyk:	EAN ~ 940105 Nestle Polska SA	

PKU Sphere 15 o smaku waniliowym: proszek 15 g - 1 op. 27 g	Ś	100% Limit R <sup>(1)</sup>	1618,47 1614,03 7,64
INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i>   ATC: V06CA (1) Fenylketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 4 roku życia, u których dobową tolerancją fenylalaniny pozwala na zastosowanie preparatów glikomakropeptydowych   Kat. ciąży: N	wyk:	EAN ~ 940112 Nestle Polska SA	
PKU Sphere 20 o smaku bananowym: proszek 20 g - 30 sasz. 35 g	Ś	100% Limit R <sup>(1)</sup>	2152,04 2152,04 3,20
INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i>   ATC: V06CA (1) Fenylketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 4 roku życia, u których dobową tolerancją fenylalaniny pozwala na zastosowanie preparatów glikomakropeptydowych   Kat. ciąży: N	wyk:	EAN ~ 943489 Nestle Polska SA	
PKU Sphere 20 o smaku cytrynowym: proszek 20 g - 30 sasz. 35 g	Ś	100% Limit R <sup>(1)</sup>	2152,04 2152,04 3,20
INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i>   ATC: V06CA (1) Fenylketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 4 roku życia, u których dobową tolerancją fenylalaniny pozwala na zastosowanie preparatów glikomakropeptydowych   Kat. ciąży: N	wyk:	EAN ~ 943472 Nestle Polska SA	
PKU Sphere 20 o smaku czekoladowym: proszek 20 g - 30 sasz. 35 g	Ś	100% Limit R <sup>(1)</sup>	2152,04 2152,04 3,20
INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i>   ATC: V06CA (1) Fenylketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 4 roku życia, u których dobową tolerancją fenylalaniny pozwala na zastosowanie preparatów glikomakropeptydowych   Kat. ciąży: N	wyk:	EAN ~ 941454 Nestle Polska SA	
PKU Sphere 20 o smaku czerwonych owoców: proszek 20 g - 1 op. 35 g	Ś	100% Limit R <sup>(1)</sup>	2152,04 2152,04 3,20
INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i>   ATC: V06CA (1) Fenylketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 4 roku życia, u których dobową tolerancją fenylalaniny pozwala na zastosowanie preparatów glikomakropeptydowych   Kat. ciąży: N	wyk:	EAN ~ 059840 Nestle Polska SA	
PKU Sphere 20 o smaku waniliowym: proszek 20 g - 1 op. 35 g	Ś	100% Limit R <sup>(1)</sup>	2152,04 2152,04 3,20
INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i>   ATC: V06CA (1) Fenylketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 4 roku życia, u których dobową tolerancją fenylalaniny pozwala na zastosowanie preparatów glikomakropeptydowych   Kat. ciąży: N	wyk:	EAN ~ 059857 Nestle Polska SA	
Plavocorin®: tabl. powł. 75 mg - 28 szt.	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	27,08 26,33 8,65 bezpł.
INN: <i>Clodigrel</i>   ATC: B01AC04 (1) Miazdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom. Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania. Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B	wyk:	B EAN ~ 762729 Sandoz GmbH	
Odpowiedniki: Clopidogrel Teva [X], Trombex [X], Clopidogrel Genoptim [14,40], Zyllit - (IR) [21,32], Zyllit® - (IR) [21,35], Clopidogrel Bluefish [21,75], Agrexex - (IR) [21,80], Agrexex - (IR) [22,36], Agrexex - (IR) [22,38], Grepid [22,95], Pegorel [22,95], Clopidogrel KRKA [23,52], Zyllit® [23,52], Clopidogrel Apotex [25,70], Clopidogrel Aurovitas [25,76], Agrexex [25,80], Clopidix [26,33], Plavocorin® [27,08], Areplex® [34,83]			
Plendil®: tabl. o przedl. uwalnianiu 5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	13,89 8,09 8,23 bezpł.
INN: <i>Felodipine</i>   ATC: C08CA02 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	wyk:	B EAN ~ 344819 AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.	
Plendil®: tabl. o przedl. uwalnianiu 10 mg - 28 szt. ◆	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	19,72 16,17 8,40 bezpł.
INN: <i>Felodipine</i>   ATC: C08CA02 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	wyk:	B EAN ~ 344918 AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.	
Polamoklav: tabl. powł. 1 g - 14 szt. ◆	Rx	100% Limit 50% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	31,00 29,99 16,01 bezpł. bezpł.
INN: <i>Amoxicillin + Clavulanic acid</i>   ATC: J01CR02 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B	wyk:	B EAN ~ 139277 Polfarmex S.A.	
Odpowiedniki: Amoksisylav® - (IR) [X], Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas [25,22], Amoksisylav® - (IR) [26,86], Co-amoxiclav Bluefish [27,29], Penlac [27,29], Amoksisylav® - (IR) [27,45], Ramoclav [28,48], Augmentin® - (IR) [29,11], Augmentin® - (IR) [29,16], Augmentin® - (IR) [29,23], Auglavin PPH [31,00], Polamoklav [31,00], Amoksisylav® [31,35], Augmentin® - (IR) [32,30], Augmentin® - (IR) [32,32], Augmentin® [34,92], Taromentin® [40,04]			





<b>Polcortolon®:</b> tabl. 4 mg - 20 szt.	Rx	100% <b>22,08</b> Limit <b>22,08</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>6,62</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Triamcinolone</i>   ATC: H02AB08   wyk: B   EAN ~ 915446 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D			
<b>Polcylin:</b> granulát do przyg. zaw. doust. 100 mg/ml - 1 but. 125 ml	Rx	100% <b>37,17</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Phenoxymethylpenicillin</i>   ATC: J01CE02   wyk: B   EAN ~ 601320 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku - profilaktyka; zakażenia u pacjentów z zaburzeniami odporności - profilaktyka; zakażenia u pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego - profilaktyka (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
<b>Polcylin:</b> granulát do przyg. zaw. doust. 100 mg/ml - 1 but. 60 ml	Rx	100% <b>19,00</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Phenoxymethylpenicillin</i>   ATC: J01CE02   wyk: B   EAN ~ 601321 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku - profilaktyka; zakażenia u pacjentów z zaburzeniami odporności - profilaktyka; zakażenia u pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego - profilaktyka (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
<b>Polfenon®:</b> tabl. powł. 150 mg - 20 szt. ◆	Rx	100% <b>8,65</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>2,88</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Propafenone hydrochloride</i>   ATC: C01BC03   wyk: B   EAN ~ 034123 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL; nadkomorowe zaburzenia rytmu serca - profilaktyka nawrotów; zaburzenia rytmu serca w zespole WPW inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; komorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
<b>Polhumin® Mix-2:</b> inj. [zaw.] 100 j.m./ml - 5 wkł. 3 ml	Rx	100% <b>97,72</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>3,40</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Insulin human/Insulin isophanic human</i>   ATC: A10AD01   wyk: B   EAN ~ 022921 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A			
Odpowiedniki: Polhumin® Mix-3 [97,72], Polhumin® Mix-4 [97,72], Polhumin® Mix-5 [97,72], Polhumin® Mix-2 [97,72], Humulin® M3 (30/70) [100,90]			
<b>Polhumin® Mix-3:</b> inj. [zaw.] 100 j.m./ml - 5 wkł. 3 ml	Rx	100% <b>97,72</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>3,40</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Insulin human/Insulin isophanic human</i>   ATC: A10AD01   wyk: B   EAN ~ 023027 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A			
Odpowiedniki: Polhumin® Mix-2 [97,72], Polhumin® Mix-4 [97,72], Polhumin® Mix-5 [97,72], Polhumin® Mix-3 [97,72], Humulin® M3 (30/70) [100,90]			
<b>Polhumin® Mix-4:</b> inj. [zaw.] 100 j.m./ml - 5 wkł. 3 ml	Rx	100% <b>97,72</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>3,40</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Insulin human/Insulin isophanic human</i>   ATC: A10AD01   wyk: B   EAN ~ 023126 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A			
Odpowiedniki: Polhumin® Mix-2 [97,72], Polhumin® Mix-3 [97,72], Polhumin® Mix-5 [97,72], Polhumin® Mix-4 [97,72], Humulin® M3 (30/70) [100,90]			
<b>Polhumin® Mix-5:</b> inj. [zaw.] 100 j.m./ml - 5 wkł. 3 ml	Rx	100% <b>97,72</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>3,40</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Insulin human/Insulin isophanic human</i>   ATC: A10AD01   wyk: B   EAN ~ 023324 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A			
Odpowiedniki: Polhumin® Mix-2 [97,72], Polhumin® Mix-3 [97,72], Polhumin® Mix-4 [97,72], Polhumin® Mix-5 [97,72], Humulin® M3 (30/70) [100,90]			
<b>Polhumin® N:</b> inj. [zaw.] 100 j.m./ml - 5 wkł. 3 ml	Rx	100% <b>97,72</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>3,40</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Insulin isophanic human</i>   ATC: A10AC01   wyk: B   EAN ~ 022525 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A			
Odpowiedniki: Insulatard® Penfill® [96,88], Polhumin® N [97,72], Humulin® N [100,90], Gensulin N [104,40]			
<b>Polhumin® R:</b> inj. [roztw.] 100 j.m./ml - 5 wkł. 3 ml	Rx	100% <b>97,72</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>3,40</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Insulin human</i>   ATC: A10AB01   wyk: B   EAN ~ 022822 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Cukrzyca (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A			
Odpowiedniki: Actrapid® Penfill® [96,88], Polhumin® R [97,72], Humulin® R [100,90], Gensulin R [104,40]			
<b>Polkepral:</b> tabl. powł. 250 mg - 50 szt. ◆	Rx	100% <b>14,46</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>5,47</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Levetiracetam</i>   ATC: N03AX14   wyk: B   EAN ~ 031497 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam NeuroPharma [X], Levetiracetam Aurovitas [14,36], Levetiracetam Accord [14,46], Polkepral [14,46], Normeg [15,94], Trund [16,85], Cezarius [19,72], Vetira [19,95], Kepra® [47,97]			
<b>Polkepral:</b> tabl. powł. 500 mg - 50 szt. ◆	Rx	100% <b>27,47</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>6,30</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Levetiracetam</i>   ATC: N03AX14   wyk: B   EAN ~ 031602 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam Aurovitas [27,30], Polkepral [27,47], Levetiracetam Accord [27,48], Normeg [30,42], Levebon [31,07], Cezarius [32,26], Levetiracetam NeuroPharma [32,26], Trund [32,26], Vetira [38,47], Kepra® [94,41]			
<b>Polkepral:</b> tabl. powł. 500 mg - 100 szt. ◆	Rx	100% <b>51,52</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>6,34</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Levetiracetam</i>   ATC: N03AX14   wyk: B   EAN ~ 031640 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Normeg [51,15], Levetiracetam Accord [51,52], Polkepral [51,52], Levetiracetam NeuroPharma [61,07], Trund [61,07], Kepra® [186,26]			
<b>Polkepral:</b> tabl. powł. 750 mg - 50 szt. ◆	Rx	100% <b>39,53</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>6,17</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Levetiracetam</i>   ATC: N03AX14   wyk: B   EAN ~ 031886 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam Aurovitas [39,27], Levetiracetam Accord [39,53], Polkepral [39,53], Normeg [43,96], Levetiracetam NeuroPharma [46,71], Trund [46,71], Cezarius [55,30], Vetira [56,01], Kepra® [140,37]			

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

Polkepral: tabl. powł. 1000 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	51,52
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	6,34

INN: *Levetiracetam* ATC: N03AX14 wyk: B EAN ~ 031992  
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA

Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam Aurovitas [51,15], Levetiracetam Accord [51,52], Polkepral [51,52], Normeg [57,40], Levebon [58,70], Cezarius [61,07], Levetiracetam NeuroPharma [61,07], Trund [61,07], Veltira [73,46]

Polkepral: tabl. powł. 1000 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	97,49
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	7,11

INN: *Levetiracetam* ATC: N03AX14 wyk: B EAN ~ 032043  
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA

Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Normeg [96,75], Levetiracetam Accord [97,49], Polkepral [97,49], Trund [115,82], Levetiracetam NeuroPharma [116,58]

Polpix SR: tabl. o przedł. uwalnianiu 2 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	40,63
		Limit	29,27
		30% <sup>(1)</sup>	20,14
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Ropinirole* ATC: N04BC04 wyk: B EAN ~ 988198  
(1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Aparxon PR [29,93], Ceurolex SR [32,28], Aropilo SR [34,57], Repirol SR [37,31], Requip-Modutab [37,99], Ropodrin [38,57], ApoRopin [39,72], Rolpryna SR [40,29], Nironovo SR [40,60], Polpix SR [40,63]

Polpix SR: tabl. o przedł. uwalnianiu 4 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	77,43
		Limit	58,54
		30% <sup>(1)</sup>	36,45
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Ropinirole* ATC: N04BC04 wyk: B EAN ~ 988204  
(1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Rolpryna SR (IR) [54,97], Aparxon PR [56,36], Aropilo SR [66,44], Ceurolex SR [70,22], Repirol SR [70,79], Requip-Modutab [72,65], Ropodrin [73,30], ApoRopin [75,59], Rolpryna SR [76,74], Nironovo SR [77,35], Polpix SR [77,43]

Polpix SR: tabl. o przedł. uwalnianiu 8 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	148,53
		Limit	117,09
		30% <sup>(1)</sup>	66,57
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Ropinirole* ATC: N04BC04 wyk: B EAN ~ 988242  
(1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Rolpryna SR (IR) [103,59], Aparxon PR [111,19], Aropilo SR [123,10], Ceurolex SR [134,54], Repirol SR [136,03], Requip-Modutab [138,38], Ropodrin [140,27], ApoRopin [144,85], Rolpryna SR [147,14], Nironovo SR [148,37], Polpix SR [148,53]

Polprazol®: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 28 szt.	Rx	100%	20,92
		Limit	12,43
		50% <sup>(1)</sup>	14,71
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Omeprazole* ATC: A02BC01 wyk: B EAN ~ 772667  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: A  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Prenome [9,47], Heligen Neo [9,66], Omeprazole Genoptim [10,75], Agastin® [11,85], Goprazol [12,39], Progestim [14,57], Ultop [16,26], Gasec®-20 Gastrocaps® [16,34], Helicid® 20 [18,49], Prazol® [19,18], Bioprazol® [19,76], Polprazol® [20,92]

Polprazol® PPH: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 28 szt.	Rx	100%	32,52
		Limit	24,87
		50% <sup>(1)</sup>	20,09
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Omeprazole* ATC: A02BC01 wyk: B EAN ~ 077731  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: A  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Prenome [15,39], Prazol® [17,28], Heligen Neo [17,59], Omeprazole Genoptim [19,68], Bioprazol® [26,94], Helicid® Forte [28,53], Ultop [30,13], Polprazol® PPH [32,52]

Polpri®: tabl. 2,5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	5,93
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,53
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril* ATC: C09AA05 wyk: B EAN ~ 924608

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Ramacor® [4,91], Polpri® [5,93], Tritace® 2,5 [9,63], Polpri® [13,86]

Polpri®: tabl. 5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	10,97
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,86
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril* ATC: C09AA05 wyk: B EAN ~ 924646

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Ramacor® [8,70], Ramipril Genoptim [9,56], Vivace - (IR) [10,52], Vivace - (IR) [10,53], Vivace - (IR) [10,63], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Polpri® [10,97], Polpri® [11,49], Tritace® 5 [13,50]

Polpri®: tabl. 10 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	20,85
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	10,76
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril* ATC: C09AA05 wyk: B EAN ~ 924653

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Tritace® 10 - (IR) [X], Ramacor® [15,95], Ramipril Genoptim [17,84], Tritace® 10 - (IR) [19,44], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,65], Tritace® 10 - (IR) [19,68], Vivace - (IR) [19,91], Vivace - (IR) [20,08], Piramil 10 mg [20,13], Vivace - (IR) [20,25], Polpri® [20,85], Polpri® [22,18], Tritace® 10 [22,20]

Polpri®: kaps. twarde 5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	11,49
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,33
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril* ATC: C09AA05 wyk: B EAN ~ 694631

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Ramacor® [8,70], Ramipril Genoptim [9,56], Vivace - (IR) [10,52], Vivace - (IR) [10,53], Vivace - (IR) [10,63], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Polpri® [10,97], Polpri® [11,49], Tritace® 5 [13,50]

Polpri®: kaps. twarde 10 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	22,18
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	11,95
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril* ATC: C09AA05 wyk: B EAN ~ 694655

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Tritace® 10 - (IR) [X], Ramacor® [15,95], Ramipril Genoptim [17,84], Tritace® 10 - (IR) [19,44], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,65], Tritace® 10 - (IR) [19,68], Vivace - (IR) [19,91], Vivace - (IR) [20,08], Piramil 10 mg [20,13], Vivace - (IR) [20,25], Polpri® [20,85], Polpri® [22,18], Tritace® 10 [22,20]

Polsart: tabl. 40 mg - 28 szt.	Rx	100%	17,16
		Limit	10,70
		30% <sup>(1)</sup>	9,67
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Telmisartan* ATC: C09CA07 wyk: B EAN ~ 936670

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r.; przewłoka choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tezeo - (IR) [11,23], Tezeo - (IR) [11,24], Telmisartan Bluefish [11,80], Telmisartan Mylan [11,91], Telmabax [12,07], Zancador [12,77], Telmisartan Genoptim [12,86], Topelmi [13,41], Tezeo [13,46], Telmisartan EGIS [13,58], Actelsar [13,75], Tolura [14,61], Telmiz [15,74], Telmizek [16,88], Polsart [17,16], Pritor® [18,81], Micardis® [24,02]



# ZOLPIC

zolidem

Daj owcom odpocząć.



Polsart: tabl. 80 mg - 28 szt.	Rx	100%	33,36
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	18,38
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan** | ATC: C09CA07 | wyk: B | EAN ~ 936700

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciskiennienie tętnicze inne niż określone w ChPL - w dzieci do 18 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tolura - (IR) [X], Tolura - (IR) [20,22], Telmisartan EGIS - (IR) [21,31], Tezeo - (IR) [21,34], Tezeo - (IR) [21,34], Telmabax [22,53], Telmisartan Mylan [22,65], Telmisartan Bluefish [22,75], Telmisartan EGIS - (IR) [22,99], Zanacodar [24,59], Telmisartan Genoptim [24,76], Pritor® [24,98], Toptelmi [25,85], Tezeo [25,97], Telmisartan EGIS [26,19], Actelsar [26,88], Tolura [28,26], Telmix [30,52], Telmizek [32,79], Polsart [33,36], Micardis® [33,56]

Polsart Plus: tabl. 40/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	16,30
		Limit	10,70
		30% <sup>(1)</sup>	8,81
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan + Hydrochlorothiazide** | ATC: C09DA07 | wyk: B | EAN ~ 079451

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciskiennienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Toptelmi HCT [12,31], Telmisartan + HCT Genoptim [13,24], Telmix Plus [14,21], Tezeo HCT [15,23], Tolucombi [15,75], Telmisartan HCT EGIS [15,87], Zanacodar Combi [16,04], Polsart Plus [16,30], Telmizek HCT [17,47], PritorPlus® [28,41]

Polsart Plus: tabl. 80/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	31,65
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	16,67
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan + Hydrochlorothiazide** | ATC: C09DA07 | wyk: B | EAN ~ 079598

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciskiennienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Toptelmi HCT [23,61], Telmisartan + HCT Genoptim [25,51], Telmix Plus [27,46], Tezeo HCT [29,52], Tolucombi [30,55], Actelsar HCT [31,00], Telmisartan HCT EGIS [31,00], Gisartan [31,12], Zanacodar Combi [31,12], Polsart Plus [31,65], Telmizek HCT [33,98], PritorPlus® [35,35], MicardisPlus [38,59]

Polsart Plus: tabl. 80/25 mg - 28 szt.	Rx	100%	31,65
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	16,67
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan + Hydrochlorothiazide** | ATC: C09DA07 | wyk: B | EAN ~ 079703

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciskiennienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Toptelmi HCT [23,61], Telmisartan + HCT Genoptim [25,51], Telmix Plus [27,46], Tezeo HCT [29,52], Tolucombi [30,55], Actelsar HCT [31,00], Telmisartan HCT EGIS [31,00], Gisartan [31,12], Zanacodar Combi [31,12], Polsart Plus [31,65], Telmizek HCT [33,98], PritorPlus® [35,35], MicardisPlus [39,36]

Poltram®: kaps. 50 mg - 20 szt. ◆	Rx	100%	8,50
		Limit	6,31
		30% <sup>(1)</sup>	3,67
		B <sup>(2)</sup>	1,97
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Tramadol hydrochloride** | ATC: N02AX02 | wyk: B | EAN ~ 968718

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Tramadol Aurovitas [7,65], Tramadol Krka [7,84], Tramal® [8,28], Poltram® [8,50], Tramadol Syn-teza [9,90]

Poltram®: krople doustne 100 mg/ml - 1 op. 96 ml ◆	Rx	100%	78,32
		Limit	78,29
		30% <sup>(1)</sup>	21,17
		B <sup>(2)</sup>	0,03
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Tramadol hydrochloride** | ATC: N02AX02 | wyk: B | EAN ~ 969029

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Poltram®: krople doustne 100 mg/ml - 1 op. 10 ml ◆	Rx	100%	9,83
		Limit	8,16
		30% <sup>(1)</sup>	3,71
		B <sup>(2)</sup>	1,50
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Tramadol hydrochloride** | ATC: N02AX02 | wyk: B | EAN ~ 969012

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Poltram® [9,83], Tramadol Synteza [12,50]

Poltram® Combo: tabl. powł. 37,5/325 mg - 20 szt. ◆	Rx	100%	5,81
		Limit	4,73
		30% <sup>(1)</sup>	2,25
		B <sup>(2)</sup>	0,97
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Tramadol hydrochloride + Paracetamol** | ATC: N02AX52 | wyk: B | EAN ~ 840984

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Poltram® Combo [5,81], Doreta [20,02], Tramapar [20,02]

Poltram® Combo: tabl. powł. 37,5/325 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	8,33
		Limit	7,10
		30% <sup>(1)</sup>	3,02
		B <sup>(2)</sup>	1,11
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Tramadol hydrochloride + Paracetamol** | ATC: N02AX52 | wyk: B | EAN ~ 840991

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Padolten [8,24], Tramapar [8,33], Poltram® Combo [8,33], Doreta [25,42]

Poltram® Combo: tabl. powł. 37,5/325 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	15,76
		Limit	14,20
		30% <sup>(1)</sup>	5,24
		B <sup>(2)</sup>	1,40
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Tramadol hydrochloride + Paracetamol** | ATC: N02AX52 | wyk: B | EAN ~ 841004

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Padolten [15,56], Doreta [15,63], Tramapar [15,76], Poltram® Combo [15,76]

Poltram® Combo: tabl. powł. 37,5/325 mg - 90 szt. ◆	Rx	100%	22,96
		Limit	21,30
		30% <sup>(1)</sup>	7,25
		B <sup>(2)</sup>	1,49
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Tramadol hydrochloride + Paracetamol** | ATC: N02AX52 | wyk: B | EAN ~ 981472

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Doreta [22,67], Padolten [22,67], Poltram® Combo [22,96]

Poltram® Combo Forte: tabl. powł. 75/650 mg - 20 szt. ◆	Rx	100%	10,68
		Limit	9,46
		30% <sup>(1)</sup>	3,65
		B <sup>(2)</sup>	1,10
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Tramadol hydrochloride + Paracetamol** | ATC: N02AX52 | wyk: B | EAN ~ 283735

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Poltram® Combo Forte [10,68], Doreta [30,04]

Poltram® Combo Forte: tabl. powł. 75/650 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	15,55
		Limit	14,20
		30% <sup>(1)</sup>	5,05
		B <sup>(2)</sup>	1,22
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Tramadol hydrochloride + Paracetamol** | ATC: N02AX52 | wyk: B | EAN ~ 283742

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Poltram® Combo Forte [15,55], Doreta [31,86]

Poltram® Combo Forte: tabl. powł. 75/650 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	29,48
		Limit	28,39
		30% <sup>(1)</sup>	8,65
		B <sup>(2)</sup>	0,98
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Tramadol hydrochloride + Paracetamol** | ATC: N02AX52 | wyk: B | EAN ~ 283759

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Poltram® Combo Forte [29,48], Doreta [29,63]

**ADRENALINA WZF**

Adrenalinum

Zawsze pod ręką!

**Refundacja** od lipca 2015  
Poziom odpłatności 50%

ADR-WZF/131/06-2015

Poltram® Combo Forte: tabl. powł. 75/650 mg - 90 szt. ◆	Rx	100%	42,55
		Limit	42,55
		30% <sup>(1)</sup>	11,49
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Tramadol hydrochloride + Paracetamol* ATC: N02AX52 wyk: B EAN ~ 283766

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Poltram® Combo Forte [42,55], Doreta [42,59]

Poltram® Retard 100: tabl. o przedl. uwalnianiu 100 mg - 10 szt. ◆	Rx	100%	8,52
		Limit	6,31
		30% <sup>(1)</sup>	4,10
		B <sup>(2)</sup>	2,21
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Tramadol hydrochloride* ATC: N02AX02 wyk: B EAN ~ 967612

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Tramal® Retard 100 [8,01], Poltram® Retard 100 [8,52]

Poltram® Retard 100: tabl. o przedl. uwalnianiu 100 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	23,87
		Limit	18,93
		30% <sup>(1)</sup>	10,62
		B <sup>(2)</sup>	4,94
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Tramadol hydrochloride* ATC: N02AX02 wyk: B EAN ~ 967629

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Tramal® Retard 100 [22,77], Poltram® Retard 100 [23,87]

Poltram® Retard 100: tabl. o przedl. uwalnianiu 100 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	38,00
		Limit	31,55
		30% <sup>(1)</sup>	15,92
		B <sup>(2)</sup>	6,45
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Tramadol hydrochloride* ATC: N02AX02 wyk: B EAN ~ 967636

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Tramal® Retard 100 [36,53], Poltram® Retard 100 [38,00]

Poltram® Retard 150: tabl. o przedl. uwalnianiu 150 mg - 10 szt. ◆	Rx	100%	12,34
		Limit	9,46
		30% <sup>(1)</sup>	5,72
		B <sup>(2)</sup>	2,88
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Tramadol hydrochloride* ATC: N02AX02 wyk: B EAN ~ 967711

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Tramal® Retard 150 [11,55], Poltram® Retard 150 [12,34]

Poltram® Retard 150: tabl. o przedl. uwalnianiu 150 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	36,50
		Limit	28,39
		30% <sup>(1)</sup>	16,63
		B <sup>(2)</sup>	8,11
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Tramadol hydrochloride* ATC: N02AX02 wyk: B EAN ~ 967728

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Tramal® Retard 150 - (IR) [30,55], Tramal® Retard 150 [33,21], Poltram® Retard 150 [36,50]

Poltram® Retard 150: tabl. o przedl. uwalnianiu 150 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	55,63
		Limit	47,32
		30% <sup>(1)</sup>	22,51
		B <sup>(2)</sup>	8,31
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Tramadol hydrochloride* ATC: N02AX02 wyk: B EAN ~ 967735

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Tramal® Retard 150 - (IR) [48,70], Tramal® Retard 150 [53,11], Poltram® Retard 150 [55,63]

Poltram® Retard 200: tabl. o przedl. uwalnianiu 200 mg - 10 szt. ◆	Rx	100%	16,32
		Limit	12,62
		30% <sup>(1)</sup>	7,49
		B <sup>(2)</sup>	3,70
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Tramadol hydrochloride* ATC: N02AX02 wyk: B EAN ~ 967810

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Tramal® Retard 200 [15,26], Poltram® Retard 200 [16,32]

Poltram® Retard 200: tabl. o przedl. uwalnianiu 200 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	44,99
		Limit	37,86
		30% <sup>(1)</sup>	18,49
		B <sup>(2)</sup>	7,13
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Tramadol hydrochloride* ATC: N02AX02 wyk: B EAN ~ 967827

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Tramal® Retard 200 [43,16], Poltram® Retard 200 [44,99]

Poltram® Retard 200: tabl. o przedl. uwalnianiu 200 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	72,60
		Limit	63,10
		30% <sup>(1)</sup>	28,43
		B <sup>(2)</sup>	9,50
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Tramadol hydrochloride* ATC: N02AX02 wyk: B EAN ~ 967834

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Tramal® Retard 200 [69,16], Poltram® Retard 200 [72,60]

Posaconazole AHCL: zaw. doust. 40 mg/ml - 1 but. 105 ml	Rx-z	100%	686,88
		Limit	684,02
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
INN: <i>Posaconazole</i>	ATC: J02AC04	wyk:	EAN ~ 575435
(1) Chemioterapia ICD10: C.0.14.a.; C.0.14.b.; C.0.14.c.   Kat. ciąży: C Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Posaconazole Teva [673,14], Posaconazole AHCL [686,88]			

Posaconazole Glenmark: zaw. doust. 40 mg/ml - 1 but. 105 ml	Rx-z	100%	673,14
		Limit	673,14
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Posaconazole* ATC: J02AC04 wyk: EAN ~ 267815

(1) Chemioterapia ICD10: C.0.14.a.; C.0.14.b.; C.0.14.c. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku (HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych WP: Zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci poniżej 18 rż. przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych; stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poniżej 18 rż. - wórná profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego; przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych; ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci do 18 rż. - wórná profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii, chłoniaki złośliwe u dzieci do 18 rż. - wórná profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii; nowotwory łite u dzieci do 18 rż. - wórná profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Posaconazole Glenmark [673,14], Posaconazole Stada [675,43], Posaconazole Mylan [684,02]



Naszym wyborem

**enarenal**  
 enalaprilii maleas

Posaconazole Mylan: zaw. doust. 40 mg/ml - 1 but. 105 ml	Rx-z	100%	684,02
		Limit	684,02
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	11,79
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

 INN: *Posaconazole* ATC: J02AC04 wyk: EAN ~ 771074

(1) Chemioterapia ICD10: C.0.14.a.; C.0.14.b.; C.0.14.c. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku (HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych WP: Zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci poniżej 18 rż. przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych; stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poniżej 18 rż. - wrotna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego; przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych; ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci do 18 rż. - wrotna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii; chłoniaki złośliwe u dzieci do 18 rż. - wrotna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do 18 rż. - wrotna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Odpowiedniki: Posaconazole Glenmark [673,14], Posaconazole Stada [675,43], Posaconazole Mylan [684,02]

Posaconazole Stada: zaw. doust. 40 mg/ml - 1 but. 105 ml	Rx-z	100%	675,43
		Limit	675,43
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

 INN: *Posaconazole* ATC: J02AC04 wyk: EAN ~ 136856

(1) Chemioterapia ICD10: C.0.14.a.; C.0.14.b.; C.0.14.c. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku (HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych WP: Zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci poniżej 18 rż. przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych; stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poniżej 18 rż. - wrotna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego; przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych; ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci do 18 rż. - wrotna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii; chłoniaki złośliwe u dzieci do 18 rż. - wrotna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do 18 rż. - wrotna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Odpowiedniki: Posaconazole Glenmark [673,14], Posaconazole Stada [675,43], Posaconazole Mylan [684,02]

Posaconazole Teva: zaw. doust. 40 mg/ml - 1 but. 105 ml	Rx-z	100%	673,14
		Limit	673,14
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

 INN: *Posaconazole* ATC: J02AC04 wyk: EAN ~ 142205

(1) Chemioterapia ICD10: C.0.14.a.; C.0.14.b.; C.0.14.c. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku (HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych WP: Zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci poniżej 18 rż. przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych; stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poniżej 18 rż. - wrotna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego; przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych; ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci do 18 rż. - wrotna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii; chłoniaki złośliwe u dzieci do 18 rż. - wrotna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do 18 rż. - wrotna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Odpowiedniki: Posaconazole Teva [673,14], Posaconazole AHCL [686,88]

Pradaxa®: kaps. twarde 110 mg - 30 szt.	Rx	100%	131,73
		Limit	51,54
		30% <sup>(1)</sup>	95,65
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

 INN: *Dabigatran etexilate* ATC: B01AE07 wyk: EAN ~ 641260

(1) Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna oraz prewencja nawrotów zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Odpowiedniki: Daxanlo [47,76], Telexer [54,45], Pradaxa® [131,73]

Pradaxa®: kaps. twarde 150 mg - 30 szt.	Rx	100%	133,36
		Limit	70,28
		30% <sup>(1)</sup>	84,16
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

 INN: *Dabigatran etexilate* ATC: B01AE07 wyk: EAN ~ 887453

(1) Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna oraz prewencja nawrotów zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Odpowiedniki: Daxanlo [63,18], Telexer [72,31], Pradaxa® [133,36]

Prazol®: kaps. 20 mg - 28 szt.	Rx	100%	19,18
		Limit	12,43
		50% <sup>(1)</sup>	12,97
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: *Omeprazole* ATC: A02BC01 wyk: B EAN ~ 772933

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Odpowiedniki: Prenome [9,47], Heligen Neo [9,66], Omeprazole Genotim [10,75], Agastin® [11,85], Goprazol [12,39], Progestim [14,57], Ultop [16,26], Gasec®-20 Gastrocaps® [16,34], Helicid® 20 [18,49], Prazol® [19,18], Bioprazol® [19,76], Polprazol® [20,92]

Preato: tabl. 75 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	21,93
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: *Pregabalin* ATC: N03AX16 wyk: B EAN ~ 142123

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D

Odpowiedniki: Pregabalin Sandoz [16,96], Preato [21,93]

Preato: tabl. 75 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	31,36
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: *Pregabalin* ATC: N03AX16 wyk: B EAN ~ 140045

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D

Odpowiedniki: Pregabalin Sandoz [25,88], Preato [31,36], Lyrica® [52,19], Lyrica® (IR) [52,19]

Preato: tabl. 100 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	38,51
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: *Pregabalin* ATC: N03AX16 wyk: B EAN ~ 140046

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D

Odpowiedniki: Pregabalin Sandoz [25,88], Preato [31,36], Lyrica® (IR) [52,19], Lyrica® (IR) [52,19]

Preato: tabl. 150 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	46,81
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: *Pregabalin* ATC: N03AX16 wyk: B EAN ~ 140047

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D

Odpowiedniki: Pregabalin Sandoz [44,92], Preato [46,81], Lyrica® (IR) [98,78], Lyrica® (IR) [102,90], Lyrica® [103,04]

Preato: tabl. 200 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	56,24
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,98
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: *Pregabalin* ATC: N03AX16 wyk: B EAN ~ 140048

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D

Odpowiedniki: Pregabalin Sandoz [44,92], Preato [46,81], Lyrica® (IR) [98,78], Lyrica® (IR) [102,90], Lyrica® [103,04]

Predasol: tabl. 20 mg - 20 szt.	Rx	100%	36,26
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	4,27
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Prednisolone** ATC: H02AB06 wyk: B EAN ~ 356712  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Autoimmunizacyjne zapalenie trzustki u dzieci do 18 rż.; eozynoflowe zapalenie jelit u dzieci do 18 rż.(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
 Sun-Farm Sp. z o.o.

Prefaxine: kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde 37,5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	13,80
		Limit	10,92
		30% <sup>(1)</sup>	6,16
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Venlafaxine** ATC: N06AX16 wyk: B EAN ~ 727490  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Symfazin ER<sup>®</sup> [10,37], Oriven [10,53], Faxigen XL [11,02], Efevelon SR [11,39], Lafactin [12,03], Velaxin<sup>®</sup> ER 37,5 [12,56], Venlectine [12,69], Alventa<sup>®</sup> [12,77], Venlafaxine Apotex [12,82], Faxelet ER [13,10], Axyven [13,37], Prefaxine [13,80]

Prefaxine: kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde 75 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	26,50
		Limit	21,84
		30% <sup>(1)</sup>	11,21
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Venlafaxine** ATC: N06AX16 wyk: B EAN ~ 727506  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Venlafaxine Bluefish XL [17,37], Alventa<sup>®</sup> - (IR) [17,75], Symfazin ER<sup>®</sup> [19,46], Oriven [19,60], Faxigen XL [20,62], Lafactin [22,78], Alventa<sup>®</sup> [23,03], Efevelon SR [23,60], Velaxin<sup>®</sup> ER 75 [23,91], Venlectine [24,18], Venlafaxine Apotex [24,46], Faxelet ER [24,62], Axyven [25,04], Efectin<sup>®</sup> ER 75 [25,55], Prefaxine [26,50]

Prefaxine: kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde 150 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	50,06
		Limit	43,68
		30% <sup>(1)</sup>	19,48
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Venlafaxine** ATC: N06AX16 wyk: B EAN ~ 727520  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Venlafaxine Bluefish XL [31,86], Symfazin ER<sup>®</sup> [32,21], Alventa<sup>®</sup> - (IR) [32,27], Oriven [32,80], Faxigen XL [38,30], Lafactin [42,60], Alventa<sup>®</sup> [43,10], Efevelon SR [44,25], Efectin<sup>®</sup> ER 150 [44,82], Velaxin<sup>®</sup> ER 150 [44,84], Venlectine [45,62], Axyven [46,26], Venlafaxine Apotex [46,77], Faxelet ER [47,11], Prefaxine [50,06]

Pregabalin Sandoz: kaps. twarde 75 mg - 70 szt. ◆	Rx	100%	66,77
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	4,73
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Pregabalin** ATC: N03AX16 wyk: B EAN ~ 670483  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 rż.(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
 Sandoz GmbH

Pregabalin Sandoz: kaps. twarde 150 mg - 70 szt. ◆	Rx	100%	126,86
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,73
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Pregabalin** ATC: N03AX16 wyk: B EAN ~ 670507  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 rż.(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
 Sandoz GmbH

Prenessa <sup>®</sup> : tabl. 4 mg - 30 szt.	Rx	100%	13,09
		Limit	5,58
		R <sup>(1)</sup>	10,71
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Perindopril erbumine** ATC: C09AA04 wyk: B EAN ~ 569311  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Prenessa <sup>®</sup> : tabl. 8 mg - 30 szt.	Rx	100%	24,71
		Limit	11,17
		R <sup>(1)</sup>	19,94
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Perindopril erbumine** ATC: C09AA04 wyk: B EAN ~ 662494  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Prenome: tabl. dojelitowe, twarde 20 mg - 28 szt.	Rx	100%	9,47
		Limit	9,47
		50% <sup>(1)</sup>	4,74
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Omeprazole** ATC: A02BC01 wyk: B EAN ~ 227253  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 rż.(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: A  
 Mercapharm Sp. z o.o. Polska  
 Odpowiedniki: Prenome [9,47], Heligen Neo [9,66], Omeprazole Genoptim [10,75], Agastin<sup>®</sup> [11,85], Goprazol [12,39], Progestim [14,57], Ultop [16,26], Gasec<sup>®</sup>-20 Gastrocaps<sup>®</sup> [16,34], Helicid<sup>®</sup> 20 [18,49], Prazol<sup>®</sup> [19,18], Bioprazol<sup>®</sup> [19,76], Polprazol<sup>®</sup> [20,92]

Prenome: tabl. dojelitowe, twarde 40 mg - 28 szt.	Rx	100%	15,39
		Limit	15,39
		50% <sup>(1)</sup>	7,70
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Omeprazole** ATC: A02BC01 wyk: B EAN ~ 227239  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 rż.(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: A  
 Mercapharm Sp. z o.o. Polska  
 Odpowiedniki: Prenome [15,39], Prazol<sup>®</sup> [17,28], Heligen Neo [17,59], Omeprazole Genoptim [19,68], Bioprazol<sup>®</sup> [26,94], Helicid<sup>®</sup> Forte [28,53], Ultop [30,13], Polprazol<sup>®</sup> PPH [32,52]

Presartan: tabl. powl. 50 mg - 30 szt.	Rx	100%	12,26
		Limit	11,46
		30% <sup>(1)</sup>	4,24
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Losartan potassium** ATC: C09CA01 wyk: B EAN ~ 724345  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Bausch Health

Odpowiedniki: Losartanum 123ratio [X], Presartan [12,26], Lakea<sup>®</sup> [14,05], Losartan Krka [14,81], Lozap<sup>®</sup> 50 [15,15], Losacor<sup>®</sup> [15,61], Xartan<sup>®</sup> [23,13]

Presartan H: tabl. powl. 50/12,5 mg - 30 szt.	Rx	100%	14,78
		Limit	11,46
		30% <sup>(1)</sup>	6,76
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Losartan potassium + Hydrochlorothiazide** ATC: C09DA01 wyk: B EAN ~ 721641  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Bausch Health

Odpowiedniki: Presartan H [14,78], Lozap<sup>®</sup> HCT [15,15]

Presartan H: tabl. powl. 100/25 mg - 30 szt.	Rx	100%	28,48
		Limit	22,93
		30% <sup>(1)</sup>	12,43
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Losartan potassium + Hydrochlorothiazide** ATC: C09DA01 wyk: B EAN ~ 721894  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Bausch Health

Prestarium <sup>®</sup> 5 mg: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.	Rx	100%	22,10
		Limit	5,58
		R <sup>(1)</sup>	19,72
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Perindopril arginine** ATC: C09AA04 wyk: B EAN ~ 337774  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Servier Polska Sp. z o.o.

Prestarium <sup>®</sup> 10 mg: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.	Rx	100%	35,29
		Limit	11,17
		R <sup>(1)</sup>	30,52
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Perindopril arginine** ATC: C09AA04 wyk: B EAN ~ 336081  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Servier Polska Sp. z o.o.

Prestocek Combi: tabl. 4/5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	14,69
		Limit	5,58
		R <sup>(1)</sup>	12,31
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Amlodipine + Perindopril tert-butylamine** ATC: C09BB04 wyk: B EAN ~ 001839  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Amlessa [14,69], Prestocek Combi [14,69]


**ZAKODOWANY DO WALKI  
Z ZAKAŻENIEM**

<b>Prestożek Combi: tabl. 4/5 mg - 60 szt. ♦</b>	Rx	100%	29,04
		Limit	11,17
		R <sup>(1)</sup>	24,27
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Amlodipine + Perindopril tert-butylamine</i>	ATC: C09BB04	wyk: B	EAN ~ 001846
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Adamed Sp. z o.o.			

<b>Prestożek Combi: tabl. 4/10 mg - 30 szt. ♦</b>	Rx	100%	14,69
		Limit	5,58
		R <sup>(1)</sup>	12,31
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Amlodipine + Perindopril tert-butylamine</i>	ATC: C09BB04	wyk: B	EAN ~ 001860
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Amlessa [14,69], Prestożek Combi [14,69]			

<b>Prestożek Combi: tabl. 4/10 mg - 60 szt. ♦</b>	Rx	100%	29,04
		Limit	11,17
		R <sup>(1)</sup>	24,27
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Amlodipine + Perindopril tert-butylamine</i>	ATC: C09BB04	wyk: B	EAN ~ 001877
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:C, T3:D Adamed Sp. z o.o.			

<b>Prestożek Combi: tabl. 8/5 mg - 30 szt. ♦</b>	Rx	100%	29,04
		Limit	11,17
		R <sup>(1)</sup>	24,27
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Amlodipine + Perindopril tert-butylamine</i>	ATC: C09BB04	wyk: B	EAN ~ 001891
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Amlessa [29,04], Prestożek Combi [29,04]			

<b>Prestożek Combi: tabl. 8/5 mg - 60 szt. ♦</b>	Rx	100%	57,05
		Limit	22,34
		R <sup>(1)</sup>	47,51
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Amlodipine + Perindopril tert-butylamine</i>	ATC: C09BB04	wyk: B	EAN ~ 001907
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2: T3: D Adamed Sp. z o.o.			

<b>Prestożek Combi: tabl. 8/10 mg - 30 szt. ♦</b>	Rx	100%	29,04
		Limit	11,17
		R <sup>(1)</sup>	24,27
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Amlodipine + Perindopril tert-butylamine</i>	ATC: C09BB04	wyk: B	EAN ~ 001921
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Amlessa [29,04], Prestożek Combi [29,04]			

<b>Prestożek Combi: tabl. 8/10 mg - 60 szt. ♦</b>	Rx	100%	57,05
		Limit	22,34
		R <sup>(1)</sup>	47,51
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Amlodipine + Perindopril tert-butylamine</i>	ATC: C09BB04	wyk: B	EAN ~ 001938
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Adamed Sp. z o.o.			

<b>Prevenar 13®: inj. [zaw.] 0,5 ml - 1 amp.-strzyk. (+ igła)</b>	Rx	100%	280,12
		Limit	280,12
		50% <sup>(1)</sup>	140,06
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Pneumococcal vaccine</i>	ATC: J07AL02	wyk: B	EAN ~ 737420
(1) Profilaktyka osób powyżej 65 r. ze zwiększonym (umiarkowanym do wysokiego) ryzykiem choroby pneumokokowej tj. z: przewlekłą chorobą serca, przewlekłą chorobą wątroby, przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą, implantem ślimakowym, wyciekami płynu mózgowo-rdzeniowego, wrodzoną lub nabytą asplenią, niedokrwistością sierpowatą i innymi hemoglobinopatiami, przewlekłą niewydolnością nerek, wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności, uogólnioną chorobą nowotworową, zakażeniem wirusem HIV, chorobą Hodgkina, jatrogenną immunosupresją, białaczką, szpiczakiem mnogim, przeszczepem narządu litego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Pfizer Polska Sp. z o.o.			

<b>Probella: tabl. 2 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	42,10
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	8,88
INN: <i>Dienogest</i>	ATC: G03DB08	wyk: B	EAN ~ 139697
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Endometriozia   Kat. ciąży: X Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			
Odpowiedniki: Diemono - (IR) [37,59], Diemono - (IR) [37,65], Zafrilla [37,76], Aridla [38,45], Symdiono [39,59], Endovelle [39,82], Probella [42,10], Diemono [42,11], Visanne® [62,37]			

<b>Profenid®: czopki 100 mg - 10 szt.</b>	Rx	100%	11,80
		Limit	11,80
		50% <sup>(1)</sup>	5,90
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ketoprofen</i>	ATC: M01AE03	wyk: B	EAN ~ 098514
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ból w przebiegu chorób nowotworowych - w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:B, T2:B, T3:D Sanofi Winthrop Industrie			

<b>Profenid®: tabl. powł. 100 mg - 30 szt.</b>	Rx	100%	12,09
		Limit	10,22
		50% <sup>(1)</sup>	6,98
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ketoprofen</i>	ATC: M01AE03	wyk: B	EAN ~ 760718
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ból w przebiegu chorób nowotworowych - w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:B, T2:B, T3:D Sanofi Winthrop Industrie			
Odpowiedniki: Ketokaps Med [12,04], Profenid® [12,09], Refastin [14,56], Ketonal® forte [14,93]			

<b>Progastim: kaps. dojelitowe 20 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	14,57
		Limit	12,43
		50% <sup>(1)</sup>	8,36
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Omeprazole</i>	ATC: A02BC01	wyk: B	EAN ~ 635450
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r.(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C RECORDATI Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Premeo [9,47], Heligen Neo [9,66], Omeprazole Genotim [10,75], Agastin® [11,85], Goprazol [12,39], Progastim [14,57], Ultop [16,26], Gasec®-20 Gastrocaps® [16,34], Helicid® 20 [18,49], Prazolol [19,18], Bioprazolol® [19,76], Polprazolol® [20,92]			

<b>Prograf: kaps. twarde 0,5 mg - 30 szt.</b>	Rx	100%	57,92
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,83
INN: <i>Tacrolimus</i>	ATC: L04AD02	wyk: B	EAN ~ 148713
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kośćczyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Astellas Pharma Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Cidimus [46,03], Prograf [57,92]			

<b>Prograf: kaps. twarde 1 mg - 30 szt.</b>	Rx	100%	114,58
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
INN: <i>Tacrolimus</i>	ATC: L04AD02	wyk: B	EAN ~ 447213
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kośćczyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Astellas Pharma Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Cidimus [85,70], Prograf [114,58]			

<b>Prograf: kaps. twarde 5 mg - 30 szt.</b>	Rx	100%	570,70
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
INN: <i>Tacrolimus</i>	ATC: L04AD02	wyk: B	EAN ~ 447312
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kośćczyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Astellas Pharma Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Cidimus [383,48], Prograf [570,70]			



<b>Prolia:</b> inj. [roztw.] <b>60 mg/ml</b> - 1 amp.-strzyk. z aut. zabezp. igły	Rx	100%	<b>630,66</b>
		Limit	<b>630,66</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>189,20</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Denosumab</b>	ATC: <b>M05BX04</b>	wyk: <b>EAN ~ 076164</b>	
(1) Osteoporoza pomenopauzalna (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA lub wystąpienie złamania osteoporotycznego) u kobiet w wieku powyżej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.			

<b>Promonta 4 mg:</b> tabl. do rozgr. i żucia <b>4 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>13,68</b>
		Limit	<b>9,30</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>7,17</b>
		C <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Montelukast</b>	ATC: <b>R03DC03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>671052</b>
(1) Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>			
Bausch Health			
Odpowiedniki: Montelukast Bluefish [X], Montelukast Aurovitas [9,18], Romilast [10,31], Orilukast [10,47], Monka- sta [13,68], Montelukast Sandoz [13,68], Promonta 4 mg [13,68], Astmodil [15,46], Milukante [15,46]			

<b>Promonta 5 mg:</b> tabl. do rozgr. i żucia <b>5 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>17,15</b>
		Limit	<b>11,63</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>9,01</b>
		C <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Montelukast</b>	ATC: <b>R03DC03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>671076</b>
(1) Astma, Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>			
Bausch Health			
Odpowiedniki: Montelukast Bluefish [X], Montelukast Aurovitas [11,27], Romilast [12,62], Orilukast [12,64], Montelukast Sandoz [13,83], Promonta 5 mg [17,15], MonkaSta [17,28], Astmodil [18,82], Milukante [19,27]			

<b>Promonta 10 mg:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>26,34</b>
		Limit	<b>23,25</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>10,07</b>
		C <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Montelukast</b>	ATC: <b>R03DC03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>671090</b>
(1) Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Astma (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>			
Bausch Health			
Odpowiedniki: Montelukast Aurovitas [21,22], Montelukast Medreg [22,45], Montelukast Bluefish [23,07], Asmenol [23,25], Montelukast Sandoz [23,25], Romilast [23,42], Orilukast [25,65], MonkaSta [26,01], Promonta 10 mg [26,34], Astmodil [27,02], Milukante [29,61]			

<b>Pronasal:</b> aerozol do nosa <b>50 µg/dawkę</b> - 1 but. (140 dawek)	Rx	100%	<b>15,01</b>
		Limit	<b>15,01</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>7,51</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Mometasone furoate</b>	ATC: <b>R01AD09</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>099688</b>
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Pronasal [15,01], Metmin [16,50], Momester [17,41]			

<b>Pronasal:</b> aerozol do nosa <b>50 µg/dawkę</b> - 2 but. 140 dawek	Rx	100%	<b>28,50</b>
		Limit	<b>28,50</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>14,25</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Mometasone furoate</b>	ATC: <b>R01AD09</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>099695</b>
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.			

<b>Pronoran®:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu <b>50 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>27,67</b>
		Limit	<b>23,52</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>11,21</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Piribedil</b>	ATC: <b>N04BC08</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>846320</b>
(1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Servier Polska Sp. z o.o.			

<b>Proscar®:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>28,80</b>
		Limit	<b>24,94</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>7,06</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Finasteride</b>	ATC: <b>G04CB01</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>362110</b>
(1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>N</b>			
MSD Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Finahit [X], Zasterid® [27,70], Finxta [28,38], Proscar® [28,80]			

<b>Prostammic:</b> kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde <b>0,4 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>24,04</b>
		Limit	<b>19,21</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>8,03</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Tamsulosin hydrochloride</b>	ATC: <b>G04CA02</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>573257</b>
(1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>N</b>			
+pharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: TamsuGen® [17,94], Tamoptim [19,96], Adatam [23,97], Uprox [23,98], Prostammic [24,04], Tanyz® [24,10], Tamsudil [24,84], Omnic® 0,4 [24,85]			

<b>Prourosan®:</b> kaps. <b>250 mg</b> - 90 szt.	Rx	100%	<b>95,19</b>
		Limit	<b>75,09</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>42,63</b>
		C <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Ursodeoxycholic acid</b>	ATC: <b>A05AA02</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>203924</b>
(1) Zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych związane z mukowiscydozą, Pierwotna żółciowa marskość wątroby w początkowym stadium choroby (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
PRO. MED. PL Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Ursocam [89,59], Prourosan® [95,19]			

<b>Provera®:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>9,70</b>
		Limit	<b>8,15</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>4,00</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Medroxyprogesterone</b>	ATC: <b>G03DA02</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>236411</b>
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b>			
Pfizer Polska Sp. z o.o.			

<b>Propranolol Accord:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 50 szt.	Rx	100%	<b>5,36</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>5,36</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Propranolol hydrochloride</b>	ATC: <b>C07AA05</b>	wyk: <b>EAN ~ 033507</b>	
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Napady anoksemiczne u dzieci do 18 rż. - profilaktyka; niewydolność serca u dzieci do 18 rż.; naczyńniaki wczesnoniemowlęce u dzieci do 18 rż.; naczyńniaki płaskie; naczyńniaki jamiste (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Propranolol WZF [5,36], Propranolol Accord [5,36]			

<b>Propranolol Accord:</b> tabl. powł. <b>40 mg</b> - 50 szt.	Rx	100%	<b>9,30</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Propranolol hydrochloride</b>	ATC: <b>C07AA05</b>	wyk: <b>EAN ~ 033590</b>	
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Napady anoksemiczne u dzieci do 18 rż. - profilaktyka; niewydolność serca u dzieci do 18 rż.; naczyńniaki wczesnoniemowlęce u dzieci do 18 rż.; naczyńniaki płaskie; naczyńniaki jamiste (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Propranolol WZF [9,30], Propranolol Accord [9,30]			

<b>Propranolol WZF:</b> tabl. <b>10 mg</b> - 50 szt.	Rx	100%	<b>5,36</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>4,82</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Propranolol hydrochloride</b>	ATC: <b>C07AA05</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>112111</b>
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Napady anoksemiczne u dzieci do 18 rż. - profilaktyka; niewydolność serca u dzieci do 18 rż.; naczyńniaki wczesnoniemowlęce u dzieci do 18 rż.; naczyńniaki płaskie; naczyńniaki jamiste (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>			
Polfa Warszawa SA			
Odpowiedniki: Propranolol Accord [5,36], Propranolol WZF [5,36]			

<b>Propranolol WZF:</b> tabl. <b>40 mg</b> - 50 szt.	Rx	100%	<b>9,30</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>2,88</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Propranolol hydrochloride</b>	ATC: <b>C07AA05</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>112210</b>
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Napady anoksemiczne u dzieci do 18 rż. - profilaktyka; niewydolność serca u dzieci do 18 rż.; naczyńniaki wczesnoniemowlęce u dzieci do 18 rż.; naczyńniaki płaskie; naczyńniaki jamiste (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>			
Polfa Warszawa SA			
Odpowiedniki: Propranolol Accord [9,30], Propranolol WZF [9,30]			







# ZOLPIC

Daj owcom odpocząć.  
zolpidem



Pulmoterol: prosz. do inhal. [kaps. twarde] 50 µg/dawkę - 120 szt.	Rx	100%	116,90
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,98
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Salmeterol* ATC: R03AC12 wyk: A EAN ~ 206390  
 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Pulmozyme®: roztw. do inhal. z nebulizatora 2,5 mg/2,5 ml - 30 amp. 2,5 ml	Rx	100%	2457,07
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Dornase alfa* ATC: R05CB13 wyk: B EAN ~ 375813  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Mukowiscydoza WP: Pierwotna dyskineza rzęsek | Kat. ciąży: B

Pulsaren® 20: tabl. powł. 20 mg - 30 szt. ♦	Rx	100%	15,85
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	12,67
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Quinapril* ATC: C09AA06 wyk: B EAN ~ 165710  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci od 6 do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D

Odpowiedniki: Accupro® 20 [X], Pulsaren® 20 [15,85], Acurenal® [19,25]

Puregon®: inj. dom./podsk. [lief. do przyg. roztw.] 300 j.m./0,36 ml - 1 zest. (+ 6 igieł)	Rx-z	100%	314,11
		Limit	305,99
		R <sup>(1)</sup>	11,32
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Follitropin beta* ATC: G03GA06 wyk: B EAN ~ 339754  
 (1) Kontrolowana hiperstimulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli; Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) - refundacja do 3 cykli | Kat. ciąży: X

Puregon®: inj. dom./podsk. [lief.] 600 j.m./0,72 ml - 2 zest. (+ 6 igieł)	Rx-z	100%	615,27
		Limit	612,01
		R <sup>(1)</sup>	6,46
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Follitropin beta* ATC: G03GA06 wyk: B EAN ~ 033976  
 (1) Kontrolowana hiperstimulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli; Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) - refundacja do 3 cykli | Kat. ciąży: X

Puretha®: inj. podsk. zaw. [mieszanki alergenów drzewa] 0,5 mg/ml - 1 fioł. 3 ml (+8 strzyk. z igła)	Rx	100%	268,20
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Allergen extracts* ATC: V01AA wyk: B EAN ~ 975419  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Puretha®: inj. podsk. zaw. [mieszanki alergenów trawy, brzoza] 0,5 mg/ml - 1 fioł. 3 ml (+8 strzyk. z igła)	Rx	100%	268,20
		Limit	268,20
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Allergen extracts* ATC: V01AA wyk: B EAN ~ 975419  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach | Kat. ciąży: C

Puretha®: inj. podsk. zaw. [mieszanki alergenów trawy] 0,5 mg/ml - 1 fioł. 3 ml (+8 strzyk. z igła)	Rx	100%	268,20
		Limit	268,20
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Allergen extracts* ATC: V01AA wyk: B EAN ~ 975419  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach | Kat. ciąży: C

Puretha®: inj. podsk. zaw. [pojedyncze alergoidy brzozy] 0,5 mg/ml - 1 fioł. 3 ml (+8 strzyk. z igła)	Rx	100%	268,20
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Allergen extracts* ATC: V01AA wyk: B EAN ~ 975310  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Purilon Gel: opatrunek leczniczy [żel] - 1 op. 15 g	WM	100%	12,43
		Limit	11,72
		30% <sup>(1)</sup>	4,23
		B <sup>(2)</sup>	0,71
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Emplastri conlativi* ATC: V20 wyk: EAN ~ 645317  
 (1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N

Pyrazinamid Farmapol: tabl. 500 mg - 250 szt.	Rx	100%	159,61
		Limit	159,61
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Pyrazinamide* ATC: J04AK01 wyk: B EAN ~ 263516  
 (1) Gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D

▼Raenom: tabl. powł. 5 mg - 56 szt. ♦	Rx	100%	72,12
		Limit	70,31
		R <sup>(1)</sup>	5,01
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ivabradine* ATC: C01EB17 wyk: EAN ~ 307349  
 (1) Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II-NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca  $\geq 75$  uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z  $\beta$ -adrenolitykiem lub gdy leczenie  $\beta$ -adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D

Odpowiedniki: Ivabradine Accord [X], Ivabradine Ranbaxy [68,69], Ivabradine Zentiva [68,69], Bixebra - (IR) [72,05], Raenom [72,12], Bixebra - (IR) [73,22], Bixebra - (IR) [73,25], Ivabradine Mylan [76,70], Ivabradine Anpharm - (IR) [77,85], Ivabradine Aurovitas [80,43], Ivohart [81,01], Ivabradine Genoptim [81,08], Ivabradine Anpharm [83,37], Bixebra [84,72]

▼Raenom: tabl. powł. 7,5 mg - 56 szt. ♦	Rx	100%	104,94
		Limit	104,94
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ivabradine* ATC: C01EB17 wyk: EAN ~ 307370  
 (1) Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II-NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca  $\geq 75$  uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z  $\beta$ -adrenolitykiem lub gdy leczenie  $\beta$ -adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D

Odpowiedniki: Ivabradine Accord [X], Ivabradine Aurovitas [X], Ivabradine Ranbaxy [99,79], Ivabradine Zentiva [99,79], Bixebra - (IR) [104,82], Bixebra - (IR) [104,94], Raenom [104,94], Bixebra - (IR) [105,46], Bixebra - (IR) [105,46], Ivabradine Mylan [111,81], Ivabradine Anpharm - (IR) [113,53], Ivohart [118,27], Ivabradine Genoptim [118,32], Ivabradine Anpharm [121,89], Bixebra [123,83]

Ramitor®: tabl. powł. 2,5 mg - 28 szt. ♦	Rx	100%	4,91
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril* ATC: C09AA05 wyk: B EAN ~ 093280  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D

Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Ramitor® [4,91], Polpri® [5,93], Tritace® 2,5 [9,63], Polpri® [13,86]

Ramitor®: tabl. powł. 5 mg - 28 szt. ♦	Rx	100%	8,70
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,97
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril* ATC: C09AA05 wyk: B EAN ~ 093303  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D

Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Ramitor® [8,70], Ramipril Genoptim [9,56], Vivace - (IR) [10,52], Vivace - (IR) [10,53], Vivace - (IR) [10,63], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Polpri® [10,97], Polpri® [11,49], Tritace® 5 [13,50]

<b>Ramicor®: tabl. powł. 10 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100%	15,95
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	11,95
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: **Ramipril** | ATC: C09AA05 | wyk: B | EAN ~ 093334

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D

Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Tritace® 10 - (IR) [X], Ramicor® [15,95], Ramipril Genoptim [17,84], Tritace® 10 - (IR) [19,44], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,65], Tritace® 10 - (IR) [19,68], Vivace - (IR) [19,91], Vivace - (IR) [20,08], Piramil 10 mg [20,13], Vivace - (IR) [20,25], Polpril® [20,85], Polpril® [22,18], Tritace® 10 [22,20]

<b>Ramipril Aurovitas: tabl. 5 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	11,27
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,50
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: **Ramipril** | ATC: C09AA05 | wyk: B | EAN ~ 132595

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D

Odpowiedniki: Ampril 5 mg [9,87], Piramil 5 mg - (IR) [10,99], Piramil 5 mg - (IR) [10,99], Piramil 5 mg - (IR) [11,00], Piramil 5 mg - (IR) [11,00], Ramipril Aurovitas [11,27], Piramil 5 mg [11,38], Vivace [11,60], Axti® [11,74]

<b>Ramipril Aurovitas: tabl. 10 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	21,33
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	12,80
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: **Ramipril** | ATC: C09AA05 | wyk: B | EAN ~ 326012

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D

Odpowiedniki: Piramil 10 mg - (IR) [16,06], Piramil 10 mg - (IR) [16,06], Ampril 10 mg - (IR) [16,17], Piramil 10 mg - (IR) [16,17], Ampril 10 mg - (IR) [16,20], Piramil 10 mg - (IR) [16,98], Ampril 10 mg [18,35], Ramipril Aurovitas [21,33], Vivace [22,01], Axti® [22,39]

<b>Ramipril Genoptim: tabl. 5 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100%	9,56
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,97
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: **Ramipril** | ATC: C09AA05 | wyk: B | EAN ~ 131646

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D

Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Ramicor® [8,70], Ramipril Genoptim [9,56], Vivace - (IR) [10,52], Vivace - (IR) [10,53], Vivace - (IR) [10,63], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Polpril® [10,97], Polpril® [11,49], Tritace® 5 [13,50]

<b>Ramipril Genoptim: tabl. 10 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100%	17,84
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	11,95
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: **Ramipril** | ATC: C09AA05 | wyk: B | EAN ~ 131665

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D

Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Ramicor® [8,70], Ramipril Genoptim [17,84], Tritace® 10 - (IR) [19,44], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,65], Tritace® 10 - (IR) [19,68], Vivace - (IR) [19,91], Vivace - (IR) [20,08], Piramil 10 mg [20,13], Vivace - (IR) [20,25], Polpril® [20,85], Polpril® [22,18], Tritace® 10 [22,20]

<b>Ramizek Combi: kaps. twarde 5/10 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	17,33
		Limit	17,33
		30% <sup>(1)</sup>	4,68
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: **Ramipril + Amlodipine** | ATC: C09BB07 | wyk: B | EAN ~ 142681

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D

Odpowiedniki: Sumilar Duo [16,31], Sumilar [17,33], Ramizek Combi [17,33], Rimal [17,34], Egramoln [17,49]

<b>Ramizek Combi: kaps. twarde 5/5 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	17,33
		Limit	17,33
		30% <sup>(1)</sup>	4,68
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: **Ramipril + Amlodipine** | ATC: C09BB07 | wyk: B | EAN ~ 142681

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D

Odpowiedniki: Sumilar Duo [16,31], Sumilar [17,33], Ramizek Combi [17,33], Rimal [17,34], Egramoln [17,49]

<b>Ramizek Combi: kaps. twarde 10/5 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	9,16
		Limit	8,67
		30% <sup>(1)</sup>	2,78
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: **Ramipril + Amlodipine** | ATC: C09BB07 | wyk: B | EAN ~ 142520

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D

Odpowiedniki: Sumilar Duo [8,45], Rimal [9,16], Sumilar [9,16], Ramizek Combi [9,16], Egramoln [9,23]

<b>Ramizek Combi: kaps. twarde 5/10 mg - 60 szt. ◆</b>	Rx	100%	17,33
		Limit	17,33
		30% <sup>(1)</sup>	4,68
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: **Ramipril + Amlodipine** | ATC: C09BB07 | wyk: B | EAN ~ 142613

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D

Odpowiedniki: Sumilar Duo [8,45], Rimal [9,16], Sumilar [9,16], Ramizek Combi [9,16], Egramoln [9,23]

<b>Ramizek Combi: kaps. twarde 10/5 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	9,16
		Limit	8,67
		30% <sup>(1)</sup>	2,78
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: **Ramipril + Amlodipine** | ATC: C09BB07 | wyk: B | EAN ~ 142636

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D

Odpowiedniki: Sumilar Duo [8,45], Rimal [9,16], Sumilar [9,16], Ramizek Combi [9,16], Egramoln [9,23]

<b>Ramizek Combi: kaps. twarde 10/10 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100%	17,33
		Limit	17,33
		30% <sup>(1)</sup>	4,68
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: **Ramipril + Amlodipine** | ATC: C09BB07 | wyk: B | EAN ~ 142759

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D

Odpowiedniki: Sumilar Duo [16,31], Ramizek Combi [17,33], Rimal [17,34], Egramoln [17,49]

<b>Ramizek Combi: kaps. twarde 10/10 mg - 60 szt. ◆</b>	Rx	100%	17,33
		Limit	17,33
		30% <sup>(1)</sup>	4,68
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: **Ramipril + Amlodipine** | ATC: C09BB07 | wyk: B | EAN ~ 142643

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D

Odpowiedniki: Sumilar Duo [16,31], Ramizek Combi [17,33], Rimal [17,34], Egramoln [17,49]

<b>Ramizek Combi: kaps. twarde 10/10 mg - 60 szt. ◆</b>	Rx	100%	32,73
		Limit	32,73
		30% <sup>(1)</sup>	8,84
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: **Ramipril + Amlodipine** | ATC: C09BB07 | wyk: B | EAN ~ 142728

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D

Odpowiedniki: Sumilar Duo [16,31], Ramizek Combi [17,33], Rimal [17,34], Egramoln [17,49]

<b>Ramoclav: tabl. powł. 1 g - 14 szt. ◆</b>	Rx	100%	28,48
		Limit	28,48
		50% <sup>(1)</sup>	14,24
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: **Amoxicillin + Clavulanic acid** | ATC: J01CR02 | wyk: B | EAN ~ 042073

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Odpowiedniki: Amoksisylav® - (IR) [X], Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas [25,22], Amoksisylav® - (IR) [26,86], Co-amoxiclav Bluefish [27,29], Penlac [27,29], Amoksisylav® - (IR) [27,45], Ramoclav [28,48], Augmentin® - (IR) [29,11], Augmentin® - (IR) [29,16], Augmentin® - (IR) [29,23], Auglavin PPH [31,00], Polamoklav [31,00], Amoksisylav® [31,35], Augmentin® - (IR) [32,30], Augmentin® - (IR) [32,32], Augmentin® [34,92], Taromentin® [40,04]

<b>Ramoclav: tabl. powł. 1 g - 21 szt. ◆</b>	Rx	100%	41,04
		Limit	41,04
		50% <sup>(1)</sup>	20,52
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

 INN: **Amoxicillin + Clavulanic acid** | ATC: J01CR02 | wyk: B | EAN ~ 042080

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

Odpowiedniki: Ramoclav [41,04], Taromentin® [52,77]



Naszym wyborem

**enarenal**  
 enalapryli maleas

<b>Ramoclav - (IR): tabl. powł. 875 mg+ 125 mg - 14 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>28,14</b>
		Limit	<b>28,14</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>14,07</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amoxicillin + Clavulanic acid** ATC: **J01CR02** wyk: **B** EAN ~ **147402**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** **Delfarma Sp. z o.o.**

Odpowiedniki: Amylan [25,22], Ramoclav - (IR) [28,14], Hiconcil combi [29,00]

<b>Ramoclav - (IR): tabl. powł. 875 mg+ 125 mg - 21 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>40,53</b>
		Limit	<b>40,53</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>20,27</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amoxicillin + Clavulanic acid** ATC: **J01CR02** wyk: **B** EAN ~ **147403**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** **Delfarma Sp. z o.o.**

<b>Ranacand: tabl. 8 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	<b>14,44</b>
		Limit	<b>10,70</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>6,95</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Candesartan cilexetil** ATC: **C09CA06** wyk: **B** EAN ~ **801367**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D** **Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.**

Odpowiedniki: Kandesar [13,24], Candepres [13,46], Carzap [13,46], Atacand® [14,18], **Ranacand [14,44]**, Karbis [14,61]

<b>Ranacand: tabl. 16 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	<b>27,91</b>
		Limit	<b>21,40</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>12,93</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Candesartan cilexetil** ATC: **C09CA06** wyk: **B** EAN ~ **801350**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D** **Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.**

Odpowiedniki: Carzap - (IR) [21,33], Carzap - (IR) [21,37], Carzap - (IR) [21,37], Candepres - (IR) [21,39], Kandesar [25,51], Candepres [25,97], Carzap [25,97], **Ranacand [27,91]**, Karbis [28,26], Atacand® [28,88]

<b>Ranloc: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>9,02</b>
		Limit	<b>6,22</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>5,91</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Pantoprazole** ATC: **A02BC02** wyk: **B** EAN ~ **730100**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.**

Odpowiedniki: Pamył 20 mg [6,32], Pantoprazole Genoptim [6,80], Ozzion [6,91], Pantoprazole Bluefish [7,13], Panrazol [7,23], Gerdin 20 mg [7,36], Panprazol [8,05], Noacid [8,37], **Ranloc [9,02]**, Nolzapa® 20 mg tabletki dojelitowe [9,07], Controloc® 20 [9,80], Panzol [10,03], IPP 20 [10,14], Contix [10,48], Anesteloc® 20 [11,29]

<b>Ranloc: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>17,37</b>
		Limit	<b>12,43</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>11,16</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Pantoprazole** ATC: **A02BC02** wyk: **B** EAN ~ **730179**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.**

Odpowiedniki: Nolzapa® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [11,61], Nolzapa® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR) [11,63], Pamył 40 mg [12,71], Pantoprazole Genoptim [12,71], Ozzion [12,93], Pantoprazole Bluefish [13,25], Gerdin 40 mg [13,46], Panrazol [13,71], Panprazol [15,37], Contix [15,47], Noacid [16,00], **Ranloc [17,37]**, Nolzapa® 40 mg tabletki dojelitowe [17,49], Controloc® 40 [17,52], Panzol [19,53], IPP 40 [19,66], Anesteloc® 40 [19,74]

<b>Ranlosin: kaps. o przedł. uwalnianiu 0,4 mg - 30 szt.</b>	Rx	100%	<b>23,99</b>
		Limit	<b>19,21</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>7,98</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Tamsulosin hydrochloride** ATC: **G04CA02** wyk: **B** EAN ~ **048007**  
 (1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **N** **Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.**

Odpowiedniki: Omsal - (IR) [X], Urostat 0,4 mg [X], Urostat 0,4 mg - (IR) [X], Tamsiger [16,35], Urostat 0,4 mg - (IR) [16,35], Tamiron [16,49], Bazetham Retard [23,81], Omsal [23,81], Symlosin SR® [23,81], Tanyz® ERAS [23,90], Uprox XR [23,98], Adatam XR [23,99], **Ranlosin [23,99]**, TamiPras [24,34], Apo-Tamis [24,38], Omnic Ocas® 0,4 [25,18]

<b>Ranlosin: kaps. o przedł. uwalnianiu 0,4 mg - 90 szt.</b>	Rx	100%	<b>66,31</b>
		Limit	<b>57,63</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>18,28</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Tamsulosin hydrochloride** ATC: **G04CA02** wyk: **B** EAN ~ **092184**

(1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **N** **Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.**  
 Odpowiedniki: Symlosin SR® [50,85], Bazetham Retard [65,74], **Ranlosin [66,31]**, Uprox XR [66,83], Adatam XR [66,87], Apo-Tamis [68,02]

<b>Ranmet XR: tabl. o przedł. uwalnianiu 500 mg - 60 szt.</b>	Rx	100%	<b>10,85</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>6,26</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Metformin hydrochloride** ATC: **A10BA02** wyk: **B** EAN ~ **119597**

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.**  
 Odpowiedniki: Diabufor XR [10,85], **Ranmet XR [10,85]**, Zenofor SR [12,29], Eform SR [12,68], Metcrean XR [12,89], Symformin XR [14,89], Avamina SR [17,25], Metformax® SR 500 [18,58], Glucophage® XR [18,87]

<b>Ranmet XR: tabl. o przedł. uwalnianiu 750 mg - 60 szt.</b>	Rx	100%	<b>16,01</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>7,53</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Metformin hydrochloride** ATC: **A10BA02** wyk: **B** EAN ~ **119604**

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.**  
 Odpowiedniki: Diabufor XR [16,01], **Ranmet XR [16,01]**, Zenofor SR [18,27], Eform SR [18,84], Symformin XR [22,16], Metformax® SR 750 [22,57], Avamina SR [24,11], Glucophage® XR [28,12]

<b>Ranmet XR: tabl. o przedł. uwalnianiu 1000 mg - 60 szt.</b>	Rx	100%	<b>21,05</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>8,68</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Metformin hydrochloride** ATC: **A10BA02** wyk: **B** EAN ~ **119611**

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinoooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B** **Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.**

Odpowiedniki: Diabufor XR [21,05], **Ranmet XR [21,05]**, Zenofor SR [24,04], Eform SR [24,81], Metformax® SR 1000 [28,92], Symformin XR [29,21], Avamina SR [32,48], Glucophage® XR [37,21]

<b>Ranofren: tabl. 10 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>99,50</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>9,76</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Olanzapine** ATC: **N05AH03** wyk: **B** EAN ~ **640287**

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C** **Adamed Sp. z o.o.**

Odpowiedniki: Olanzin - (IR) [X], Zalasta® - (IR) [60,09], Zalasta® - (IR) [65,24], Zalasta® - (IR) [76,23], Olanzapine Mylan - (IR) [77,32], Olanzarar [79,67], Olanzapina Mylan [80,36], Olazax [83,79], Olinat® [86,54], Egolanza - (IR) [89,74], Egolanza - (IR) [90,20], Olanzin [90,34], Zalasta® [91,44], Olzapin [92,44], Egolanza [93,41], Olanzapine Apotex [93,71], **Ranofren [99,50]**

<b>Ranopril®: tabl. 5 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	<b>5,24</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>5,24</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Lisinopril** ATC: **C09AA03** wyk: **B** EAN ~ **132927**

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D** **Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.**

Odpowiedniki: **Ranopril® [5,24]**, Lisiprol® [8,05]

<b>Ranopril®: tabl. 10 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	<b>9,60</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>7,59</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Lisinopril** ATC: **C09AA03** wyk: **B** EAN ~ **133122**

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D** **Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.**

Odpowiedniki: **Ranopril® [9,60]**, Lisiprol® [12,37]

<b>Ranopril®: tabl. 20 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	<b>17,39</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>12,93</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Lisinopril** ATC: **C09AA03** wyk: **B** EAN ~ **133023**

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D** **Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.**

Odpowiedniki: **Ranopril® [17,39]**, Lisiprol® [20,03]

<b>Rapamune: roztw. doust. 1 mg/ml - 1 but. 60 ml (+30 strzyk.)</b>		Rx	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>1004,68</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	1004,68	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>▼ Rekovelle: inj. [roztw.] 12 µg/0,36 ml - 1 wstrzyk. (+ 3 igły)</b>	Rx-z	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>304,08</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>229,50</td></tr> <tr><td>R<sup>(1)</sup></td><td>77,78</td></tr> </table>	100%	304,08	Limit	229,50	R <sup>(1)</sup>	77,78					
100%	1004,68																										
Limit	0,00																										
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(2)</sup>	3,20																										
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
100%	304,08																										
Limit	229,50																										
R <sup>(1)</sup>	77,78																										
<b>INN: Sirolimus</b>   ATC: L04AA10   wyk: B   EAN ~ 893645 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanki lub komórek; stwardnienie guzowate; limfangioleiomiatoza; nowotwór z epiteloidalnych komórek przynacyniowych; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - odporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach; zespół umiastych zmian barwnikowych; angiomatoza; Zespół Klippela-Trénaunaya (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		<b>Pfizer Polska Sp. z o.o.</b>		<b>INN: Follitropin delta</b>   ATC: G03GA10   wyk: EAN ~ 134301 (1) Kontrolowana hiperstimulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli   Kat. ciąży: D		<b>Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.</b>																					
<b>Rapamune: tabl. draż. 1 mg - 30 szt.</b>		Rx	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>510,04</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	510,04	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>▼ Rekovelle: inj. [roztw.] 72 µg/2,16 ml - 1 wstrzyk. (+ 9 igieł)</b>		Rx-z	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>1754,56</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>1377,00</td></tr> <tr><td>R<sup>(1)</sup></td><td>380,76</td></tr> </table>	100%	1754,56	Limit	1377,00	R <sup>(1)</sup>	380,76				
100%	510,04																										
Limit	0,00																										
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(2)</sup>	3,20																										
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
100%	1754,56																										
Limit	1377,00																										
R <sup>(1)</sup>	380,76																										
<b>INN: Sirolimus</b>   ATC: L04AA10   wyk: B   EAN ~ 985210 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku WP: Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanki lub komórek; stwardnienie guzowate; limfangioleiomiatoza; nowotwór z epiteloidalnych komórek przynacyniowych; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - odporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach; zespół umiastych zmian barwnikowych; angiomatoza; Zespół Klippela-Trénaunaya (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		<b>Pfizer Polska Sp. z o.o.</b>		<b>INN: Follitropin delta</b>   ATC: G03GA10   wyk: EAN ~ 134303 (1) Kontrolowana hiperstimulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli   Kat. ciąży: D		<b>Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.</b>																					
<b>Rawe® SR: tabl. powł. o przedl. uwalnianiu 1,5 mg - 30 szt.</b>		Rx	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>8,14</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>8,14</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>2,44</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	8,14	Limit	8,14	30% <sup>(1)</sup>	2,44	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>○ RELESED®: mikrowlewy doodbytnicze 5 mg/2,5 ml - 5 szt. ◇</b>		Rx	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>26,84</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>11,76</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	26,84	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	11,76	S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
100%	8,14																										
Limit	8,14																										
30% <sup>(1)</sup>	2,44																										
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
100%	26,84																										
Limit	0,00																										
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(2)</sup>	11,76																										
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
<b>INN: Indapamide</b>   ATC: C03BA11   wyk: B   EAN ~ 424801 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B		<b>Krka Polska Sp. z o.o.</b>		<b>INN: Diazepam</b>   ATC: N05BA01   wyk: B   EAN ~ 751518 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Padaczka WP: Drgawki inne niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D		<b>Pofa Warszawa SA</b>																					
<b>Rawe® SR: tabl. powł. o przedl. uwalnianiu 1,5 mg - 60 szt.</b>		Rx	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>15,07</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>15,07</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>4,52</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	15,07	Limit	15,07	30% <sup>(1)</sup>	4,52	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>○ RELESED®: mikrowlewy doodbytnicze 10 mg/2,5 ml - 5 szt. ◇</b>		Rx	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>33,93</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>2,88</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	33,93	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	2,88	S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
100%	15,07																										
Limit	15,07																										
30% <sup>(1)</sup>	4,52																										
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
100%	33,93																										
Limit	0,00																										
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(2)</sup>	2,88																										
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
<b>INN: Indapamide</b>   ATC: C03BA11   wyk: B   EAN ~ 424849 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B		<b>Krka Polska Sp. z o.o.</b>		<b>INN: Diazepam</b>   ATC: N05BA01   wyk: B   EAN ~ 751617 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Padaczka WP: Drgawki inne niż określone w ChPL (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D		<b>Pofa Warszawa SA</b>																					
<b>▼ Reagila: kaps. twarde 1,5 mg - 28 szt.</b>		Rx	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>236,22</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>236,22</td></tr> <tr><td>B<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	236,22	Limit	236,22	B <sup>(1)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>■ Reltebon: tabl. o przedl. uwalnianiu 5 mg - 60 szt. ◇</b>		Rx-w	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>23,54</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>9,09</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>9,09</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	23,54	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	9,09	S <sup>(3)</sup>	9,09	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	236,22																										
Limit	236,22																										
B <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
100%	23,54																										
Limit	0,00																										
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(2)</sup>	9,09																										
S <sup>(3)</sup>	9,09																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
<b>INN: Cariprazine</b>   ATC: N05AX15   wyk: EAN ~ 337056 (1) Leczenie dorosłych pacjentów ze schizofrenią z pierwotnymi, przeważającymi i przetrwałymi objawami negatywnymi, u których nie występują objawy depresyjne (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		<b>Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.</b>		<b>INN: Oxycodone hydrochloride</b>   ATC: N02AA05   wyk: N   EAN ~ 184742 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Neuralgia popółpaścowa przewlekła (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia, Nowotwory złośliwe (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B		<b>Actavis Group PTC ehf.</b>																					
<b>▼ Reagila: kaps. twarde 3 mg - 28 szt.</b>		Rx	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>236,22</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>236,22</td></tr> <tr><td>B<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	236,22	Limit	236,22	B <sup>(1)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>■ Reltebon: tabl. o przedl. uwalnianiu 10 mg - 60 szt. ◇</b>		Rx-w	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>39,74</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>7,63</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>7,63</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	39,74	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	7,63	R <sup>(3)</sup>	7,63	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	236,22																										
Limit	236,22																										
B <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
100%	39,74																										
Limit	0,00																										
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(2)</sup>	7,63																										
R <sup>(3)</sup>	7,63																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
<b>INN: Cariprazine</b>   ATC: N05AX15   wyk: EAN ~ 337155 (1) Leczenie dorosłych pacjentów ze schizofrenią z pierwotnymi, przeważającymi i przetrwałymi objawami negatywnymi, u których nie występują objawy depresyjne (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		<b>Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.</b>		<b>INN: Oxycodone hydrochloride</b>   ATC: N02AA05   wyk: N   EAN ~ 184827 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Nowotwory złośliwe (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia, Neuralgia popółpaścowa przewlekła (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B		<b>Actavis Group PTC ehf.</b>																					
<b>▼ Reagila: kaps. twarde 4,5 mg - 28 szt.</b>		Rx	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>236,22</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>236,22</td></tr> <tr><td>B<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	236,22	Limit	236,22	B <sup>(1)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>■ Reltebon: tabl. o przedl. uwalnianiu 20 mg - 60 szt. ◇</b>		Rx-w	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>79,15</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>11,73</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>11,73</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	79,15	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	11,73	R <sup>(3)</sup>	11,73	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	236,22																										
Limit	236,22																										
B <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
100%	79,15																										
Limit	0,00																										
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																										
R <sup>(2)</sup>	11,73																										
R <sup>(3)</sup>	11,73																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
<b>INN: Cariprazine</b>   ATC: N05AX15   wyk: EAN ~ 337230 (1) Leczenie dorosłych pacjentów ze schizofrenią z pierwotnymi, przeważającymi i przetrwałymi objawami negatywnymi, u których nie występują objawy depresyjne (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C		<b>Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.</b>		<b>INN: Oxycodone hydrochloride</b>   ATC: N02AA05   wyk: N   EAN ~ 184865 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Neuralgia popółpaścowa przewlekła (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia, Nowotwory złośliwe (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B		<b>Actavis Group PTC ehf.</b>																					
<b>Refastin: tabl. powł. 100 mg - 30 szt. ◇</b>		Rx	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>14,56</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>10,22</td></tr> <tr><td>50%<sup>(1)</sup></td><td>8,51</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	14,56	Limit	10,22	50% <sup>(1)</sup>	8,51	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>INN: Ketoprofen</b>   ATC: M01AE03   wyk: B   EAN ~ 675593 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ból w przebiegu chorób nowotworowych - w przypadkach innych niż określone w ChPL (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:B, T2:B, T3:D		<b>Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA</b>											
100%	14,56																										
Limit	10,22																										
50% <sup>(1)</sup>	8,51																										
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
<b>INN: Ketoprofen</b>   ATC: M01AE03   wyk: B   EAN ~ 675593 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ból w przebiegu chorób nowotworowych - w przypadkach innych niż określone w ChPL (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:B, T2:B, T3:D		<b>Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA</b>		<b>Odpowiedniki: Accordeon [21,84], Reltebon [23,54], OxyContin® [24,34]</b>		<b>Odpowiedniki: Accordeon [X], Oxydolor [77,49], Reltebon [79,15], OxyContin® [86,10]</b>																					
<b>Odpowiedniki: Ketokaps Med [12,04], Profenid® [12,09], Refastin [14,56], Ketonal® forte [14,93]</b>																											



■ <b>Reltebon:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu <b>40 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx-w	100%	<b>158,44</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>20,62</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>20,62</b>

INN: *Oxycodone hydrochloride* | ATC: N02AA05 | wyk: N | EAN ~ 184902  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B | Actavis Group PTC ehf.  
 Odpowiedniki: Oxydolor [147,05], Reltebon [158,44], OxyContin® [164,28]

■ <b>Reltebon:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu <b>80 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx-w	100%	<b>316,89</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>41,26</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>41,26</b>

INN: *Oxycodone hydrochloride* | ATC: N02AA05 | wyk: N | EAN ~ 184940  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Nowotwory złośliwe, Neuralgia popółpaścowa przewlekła (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B | Actavis Group PTC ehf.  
 Odpowiedniki: Oxydolor [282,46], OxyContin® [316,89], Reltebon [316,89]

Remolexam: tabl. <b>15 mg</b> - 20 szt.	Rx	100%	<b>9,82</b>
		Limit	<b>9,82</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>4,91</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Meloxicam* | ATC: M01AC06 | wyk: B | EAN ~ 134335  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:D, T2:D, T3:C | Farmak Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Remolexam [9,82], Meloxicad® [10,22], Aglan® 15 [11,55], Aspicam [12,87], Movalis® [13,79]

Repirol SR: tabl. o przedł. uwalnianiu <b>2 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>37,31</b>
		Limit	<b>29,27</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>16,82</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Ropinirole* | ATC: N04BC04 | wyk: B | EAN ~ 983582  
 (1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Bausch Health  
 Odpowiedniki: Aparxon PR [29,93], Ceurolex SR [32,28], Aropilo SR [34,57], Repirol SR [37,31], Requip-Modutab [37,99], Ropodrin [38,57], ApoRopin [39,72], Rolpryna SR [40,29], Nironovo SR [40,60], Polpix SR [40,63]

Repirol SR: tabl. o przedł. uwalnianiu <b>4 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>70,79</b>
		Limit	<b>58,54</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>29,81</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Ropinirole* | ATC: N04BC04 | wyk: B | EAN ~ 983803  
 (1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Bausch Health  
 Odpowiedniki: Rolpryna SR [54,97], Aparxon PR [56,36], Aropilo SR [66,44], Ceurolex SR [70,22], Repirol SR [70,79], Requip-Modutab [72,65], Ropodrin [73,30], ApoRopin [75,59], Rolpryna SR [76,74], Nironovo SR [77,35], Polpix SR [77,43]

Repirol SR: tabl. o przedł. uwalnianiu <b>8 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>136,03</b>
		Limit	<b>117,09</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>54,07</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Ropinirole* | ATC: N04BC04 | wyk: B | EAN ~ 983971  
 (1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Bausch Health  
 Odpowiedniki: Rolpryna SR [103,59], Aparxon PR [111,19], Aropilo SR [123,10], Ceurolex SR [134,54], Repirol SR [136,03], Requip-Modutab [138,38], Ropodrin [140,27], ApoRopin [144,85], Rolpryna SR [147,14], Nironovo SR [148,37], Polpix SR [148,53]

Requip-Modutab: tabl. o przedł. uwalnianiu <b>2 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>37,99</b>
		Limit	<b>29,27</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>17,50</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Ropinirole* | ATC: N04BC04 | wyk: B | EAN ~ 644728  
 (1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited  
 Odpowiedniki: Aparxon PR [29,93], Ceurolex SR [32,28], Aropilo SR [34,57], Repirol SR [37,31], Requip-Modutab [37,99], Ropodrin [38,57], ApoRopin [39,72], Rolpryna SR [40,29], Nironovo SR [40,60], Polpix SR [40,63]

Requip-Modutab: tabl. o przedł. uwalnianiu <b>4 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>72,65</b>
		Limit	<b>58,54</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>31,67</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Ropinirole* | ATC: N04BC04 | wyk: B | EAN ~ 644612  
 (1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited  
 Odpowiedniki: Rolpryna SR [54,97], Aparxon PR [56,36], Aropilo SR [66,44], Ceurolex SR [70,22], Repirol SR [70,79], Requip-Modutab [72,65], Ropodrin [73,30], ApoRopin [75,59], Rolpryna SR [76,74], Nironovo SR [77,35], Polpix SR [77,43]

Requip-Modutab: tabl. o przedł. uwalnianiu <b>8 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>138,38</b>
		Limit	<b>117,09</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>56,42</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Ropinirole* | ATC: N04BC04 | wyk: B | EAN ~ 644636  
 (1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited  
 Odpowiedniki: Rolpryna SR [103,59], Aparxon PR [111,19], Aropilo SR [123,10], Ceurolex SR [134,54], Repirol SR [136,03], Requip-Modutab [138,38], Ropodrin [140,27], ApoRopin [144,85], Rolpryna SR [147,14], Nironovo SR [148,37], Polpix SR [148,53]

ReQuip™: tabl. powł. <b>0,5 mg</b> - 21 szt. ◆	Rx	100%	<b>8,33</b>
		Limit	<b>5,49</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>4,49</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Ropinirole* | ATC: N04BC04 | wyk: B | EAN ~ 013685  
 (1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited  
 Odpowiedniki: ReQuip™ [8,33], Aropilo [8,36]

ReQuip™: tabl. powł. <b>1 mg</b> - 21 szt. ◆	Rx	100%	<b>15,28</b>
		Limit	<b>10,98</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>7,59</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Ropinirole* | ATC: N04BC04 | wyk: B | EAN ~ 013890  
 (1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited  
 Odpowiedniki: Aropilo [15,28], ReQuip™ [15,28]

ReQuip™: tabl. powł. <b>2 mg</b> - 21 szt. ◆	Rx	100%	<b>30,64</b>
		Limit	<b>21,95</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>15,28</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Ropinirole* | ATC: N04BC04 | wyk: B | EAN ~ 013586  
 (1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited  
 Odpowiedniki: Aropilo [29,26], ReQuip™ [30,64]

ReQuip™: tabl. powł. <b>5 mg</b> - 21 szt. ◆	Rx	100%	<b>71,47</b>
		Limit	<b>54,89</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>33,05</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Ropinirole* | ATC: N04BC04 | wyk: B | EAN ~ 013968  
 (1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited  
 Odpowiedniki: Aropilo [58,10], ReQuip™ [71,47]

Reseligo: implant w amp.-strzyk. <b>3,6 mg</b> - 1 szt.	Rx	100%	<b>175,95</b>
		Limit	<b>175,95</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>3,20</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Goserelin* | ATC: L02AE03 | wyk: B | EAN ~ 256197  
 (1) Rak piersi i rak trzonu macicy, Rak prostaty WP: Obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: N | Alvogon Pharma Sp. z o.o.

Reseligo: implant w amp.-strzyk. <b>10,8 mg</b> - 1 szt.	Rx	100%	<b>525,75</b>
		Limit	<b>525,75</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>8,96</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Goserelin* | ATC: L02AE03 | wyk: B | EAN ~ 256210  
 (1) Rak prostaty WP: Obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: N | Alvogon Pharma Sp. z o.o.

RespoSorb Silicone: opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową <b>10x20 cm</b> - 1 szt.	WM	100%	<b>23,00</b>
		Limit	<b>23,00</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>6,90</b>
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Emplastr microfibricum cellulosa* | ATC: V20AA | wyk: EAN ~ 613123  
 (1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

RespoSorb Silicone: opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową <b>12,5x12,5 cm</b> - 1 szt.	WM	100%	<b>18,26</b>
		Limit	<b>18,26</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>5,48</b>
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Emplastr microfibricum cellulosa* | ATC: V20AA | wyk: EAN ~ 604770  
 (1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

RespoSorb Silicone Borde: opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową <b>12,5x12,5 cm</b> - 1 szt.	WM	100%	<b>18,26</b>
		Limit	<b>18,26</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>5,48</b>
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Emplastr microfibricum cellulosa* | ATC: V20AA | wyk: EAN ~ 579498  
 (1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.



Skuteczny przepływ

pentoxifylline  
**polfilin**  
 prolongatum

400 mg x 20 tabl. ♥ 400 mg x 60 tabl.

<p><b>RespoSorb Silicone Borde:</b> opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową <b>16x26 cm</b> - 1 szt.</p>	WM	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> B <sup>(2)</sup>	44,15 44,15 13,25 bezpł.
<p>INN: <i>Emplastrum microfibrillum cellulosae</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 580135            (1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.</p>			
<p><b>RespoSorb Silicone Borde:</b> opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową <b>17,5x17,5 cm</b> - 1 szt.</p>	WM	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> B <sup>(2)</sup>	33,41 33,41 10,02 bezpł.
<p>INN: <i>Emplastrum microfibrillum cellulosae</i>   ATC: V20AA   wyk: EAN ~ 630526            (1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.</p>			
<p><b>Rexetin®:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 30 szt.</p>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> S <sup>(3)</sup>	19,39 14,11 9,51 bezpł.
<p>INN: <i>Paroxetine</i>   ATC: N06AB05   wyk: B   EAN ~ 006310            (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.</p>			
<p>Odpowiedniki: Paroxetine Aurovitas [13,55], Paroxinor [13,78], Xetanon 20 mg [16,36], Arketis [17,79], Parogen [19,16], <b>Rexetin®</b> [19,39], Paxtin 20 [19,50]</p>			
<p><b>Ricordo:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>5 mg</b> - 28 szt. ♦</p>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> S <sup>(3)</sup>	27,78 18,79 14,63 bezpł.
<p>INN: <i>Donepezil hydrochloride</i>   ATC: N06DA02   wyk: B   EAN ~ 798933            (1) Choroba Alzheimera <b>WP:</b> Ośpienie z ciałami Lewy'ego; ośpienie w przebiegu choroby Parkinsona            (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Adamed Sp. z o.o.</p>			
<p>Odpowiedniki: Yasnal® Q-Tab [25,41], <b>Ricordo</b> [27,78]</p>			
<p><b>Ricordo:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>10 mg</b> - 28 szt. ♦</p>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> S <sup>(3)</sup>	40,07 37,57 13,77 bezpł.
<p>INN: <i>Donepezil hydrochloride</i>   ATC: N06DA02   wyk: B   EAN ~ 798940            (1) Choroba Alzheimera <b>WP:</b> Ośpienie z ciałami Lewy'ego; ośpienie w przebiegu choroby Parkinsona            (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C   Adamed Sp. z o.o.</p>			
<p>Odpowiedniki: Yasnal® Q-Tab [39,29], <b>Ricordo</b> [40,07]</p>			
<p><b>Ridlip:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 28 szt.</p>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	5,15 3,93 2,40 bezpł. bezpł.
<p>INN: <i>Rosuvastatin</i>   ATC: C10AA07   wyk: B   EAN ~ 000103            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X   Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.</p>			
<p>Odpowiedniki: Astrium [X], Rosuvastatin Medical Valley [4,65], Aporoza [4,80], Zahron [4,80], Suwardio [4,81], Rosutrox [4,82], <b>Ridlip</b> [5,15], Roswera [5,16], Crosovo [12,30], Zaranta [14,20]</p>			
<p><b>Ridlip:</b> tabl. <b>5 mg</b> - 90 szt.</p>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	13,02 12,64 4,17 bezpł. bezpł.
<p>INN: <i>Rosuvastatin</i>   ATC: C10AA07   wyk: B   EAN ~ 137577            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X   Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.</p>			
<p>Odpowiedniki: <b>Ridlip</b> [13,02], Roswera [13,63]</p>			
<p><b>Ridlip:</b> tabl. <b>10 mg</b> - 28 szt.</p>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	9,40 7,87 3,89 bezpł. bezpł.
<p>INN: <i>Rosuvastatin</i>   ATC: C10AA07   wyk: B   EAN ~ 000141            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X   Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.</p>			
<p>Odpowiedniki: Astrium [X], Rosuvastatin Medical Valley [8,41], Crosovo [8,73], Zahron [8,73], Suwardio [8,80], Rosutrox [8,82], Zaranta [9,13], <b>Ridlip</b> [9,40], Roswera [9,42]</p>			
<p><b>Ridlip:</b> tabl. <b>10 mg</b> - 90 szt.</p>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	24,70 24,70 7,41 bezpł. bezpł.
<p>INN: <i>Rosuvastatin</i>   ATC: C10AA07   wyk: B   EAN ~ 137579            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X   Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.</p>			
<p>Odpowiedniki: <b>Ridlip</b> - (IR) [24,58], <b>Ridlip</b> [24,70], Roswera [25,93]</p>			
<p><b>Ridlip:</b> tabl. <b>20 mg</b> - 28 szt.</p>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	17,92 15,74 6,90 bezpł. bezpł.
<p>INN: <i>Rosuvastatin</i>   ATC: C10AA07   wyk: B   EAN ~ 000158            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X   Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.</p>			
<p>Odpowiedniki: Astrium [X], Rosuvastatin Medical Valley [15,81], Aporoza [16,47], Rosutrox [16,64], Suwardio [16,64], Zaranta [17,35], <b>Ridlip</b> [17,92], Roswera [17,96], Crosovo [18,03], Zahron [18,03]</p>			
<p><b>Ridlip:</b> tabl. <b>20 mg</b> - 90 szt.</p>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	46,10 46,10 13,83 bezpł. bezpł.
<p>INN: <i>Rosuvastatin</i>   ATC: C10AA07   wyk: B   EAN ~ 137581            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X   Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.</p>			
<p>Odpowiedniki: <b>Ridlip</b> - (IR) [45,53], <b>Ridlip</b> - (IR) [45,65], <b>Ridlip</b> [46,10], Roswera [48,57]</p>			
<p><b>Ridlip:</b> tabl. <b>40 mg</b> - 28 szt.</p>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	31,47 31,47 9,44 bezpł. bezpł.
<p>INN: <i>Rosuvastatin</i>   ATC: C10AA07   wyk: B   EAN ~ 000165            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X   Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.</p>			
<p>Odpowiedniki: Astrium [X], Rosuvastatin Medical Valley [29,83], Zahron [31,06], Zaranta [31,06], Aporoza [31,15], Crosovo [31,19], Suwardio [31,23], Rosutrox [31,47], <b>Ridlip</b> [31,47], Roswera [34,14]</p>			
<p><b>Ridlip - (IR):</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 30 szt.</p>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	9,23 8,43 3,33 bezpł. bezpł.
<p>INN: <i>Rosuvastatin</i>   ATC: C10AA07   wyk: B   EAN ~ 151960            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X   Delfarma Sp. z o.o.</p>			
<p>Odpowiedniki: Astrium [X], <b>Ridlip</b> - (IR) [9,23], Romazic [9,30]</p>			
<p><b>Ridlip - (IR):</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 90 szt.</p>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	24,58 24,58 7,37 bezpł. bezpł.
<p>INN: <i>Rosuvastatin</i>   ATC: C10AA07   wyk: B   EAN ~ 151961            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X   Delfarma Sp. z o.o.</p>			
<p>Odpowiedniki: <b>Ridlip</b> - (IR) [24,58], <b>Ridlip</b> [24,70], Roswera [25,93]</p>			
<p><b>Ridlip - (IR):</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 30 szt.</p>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	16,76 16,76 5,03 bezpł. bezpł.
<p>INN: <i>Rosuvastatin</i>   ATC: C10AA07   wyk: B   EAN ~ 149657            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X   Inharm Sp. z o.o.</p>			
<p>Odpowiedniki: Astrium [X], <b>Ridlip</b> - (IR) [16,76], <b>Ridlip</b> - (IR) [17,39], Romazic [17,79]</p>			
<p><b>Ridlip - (IR):</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 30 szt.</p>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	17,39 16,86 5,59 bezpł. bezpł.
<p>INN: <i>Rosuvastatin</i>   ATC: C10AA07   wyk: B   EAN ~ 147698            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X   Delfarma Sp. z o.o.</p>			
<p>Odpowiedniki: Astrium [X], <b>Ridlip</b> - (IR) [16,76], <b>Ridlip</b> - (IR) [17,39], Romazic [17,79]</p>			
<p><b>Ridlip - (IR):</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 90 szt.</p>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	45,53 45,53 13,66 bezpł. bezpł.
<p>INN: <i>Rosuvastatin</i>   ATC: C10AA07   wyk: B   EAN ~ 150941            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X   Delfarma Sp. z o.o.</p>			
<p>Odpowiedniki: <b>Ridlip</b> - (IR) [45,53], <b>Ridlip</b> - (IR) [45,65], <b>Ridlip</b> [46,10], Roswera [48,57]</p>			

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

Ridlip - (IR): tabl. powł. 20 mg - 90 szt.	Rx	100%	45,65
		Limit	45,65
		30% <sup>(1)</sup>	13,70
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Rosuvastatin* ATC: C10AA07 wyk: B EAN ~ 149658  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
 Inpharm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Ridlip - (IR) [45,53], Ridlip - (IR) [45,65], Ridlip [46,10], Roswera [48,57]

Rifamazid®: kaps. 150/100 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	182,05
		Limit	175,57
		B <sup>(1)</sup>	5,83
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Rifampicin + Isoniazid* ATC: J04AM02 wyk: B EAN ~ 086115  
 (1) Gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA

Rifamazid®: kaps. 300/150 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	351,13
		Limit	351,13
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Rifampicin + Isoniazid* ATC: J04AM02 wyk: B EAN ~ 086214  
 (1) Gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA

Rifampicyna TZF: kaps. 150 mg - 100 szt.	Rx	100%	147,58
		Limit	141,75
		B <sup>(1)</sup>	5,25
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Rifampicin* ATC: J04AB02 wyk: B EAN ~ 085019  
 (1) Gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA

Rifampicyna TZF: kaps. 300 mg - 100 szt.	Rx	100%	283,49
		Limit	283,49
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Rifampicin* ATC: J04AB02 wyk: B EAN ~ 084913  
 (1) Gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA

Rigevidon®: tabl. powł. 0,03 mg+ 0,15 mg - 21 szt.	Rx	100%	8,51
		Limit	7,60
		30% <sup>(1)</sup>	3,19

INN: *Ethinylestradiol + Levonorgestrel* ATC: G03AA07 wyk: B EAN ~ 873319  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach | Kat. ciąży: X  
 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Rigevidon® - (IR): tabl. draż. 0,03 mg+ 0,15 mg - 21 szt.	Rx	100%	8,29
		Limit	7,60
		30% <sup>(1)</sup>	2,97

INN: *Ethinylestradiol + Levonorgestrel* ATC: G03AA07 wyk: B EAN ~ 138381  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach | Kat. ciąży: X  
 Delfarma Sp. z o.o.

Riluzol PMCS: tabl. powł. 50 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	183,52
		Limit	183,52
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Riluzole* ATC: N07XX02 wyk: B EAN ~ 928156  
 (1) Stwardnienie zanikowe boczne (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 PRO. MED. PL Sp. z o.o.

Rimal: kaps. twarde 5/5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	9,16
		Limit	8,67
		30% <sup>(1)</sup>	2,78
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril + Amlodipine* ATC: C09BB07 wyk: B EAN ~ 611429  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Sumilar Duo [8,45], Ramizek Combi [9,16], Sumilar [9,16], Rimal [9,16], Egramilon [9,23]

Rimal: kaps. twarde 5/10 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	17,34
		Limit	17,33
		30% <sup>(1)</sup>	4,69
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril + Amlodipine* ATC: C09BB07 wyk: B EAN ~ 611467  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Sumilar Duo [16,31], Ramizek Combi [17,33], Sumilar [17,33], Rimal [17,34], Egramilon [17,49]

Rimal: kaps. twarde 10/10 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	17,34
		Limit	17,33
		30% <sup>(1)</sup>	4,69
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril + Amlodipine* ATC: C09BB07 wyk: B EAN ~ 611542  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Sumilar Duo [16,31], Ramizek Combi [17,33], Rimal [17,34], Egramilon [17,49]

Rimal: kaps. twarde 10/5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	9,16
		Limit	8,67
		30% <sup>(1)</sup>	2,78
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril + Amlodipine* ATC: C09BB07 wyk: B EAN ~ 611504  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Sumilar Duo [8,45], Ramizek Combi [9,16], Sumilar [9,16], Rimal [9,16], Egramilon [9,23]

Risendros® 35: tabl. powł. 35 mg - 4 szt.	Rx	100%	14,87
		Limit	12,50
		30% <sup>(1)</sup>	6,12
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Risedronate sodium* ATC: M05BA07 wyk: B EAN ~ 082599  
 (1) Osteoporoza WP: Osteoporoza posterydowa - profilaktyka (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Zentiva PL Sp. z o.o.

Risperidone Teva: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw. o przedł. uwalnianiu] 25 mg - 1 fiol. prosz. +1 strzyk. +2 igły +1 adapter ◆	Rx	100%	118,84
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20

INN: *Risperidone* ATC: N05AX08 wyk: B EAN ~ 145795  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego | Kat. ciąży: C  
 Teva B.V.

Risperidone Teva: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw. o przedł. uwalnianiu] 37,5 mg - 1 fiol. prosz. +1 strzyk. +2 igły +1 adapter ◆	Rx	100%	177,90
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20

INN: *Risperidone* ATC: N05AX08 wyk: B EAN ~ 145792  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego | Kat. ciąży: C  
 Teva B.V.

Risperidone Teva: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw. o przedł. uwalnianiu] 50 mg - 1 fiol. prosz. +1 strzyk. +2 igły +1 adapter ◆	Rx	100%	237,01
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20

INN: *Risperidone* ATC: N05AX08 wyk: B EAN ~ 145789  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego | Kat. ciąży: C  
 Teva B.V.

Risperidon Vipharm: tabl. powł. 1 mg - 20 szt. ◆	Rx	100%	9,42
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,20
S <sup>(3)</sup>	bezpł.		

INN: *Risperidone* ATC: N05AX08 wyk: B EAN ~ 044481  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Vipharm SA

Odpowiedniki: Orizon [9,32], Risperidon Vipharm [9,42], Risperon [9,91], Rispolept® [10,02], Ryspolit [10,06]

Risperidon Vipharm: tabl. powł. 2 mg - 20 szt. ◆	Rx	100%	18,29
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,64
S <sup>(3)</sup>	bezpł.		

INN: *Risperidone* ATC: N05AX08 wyk: B EAN ~ 044344  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Vipharm SA

Odpowiedniki: Risperidon Vipharm [18,29], Risperon [18,87], Rispolept® [19,32], Ryspolit [20,15]





# ZOLPIC

zolidem

Daj owcom odpocząć.



<b>Risperidon Vipfarm: tabl. powł. 3 mg - 20 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>27,51</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>8,44</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	27,51	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	8,44	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Risperon: tabl. powł. 4 mg - 20 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>36,10</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>9,61</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	36,10	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	9,61	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	27,51																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	8,44																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	36,10																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	9,61																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Risperidone</i>   ATC: N05AX08   wyk: B   EAN ~ 044252 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Vipfarm SA		INN: <i>Risperidone</i>   ATC: N05AX08   wyk: B   EAN ~ 336586 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.																					
Odpowiedniki: Rispolept® [25,10], Risperon [26,19], Risperidon Vipfarm [27,51], Ryspolit [29,23]		Odpowiedniki: Rispolept® [29,69], Risperon [36,10], Risperidon Vipfarm [36,78], Ryspolit [38,84]																					
<b>Risperidon Vipfarm: tabl. powł. 4 mg - 20 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>36,78</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>10,29</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	36,78	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	10,29	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Risperon: tabl. powł. 4 mg - 60 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>100,14</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>16,19</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	100,14	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	16,19	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	36,78																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	10,29																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	100,14																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	16,19																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Risperidone</i>   ATC: N05AX08   wyk: B   EAN ~ 044146 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Vipfarm SA		INN: <i>Risperidone</i>   ATC: N05AX08   wyk: B   EAN ~ 336609 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.																					
Odpowiedniki: Rispolept® [29,69], Risperon [36,10], Risperidon Vipfarm [36,78], Ryspolit [38,84]		Odpowiedniki: Orizon [78,05], Risperon [100,14]																					
<b>Risperon: tabl. powł. 1 mg - 20 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>9,91</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>5,69</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	9,91	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	5,69	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Rispolept Consta®: inj. [prosz. + rozp. do przyg. zaw. o przedł. uwalnianiu] 25 mg - 1 zest. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>141,74</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>26,10</td></tr> </table>	100%	141,74	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	26,10		
100%	9,91																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	5,69																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	141,74																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	26,10																						
INN: <i>Risperidone</i>   ATC: N05AX08   wyk: B   EAN ~ 336524 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.		INN: <i>Risperidone</i>   ATC: N05AX08   wyk: B   EAN ~ 058227 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego   Kat. ciąży: C Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.																					
Odpowiedniki: Orizon [9,32], Risperidon Vipfarm [9,42], Risperon [9,91], Rispolept® [10,02], Ryspolit [10,06]		Odpowiedniki: Orizon [78,05], Risperon [100,14]																					
<b>Risperon: tabl. powł. 1 mg - 60 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>27,96</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>8,89</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	27,96	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	8,89	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Rispolept Consta®: inj. [prosz. + rozp. do przyg. zaw. o przedł. uwalnianiu] 37,5 mg - 1 zest. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>212,96</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>37,90</td></tr> </table>	100%	212,96	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	37,90		
100%	27,96																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	8,89																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	212,96																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	37,90																						
INN: <i>Risperidone</i>   ATC: N05AX08   wyk: B   EAN ~ 336548 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.		INN: <i>Risperidone</i>   ATC: N05AX08   wyk: B   EAN ~ 058128 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego   Kat. ciąży: C Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.																					
Odpowiedniki: Orizon [22,81], Risperon [27,96]		Odpowiedniki: Orizon [9,32], Risperidon Vipfarm [9,42], Risperon [9,91], Rispolept® [10,02], Ryspolit [10,06]																					
<b>Risperon: tabl. powł. 2 mg - 20 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>18,87</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>7,22</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	18,87	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	7,22	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Rispolept Consta®: inj. [prosz. + rozp. do przyg. zaw. o przedł. uwalnianiu] 50 mg - 1 zest. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>273,06</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>38,58</td></tr> </table>	100%	273,06	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	38,58		
100%	18,87																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	7,22																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	273,06																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	38,58																						
INN: <i>Risperidone</i>   ATC: N05AX08   wyk: B   EAN ~ 336487 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.		INN: <i>Risperidone</i>   ATC: N05AX08   wyk: B   EAN ~ 058029 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego   Kat. ciąży: C Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.																					
Odpowiedniki: Risperidon Vipfarm [18,29], Risperon [18,87], Rispolept® [19,32], Ryspolit [20,15]		Odpowiedniki: Orizon [9,32], Risperidon Vipfarm [9,42], Risperon [9,91], Rispolept® [10,02], Ryspolit [10,06]																					
<b>Risperon: tabl. powł. 2 mg - 60 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>52,46</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>11,12</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	52,46	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	11,12	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Rispolept®: tabl. powł. 1 mg - 20 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>10,02</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>5,80</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	10,02	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	5,80	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	52,46																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	11,12																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	10,02																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	5,80																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Risperidone</i>   ATC: N05AX08   wyk: B   EAN ~ 336500 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.		INN: <i>Risperidone</i>   ATC: N05AX08   wyk: B   EAN ~ 670413 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.																					
Odpowiedniki: Orizon [42,84], Risperon [52,46]		Odpowiedniki: Orizon [9,32], Risperidon Vipfarm [9,42], Risperon [9,91], Rispolept® [10,02], Ryspolit [10,06]																					
<b>Risperon: tabl. powł. 3 mg - 20 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>26,19</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>7,12</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	26,19	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	7,12	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Rispolept®: tabl. powł. 2 mg - 20 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>19,32</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>7,67</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	19,32	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	7,67	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	26,19																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	7,12																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	19,32																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	7,67																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Risperidone</i>   ATC: N05AX08   wyk: B   EAN ~ 336555 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.		INN: <i>Risperidone</i>   ATC: N05AX08   wyk: B   EAN ~ 670512 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.																					
Odpowiedniki: Rispolept® [25,10], Risperon [26,19], Risperidon Vipfarm [27,51], Ryspolit [29,23]		Odpowiedniki: Risperidon Vipfarm [18,29], Risperon [18,87], Rispolept® [19,32], Ryspolit [20,15]																					
<b>Risperon: tabl. powł. 3 mg - 60 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>72,15</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>9,19</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	72,15	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	9,19	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Rispolept®: tabl. powł. 3 mg - 20 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>25,10</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>6,03</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	25,10	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	6,03	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	72,15																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	9,19																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	25,10																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	6,03																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Risperidone</i>   ATC: N05AX08   wyk: B   EAN ~ 336579 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.		INN: <i>Risperidone</i>   ATC: N05AX08   wyk: B   EAN ~ 670611 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.																					
Odpowiedniki: Orizon [62,02], Risperon [72,15]		Odpowiedniki: Rispolept® [25,10], Risperon [26,19], Risperidon Vipfarm [27,51], Ryspolit [29,23]																					

**ADRENALINA WZF**

Adrenalinum

Zawsze pod ręką!

**Refundacja** od lipca 2015  
Poziom odpłatności 50%

ADR-WZF/131/06-2015

<b>Rispolept®: tabl. powł. 4 mg - 20 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>29,69</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Risperidone</b>	ATC: <b>N05AX08</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>670710</b>
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: <b>Rispolept® [29,69]</b> , Risperon [36,10], Risperidon Vipharm [36,78], Ryspolit [38,84]			
<b>Rispolept®: roztw. doust. 1 mg/ml - 1 but. 100 ml ◆</b>	Rx	100%	<b>44,27</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>10,36</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
INN: <b>Risperidone</b>	ATC: <b>N05AX08</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>423828</b>
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: <b>Orizon [40,84]</b> , <b>Rispolept® [44,27]</b>			
<b>Ristidic: kaps. twarde 1,5 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>12,60</b>
		Limit	<b>4,70</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>9,31</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
			<b>bezpł.</b>
INN: <b>Rivastigmine</b>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>782048</b>
(1) Choroba Alzheimerera WP: Ołępienie z ciałami Lewy'ego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Bausch Health			
Odpowiedniki: <b>Rivastigmin NeuroPharma [9,32]</b> , <b>Ristidic [12,60]</b> , <b>Nimvastid [14,90]</b> , <b>Rivastigmin Orion [15,28]</b> , <b>Rivaldo [21,55]</b> , <b>Exelon® [134,00]</b>			
<b>Ristidic: kaps. twarde 1,5 mg - 56 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>24,85</b>
		Limit	<b>9,39</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>18,28</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
			<b>bezpł.</b>
INN: <b>Rivastigmine</b>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>782055</b>
(1) Choroba Alzheimerera WP: Ołępienie z ciałami Lewy'ego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Bausch Health			
Odpowiedniki: <b>Rivastigmin NeuroPharma [35,29]</b> , <b>Rivastigmin Orion [39,41]</b> , <b>Ristidic [48,12]</b> , <b>Nimvastid [49,06]</b> , <b>Rivaldo [49,21]</b> , <b>Exelon® [279,31]</b>			
<b>Ristidic: kaps. twarde 3 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>24,47</b>
		Limit	<b>9,39</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>17,90</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
			<b>bezpł.</b>
INN: <b>Rivastigmine</b>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>782079</b>
(1) Choroba Alzheimerera WP: Ołępienie z ciałami Lewy'ego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Bausch Health			
Odpowiedniki: <b>Exelon® [X]</b> , <b>Rivastigmin NeuroPharma [18,06]</b> , <b>Rivastigmin Orion [21,27]</b> , <b>Ristidic [24,47]</b> , <b>Nimvastid [24,94]</b> , <b>Rivaldo [28,51]</b>			
<b>Ristidic: kaps. twarde 3 mg - 56 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>48,12</b>
		Limit	<b>18,79</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>34,97</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
			<b>bezpł.</b>
INN: <b>Rivastigmine</b>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>782086</b>
(1) Choroba Alzheimerera WP: Ołępienie z ciałami Lewy'ego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Bausch Health			
Odpowiedniki: <b>Rivastigmin NeuroPharma [35,29]</b> , <b>Rivastigmin Orion [39,41]</b> , <b>Ristidic [48,12]</b> , <b>Nimvastid [49,06]</b> , <b>Rivaldo [49,21]</b> , <b>Exelon® [279,31]</b>			
<b>Ristidic: kaps. twarde 4,5 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>35,28</b>
		Limit	<b>14,09</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>25,42</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
			<b>bezpł.</b>
INN: <b>Rivastigmine</b>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>782147</b>
(1) Choroba Alzheimerera WP: Ołępienie z ciałami Lewy'ego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Bausch Health			
Odpowiedniki: <b>Exelon® [X]</b> , <b>Rivastigmin Orion [X]</b> , <b>Rivastigmin NeuroPharma [26,81]</b> , <b>Ristidic [35,28]</b> , <b>Nimvastid [37,12]</b> , <b>Rivaldo [37,25]</b>			
<b>Ristidic: kaps. twarde 4,5 mg - 56 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>71,95</b>
		Limit	<b>28,18</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>52,22</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
			<b>bezpł.</b>
INN: <b>Rivastigmine</b>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>782154</b>
(1) Choroba Alzheimerera WP: Ołępienie z ciałami Lewy'ego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Bausch Health			
Odpowiedniki: <b>Rivastigmin NeuroPharma [52,04]</b> , <b>Rivastigmin Orion [55,58]</b> , <b>Ristidic [71,95]</b> , <b>Nimvastid [72,67]</b> , <b>Rivaldo [72,91]</b> , <b>Exelon® [288,53]</b>			
<b>Ristidic: kaps. twarde 6 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>48,12</b>
		Limit	<b>18,79</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>34,97</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
			<b>bezpł.</b>
INN: <b>Rivastigmine</b>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>782178</b>
(1) Choroba Alzheimerera WP: Ołępienie z ciałami Lewy'ego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Bausch Health			
Odpowiedniki: <b>Exelon® [X]</b> , <b>Rivastigmin Orion [X]</b> , <b>Rivastigmin NeuroPharma [35,29]</b> , <b>Ristidic [48,12]</b> , <b>Nimvastid [49,06]</b> , <b>Rivaldo [49,21]</b>			

<b>Ristidic: kaps. twarde 6 mg - 56 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>93,90</b>
		Limit	<b>37,57</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>67,60</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
			<b>bezpł.</b>
INN: <b>Rivastigmine</b>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>782185</b>
(1) Choroba Alzheimerera WP: Ołępienie z ciałami Lewy'ego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Bausch Health			
Odpowiedniki: <b>Exelon® [X]</b> , <b>Rivastigmin NeuroPharma [68,26]</b> , <b>Rivastigmin Orion [70,89]</b> , <b>Ristidic [93,90]</b> , <b>Nimvastid [95,77]</b> , <b>Rivaldo [96,10]</b>			
<b>Rivastigmin NeuroPharma: kaps. twarde 1,5 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>9,32</b>
		Limit	<b>4,70</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>6,03</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
			<b>bezpł.</b>
INN: <b>Rivastigmine</b>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>982981</b>
(1) Choroba Alzheimerera WP: Ołępienie z ciałami Lewy'ego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Neuroxpharm Arzneimittel GmbH			
Odpowiedniki: <b>Rivastigmin NeuroPharma [9,32]</b> , <b>Ristidic [12,60]</b> , <b>Nimvastid [14,90]</b> , <b>Rivastigmin Orion [15,28]</b> , <b>Rivaldo [21,55]</b> , <b>Exelon® [134,00]</b>			
<b>Rivastigmin NeuroPharma: kaps. twarde 3 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>18,06</b>
		Limit	<b>9,39</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>11,49</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
			<b>bezpł.</b>
INN: <b>Rivastigmine</b>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>983162</b>
(1) Choroba Alzheimerera WP: Ołępienie z ciałami Lewy'ego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Neuroxpharm Arzneimittel GmbH			
Odpowiedniki: <b>Exelon® [X]</b> , <b>Rivastigmin NeuroPharma [18,06]</b> , <b>Rivastigmin Orion [21,27]</b> , <b>Ristidic [24,47]</b> , <b>Nimvastid [24,94]</b> , <b>Rivaldo [28,51]</b>			
<b>Rivastigmin NeuroPharma: kaps. twarde 3 mg - 56 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>35,29</b>
		Limit	<b>18,79</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>22,14</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
			<b>bezpł.</b>
INN: <b>Rivastigmine</b>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>983179</b>
(1) Choroba Alzheimerera WP: Ołępienie z ciałami Lewy'ego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Neuroxpharm Arzneimittel GmbH			
Odpowiedniki: <b>Rivastigmin NeuroPharma [35,29]</b> , <b>Rivastigmin Orion [39,41]</b> , <b>Ristidic [48,12]</b> , <b>Nimvastid [49,06]</b> , <b>Rivaldo [49,21]</b> , <b>Exelon® [279,31]</b>			
<b>Rivastigmin NeuroPharma: kaps. twarde 4,5 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>26,81</b>
		Limit	<b>14,09</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>16,95</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
			<b>bezpł.</b>
INN: <b>Rivastigmine</b>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>983308</b>
(1) Choroba Alzheimerera WP: Ołępienie z ciałami Lewy'ego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Neuroxpharm Arzneimittel GmbH			
Odpowiedniki: <b>Exelon® [X]</b> , <b>Rivastigmin Orion [X]</b> , <b>Rivastigmin NeuroPharma [26,81]</b> , <b>Ristidic [35,28]</b> , <b>Nimvastid [37,12]</b> , <b>Rivaldo [37,25]</b>			
<b>Rivastigmin NeuroPharma: kaps. twarde 4,5 mg - 56 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>52,04</b>
		Limit	<b>28,18</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>32,31</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
			<b>bezpł.</b>
INN: <b>Rivastigmine</b>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>983322</b>
(1) Choroba Alzheimerera WP: Ołępienie z ciałami Lewy'ego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Neuroxpharm Arzneimittel GmbH			
Odpowiedniki: <b>Rivastigmin NeuroPharma [52,04]</b> , <b>Rivastigmin Orion [55,58]</b> , <b>Ristidic [71,95]</b> , <b>Nimvastid [72,67]</b> , <b>Rivaldo [72,91]</b> , <b>Exelon® [288,53]</b>			
<b>Rivastigmin NeuroPharma: kaps. twarde 6 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>35,29</b>
		Limit	<b>18,79</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>22,14</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
			<b>bezpł.</b>
INN: <b>Rivastigmine</b>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>983506</b>
(1) Choroba Alzheimerera WP: Ołępienie z ciałami Lewy'ego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Neuroxpharm Arzneimittel GmbH			
Odpowiedniki: <b>Exelon® [X]</b> , <b>Rivastigmin Orion [X]</b> , <b>Rivastigmin NeuroPharma [35,29]</b> , <b>Ristidic [48,12]</b> , <b>Nimvastid [49,06]</b> , <b>Rivaldo [49,21]</b>			
<b>Rivastigmin NeuroPharma: kaps. twarde 6 mg - 56 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>68,26</b>
		Limit	<b>37,57</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>41,96</b>
		S <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
			<b>bezpł.</b>
INN: <b>Rivastigmine</b>	ATC: <b>N06DA03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>983544</b>
(1) Choroba Alzheimerera WP: Ołępienie z ciałami Lewy'ego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Neuroxpharm Arzneimittel GmbH			
Odpowiedniki: <b>Exelon® [X]</b> , <b>Rivastigmin NeuroPharma [68,26]</b> , <b>Rivastigmin Orion [70,89]</b> , <b>Ristidic [93,90]</b> , <b>Nimvastid [95,77]</b> , <b>Rivaldo [96,10]</b>			



Naszym wyborem

enarenal  
enalaprilii maleas

<b>Rivastigmin Orion:</b> kaps. twarde <b>3 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>21,27</b>
		Limit	<b>9,39</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>14,70</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>   ATC: N06DA03   wyk: B   EAN ~ 778935 (1) Choroba Alzheimera WP: Otepienie z ciałami Lewy'ego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Orion Pharma Poland Sp. o.o.			
Odpowiedniki: Exelon® [X], Rivastigmin NeuroPharma [18,06], Rivastigmin Orion [21,27], Ristidic [24,47], Nimvastid [24,94], Rivaldo [28,51]			
<b>Rivastigmin Orion:</b> kaps. twarde <b>3 mg</b> - 56 szt. ◆	Rx	100%	<b>39,41</b>
		Limit	<b>18,79</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>26,26</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>   ATC: N06DA03   wyk: B   EAN ~ 778942 (1) Choroba Alzheimera WP: Otepienie z ciałami Lewy'ego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Orion Pharma Poland Sp. o.o.			
Odpowiedniki: Rivastigmin NeuroPharma [35,29], Rivastigmin Orion [39,41], Ristidic [48,12], Nimvastid [49,06], Rivaldo [49,21], Exelon® [279,31]			
<b>Rivastigmin Orion:</b> kaps. twarde <b>4,5 mg</b> - 56 szt. ◆	Rx	100%	<b>55,58</b>
		Limit	<b>28,18</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>35,85</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>   ATC: N06DA03   wyk: B   EAN ~ 778973 (1) Choroba Alzheimera WP: Otepienie z ciałami Lewy'ego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Orion Pharma Poland Sp. o.o.			
Odpowiedniki: Rivastigmin NeuroPharma [52,04], Rivastigmin Orion [55,58], Ristidic [71,95], Nimvastid [72,67], Rivaldo [72,91], Exelon® [288,53]			
<b>Rivastigmin Orion:</b> kaps. twarde <b>6 mg</b> - 56 szt. ◆	Rx	100%	<b>70,89</b>
		Limit	<b>37,57</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>44,59</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rivastigmine</i>   ATC: N06DA03   wyk: B   EAN ~ 779000 (1) Choroba Alzheimera WP: Otepienie z ciałami Lewy'ego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Orion Pharma Poland Sp. o.o.			
Odpowiedniki: Exelon® [X], Rivastigmin NeuroPharma [68,26], Rivastigmin Orion [70,89], Ristidic [93,90], Nimvastid [95,77], Rivaldo [96,10]			
<b>▼ Rizmoic:</b> tabl. powł. <b>200 µg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>244,68</b>
		Limit	<b>244,68</b>
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Naldemedine</i>   ATC: A06AH05   wyk:   EAN ~ 194007 (1) Leczenie zaparcí indukowanych opioidami u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową i uprzednio leczonych bezskutecznie środkami przeczyszczającymi, u których nie jest stosowany inny antagonistą opioidowy zarówno osobno jak i w połączeniu(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Shionogi B.V.			
<b>Rolicyn®:</b> tabl. powł. <b>100 mg</b> - 10 szt. ◆	Rx	100%	<b>24,36</b>
		Limit	<b>8,61</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>18,05</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Roxithromycin</i>   ATC: J01FA06   wyk: B   EAN ~ 847914 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA			
<b>Rolicyn®:</b> tabl. powł. <b>150 mg</b> - 10 szt. ◆	Rx	100%	<b>31,75</b>
		Limit	<b>12,92</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>22,76</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Roxithromycin</i>   ATC: J01FA06   wyk: B   EAN ~ 848010 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA			
<b>Rolpryna SR:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu <b>2 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>40,29</b>
		Limit	<b>29,27</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>19,80</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ropinirole</i>   ATC: N04BC04   wyk: B   EAN ~ 855766 (1) Choroba i zespół Parkinsona(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Aparxon PR [29,93], Ceurolex SR [32,28], Aropilo SR [34,57], Repirol SR [37,31], Requip-Modutab [37,99], Ropodrin [38,57], ApoRopin [39,72], Rolpryna SR [40,29], Nironovo SR [40,60], Polpix SR [40,63]			
<b>Rolpryna SR:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu <b>2 mg</b> - 84 szt. ◆	Rx	100%	<b>95,83</b>
		Limit	<b>87,82</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>34,36</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ropinirole</i>   ATC: N04BC04   wyk: B   EAN ~ 033781 (1) Choroba i zespół Parkinsona(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.			
<b>Rolpryna SR:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu <b>4 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>76,74</b>
		Limit	<b>58,54</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>35,76</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ropinirole</i>   ATC: N04BC04   wyk: B   EAN ~ 855773 (1) Choroba i zespół Parkinsona(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Rolpryna SR -(IR) [54,97], Aparxon PR [56,36], Aropilo SR [66,44], Ceurolex SR [70,22], Repirol SR [70,79], Requip-Modutab [72,65], Ropodrin [73,30], ApoRopin [75,59], Rolpryna SR [76,74], Nironovo SR [77,35], Polpix SR [77,43]			
<b>Rolpryna SR:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu <b>4 mg</b> - 84 szt. ◆	Rx	100%	<b>182,83</b>
		Limit	<b>175,63</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>59,89</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ropinirole</i>   ATC: N04BC04   wyk: B   EAN ~ 033798 (1) Choroba i zespół Parkinsona(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.			
<b>Rolpryna SR:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu <b>8 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>147,14</b>
		Limit	<b>117,09</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>65,18</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ropinirole</i>   ATC: N04BC04   wyk: B   EAN ~ 855780 (1) Choroba i zespół Parkinsona(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Rolpryna SR -(IR) [103,59], Aparxon PR [111,19], Aropilo SR [123,10], Ceurolex SR [134,54], Repirol SR [136,03], Requip-Modutab [138,38], Ropodrin [140,27], ApoRopin [144,85], Rolpryna SR [147,14], Nironovo SR [148,37], Polpix SR [148,53]			
<b>Rolpryna SR:</b> tabl. o przedł. uwalnianiu <b>8 mg</b> - 84 szt. ◆	Rx	100%	<b>353,17</b>
		Limit	<b>351,27</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>107,28</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ropinirole</i>   ATC: N04BC04   wyk: B   EAN ~ 033804 (1) Choroba i zespół Parkinsona(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.			
<b>Rolpryna SR -(IR):</b> tabl. o przedł. uwalnianiu <b>4 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>54,97</b>
		Limit	<b>54,97</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>16,49</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ropinirole</i>   ATC: N04BC04   wyk:   EAN ~ 139148 (1) Choroba i zespół Parkinsona(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży:   Delfarma Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Rolpryna SR -(IR) [54,97], Aparxon PR [56,36], Aropilo SR [66,44], Ceurolex SR [70,22], Repirol SR [70,79], Requip-Modutab [72,65], Ropodrin [73,30], ApoRopin [75,59], Rolpryna SR [76,74], Nironovo SR [77,35], Polpix SR [77,43]			
<b>Rolpryna SR -(IR):</b> tabl. o przedł. uwalnianiu <b>8 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>103,59</b>
		Limit	<b>103,59</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>31,08</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Ropinirole</i>   ATC: N04BC04   wyk:   EAN ~ 139168 (1) Choroba i zespół Parkinsona(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży:   Delfarma Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Rolpryna SR -(IR) [103,59], Aparxon PR [111,19], Aropilo SR [123,10], Ceurolex SR [134,54], Repirol SR [136,03], Requip-Modutab [138,38], Ropodrin [140,27], ApoRopin [144,85], Rolpryna SR [147,14], Nironovo SR [148,37], Polpix SR [148,53]			
<b>Romazic:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>5,11</b>
		Limit	<b>4,21</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>1,94</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rosuvastatin</i>   ATC: C10AA07   wyk: B   EAN ~ 919574 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			
Odpowiedniki: Astrium [X], Romazic [5,11]			
<b>Romazic:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>9,30</b>
		Limit	<b>8,43</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>3,06</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rosuvastatin</i>   ATC: C10AA07   wyk: B   EAN ~ 919604 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			
Odpowiedniki: Astrium [X], Ridlip - (IR) [9,23], Romazic [9,30]			
<b>Romazic:</b> tabl. powł. <b>15 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>13,51</b>
		Limit	<b>12,64</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>4,19</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rosuvastatin</i>   ATC: C10AA07   wyk: B   EAN ~ 143595 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			

<b>Romazic:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>17,79</b> Limit <b>16,86</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,39</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA	ATC: <b>C10AA07</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>919659</b>	
<b>Romazic:</b> tabl. powł. <b>30 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>25,71</b> Limit <b>25,29</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>7,21</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA	ATC: <b>C10AA07</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>143598</b>	
<b>Romazic:</b> tabl. powł. <b>40 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>33,26</b> Limit <b>33,26</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>8,98</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA	ATC: <b>C10AA07</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>919673</b>	
<b>Romilast:</b> tabl. do rozgr. i żucia <b>4 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>10,31</b> Limit <b>9,30</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>3,80</b> C <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Montelukast</b> (1) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.	ATC: <b>R03DC03</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>007263</b>	
<b>Romilast:</b> tabl. do rozgr. i żucia <b>5 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>12,62</b> Limit <b>11,63</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>4,48</b> C <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Montelukast</b> (1) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.	ATC: <b>R03DC03</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>007270</b>	
<b>Romilast:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>23,42</b> Limit <b>23,25</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>7,15</b> C <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Montelukast</b> (1) Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.	ATC: <b>R03DC03</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>007300</b>	
<b>Ropodrin:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>2 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>38,57</b> Limit <b>29,27</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>18,08</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Ropinirole</b> (1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Egis Polska Sp. z o.o.	ATC: <b>N04BC04</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>963874</b>	
<b>Ropodrin:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>4 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>73,30</b> Limit <b>58,54</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>32,32</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Ropinirole</b> (1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Egis Polska Sp. z o.o.	ATC: <b>N04BC04</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>964239</b>	

<b>Ropodrin:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>8 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>140,27</b> Limit <b>117,09</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>58,31</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Ropinirole</b> (1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Egis Polska Sp. z o.o.	ATC: <b>N04BC04</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>964321</b>	
<b>Rosutrox:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>4,82</b> Limit <b>3,93</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>2,07</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Biofarm Sp. z o.o.	ATC: <b>C10AA07</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>085599</b>	
<b>Rosutrox:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 56 szt.	Rx	100% <b>8,80</b> Limit <b>7,87</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>3,29</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Biofarm Sp. z o.o.	ATC: <b>C10AA07</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>085636</b>	
<b>Rosutrox:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>8,82</b> Limit <b>7,87</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>3,31</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Biofarm Sp. z o.o.	ATC: <b>C10AA07</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>085674</b>	
<b>Rosutrox:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 56 szt.	Rx	100% <b>16,64</b> Limit <b>15,74</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,62</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Biofarm Sp. z o.o.	ATC: <b>C10AA07</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>085698</b>	
<b>Rosutrox:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>31,47</b> Limit <b>31,47</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>9,44</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Biofarm Sp. z o.o.	ATC: <b>C10AA07</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>085773</b>	
<b>Rosutrox:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 56 szt.	Rx	100% <b>31,47</b> Limit <b>31,47</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>9,44</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Biofarm Sp. z o.o.	ATC: <b>C10AA07</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>085841</b>	



<b>Rosutrox:</b> tabl. powł. <b>40 mg</b> - 56 szt.	Rx	100% <b>59,14</b> Limit <b>59,14</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>17,74</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: <b>C10AA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>085865</b> Biotfarm Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Zahron [58,32], Rosutrox [59,14]					
<b>Rosuvastatin Medical Valley:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>4,65</b> Limit <b>3,93</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>1,90</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: <b>C10AA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>147506</b> Medical Valley Invest AB		
Odpowiedniki: Astrium [X], Rosuvastatin Medical Valley [4,65], Aporoza [4,80], Zahron [4,80], Suvardio [4,81], Rosutrox [4,82], Ridlip [5,15], Roswera [5,16], Crosovo [12,30], Zaranta [14,20]					
<b>Rosuvastatin Medical Valley:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>8,41</b> Limit <b>7,87</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>2,90</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: <b>C10AA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>147507</b> Medical Valley Invest AB		
Odpowiedniki: Astrium [X], Rosuvastatin Medical Valley [8,41], Crosovo [8,73], Zahron [8,73], Suvardio [8,80], Rosutrox [8,82], Zaranta [9,13], Ridlip [9,40], Roswera [9,42]					
<b>Rosuvastatin Medical Valley:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>15,81</b> Limit <b>15,74</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>4,79</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: <b>C10AA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>147508</b> Medical Valley Invest AB		
Odpowiedniki: Astrium [X], Rosuvastatin Medical Valley [15,81], Aporoza [16,47], Rosutrox [16,64], Suvardio [16,64], Zaranta [17,35], Ridlip [17,92], Roswera [17,96], Crosovo [18,03], Zahron [18,03]					
<b>Rosuvastatin Medical Valley:</b> tabl. powł. <b>40 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>29,83</b> Limit <b>29,83</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>8,95</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: <b>C10AA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>147509</b> Medical Valley Invest AB		
Odpowiedniki: Astrium [X], Rosuvastatin Medical Valley [29,83], Zahron [31,06], Zaranta [31,06], Aporoza [31,15], Crosovo [31,19], Suvardio [31,23], Ridlip [31,47], Rosutrox [31,47], Roswera [34,14]					
<b>Roswera:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>5,16</b> Limit <b>3,93</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>2,41</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: <b>C10AA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>895106</b> Krka Polska Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Astrium [X], Rosuvastatin Medical Valley [4,65], Aporoza [4,80], Zahron [4,80], Suvardio [4,81], Rosutrox [4,82], Ridlip [5,15], Roswera [5,16], Crosovo [12,30], Zaranta [14,20]					
<b>Roswera:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 90 szt.	Rx	100% <b>13,63</b> Limit <b>12,64</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>4,78</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: <b>C10AA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>895182</b> Krka Polska Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Ridlip [13,02], Roswera [13,63]					
<b>Roswera:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>9,42</b> Limit <b>7,87</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>3,91</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: <b>C10AA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>895250</b> Krka Polska Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Astrium [X], Rosuvastatin Medical Valley [8,41], Crosovo [8,73], Zahron [8,73], Suvardio [8,80], Rosutrox [8,82], Zaranta [9,13], Ridlip [9,40], Roswera [9,42]					
<b>Roswera:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 90 szt.	Rx	100% <b>25,93</b> Limit <b>25,29</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>8,23</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: <b>C10AA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>895304</b> Krka Polska Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Ridlip - (IR) [24,58], Ridlip [24,70], Roswera [25,93]					
<b>Roswera:</b> tabl. powł. <b>15 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>13,72</b> Limit <b>11,80</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,46</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: <b>C10AA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>895380</b> Krka Polska Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Zahron [12,69], Roswera [13,72]					
<b>Roswera:</b> tabl. powł. <b>15 mg</b> - 56 szt.	Rx	100% <b>24,25</b> Limit <b>23,60</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>7,73</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: <b>C10AA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>895403</b> Krka Polska Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Zaranta [24,07], Zahron [24,12], Roswera [24,25]					
<b>Roswera:</b> tabl. powł. <b>15 mg</b> - 90 szt.	Rx	100% <b>37,28</b> Limit <b>37,28</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>11,18</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: <b>C10AA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>895458</b> Krka Polska Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Zaranta [36,82], Roswera [37,28]					
<b>Roswera:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>17,96</b> Limit <b>15,74</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>6,94</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: <b>C10AA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>895533</b> Krka Polska Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Astrium [X], Rosuvastatin Medical Valley [15,81], Aporoza [16,47], Rosutrox [16,64], Suvardio [16,64], Zaranta [17,35], Ridlip [17,92], Roswera [17,96], Crosovo [18,03], Zahron [18,03]					
<b>Roswera:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 90 szt.	Rx	100% <b>48,57</b> Limit <b>48,57</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>14,57</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: <b>C10AA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>895588</b> Krka Polska Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Ridlip - (IR) [45,53], Ridlip - (IR) [45,65], Ridlip [46,10], Roswera [48,57]					
<b>Roswera:</b> tabl. powł. <b>30 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>26,28</b> Limit <b>23,60</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>9,76</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>			
INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: <b>C10AA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>895663</b> Krka Polska Sp. z o.o.		
Odpowiedniki: Zahron [24,12], Roswera [26,28]					



Roswera: tabl. powł. 30 mg - 56 szt.	Rx	100% 45,48 Limit 45,48 30% <sup>(1)</sup> 13,64 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.	INN: <i>Rosuvastatin</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Odpowiedniki: Zaranta [45,14], Zahron [45,25], Roswera [45,48]	ATC: C10AA07	wyk: B	EAN ~ 895687 Krka Polska Sp. z o.o.	Rozaduo: krople do oczu [roztw.] (40 µg+ 5 mg)/ml - 1 but. 2,5 ml	Rx	100% 39,27 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 10,82 S <sup>(3)</sup> bezpl.	INN: <i>Travoprost + Timolol</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Odpowiedniki: Travoprost + Timolol Medical Valley [32,69], Travoprost+Timolol Genoptim [39,27], Rozaduo [39,27], DuoTrav [45,46]	ATC: S01ED51	wyk: B	EAN ~ 134780 Adamed Sp. z o.o.
Roswera: tabl. powł. 30 mg - 90 szt.	Rx	100% 70,24 Limit 70,24 30% <sup>(1)</sup> 21,07 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.	INN: <i>Rosuvastatin</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Odpowiedniki: Zaranta [69,35], Roswera [70,24]	ATC: C10AA07	wyk: B	EAN ~ 895724 Krka Polska Sp. z o.o.	Rozaduo: krople do oczu [roztw.] (40 µg+ 5 mg)/ml - 3 but. 2,5 ml	Rx	100% 108,81 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 21,87 S <sup>(3)</sup> bezpl.	INN: <i>Travoprost + Timolol</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Odpowiedniki: Travoprost+Timolol Genoptim [107,23], Rozaduo [108,81]	ATC: S01ED51	wyk: B	EAN ~ 134781 Adamed Sp. z o.o.
Roswera: tabl. powł. 40 mg - 28 szt.	Rx	100% 34,14 Limit 31,47 30% <sup>(1)</sup> 12,11 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.	INN: <i>Rosuvastatin</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Odpowiedniki: Astrium [X], Rosuvastatin Medical Valley [29,83], Zahron [31,06], Zaranta [31,06], Aporoza [31,15], Crosuvo [31,19], Suvaridio [31,23], Ridlip [31,47], Rosutrox [31,47], Roswera [34,14]	ATC: C10AA07	wyk: B	EAN ~ 895786 Krka Polska Sp. z o.o.	Rozaduo: krople do oczu [roztw.] (40 µg+ 5 mg)/ml - 4 but. 2,5 ml	Rx	100% 141,95 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 26,03 S <sup>(3)</sup> bezpl.	INN: <i>Travoprost + Timolol</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Odpowiedniki: Dorzolamid STADA [X], Dorzostill [X], Oftidor [X], Vizidor [19,67], Nodofree [19,84], Trusopt® [21,36], Nodom [22,90], Rozalin [24,04]	ATC: S01ED51	wyk: B	EAN ~ 134782 Adamed Sp. z o.o.
Roswera: tabl. powł. 40 mg - 90 szt.	Rx	100% 91,88 Limit 91,88 30% <sup>(1)</sup> 27,56 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.	INN: <i>Rosuvastatin</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Odpowiedniki: Astrium [X], Rosuvastatin Medical Valley [29,83], Zahron [31,06], Zaranta [31,06], Aporoza [31,15], Crosuvo [31,19], Suvaridio [31,23], Ridlip [31,47], Rosutrox [31,47], Roswera [34,14]	ATC: C10AA07	wyk: B	EAN ~ 895892 Krka Polska Sp. z o.o.	Rozalin: krople do oczu [roztw.] 20 mg/ml - 1 but. 5 ml ♦	Rx	100% 24,04 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 9,58 S <sup>(3)</sup> bezpl.	INN: <i>Dorzolamide</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Dorzolamid STADA [X], Dorzostill [X], Oftidor [X], Vizidor [19,67], Nodofree [19,84], Trusopt® [21,36], Nodom [22,90], Rozalin [24,04]	ATC: S01EC03	wyk: B	EAN ~ 643929 Adamed Sp. z o.o.
Rovamycine®: tabl. powł. 1,5 mln j.m. - 16 szt.	Rx	100% 21,24 Limit 20,66 50% <sup>(1)</sup> 10,91 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.	INN: <i>Rosuvastatin</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: C10AA07	wyk: B	EAN ~ 895892 Krka Polska Sp. z o.o.	Rozalin: krople do oczu [roztw.] 20 mg/ml - 3 but. 5 ml ♦	Rx	100% 56,31 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 8,66 S <sup>(3)</sup> bezpl.	INN: <i>Dorzolamide</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Vizidor [54,31], Nodofree [54,85], Nodom [54,86], Rozalin [56,31]	ATC: S01EC03	wyk: B	EAN ~ 000962 Adamed Sp. z o.o.
Rovamycine®: tabl. powł. 3 mln j.m. - 10 szt.	Rx	100% 25,83 Limit 25,83 50% <sup>(1)</sup> 12,92 DZ <sup>(2)</sup> bezpl. S <sup>(3)</sup> bezpl.	INN: <i>Spiramycin</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Odpowiedniki: Oftidorix [26,39], Nodofree Combi [26,49], Nodom Combi [30,41], Rozacom [30,98], Cosopt® [32,35]	ATC: J01FA02	wyk: B	EAN ~ 098613 Sanofi Winthrop Industrie	Rozaprost: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml - 1 but. 2,5 ml	Rx	100% 38,06 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 9,61 S <sup>(3)</sup> bezpl.	INN: <i>Latanoprost</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Akistan [31,83], Latanoprost Genoptim [33,92], Latalux [36,12], Xalatan® [37,26], Rozaprost [38,06], Xaloptic [41,83]	ATC: S01EE01	wyk: B	EAN ~ 841448 Adamed Sp. z o.o.
Rozacom: krople do oczu [roztw.] (20 mg+ 5 mg)/ml - 1 but. 5 ml ♦	Rx	100% 30,98 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 7,69 S <sup>(3)</sup> bezpl.	INN: <i>Spiramycin</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Odpowiedniki: Oftidorix [26,39], Nodofree Combi [26,49], Nodom Combi [30,41], Rozacom [30,98], Cosopt® [32,35]	ATC: J01FA02	wyk: B	EAN ~ 692118 Sanofi Winthrop Industrie	Rozaprost: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml - 3 but. 2,5 ml	Rx	100% 101,65 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 14,71 S <sup>(3)</sup> bezpl.	INN: <i>Latanoprost</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Akistan [86,49], Xalatan® [96,50], Rozaprost [101,65], Xaloptic [105,38]	ATC: S01EE01	wyk: B	EAN ~ 001298 Adamed Sp. z o.o.
Rozacom: krople do oczu [roztw.] (20 mg+ 5 mg)/ml - 3 but. 5 ml ♦	Rx	100% 71,98 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 8,00 S <sup>(3)</sup> bezpl.	INN: <i>Dorzolamide + Timolol</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Odpowiedniki: Oftidorix [26,39], Nodofree Combi [26,49], Nodom Combi [30,41], Rozacom [30,98], Cosopt® [32,35]	ATC: S01ED51	wyk: B	EAN ~ 074670 Adamed Sp. z o.o.	Rozaprost Mono: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml - 30 poj. 0,2 ml	Rx	100% 43,22 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 8,44 S <sup>(3)</sup> bezpl.	INN: <i>Latanoprost</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Rozaprost Mono [43,22], Xaloptic Free [44,92]	ATC: S01EE01	wyk: B	EAN ~ 102883 Adamed Sp. z o.o.
Rozaprost: krople do oczu [roztw.] (20 mg+ 5 mg)/ml - 1 but. 5 ml ♦	Rx	100% 30,98 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 7,69 S <sup>(3)</sup> bezpl.	INN: <i>Dorzolamide + Timolol</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Odpowiedniki: Nodofree Combi [71,76], Nodom Combi [71,98], Rozacom [71,98]	ATC: S01ED51	wyk: B	EAN ~ 400095 Adamed Sp. z o.o.	Rozaprost Mono: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml - 90 poj. 0,2 ml	Rx	100% 120,79 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 16,46 S <sup>(3)</sup> bezpl.	INN: <i>Latanoprost</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Rozaprost Mono [120,79], Xaloptic Free [124,10]	ATC: S01EE01	wyk: B	EAN ~ 102890 Adamed Sp. z o.o.

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

<b>Rozesta: tabl. 5/10 mg - 30 szt. ♦</b>	Rx	100%	23,74
		Limit	14,23
		30% <sup>(1)</sup>	13,78
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Rosuvastatin + Ezetimibe* ATC: C10BA06 wyk: B EAN ~ 146376  
(1) Leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
Zentiva PL Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Rozesta [23,74], Coroswera [23,85], Suvadlio Plus [24,46]

<b>Rozesta: tabl. 10/10 mg - 30 szt. ♦</b>	Rx	100%	23,74
		Limit	14,23
		30% <sup>(1)</sup>	13,78
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Rosuvastatin + Ezetimibe* ATC: C10BA06 wyk: B EAN ~ 146381  
(1) Leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
Zentiva PL Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Rozesta [23,74], Coroswera [24,19], Suvadlio Plus [24,46]

<b>Rozesta: tabl. 20/10 mg - 30 szt. ♦</b>	Rx	100%	23,74
		Limit	14,23
		30% <sup>(1)</sup>	13,78
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Rosuvastatin + Ezetimibe* ATC: C10BA06 wyk: B EAN ~ 146383  
(1) Leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
Zentiva PL Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Rozesta [23,74], Coroswera [24,19], Suvadlio Plus [24,46]

<b>Ruconest: prosz. i rozp. do przyg. roztw. 2100 j.m. - 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + zestaw</b>	Rx-z	100%	3947,16
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Conestat alfa* ATC: B06AC04 wyk: B EAN ~ 968007  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Leczenie ostrego, zagrażającego życiu napadu obrzęku naczynioruchowego u dzieci od 2 roku życia, chorych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esteraazy C1 (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Pharming Group NV

<b>Rupaller: tabl. 10 mg - 100 szt.</b>	Rx	100%	35,18
		Limit	35,18
		30% <sup>(1)</sup>	10,55
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Rupatadine* ATC: R06AX28 wyk: B EAN ~ 142988  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
FARMAK Sp. z o.o.

<b>▼RXULTI: tabl. powł. 1 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	312,90
		Limit	312,90
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Brexiprazole* ATC: N05AX16 wyk: B EAN ~ 600286  
(1) Schizofrenia u pacjentów dorosłych po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii pozostałymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacji | Kat. ciąży: C  
Lundbeck Poland Sp. z o.o.

<b>▼RXULTI: tabl. powł. 2 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	312,90
		Limit	312,90
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Brexiprazole* ATC: N05AX16 wyk: B EAN ~ 600287  
(1) Schizofrenia u pacjentów dorosłych po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii pozostałymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacji | Kat. ciąży: C  
Lundbeck Poland Sp. z o.o.

<b>▼RXULTI: tabl. powł. 3 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	312,90
		Limit	312,90
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Brexiprazole* ATC: N05AX16 wyk: B EAN ~ 600288  
(1) Schizofrenia u pacjentów dorosłych po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii pozostałymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacji | Kat. ciąży: C  
Lundbeck Poland Sp. z o.o.

<b>▼RXULTI: tabl. powł. 4 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	312,90
		Limit	312,90
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,84
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Brexiprazole* ATC: N05AX16 wyk: B EAN ~ 600289  
(1) Schizofrenia u pacjentów dorosłych po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii pozostałymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacji | Kat. ciąży: C  
Lundbeck Poland Sp. z o.o.

<b>Ryspolit: tabl. powł. 1 mg - 20 szt. ♦</b>	Rx	100%	10,06
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,84
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Risperidone* ATC: N05AX08 wyk: B EAN ~ 567683  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Orizon [9,32], Risperidon Vipharm [9,42], Risperon [9,91], Rispolept® [10,02], Ryspolit [10,06]

<b>Ryspolit: tabl. powł. 2 mg - 20 szt. ♦</b>	Rx	100%	20,15
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	8,50
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Risperidone* ATC: N05AX08 wyk: B EAN ~ 567737  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

<b>Ryspolit: tabl. powł. 3 mg - 20 szt. ♦</b>	Rx	100%	29,23
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	10,16
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Risperidone* ATC: N05AX08 wyk: B EAN ~ 567935  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

<b>Ryspolit: tabl. powł. 4 mg - 20 szt. ♦</b>	Rx	100%	38,84
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	12,35
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Risperidone* ATC: N05AX08 wyk: B EAN ~ 568031  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

<b>Ryzodeg®: inj. (roztw.) 100 j./ml - 5 wkł. 3 ml</b>	Rx	100%	174,28
		Limit	154,96
		30% <sup>(1)</sup>	65,81
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Insulin aspart + Insulin degludec* ATC: A10AD06 wyk: B EAN ~ 137156  
(1) Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 m-cy i z HbA1c ≥ 8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 m-cy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO), Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i powyżej (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: A  
Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

<b>Sabril®: prosz. do przyg. roztw. doust. 500 mg - 50 sasz. ♦</b>	Rx	100%	155,96
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Vigabatrin* ATC: N03AG04 wyk: B EAN ~ 832712  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Zespół Westa (3) Padaczka oporna na leczenie WP: Stany napadowe w przebiegu stwardnienia guzowatego - monoterapia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Sanofi Winthrop Industrie

<b>Sabril®: tabl. powł. 500 mg - 100 szt. ♦</b>	Rx	100%	235,94
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Vigabatrin* ATC: N03AG04 wyk: B EAN ~ 312818  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Zespół Westa (3) Padaczka oporna na leczenie WP: Stany napadowe w przebiegu stwardnienia guzowatego - monoterapia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Sanofi Winthrop Industrie

<b>Salaza: czopki 500 mg - 30 szt.</b>	Rx	100%	44,82
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,68
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Mesalazine* ATC: A07EC02 wyk: B EAN ~ 144855  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
RECORDATI Polska Sp. z o.o.

<b>Salaza: czopki 1000 mg - 30 szt.</b>	Rx	100%	84,68
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Mesalazine* ATC: A07EC02 wyk: B EAN ~ 143385  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
RECORDATI Polska Sp. z o.o.

<b>Salaza: czopki 500 mg - 30 szt.</b>	Rx	100%	84,68
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Mesalazine* ATC: A07EC02 wyk: B EAN ~ 143385  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
RECORDATI Polska Sp. z o.o.

<b>Salaza: czopki 1000 mg - 30 szt.</b>	Rx	100%	84,68
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Mesalazine* ATC: A07EC02 wyk: B EAN ~ 143385  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
RECORDATI Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Salaza [84,68], Crohnax [84,97], Salofalk® 1 g [154,52]



# ZOLPIC

zolidem

Daj owcom odpocząć.



Salaza: tabl. dojelitowe 500 mg - 100 szt.	Rx	100%	78,94
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,59
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Mesalazine* | ATC: A07EC02 | wyk: B | EAN ~ 141884  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 RECORDATI Polska Sp. z o.o.

Salaza: tabl. dojelitowe 1000 mg - 100 szt.	Rx	100%	149,82
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,11
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Mesalazine* | ATC: A07EC02 | wyk: B | EAN ~ 144996  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 RECORDATI Polska Sp. z o.o.

Salazopyrin™ EN: tabl. dojelitowe 500 mg - 50 szt.	Rx	100%	31,15
		Limit	28,09
		30% <sup>(1)</sup>	11,49
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	6,26
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Sulfasalazine* | ATC: A07EC01 | wyk: B | EAN ~ 864416  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, Choroba Leśniowskiego-Crohna WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Pfizer Polska Sp. z o.o.

Salazopyrin™ EN: tabl. dojelitowe 500 mg - 100 szt.	Rx	100%	58,17
		Limit	56,18
		30% <sup>(1)</sup>	18,84
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	5,19
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Sulfasalazine* | ATC: A07EC01 | wyk: B | EAN ~ 864423  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, Choroba Leśniowskiego-Crohna WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Pfizer Polska Sp. z o.o.

Salbetan: roztw. na skórę (0,64 mg+ 20 mg)/g - 1 but. 50 ml	Rx	100%	17,69
		Limit	13,93
		50% <sup>(1)</sup>	10,73
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Betamethasone dipropionate + Salicylic acid* | ATC: D07XC01 | wyk: B | EAN ~ 254988  
 (1) Leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Sun-Farm Sp. z o.o.

Salbetan: roztw. na skórę (0,64 mg+ 20 mg)/g - 1 but. 100 ml	Rx	100%	27,38
		Limit	27,38
		50% <sup>(1)</sup>	13,69
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Betamethasone dipropionate + Salicylic acid* | ATC: D07XC01 | wyk: B | EAN ~ 254995  
 (1) Leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Sun-Farm Sp. z o.o.

Salbutamol Hasco: syrop 2 mg/5 ml - 1 but. 100 ml	Rx	100%	10,56
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Salbutamol* | ATC: R03CC02 | wyk: B | EAN ~ 317516  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Bradykardia u dzieci do 18 rż.(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA

Salfumix Easyhaler: prosz. do inhal. 250/50 µg/dawkę - 1 inhal. (60 dawek)	Rx	100%	89,01
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	13,89
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Fluticasone propionate + Salmeterol* | ATC: R03AK06 | wyk: A | EAN ~ 138362  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Astma(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Orion Pharma Poland Sp. o.o.

Odpowiedniki: Duexon Pro [87,41], Salfumix Easyhaler [89,01], Asaris [90,16]

Salfumix Easyhaler: prosz. do inhal. 500/50 µg/dawkę - 1 inhal. (60 dawek)	Rx	100%	106,83
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	16,04
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Fluticasone propionate + Salmeterol* | ATC: R03AK06 | wyk: A | EAN ~ 138365  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Orion Pharma Poland Sp. o.o.

Salmex: inhal. proszkowy 100/50 µg/dawkę - 1 inhal. (60 dawek)	Rx	100%	72,94
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,78
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Fluticasone propionate + Salmeterol* | ATC: R03AK06 | wyk: A | EAN ~ 034900  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Astma, Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Celon Pharma Sp. z o.o.

Salmex: inhal. proszkowy 250/50 µg/dawkę - 1 inhal. (60 dawek)	Rx	100%	92,67
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	15,80
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Fluticasone propionate + Salmeterol* | ATC: R03AK06 | wyk: A | EAN ~ 034924  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Astma(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Celon Pharma Sp. z o.o.

Salmex: inhal. proszkowy 500/50 µg/dawkę - 1 inhal. (60 dawek)	Rx	100%	111,98
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	19,07
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: *Fluticasone propionate + Salmeterol* | ATC: R03AK06 | wyk: A | EAN ~ 034931  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli, Przewłoka obturacyjna choroba płuc(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Celon Pharma Sp. z o.o.

Salofalk®: zaw. doodbytnicza 4 g/60 ml - 7 but. 60 ml	Rx	100%	145,41
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Mesalazine* | ATC: A07EC02 | wyk: B | EAN ~ 970117  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Dr. Falk

Salofalk® 1 g: czopki 1000 mg - 30 szt.	Rx	100%	154,52
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	73,04
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Mesalazine* | ATC: A07EC02 | wyk: B | EAN ~ 806430  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Dr. Falk

Salofalk® 500: czopki 500 mg - 30 szt.	Rx	100%	90,99
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	51,85
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Mesalazine* | ATC: A07EC02 | wyk: B | EAN ~ 422227  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Dr. Falk

Salofalk® 500: tabl. dojelitowe 500 mg - 50 szt.	Rx	100%	51,71
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	17,45
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Mesalazine* | ATC: A07EC02 | wyk: B | EAN ~ 400119  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Dr. Falk



<b>Salson:</b> tabl. o zmodyf. uwalnianiu <b>60 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>12,36</b>
		Limit	<b>9,83</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>5,73</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: <b>Gliclazide</b>	ATC: <b>A10BB09</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>267186</b>
(1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>			
Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: Gliclazide Zentiva [X], Clazicon [12,09], Diagen [12,09], Salson [12,36], Symazide MR [13,05], Gliclada® [15,50], Oziclide MR [15,62], Diaprel® MR [23,50]			

<b>Salson:</b> tabl. o zmodyf. uwalnianiu <b>60 mg</b> - 60 szt.	Rx	100%	<b>23,90</b>
		Limit	<b>19,65</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>10,65</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: <b>Gliclazide</b>	ATC: <b>A10BB09</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>267193</b>
(1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>			
Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: Symazide MR 60 [23,55], Salson [23,90], Gliclada® [30,20], Oziclide MR [30,42]			

<b>Sandimmun Neoral®:</b> kaps. miękkie <b>10 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx	100%	<b>57,22</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>27,80</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: <b>Ciclosporin</b>	ATC: <b>L04AD01</b>	wyk: <b>A</b>	EAN ~ <b>406111</b>
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; zespół Alporta z białkomoczem u dzieci do 18 r.; anemia aplastyczna u dzieci do 18 r.; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 r.; aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granulanych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwono krwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kośćczyny, rogówki, tkanek lub komórek (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Novartis Poland Sp. z o.o.			

<b>Sandimmun Neoral®:</b> kaps. miękkie <b>25 mg</b> - 50 szt. ◆	Rx	100%	<b>76,24</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>11,47</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: <b>Ciclosporin</b>	ATC: <b>L04AD01</b>	wyk: <b>A</b>	EAN ~ <b>336616</b>
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; zespół Alporta z białkomoczem u dzieci do 18 r.; anemia aplastyczna u dzieci do 18 r.; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 r.; aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granulanych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwono krwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kośćczyny, rogówki, tkanek lub komórek (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Novartis Poland Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Cycloid [68,57], Equoral [68,57], Sandimmun Neoral® [76,24]			

<b>Sandimmun Neoral®:</b> kaps. miękkie <b>50 mg</b> - 50 szt. ◆	Rx	100%	<b>144,89</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>12,16</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: <b>Ciclosporin</b>	ATC: <b>L04AD01</b>	wyk: <b>A</b>	EAN ~ <b>336715</b>
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; zespół Alporta z białkomoczem u dzieci do 18 r.; anemia aplastyczna u dzieci do 18 r.; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 r.; aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granulanych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwono krwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kośćczyny, rogówki, tkanek lub komórek (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Novartis Poland Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Cycloid [135,93], Equoral [135,93], Sandimmun Neoral® [144,89]			

<b>Sandimmun Neoral®:</b> kaps. miękkie <b>100 mg</b> - 50 szt. ◆	Rx	100%	<b>279,29</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>10,63</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: <b>Ciclosporin</b>	ATC: <b>L04AD01</b>	wyk: <b>A</b>	EAN ~ <b>336814</b>
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; zespół Alporta z białkomoczem u dzieci do 18 r.; anemia aplastyczna u dzieci do 18 r.; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 r.; aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granulanych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwono krwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kośćczyny, rogówki, tkanek lub komórek (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Novartis Poland Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Cycloid [271,44], Equoral [271,44], Sandimmun Neoral® [279,29]			

<b>Sandimmun Neoral®:</b> roztw. doust. <b>100 mg/ml</b> - 1 fl. 50 ml ◆	Rx	100%	<b>346,77</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>35,30</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: <b>Ciclosporin</b>	ATC: <b>L04AD01</b>	wyk: <b>A</b>	EAN ~ <b>336913</b>
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; zespół Alporta z białkomoczem u dzieci do 18 r.; anemia aplastyczna u dzieci do 18 r.; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 r.; aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granulanych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwono krwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kośćczyny, rogówki, tkanek lub komórek (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Novartis Poland Sp. z o.o.			

<b>Sandostatin®:</b> inj. [roztw.] <b>50 µg/ml</b> - 5 amp. 1 ml	Rx	100%	<b>34,34</b>
		Limit	<b>14,86</b>
		B <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(3)</sup>	<b>27,30</b>

INN: <b>Octreotide</b>	ATC: <b>H01CB02</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>042715</b>
(1) Chemioterapia ICD10: C.45.a. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Akromegalia WP: Hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL; objawy hipersekrekcji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>			
Novartis Poland Sp. z o.o.			

<b>Sandostatin®:</b> inj. [roztw.] <b>100 µg/ml</b> - 5 amp. 1 ml	Rx	100%	<b>45,79</b>
		Limit	<b>29,72</b>
		B <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(3)</sup>	<b>26,19</b>

INN: <b>Octreotide</b>	ATC: <b>H01CB02</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>042913</b>
(1) Chemioterapia ICD10: C.45.a. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Akromegalia WP: Hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL; objawy hipersekrekcji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>			
Novartis Poland Sp. z o.o.			

<b>Sandostatin® Lar®:</b> inj. dom. [mikrogran.+ rozp.] <b>10 mg</b> - 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk. z rozp. 2,5 ml	Rx	100%	<b>594,40</b>
		Limit	<b>594,40</b>
		B <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(3)</sup>	<b>14,69</b>

INN: <b>Octreotide</b>	ATC: <b>H01CB02</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>459711</b>
(1) Chemioterapia ICD10: C.45.a.; C.45.b. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Akromegalia, Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowolająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIP-oma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRF-oma oraz w leczeniu pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby WP: Hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL; objawy hipersekrekcji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>			
Novartis Poland Sp. z o.o.			

<b>Sandostatin® Lar®:</b> inj. dom. [mikrogran.+ rozp.] <b>20 mg</b> - 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk. z rozp. 2,5 ml	Rx	100%	<b>1188,82</b>
		Limit	<b>1188,82</b>
		B <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(3)</sup>	<b>9,13</b>

INN: <b>Octreotide</b>	ATC: <b>H01CB02</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>459612</b>
(1) Chemioterapia ICD10: C.45.a.; C.45.b. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowolająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIP-oma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRF-oma oraz w leczeniu pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby, Akromegalia WP: Hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL; objawy hipersekrekcji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>			
Novartis Poland Sp. z o.o.			



Naszym wyborem **enarenal**  
enalapryli maleas

<b>Sandostatyn® Lar®:</b> inj. dom. [mikrogran.+ rozp.] <b>30 mg</b> - 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk. z rozp. 2,5 ml	Rx	100%	<b>1783,22</b>
		Limit	<b>1783,22</b>
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	<b>4,57</b>
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <b>Ocreotide</b>   ATC: <b>H01CB02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>459513</b>			
(1) Chemioterapia ICD10: C.45.a.; C.45.b. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowalająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIP-oma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRF-oma oraz w leczeniu pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części przjelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby, Akromegalia WP: Hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL; objawy hipersekcji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>			
Novartis Poland Sp. z o.o.			
<b>Sastium:</b> tabl. powł. <b>50 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>11,26</b>
		Limit	<b>11,26</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>3,38</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Sertraline</b>   ATC: <b>N06AB06</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>279516</b>			
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Sastium [11,26], Sertagen [12,02], Asentra® [14,50], Zolof® [17,83], Zotal® [19,88]			
<b>Sastium:</b> tabl. powł. <b>50 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>11,92</b>
		Limit	<b>11,92</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>3,58</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Sertraline</b>   ATC: <b>N06AB06</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>279523</b>			
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: ApoSerta/Sertraline Aurovitas [11,80], Sastium [11,92], Sertralina Krka [12,56], Miravil [13,64], Sertranom [13,73], Setaflo [14,07], Asertin® 50 [15,07], Stimuloton® [17,27]			
<b>Sastium:</b> tabl. powł. <b>50 mg</b> - 84 szt. ◆	Rx	100%	<b>29,66</b>
		Limit	<b>29,66</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>8,90</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Sertraline</b>   ATC: <b>N06AB06</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>279561</b>			
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Asentra® - (IR) [20,64], Sastium [20,90], Sertagen [22,53], Asentra® [27,61], Zolof® [32,02], Zotal® [36,12]			
<b>Sastium:</b> tabl. powł. <b>100 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>20,90</b>
		Limit	<b>20,90</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>6,27</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Sertraline</b>   ATC: <b>N06AB06</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>279615</b>			
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Asentra® - (IR) [20,64], Sastium [20,90], Sertagen [22,53], Asentra® [27,61], Zolof® [32,02], Zotal® [36,12]			
<b>Sastium:</b> tabl. powł. <b>100 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>22,13</b>
		Limit	<b>22,13</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>6,64</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Sertraline</b>   ATC: <b>N06AB06</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>279622</b>			
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: ApoSerta/Sertraline Aurovitas [21,88], Sastium [22,13], Sertralina Krka [23,49], Miravil [25,60], Sertranom [25,93], Setaflo [28,22], Asertin® 100 [29,41]			
<b>Sastium:</b> tabl. powł. <b>100 mg</b> - 84 szt. ◆	Rx	100%	<b>54,96</b>
		Limit	<b>54,96</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>16,49</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Sertraline</b>   ATC: <b>N06AB06</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>279660</b>			
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.			

<b>▼Seebri Breezhaler:</b> prosz. do inhal. [kaps.] <b>0,044 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>95,44</b>
		Limit	<b>95,44</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>28,63</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Glycopyrronium bromide</b>   ATC: <b>R03BB06</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>000882</b>			
(1) Przewlekła obturacyjna choroba płuc - leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Novartis Europharm Limited			
<b>Selgres®:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 50 szt. ◆	Rx	100%	<b>19,16</b>
		Limit	<b>19,16</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>5,33</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Selegiline hydrochloride</b>   ATC: <b>N04BD01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>404315</b>			
(1) Choroba i zespół Parkinsona (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Bausch Health			
<b>Serdolect®:</b> tabl. powł. <b>4 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>98,88</b>
		Limit	<b>98,88</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>3,20</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Sertindole</b>   ATC: <b>N05AE03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>089214</b>			
(1) Schizofrenia (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Lundbeck Poland Sp. z o.o.			
<b>Serdolect®:</b> tabl. powł. <b>12 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>271,38</b>
		Limit	<b>271,38</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>3,20</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Sertindole</b>   ATC: <b>N05AE03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>089313</b>			
(1) Schizofrenia (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Lundbeck Poland Sp. z o.o.			
<b>Serdolect®:</b> tabl. powł. <b>16 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>357,70</b>
		Limit	<b>357,70</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>3,20</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Sertindole</b>   ATC: <b>N05AE03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>089412</b>			
(1) Schizofrenia (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
Lundbeck Poland Sp. z o.o.			
<b>Seretide® 50:</b> aerozol inhal. [zaw.] <b>25/50 µg/dawkę</b> - 1 poj. (120 dawek)	Rx	100%	<b>80,07</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	<b>11,33</b>
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <b>Fluticasone propionate + Salmeterol</b>   ATC: <b>R03AK06</b>   wyk: <b>A</b>   EAN ~ <b>906918</b>			
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited			
<b>Seretide® 125:</b> aerozol inhal. [zaw.] <b>25/125 µg/dawkę</b> - 1 poj. (120 dawek)	Rx	100%	<b>98,17</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	<b>23,05</b>
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <b>Fluticasone propionate + Salmeterol</b>   ATC: <b>R03AK06</b>   wyk: <b>A</b>   EAN ~ <b>907014</b>			
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Astma (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited			
<b>Seretide® 250:</b> aerozol inhal. [zaw.] <b>25/250 µg/dawkę</b> - 1 poj. (120 dawek)	Rx	100%	<b>126,87</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	<b>36,08</b>
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <b>Fluticasone propionate + Salmeterol</b>   ATC: <b>R03AK06</b>   wyk: <b>A</b>   EAN ~ <b>907113</b>			
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited			
<b>Seretide® Dysk 100:</b> prosz. do inhal. <b>100/50 µg/dawkę</b> - 1 poj. (60 dawek)	Rx	100%	<b>77,18</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	<b>8,44</b>
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <b>Fluticasone propionate + Salmeterol</b>   ATC: <b>R03AK06</b>   wyk: <b>A</b>   EAN ~ <b>832422</b>			
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited			

<b>Seretide® Dysk 250:</b> prosz. do inhal. <b>250/50 µg/dawkę</b> - 1 poj. (60 dawek)	Rx	100%	<b>87,87</b>	<b>Seretranorm:</b> tabl. powł. <b>50 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>13,73</b>
		Limit	<b>0,00</b>			Limit	<b>13,73</b>
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.			30% <sup>(1)</sup>	<b>4,12</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	<b>12,75</b>			S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Fluticasono propionato + Salmeterol</i>   ATC: <b>R03AK06</b>   wyk: <b>A</b>   EAN ~ <b>832521</b> (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Astma, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   <b>GlaxoSmithKline (Ireland) Limited</b>		INN: <i>Sertraline</i>   ATC: <b>N06AB06</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>663040</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   <b>+pharma Polska Sp. z o.o.</b>					
<b>Seretide® Dysk 500:</b> prosz. do inhal. <b>500/50 µg/dawkę</b> - 1 poj. (60 dawek)	Rx	100%	<b>105,69</b>	<b>Seretranorm:</b> tabl. powł. <b>100 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>25,93</b>
		Limit	<b>0,00</b>			Limit	<b>25,93</b>
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.			30% <sup>(1)</sup>	<b>7,78</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	<b>14,90</b>			S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Fluticasono propionato + Salmeterol</i>   ATC: <b>R03AK06</b>   wyk: <b>A</b>   EAN ~ <b>832620</b> (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Astma (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   <b>GlaxoSmithKline (Ireland) Limited</b>		INN: <i>Sertraline</i>   ATC: <b>N06AB06</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>663163</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   <b>+pharma Polska Sp. z o.o.</b>					
<b>Serevent®:</b> aerozol inhal. [zaw.] <b>25 µg/dawkę</b> - 1 poj. (120 dawek)	Rx	100%	<b>69,28</b>	<b>Setalof:</b> tabl. <b>50 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>14,07</b>
		Limit	<b>0,00</b>			Limit	<b>14,07</b>
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.			30% <sup>(1)</sup>	<b>4,22</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	<b>14,32</b>			S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Salmeterol</i>   ATC: <b>R03AC12</b>   wyk: <b>A</b>   EAN ~ <b>623099</b> (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   <b>GlaxoSmithKline (Ireland) Limited</b>		INN: <i>Sertraline</i>   ATC: <b>N06AB06</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>571925</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   <b>Actavis Group PTC ehf.</b>					
<b>Serevent® Dysk :</b> prosz. do inhal. <b>50 µg/dawkę</b> - 1 poj. (60 dawek)	Rx	100%	<b>76,84</b>	<b>Setalof:</b> tabl. <b>100 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>28,22</b>
		Limit	<b>0,00</b>			Limit	<b>28,22</b>
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.			30% <sup>(1)</sup>	<b>8,47</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	<b>21,88</b>			S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Salmeterol</i>   ATC: <b>R03AC12</b>   wyk: <b>A</b>   EAN ~ <b>437825</b> (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   <b>GlaxoSmithKline (Ireland) Limited</b>		INN: <i>Sertraline</i>   ATC: <b>N06AB06</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>571963</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   <b>Actavis Group PTC ehf.</b>					
<b>Seronil®:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>15,86</b>	<b>Setinin:</b> tabl. powł. <b>100 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx	100%	<b>48,66</b>
		Limit	<b>7,06</b>			Limit	<b>0,00</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>10,92</b>			DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.			R <sup>(2)</sup>	<b>7,45</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.			S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Fluoxetine</i>   ATC: <b>N06AB03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>374311</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   <b>Orion Pharma Poland Sp. o.o.</b>		INN: <i>Quetiapine</i>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>736393</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   <b>+pharma Polska Sp. z o.o.</b>					
<b>Seronil®:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 100 szt. ◆	Rx	100%	<b>46,95</b>	<b>Setinin:</b> tabl. powł. <b>200 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx	100%	<b>91,97</b>
		Limit	<b>23,52</b>			Limit	<b>0,00</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>30,49</b>			DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.			R <sup>(2)</sup>	<b>6,35</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.			S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Fluoxetine</i>   ATC: <b>N06AB03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>374328</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   <b>Orion Pharma Poland Sp. o.o.</b>		INN: <i>Quetiapine</i>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>736461</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   <b>+pharma Polska Sp. z o.o.</b>					
<b>Sertagen:</b> tabl. powł. <b>50 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>12,02</b>	<b>Setinin:</b> tabl. powł. <b>300 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx	100%	<b>133,27</b>
		Limit	<b>12,02</b>			Limit	<b>0,00</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>3,61</b>			DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.			R <sup>(2)</sup>	<b>4,85</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.			S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Sertraline</i>   ATC: <b>N06AB06</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>046690</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   <b>Mylan Ireland Limited</b> Odpowiedniki: Sastium [11,26], Sertagen [12,02], Asentra® [14,50], Zolof® [17,83], Zotral® [19,88]		INN: <i>Quetiapine</i>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>736492</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   <b>+pharma Polska Sp. z o.o.</b>					
<b>Sertagen:</b> tabl. powł. <b>100 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>22,53</b>	<b>Setinin:</b> tabl. powł. <b>300 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx	100%	<b>133,27</b>
		Limit	<b>22,53</b>			Limit	<b>0,00</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>6,76</b>			DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.			R <sup>(2)</sup>	<b>4,85</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.			S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Sertraline</i>   ATC: <b>N06AB06</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>046621</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   <b>Mylan Ireland Limited</b> Odpowiedniki: Asentra® - (IR) [20,64], Sastium [20,90], Sertagen [22,53], Asentra® [27,61], Zolof® [32,02], Zotral® [36,12]		INN: <i>Quetiapine</i>   ATC: <b>N05AH04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>736492</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   <b>+pharma Polska Sp. z o.o.</b>					



<b>Setron®:</b> tabl. powł. <b>8 mg</b> - 10 szt.	Rx	100%	<b>36,51</b>
		Limit	<b>36,51</b>
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Ondansetron hydrochloride* | ATC: A04AA01 | wyk: B | EAN ~ 994717  
 (1) Chemioterapia ICD10: C.0.0.09. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Nowotwory złośliwe (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Atossa® [36,51], Setron® [36,51], Zofran® [52,54]

<b>Sevredo®:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx-w	100%	<b>70,83</b>
		Limit	<b>70,83</b>
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Morphine sulphate* | ATC: N02AA01 | wyk: N | EAN ~ 336425  
 (1) Nowotwory złośliwe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Mundipharma Polska Sp. z o.o.

<b>Sigletic:</b> tabl. powł. <b>100 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>30,34</b>
		Limit	<b>29,23</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>8,40</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Sitagliptin* | ATC: A10BH01 | wyk: B | EAN ~ 142455  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA  
 Odpowiedniki: Jazeta [29,23], Lonamo [30,25], Symgliclin [30,32], Sitagliptin Adamed [30,34], Sitagliptin STADA [30,34], Sigletic [30,34], Sitagliptin Medical Valley [37,64], Maysiglu [38,21], Sitagliptin Bioton [39,93], Simlerid [43,94], JUZINA® [44,51], Sitagliptin SUN [46,80], Januvia® [80,57]

<b>Silamil:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>16,15</b>
		Limit	<b>16,15</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>4,85</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Solifenacin succinate* | ATC: G04BD08 | wyk: B | EAN ~ 142239  
 (1) Zespół pęcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Solifenacin Stada [X], Solifurin [X], Beloflow [15,41], Silamil [16,15], Soreca [18,54], Aurosolin [18,55], Solinco [18,85], Vesisol [20,21], Afenix [20,38], Zevesin [20,39], Uronorm [20,85], Vesoligo [20,85], Adablock [21,99]

<b>Silamil:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>35,29</b>
		Limit	<b>35,29</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>10,59</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Solifenacin succinate* | ATC: G04BD08 | wyk: B | EAN ~ 133913  
 (1) Zespół pęcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Solifenacin Stada [X], Beloflow [28,70], Soreca [34,95], Aurosolin [34,97], Solifenacin Medreg [35,29], Silamil [35,29], Solinco [35,57], Solifurin [36,14], Vesisol [37,63], Afenix [38,65], Zevesin [38,66], Uronorm [39,57], Vesoligo [39,57], Adablock [41,86]

<b>Sildenafil Aurovitas:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 90 szt.	Rx	100%	<b>57,24</b>
		Limit	<b>57,24</b>
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.

INN: *Sildenafil* | ATC: G04BE03 | wyk: B | EAN ~ 133801  
 (1) Program lekowy: leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) | Kat. ciąży: N  
 Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

<b>Silodosin Aurovitas:</b> kaps. twarde <b>4 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>10,13</b>
		Limit	<b>9,61</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>3,40</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Silodosine* | ATC: G04CA04 | wyk: B | EAN ~ 141888  
 (1) Leczenie objawów przedmiotowych i podmiotowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: N  
 Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Silodosin Aurovitas [10,13], Silodosin Recordati [17,51]

<b>Silodosin Aurovitas:</b> kaps. twarde <b>8 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>19,21</b>
		Limit	<b>19,21</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>5,76</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Silodosine* | ATC: G04CA04 | wyk: B | EAN ~ 141886  
 (1) Leczenie objawów przedmiotowych i podmiotowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: N  
 Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Silodosin Aurovitas [19,21], Silodosin Recordati [23,97]

<b>Silodosin Aurovitas:</b> kaps. twarde <b>8 mg</b> - 90 szt.	Rx	100%	<b>52,51</b>
		Limit	<b>52,51</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>15,75</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Silodosine* | ATC: G04CA04 | wyk: B | EAN ~ 141898  
 (1) Leczenie objawów przedmiotowych i podmiotowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: N  
 Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Silodosin Aurovitas [52,51], Silodosin Recordati [66,79]

<b>Silodosin Recordati:</b> kaps. twarde <b>4 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>17,51</b>
		Limit	<b>9,61</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>10,78</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Silodosine* | ATC: G04CA04 | wyk: B | EAN ~ 992352  
 (1) Leczenie objawów przedmiotowych i podmiotowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: N  
 RECORDATI Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Silodosin Aurovitas [10,13], Silodosin Recordati [17,51]

<b>Silodosin Recordati:</b> kaps. twarde <b>8 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>23,97</b>
		Limit	<b>19,21</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>10,52</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Silodosine* | ATC: G04CA04 | wyk: B | EAN ~ 992353  
 (1) Leczenie objawów przedmiotowych i podmiotowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: N  
 RECORDATI Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Silodosin Aurovitas [19,21], Silodosin Recordati [23,97]

<b>Silodosin Recordati:</b> kaps. twarde <b>8 mg</b> - 90 szt.	Rx	100%	<b>66,79</b>
		Limit	<b>57,63</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>26,45</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Silodosine* | ATC: G04CA04 | wyk: B | EAN ~ 992354  
 (1) Leczenie objawów przedmiotowych i podmiotowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: N  
 RECORDATI Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Silodosin Aurovitas [52,51], Silodosin Recordati [66,79]

<b>Simcovas:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 28 szt. (2 blistry)	Rx	100%	<b>8,37</b>
		Limit	<b>5,25</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>4,70</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Simvastatin* | ATC: C10AA01 | wyk: B | EAN ~ 649532  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nielaboratoryjnego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
 Actavis Group PTC ehf.

<b>Simcovas:</b> tabl. powł. <b>40 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>16,02</b>
		Limit	<b>10,49</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>8,68</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Simvastatin* | ATC: C10AA01 | wyk: B | EAN ~ 649655  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nielaboratoryjnego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
 Actavis Group PTC ehf.

Odpowiedniki: Simvastatinum Accord [X], Simvastatin Aurovitas [7,63], Simvastatin Bluefish [11,70], Simvagen 40 [13,87], Simcovas [16,02], Vasilip® [21,52], Simvacard® 40 [21,74], Simratio 40 [25,30], Zocor® 40 [25,52], Simvasterol® [26,55]

<b>Simlerid:</b> tabl. powł. <b>100 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>43,94</b>
		Limit	<b>29,23</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>23,48</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Sitagliptin* | ATC: A10BH01 | wyk: B | EAN ~ 670980  
 (1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c  $\geq 7\%$  (przez co najmniej 3 miesiące) (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Sandoz GmbH

Odpowiedniki: Jazeta [29,23], Lonamo [30,25], Symgliclin [30,32], Sigletic [30,34], Sitagliptin Adamed [30,34], Sitagliptin STADA [30,34], Sitagliptin Medical Valley [37,64], Maysiglu [38,21], Sitagliptin Bioton [39,93], Simlerid [43,94], JUZINA® [44,51], Sitagliptin SUN [46,80], Januvia® [80,57]



<b>Simratio 10:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 28 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>6,89</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>2,62</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>5,06</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>6,89</b>	Limit	<b>2,62</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>5,06</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<b>Simvachol®:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 28 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>5,06</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>2,62</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>2,91</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>5,06</b>	Limit	<b>2,62</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>2,91</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>6,89</b>																						
Limit	<b>2,62</b>																						
30% <sup>(1)</sup>	<b>5,06</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
100%	<b>5,06</b>																						
Limit	<b>2,62</b>																						
30% <sup>(1)</sup>	<b>2,91</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
INN: <b>Simvastatin</b>   ATC: <b>C10AA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>019723</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyreowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Ratiopharm GmbH		INN: <b>Simvastatin</b>   ATC: <b>C10AA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>941025</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyreowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.																					
<b>Simratio 40:</b> tabl. powł. <b>40 mg</b> - 28 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>25,30</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>10,49</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>17,96</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>25,30</b>	Limit	<b>10,49</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>17,96</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<b>Simvachol®:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 28 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>9,23</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>5,25</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>5,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>9,23</b>	Limit	<b>5,25</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>5,00</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>25,30</b>																						
Limit	<b>10,49</b>																						
30% <sup>(1)</sup>	<b>17,96</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
100%	<b>9,23</b>																						
Limit	<b>5,25</b>																						
30% <sup>(1)</sup>	<b>5,00</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
INN: <b>Simvastatin</b>   ATC: <b>C10AA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>019945</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyreowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Ratiopharm GmbH		INN: <b>Simvastatin</b>   ATC: <b>C10AA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>941124</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyreowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.																					
<b>Simvacard® 10:</b> tabl. <b>10 mg</b> - 28 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>6,25</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>2,62</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>4,42</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>6,25</b>	Limit	<b>2,62</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>4,42</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<b>Simvagen 20:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 28 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>7,35</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>5,25</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>3,68</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>7,35</b>	Limit	<b>5,25</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>3,68</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>6,25</b>																						
Limit	<b>2,62</b>																						
30% <sup>(1)</sup>	<b>4,42</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
100%	<b>7,35</b>																						
Limit	<b>5,25</b>																						
30% <sup>(1)</sup>	<b>3,68</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
INN: <b>Simvastatin</b>   ATC: <b>C10AA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>940110</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyreowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Zentiva PL Sp. z o.o.		INN: <b>Simvastatin</b>   ATC: <b>C10AA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>743650</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyreowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Mylan Ireland Limited																					
<b>Simvacard® 20:</b> tabl. <b>20 mg</b> - 28 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>11,07</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>5,25</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>7,40</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>11,07</b>	Limit	<b>5,25</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>7,40</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<b>Simvagen 40:</b> tabl. powł. <b>40 mg</b> - 28 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>13,87</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>10,49</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>6,53</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>13,87</b>	Limit	<b>10,49</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>6,53</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>11,07</b>																						
Limit	<b>5,25</b>																						
30% <sup>(1)</sup>	<b>7,40</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
100%	<b>13,87</b>																						
Limit	<b>10,49</b>																						
30% <sup>(1)</sup>	<b>6,53</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
INN: <b>Simvastatin</b>   ATC: <b>C10AA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>940219</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyreowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Zentiva PL Sp. z o.o.		INN: <b>Simvastatin</b>   ATC: <b>C10AA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>743667</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyreowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Mylan Ireland Limited																					
<b>Simvacard® 40:</b> tabl. <b>40 mg</b> - 28 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>21,74</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>10,49</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>14,40</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>21,74</b>	Limit	<b>10,49</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>14,40</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<b>SimvaHEXAL 10:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 30 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>7,21</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>2,81</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>5,24</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>7,21</b>	Limit	<b>2,81</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>5,24</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>21,74</b>																						
Limit	<b>10,49</b>																						
30% <sup>(1)</sup>	<b>14,40</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
100%	<b>7,21</b>																						
Limit	<b>2,81</b>																						
30% <sup>(1)</sup>	<b>5,24</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
INN: <b>Simvastatin</b>   ATC: <b>C10AA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>940318</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyreowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Zentiva PL Sp. z o.o.		INN: <b>Simvastatin</b>   ATC: <b>C10AA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>623273</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyreowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Sandoz GmbH																					

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

SimvaHEXAL 20: tabl. powł. 20 mg - 30 szt.	Rx	100%	13,67
		Limit	5,62
		30% <sup>(1)</sup>	9,74
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Simvastatin* ATC: C10AA01 wyk: B EAN ~ 623297

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Sandoz GmbH  
Odpowiedniki: Simvastatinum Accord [X], Simvastatin Bluefish [7,12], Apo-Simva 20 [13,33], SimvaHEXAL 20 [13,67], Ximve [13,82]

SimvaHEXAL 40: tabl. powł. 40 mg - 30 szt.	Rx	100%	24,36
		Limit	11,24
		30% <sup>(1)</sup>	16,49
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Simvastatin* ATC: C10AA01 wyk: B EAN ~ 623334

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Sandoz GmbH  
Odpowiedniki: Simvastatinum Accord [X], Apo-Simva 40 [22,30], Ximve [23,53], SimvaHEXAL 40 [24,36]

Simvastatin Aurovitas: tabl. powł. 20 mg - 28 szt.	Rx	100%	4,26
		Limit	4,26
		30% <sup>(1)</sup>	1,28
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Simvastatin* ATC: C10AA01 wyk: B EAN ~ 073156

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.  
Odpowiedniki: Simvastatinum Accord [X], Simvastatin Aurovitas [4,26], Simvastatin Bluefish [6,72], Simvagen 20 [7,35], Simvachol® [9,23], Simvacard® 20 [11,07], Vastan® [12,49], Simratio 20 [12,77], Ximve [12,91], Vasilip® [13,21], Zocor® 20 [13,22], Simvasterol® [14,29]

Simvastatin Aurovitas: tabl. powł. 40 mg - 28 szt.	Rx	100%	7,63
		Limit	7,63
		30% <sup>(1)</sup>	2,29
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Simvastatin* ATC: C10AA01 wyk: B EAN ~ 073167

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.  
Odpowiedniki: Simvastatinum Accord [X], Simvastatin Aurovitas [7,63], Simvastatin Bluefish [11,70], Simvagen 40 [13,87], Simcovas [16,02], Vasilip® [21,52], Simvacard® 40 [21,74], Simratio 40 [25,30], Zocor® 40 [25,52], Simvasterol® [26,55]

Simvastatin Bluefish: tabl. powł. 10 mg - 28 szt.	Rx	100%	4,68
		Limit	2,62
		30% <sup>(1)</sup>	2,85
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Simvastatin* ATC: C10AA01 wyk: B EAN ~ 723591

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Bluefish Pharmaceuticals  
Odpowiedniki: Simvastatinum Accord [X], Simvastatin Bluefish [4,68], Simvachol® [5,06], Simvacard® 10 [6,25], Vastan® [6,40], Vasilip® [6,68], Simratio 10 [6,89], Zocor® 10 [7,00], Simvasterol® [7,54]

Simvastatin Bluefish: tabl. powł. 20 mg - 28 szt.	Rx	100%	6,72
		Limit	5,25
		30% <sup>(1)</sup>	3,05
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Simvastatin* ATC: C10AA01 wyk: B EAN ~ 723812

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Bluefish Pharmaceuticals  
Odpowiedniki: Simvastatinum Accord [X], Simvastatin Aurovitas [4,26], Simvastatin Bluefish [6,72], Simvagen 20 [7,35], Simvachol® [9,23], Simvacard® 20 [11,07], Vastan® [12,49], Simratio 20 [12,77], Ximve [12,91], Vasilip® [13,21], Zocor® 20 [13,22], Simvasterol® [14,29]

Simvastatin Bluefish: tabl. powł. 20 mg - 30 szt.	Rx	100%	7,12
		Limit	5,62
		30% <sup>(1)</sup>	3,19
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Simvastatin* ATC: C10AA01 wyk: B EAN ~ 723829

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Bluefish Pharmaceuticals  
Odpowiedniki: Simvastatinum Accord [X], Simvastatin Bluefish [7,12], Apo-Simva 20 [13,33], SimvaHEXAL 20 [13,67], Ximve [13,82]

Simvastatin Bluefish: tabl. powł. 40 mg - 28 szt.	Rx	100%	11,70
		Limit	10,49
		30% <sup>(1)</sup>	4,36
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Simvastatin* ATC: C10AA01 wyk: B EAN ~ 724031

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Bluefish Pharmaceuticals  
Odpowiedniki: Simvastatinum Accord [X], Simvastatin Aurovitas [7,63], Simvastatin Bluefish [11,70], Simvagen 40 [13,87], Simcovas [16,02], Vasilip® [21,52], Simvacard® 40 [21,74], Simratio 40 [25,30], Zocor® 40 [25,52], Simvasterol® [26,55]

Simvasterol®: tabl. powł. 10 mg - 28 szt.	Rx	100%	7,54
		Limit	2,62
		30% <sup>(1)</sup>	5,14
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Simvastatin* ATC: C10AA01 wyk: B EAN ~ 927161

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA  
Odpowiedniki: Simvastatinum Accord [X], Simvastatin Bluefish [4,68], Simvachol® [5,06], Simvacard® 10 [6,25], Vastan® [6,40], Vasilip® [6,68], Simratio 10 [6,89], Zocor® 10 [7,00], Simvasterol® [7,54]

Simvasterol®: tabl. powł. 20 mg - 28 szt.	Rx	100%	14,29
		Limit	5,25
		30% <sup>(1)</sup>	9,56
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Simvastatin* ATC: C10AA01 wyk: B EAN ~ 927715

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA  
Odpowiedniki: Simvastatinum Accord [X], Simvastatin Aurovitas [4,26], Simvastatin Bluefish [6,72], Simvagen 20 [7,35], Simvachol® [9,23], Simvacard® 20 [11,07], Vastan® [12,49], Simratio 20 [12,77], Ximve [12,91], Vasilip® [13,21], Zocor® 20 [13,22], Simvasterol® [14,29]



# ZOLPIC

Daj owcom odpocząć.  
zolidem



<p><b>Simvastero<sup>®</sup></b>: tabl. powł. <b>40 mg</b> - 28 szt.</p> <p>INN: <b>Simvastatin</b>   ATC: <b>C10AA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>927838</b>            (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP</b>: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b>  <b>Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA</b>  <b>Odpowiedniki</b>: Simvastatinum Accord [X], Simvastatin Aurovitas [7,63], Simvastatin Bluefish [11,70], Simvagen 40 [13,87], Simcovas [16,02], Vasilip<sup>®</sup> [21,52], Simvacard<sup>®</sup> 40 [21,74], Simratio 40 [25,30], Zocor<sup>®</sup> 40 [25,52], Simvastero<sup>®</sup> [26,55]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td><b>26,55</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>10,49</b></td></tr> <tr><td></td><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>17,29</b></td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	Rx	100%	<b>26,55</b>		Limit	<b>10,49</b>		30% <sup>(1)</sup>	<b>17,29</b>		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>		R <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
Rx	100%	<b>26,55</b>																	
	Limit	<b>10,49</b>																	
	30% <sup>(1)</sup>	<b>17,29</b>																	
	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
	R <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
<p><b>Siofor<sup>®</sup> 500</b>: tabl. powł. <b>500 mg</b> - 30 szt.</p> <p>INN: <b>Metformin hydrochloride</b>   ATC: <b>A10BA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>457212</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca <b>WP</b>: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   <b>Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.</b>  <b>Odpowiedniki</b>: Metcrean [4,26], Metformin Bluefish [4,26], Zenoform [4,47], Avamina [4,51], <b>Siofor<sup>®</sup> 500</b> [5,11], Formetic [5,13], Metformax<sup>®</sup> 500 [5,71], Glucophage<sup>®</sup> 500 mg [5,91], Metfogamma 500 [7,30]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td><b>5,11</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>4,42</b></td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	Rx	100%	<b>5,11</b>		Limit	<b>0,00</b>		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>		R <sup>(2)</sup>	<b>4,42</b>		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>			
Rx	100%	<b>5,11</b>																	
	Limit	<b>0,00</b>																	
	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
	R <sup>(2)</sup>	<b>4,42</b>																	
	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
<p><b>Siofor<sup>®</sup> 500</b>: tabl. powł. <b>500 mg</b> - 60 szt.</p> <p>INN: <b>Metformin hydrochloride</b>   ATC: <b>A10BA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>457229</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca <b>WP</b>: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   <b>Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.</b>  <b>Odpowiedniki</b>: Avamina [7,66], Metcrean [7,66], Zenoform [8,07], <b>Siofor<sup>®</sup> 500</b> [8,55], Formetic [9,36], Etfom 500 [10,54], Metformax<sup>®</sup> 500 [10,54]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td><b>8,55</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>3,96</b></td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	Rx	100%	<b>8,55</b>		Limit	<b>0,00</b>		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>		R <sup>(2)</sup>	<b>3,96</b>		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>			
Rx	100%	<b>8,55</b>																	
	Limit	<b>0,00</b>																	
	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
	R <sup>(2)</sup>	<b>3,96</b>																	
	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
<p><b>Siofor<sup>®</sup> 500</b>: tabl. powł. <b>500 mg</b> - 90 szt.</p> <p>INN: <b>Metformin hydrochloride</b>   ATC: <b>A10BA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>024331</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca <b>WP</b>: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   <b>Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.</b>  <b>Odpowiedniki</b>: Avamina [10,56], Metcrean [11,03], Zenoform [11,65], <b>Siofor<sup>®</sup> 500</b> [12,38], Formetic [12,55], Etfom 500 [15,50]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td><b>12,38</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>3,90</b></td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	Rx	100%	<b>12,38</b>		Limit	<b>0,00</b>		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>		R <sup>(2)</sup>	<b>3,90</b>		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>			
Rx	100%	<b>12,38</b>																	
	Limit	<b>0,00</b>																	
	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
	R <sup>(2)</sup>	<b>3,90</b>																	
	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
<p><b>Siofor<sup>®</sup> 500</b>: tabl. powł. <b>500 mg</b> - 120 szt.</p> <p>INN: <b>Metformin hydrochloride</b>   ATC: <b>A10BA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>457236</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca <b>WP</b>: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   <b>Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.</b>  <b>Odpowiedniki</b>: Zenoform [15,13], Formetic [16,14], <b>Siofor<sup>®</sup> 500</b> [16,17]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td><b>16,17</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>3,80</b></td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	Rx	100%	<b>16,17</b>		Limit	<b>0,00</b>		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>		R <sup>(2)</sup>	<b>3,80</b>		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>			
Rx	100%	<b>16,17</b>																	
	Limit	<b>0,00</b>																	
	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
	R <sup>(2)</sup>	<b>3,80</b>																	
	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
<p><b>Siofor<sup>®</sup> 850</b>: tabl. powł. <b>850 mg</b> - 30 szt.</p> <p>INN: <b>Metformin hydrochloride</b>   ATC: <b>A10BA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>457311</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca <b>WP</b>: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   <b>Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.</b>  <b>Odpowiedniki</b>: Metfogamma 850 [6,20], Metformin Bluefish [6,37], Metcrean [6,64], Avamina [6,97], Zenoform [6,99], Formetic [7,39], <b>Siofor<sup>®</sup> 850</b> [7,40], Metformax<sup>®</sup> 850 [7,93], Glucophage<sup>®</sup> 850 mg [8,16]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td><b>7,40</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>3,98</b></td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	Rx	100%	<b>7,40</b>		Limit	<b>0,00</b>		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>		R <sup>(2)</sup>	<b>3,98</b>		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>			
Rx	100%	<b>7,40</b>																	
	Limit	<b>0,00</b>																	
	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
	R <sup>(2)</sup>	<b>3,98</b>																	
	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
<p><b>Siofor<sup>®</sup> 850</b>: tabl. powł. <b>850 mg</b> - 60 szt.</p> <p>INN: <b>Metformin hydrochloride</b>   ATC: <b>A10BA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>457328</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca <b>WP</b>: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   <b>Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.</b>  <b>Odpowiedniki</b>: Zenoform SR [6,57], Etfom SR [6,76], Metcrean XR [6,86], <b>Siofor<sup>®</sup> XR 500 mg</b> [7,71], Symformin XR [7,81], Avamina SR [9,31], Glucophage<sup>®</sup> XR [9,32], Metformax<sup>®</sup> SR 500 [9,48]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td><b>13,88</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>3,84</b></td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	Rx	100%	<b>13,88</b>		Limit	<b>0,00</b>		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>		R <sup>(2)</sup>	<b>3,84</b>		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>			
Rx	100%	<b>13,88</b>																	
	Limit	<b>0,00</b>																	
	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
	R <sup>(2)</sup>	<b>3,84</b>																	
	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
<p><b>Siofor<sup>®</sup> 850</b>: tabl. powł. <b>850 mg</b> - 120 szt.</p> <p>INN: <b>Metformin hydrochloride</b>   ATC: <b>A10BA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>457335</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca <b>WP</b>: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   <b>Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.</b>  <b>Odpowiedniki</b>: Zenoform [24,76], Formetic [26,47], <b>Siofor<sup>®</sup> 850</b> [26,59]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td><b>26,59</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>5,56</b></td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	Rx	100%	<b>26,59</b>		Limit	<b>0,00</b>		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>		R <sup>(2)</sup>	<b>5,56</b>		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>			
Rx	100%	<b>26,59</b>																	
	Limit	<b>0,00</b>																	
	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
	R <sup>(2)</sup>	<b>5,56</b>																	
	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
<p><b>Siofor<sup>®</sup> 850</b>: tabl. powł. <b>850 mg</b> - 90 szt.</p> <p>INN: <b>Metformin hydrochloride</b>   ATC: <b>A10BA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>024348</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca <b>WP</b>: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   <b>Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.</b>  <b>Odpowiedniki</b>: Avamina [16,95], Metcrean [17,79], Zenoform [18,91], <b>Siofor<sup>®</sup> 850</b> [20,29], Formetic [20,57], Etfom 850 [21,76], Metformax<sup>®</sup> 850 [21,76]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td><b>20,29</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>4,52</b></td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	Rx	100%	<b>20,29</b>		Limit	<b>0,00</b>		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>		R <sup>(2)</sup>	<b>4,52</b>		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>			
Rx	100%	<b>20,29</b>																	
	Limit	<b>0,00</b>																	
	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
	R <sup>(2)</sup>	<b>4,52</b>																	
	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
<p><b>Siofor<sup>®</sup> 1000</b>: tabl. powł. <b>1000 mg</b> - 30 szt.</p> <p>INN: <b>Metformin hydrochloride</b>   ATC: <b>A10BA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>220984</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca <b>WP</b>: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   <b>Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.</b>  <b>Odpowiedniki</b>: Metformin Bluefish [7,33], Metfogamma 1000 [7,93], Zenoform [8,07], Avamina [8,36], <b>Siofor<sup>®</sup> 1000</b> [8,55], Formetic [8,61], Glucophage<sup>®</sup> 1000 mg [8,63], Metformax<sup>®</sup> 1000 [8,67]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td><b>8,55</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>3,96</b></td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	Rx	100%	<b>8,55</b>		Limit	<b>0,00</b>		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>		R <sup>(2)</sup>	<b>3,96</b>		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>			
Rx	100%	<b>8,55</b>																	
	Limit	<b>0,00</b>																	
	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
	R <sup>(2)</sup>	<b>3,96</b>																	
	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
<p><b>Siofor<sup>®</sup> 1000</b>: tabl. powł. <b>1000 mg</b> - 60 szt.</p> <p>INN: <b>Metformin hydrochloride</b>   ATC: <b>A10BA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>220991</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca <b>WP</b>: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   <b>Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.</b>  <b>Odpowiedniki</b>: Glucophage<sup>®</sup> 1000 mg [X], Avamina [14,27], Metcrean [14,27], Metformax<sup>®</sup> 1000 - (IR) [15,07], Zenoform [15,13], Metformax<sup>®</sup> 1000 [16,16], <b>Siofor<sup>®</sup> 1000</b> [16,16], Formetic [16,88], Etfom [17,36]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td><b>16,16</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>3,79</b></td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	Rx	100%	<b>16,16</b>		Limit	<b>0,00</b>		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>		R <sup>(2)</sup>	<b>3,79</b>		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>			
Rx	100%	<b>16,16</b>																	
	Limit	<b>0,00</b>																	
	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
	R <sup>(2)</sup>	<b>3,79</b>																	
	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
<p><b>Siofor<sup>®</sup> 1000</b>: tabl. powł. <b>1000 mg</b> - 90 szt.</p> <p>INN: <b>Metformin hydrochloride</b>   ATC: <b>A10BA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>221004</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca <b>WP</b>: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   <b>Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.</b>  <b>Odpowiedniki</b>: Avamina [19,69], Zenoform [22,01], Metformax<sup>®</sup> 1000 - (IR) [22,10], <b>Siofor<sup>®</sup> 1000</b> [23,56], Metformax<sup>®</sup> 1000 [23,63], Formetic [23,95]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td><b>23,56</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>5,00</b></td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	Rx	100%	<b>23,56</b>		Limit	<b>0,00</b>		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>		R <sup>(2)</sup>	<b>5,00</b>		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>			
Rx	100%	<b>23,56</b>																	
	Limit	<b>0,00</b>																	
	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
	R <sup>(2)</sup>	<b>5,00</b>																	
	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
<p><b>Siofor<sup>®</sup> 1000</b>: tabl. powł. <b>1000 mg</b> - 120 szt.</p> <p>INN: <b>Metformin hydrochloride</b>   ATC: <b>A10BA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>221028</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca <b>WP</b>: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   <b>Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.</b>  <b>Odpowiedniki</b>: Metformax<sup>®</sup> 1000 - (IR) [28,53], Zenoform [28,53], Metformax<sup>®</sup> 1000 [29,80], Formetic [30,55], <b>Siofor<sup>®</sup> 1000</b> [30,60], Etfom [30,94]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td><b>30,60</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>6,40</b></td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	Rx	100%	<b>30,60</b>		Limit	<b>0,00</b>		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>		R <sup>(2)</sup>	<b>6,40</b>		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>			
Rx	100%	<b>30,60</b>																	
	Limit	<b>0,00</b>																	
	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
	R <sup>(2)</sup>	<b>6,40</b>																	
	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
<p><b>Siofor<sup>®</sup> XR 500 mg</b>: tabl. o przedł. uwalnianiu <b>500 mg</b> - 30 szt.</p> <p>INN: <b>Metformin hydrochloride</b>   ATC: <b>A10BA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>139443</b>            (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Cukrzyca <b>WP</b>: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   <b>Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.</b>  <b>Odpowiedniki</b>: Zenoform SR [6,57], Etfom SR [6,76], Metcrean XR [6,86], <b>Siofor<sup>®</sup> XR 500 mg</b> [7,71], Symformin XR [7,81], Avamina SR [9,31], Glucophage<sup>®</sup> XR [9,32], Metformax<sup>®</sup> SR 500 [9,48]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td><b>7,71</b></td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>7,02</b></td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	Rx	100%	<b>7,71</b>		Limit	<b>0,00</b>		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>		R <sup>(2)</sup>	<b>7,02</b>		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>			
Rx	100%	<b>7,71</b>																	
	Limit	<b>0,00</b>																	
	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																	
	R <sup>(2)</sup>	<b>7,02</b>																	
	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																	



**ADRENALINA WZF**  
Adrenalinum  
Zawsze pod ręką!

**Refundacja** od lipca 2015  
Poziom odpłatności 50%

ADR-WZF/131/06-2015

<b>Siofor® XR 500 mg:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>500 mg</b> - 120 szt.	Rx	100%	<b>29,07</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>16,70</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Metformin hydrochloride</b>		ATC: <b>A10BA02</b>	wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>139446</b>
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca <b>WP:</b> Zespoły insulinooopomości w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Etfom SR [24,81], <b>Siofor® XR 500 mg [29,07]</b> , Avamina SR [30,07]			
<b>Siofor® XR 750 mg:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>750 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>10,82</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>8,18</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Metformin hydrochloride</b>		ATC: <b>A10BA02</b>	wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>139448</b>
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca <b>WP:</b> Zespoły insulinooopomości w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Zenofor SR [9,43], Etfom SR [9,69], <b>Siofor® XR 750 mg [10,82]</b> , Symformin XR [11,26], Metformax® SR 750 [11,46], Avamina SR [13,07], Glucophage® XR [13,67]			
<b>Siofor® XR 750 mg:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>750 mg</b> - 120 szt.	Rx	100%	<b>41,32</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>22,76</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Metformin hydrochloride</b>		ATC: <b>A10BA02</b>	wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>139451</b>
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca <b>WP:</b> Zespoły insulinooopomości w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Etfom SR [36,54], <b>Siofor® XR 750 mg [41,32]</b>			
<b>Siofor® XR 1000 mg:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>1000 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>14,27</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>9,68</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Metformin hydrochloride</b>		ATC: <b>A10BA02</b>	wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>139455</b>
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca <b>WP:</b> Zespoły insulinooopomości w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Glucophage® XR [X], Zenofor SR [12,29], Etfom SR [12,68], <b>Siofor® XR 1000 mg [14,27]</b> , Metformax® SR 1000 [14,79], Symformin XR [14,86], Avamina SR [16,50]			
<b>Siofor® XR 1000 mg:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>1000 mg</b> - 120 szt.	Rx	100%	<b>54,29</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>29,55</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Metformin hydrochloride</b>		ATC: <b>A10BA02</b>	wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>139458</b>
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca <b>WP:</b> Zespoły insulinooopomości w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Etfom SR [47,92], <b>Siofor® XR 1000 mg [54,29]</b>			
<b>Sirdalud® MR :</b> kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde <b>6 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>55,01</b>
		Limit	<b>45,17</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>23,39</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Tizanidine</b>		ATC: <b>M03BX02</b>	wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>671410</b>
(1) Stwardnienie rozsiane(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Sandoz GmbH			
<b>Sitagliptin Adamed:</b> tabl. powł. <b>50 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>15,96</b>
		Limit	<b>14,62</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>5,16</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Sitagliptin</b>		ATC: <b>A10BH01</b>	wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>142097</b>
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: <b>Sitagliptin Adamed [15,96]</b> , Maysiglu [19,50], Sitagliptin Bioton [19,61], Sitagliptin SUN [24,19]			
<b>Sitagliptin Adamed:</b> tabl. powł. <b>100 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>30,34</b>
		Limit	<b>29,23</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>8,89</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Sitagliptin</b>		ATC: <b>A10BH01</b>	wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>142113</b>
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Jazeta [29,23], Lonamo [30,25], Symgliptin [30,32], Sigtelic [30,34], Sitagliptin STADA [30,34], Sitagliptin Medical Valley [37,64], Maysiglu [38,21], Sitagliptin Bioton [39,93], Simlerid [43,94], JUZINA® [44,51], Sitagliptin SUN [46,80], Januvia® [80,57]			

<b>Sitagliptin Bioton:</b> tabl. powł. <b>50 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>19,61</b>
		Limit	<b>14,62</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>9,38</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Sitagliptin</b>		ATC: <b>A10BH01</b>	wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>266229</b>
(1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c $\geq 7\%$ (przez co najmniej 3 miesiące)(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Bioton S.A.			
Odpowiedniki: Sitagliptin Adamed [15,96], Maysiglu [19,50], <b>Sitagliptin Bioton [19,61]</b> , Sitagliptin SUN [24,19]			
<b>Sitagliptin Bioton:</b> tabl. powł. <b>100 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>39,93</b>
		Limit	<b>29,23</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>19,47</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Sitagliptin</b>		ATC: <b>A10BH01</b>	wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>266226</b>
(1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c $\geq 7\%$ (przez co najmniej 3 miesiące)(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Bioton S.A.			
Odpowiedniki: Jazeta [29,23], Lonamo [30,25], Symgliptin [30,32], Sigtelic [30,34], Sitagliptin Adamed [30,34], Sitagliptin STADA [30,34], Sitagliptin Medical Valley [37,64], Maysiglu [38,21], <b>Sitagliptin Bioton [39,93]</b> , Simlerid [43,94], JUZINA® [44,51], Sitagliptin SUN [46,80], Januvia® [80,57]			
<b>Sitagliptin Medical Valley:</b> tabl. powł. <b>100 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>37,64</b>
		Limit	<b>29,23</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>17,18</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Sitagliptin</b>		ATC: <b>A10BH01</b>	wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>147088</b>
(1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c $\geq 7\%$ (przez co najmniej 3 miesiące)(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Medical Valley Invest AB			
Odpowiedniki: Jazeta [29,23], Lonamo [30,25], Symgliptin [30,32], Sigtelic [30,34], Sitagliptin Adamed [30,34], Sitagliptin STADA [30,34], <b>Sitagliptin Medical Valley [37,64]</b> , Maysiglu [38,21], Sitagliptin Bioton [39,93], Simlerid [43,94], JUZINA® [44,51], Sitagliptin SUN [46,80], Januvia® [80,57]			
<b>Sitagliptin STADA:</b> tabl. powł. <b>100 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>30,34</b>
		Limit	<b>29,23</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>9,88</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Sitagliptin</b>		ATC: <b>A10BH01</b>	wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>148113</b>
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Stada Arzneimittel AG			
Odpowiedniki: Jazeta [29,23], Lonamo [30,25], Symgliptin [30,32], Sigtelic [30,34], Sitagliptin Adamed [30,34], Sitagliptin STADA [30,34], Sitagliptin Medical Valley [37,64], Maysiglu [38,21], Sitagliptin Bioton [39,93], Simlerid [43,94], JUZINA® [44,51], Sitagliptin SUN [46,80], Januvia® [80,57]			
<b>Sitagliptin SUN:</b> tabl. powł. <b>50 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>24,19</b>
		Limit	<b>14,62</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>13,96</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Sitagliptin</b>		ATC: <b>A10BH01</b>	wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>147310</b>
(1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c $\geq 7\%$ (przez co najmniej 3 miesiące)(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.			
Odpowiedniki: Sitagliptin Adamed [15,96], Maysiglu [19,50], Sitagliptin Bioton [19,61], <b>Sitagliptin SUN [24,19]</b>			
<b>Sitagliptin SUN:</b> tabl. powł. <b>100 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>46,80</b>
		Limit	<b>29,23</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>26,34</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Sitagliptin</b>		ATC: <b>A10BH01</b>	wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>147317</b>
(1) W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c $\geq 7\%$ (przez co najmniej 3 miesiące)(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.			
Odpowiedniki: Jazeta [29,23], Lonamo [30,25], Symgliptin [30,32], Sigtelic [30,34], Sitagliptin Adamed [30,34], Sitagliptin STADA [30,34], Sitagliptin Medical Valley [37,64], Maysiglu [38,21], Sitagliptin Bioton [39,93], Simlerid [43,94], JUZINA® [44,51], <b>Sitagliptin SUN [46,80]</b> , Januvia® [80,57]			
<b>Sobycor:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>7,16</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,86</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Bisoprolol fumarate</b>		ATC: <b>C07AB07</b>	wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>097400</b>
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 r.ż.(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Corectin 5 [X], Corsib [5,96], Bisoprolol VP [5,97], Coronol 5® [6,56], <b>Sobycor [7,16]</b> , Bisoratio 5 [7,21], Bicardef [7,39]			





Naszym wyborem **enarenal**  
enalaprilii maleas

Sobycor: tabl. powł. 5 mg - 60 szt.	Rx	100%	13,46
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,65
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Bisoprolol fumarate** | ATC: C07AB07 | wyk: B | EAN ~ 097448  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Corectin 5 [11,11], Coronal 5<sup>®</sup> [11,54], Bicardef [12,54], Sobycor [13,46]

Sobycor: tabl. powł. 10 mg - 30 szt.	Rx	100%	13,46
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,65
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Bisoprolol fumarate** | ATC: C07AB07 | wyk: B | EAN ~ 097523  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Corectin 10 [X], Corsib [11,02], Bisoprolol VP [11,03], Coronal 10<sup>®</sup> [11,14], Bicardef [11,46], Bisoratio 10 [11,84], Sobycor [13,46]

Sobycor: tabl. powł. 10 mg - 60 szt.	Rx	100%	25,72
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,40
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Bisoprolol fumarate** | ATC: C07AB07 | wyk: B | EAN ~ 097554  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Corectin 10 [20,79], Coronal 10<sup>®</sup> [21,69], Bicardef [23,83], Sobycor [25,72]

Solian <sup>®</sup> : tabl. 100 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	32,26
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,54
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amisulpride** | ATC: N05AL05 | wyk: B | EAN ~ 840816  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
Sanofi Winthrop Industrie

Odpowiedniki: Amipryd [31,80], Solian<sup>®</sup> [32,26]

Solian <sup>®</sup> : tabl. 200 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	60,62
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,98
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amisulpride** | ATC: N05AL05 | wyk: B | EAN ~ 840915  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
Sanofi Winthrop Industrie

Odpowiedniki: Amisan [56,96], Masultab [58,38], Amipryd [59,75], Symamis [59,75], ApoSuprid [59,84], Solian<sup>®</sup> [60,62]

Solian <sup>®</sup> : tabl. 400 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	114,92
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amisulpride** | ATC: N05AL05 | wyk: B | EAN ~ 841011  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
Sanofi Winthrop Industrie

Odpowiedniki: Solian<sup>®</sup> - (IR) [110,34], Solian<sup>®</sup> - (IR) [110,34], Masultab [110,46], Solian<sup>®</sup> - (IR) [110,46], Amipryd [113,21], Symamis [113,21], ApoSuprid [113,37], Amisan [113,44], Solian<sup>®</sup> [114,92]

Solian <sup>®</sup> - (IR): tabl. powł. 400 mg - 30 szt.	Rx	100%	110,34
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amisulpride** | ATC: N05AL05 | wyk: B | EAN ~ 146611  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Solian<sup>®</sup> - (IR) [110,34], Solian<sup>®</sup> - (IR) [110,34], Masultab [110,46], Solian<sup>®</sup> - (IR) [110,46], Amipryd [113,21], Symamis [113,21], ApoSuprid [113,37], Amisan [113,44], Solian<sup>®</sup> [114,92]

Solian <sup>®</sup> - (IR): tabl. powł. 400 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	110,46
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amisulpride** | ATC: N05AL05 | wyk: B | EAN ~ 145226  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B | Inpharm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Solian<sup>®</sup> - (IR) [110,34], Solian<sup>®</sup> - (IR) [110,34], Masultab [110,46], Solian<sup>®</sup> - (IR) [110,46], Amipryd [113,21], Symamis [113,21], ApoSuprid [113,37], Amisan [113,44], Solian<sup>®</sup> [114,92]

Solian <sup>®</sup> - (IR): tabl. powł. 400 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	110,34
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amisulpride** | ATC: N05AL05 | wyk: B | EAN ~ 147124  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B | Inpharm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Solian<sup>®</sup> - (IR) [110,34], Solian<sup>®</sup> - (IR) [110,34], Masultab [110,46], Solian<sup>®</sup> - (IR) [110,46], Amipryd [113,21], Symamis [113,21], ApoSuprid [113,37], Amisan [113,44], Solian<sup>®</sup> [114,92]

Solifenacin Medreg: tabl. powł. 10 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	35,29
		Limit	35,29
		30% <sup>(1)</sup>	10,59
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Solifenacin succinate** | ATC: G04BD08 | wyk: B | EAN ~ 131462  
(1) Zespół pęcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
MedReg sro

Odpowiedniki: Solifenacin Stada [X], Beloflow [28,70], Soreca [34,95], Aurosolin [34,97], Silamil [35,29], Solifenacin Medreg [35,29], Solinco [35,57], Solifurin [36,14], Vesisol [37,63], Afenix [38,65], Zevesin [38,66], Uronorm [39,57], Vesoligo [39,57], Adablock [41,86]

Solifurin: tabl. powł. 10 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	36,14
		Limit	35,29
		30% <sup>(1)</sup>	11,44
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Solifenacin succinate** | ATC: G04BD08 | wyk: B | EAN ~ 135130  
(1) Zespół pęcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
Alofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Solifenacin Stada [X], Beloflow [28,70], Soreca [34,95], Aurosolin [34,97], Silamil [35,29], Solifenacin Medreg [35,29], Solinco [35,57], Solifurin [36,14], Vesisol [37,63], Afenix [38,65], Zevesin [38,66], Uronorm [39,57], Vesoligo [39,57], Adablock [41,86]

Solinco: tabl. powł. 5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	18,85
		Limit	17,65
		30% <sup>(1)</sup>	6,50
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Solifenacin succinate** | ATC: G04BD08 | wyk: B | EAN ~ 014034  
(1) Zespół pęcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
+pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Solifenacin Stada [X], Solifurin [X], Beloflow [15,41], Silamil [16,15], Soreca [18,54], Aurosolin [18,55], Solinco [18,85], Vesisol [20,21], Afenix [20,38], Zevesin [20,39], Uronorm [20,85], Vesoligo [20,85], Adablock [21,99]

Solinco: tabl. powł. 10 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	35,57
		Limit	35,29
		30% <sup>(1)</sup>	10,87
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Solifenacin succinate** | ATC: G04BD08 | wyk: B | EAN ~ 014038  
(1) Zespół pęcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
+pharma Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Solifenacin Stada [X], Beloflow [28,70], Soreca [34,95], Aurosolin [34,97], Silamil [35,29], Solifenacin Medreg [35,29], Solinco [35,57], Solifurin [36,14], Vesisol [37,63], Afenix [38,65], Zevesin [38,66], Uronorm [39,57], Vesoligo [39,57], Adablock [41,86]

Solitombo: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 6 mg+ 0,4 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	39,94
		Limit	39,94
		30% <sup>(1)</sup>	11,98
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Solifenacin succinate + Tamsulosin hydrochloride** | ATC: G04CA53 | wyk: B | EAN ~ 009164  
(1) Leczenie umiarkowanych i ciężkich objawów w fazie napelnienia pęcherza i w fazie opróżnienia pęcherza, związanych z łagodnym wzrostem gruczołu krokowego u mężczyzn, którzy niewystarczająco odpowiadają na leczenie w monoterapii (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: N  
Adamed Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Solifenacin Stada [X], Beloflow [28,70], Soreca [34,95], Aurosolin [34,97], Silamil [35,29], Solifenacin Medreg [35,29], Solinco [35,57], Solifurin [36,14], Vesisol [37,63], Afenix [38,65], Zevesin [38,66], Uronorm [39,57], Vesoligo [39,57], Adablock [41,86]

Soloxelam: roztw. do stos. w j. ustnej 2,5 mg/0,5 ml - 4 strzyk. 0,5 ml ◆	Rx	100%	274,67
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Midazolam** | ATC: N05CD08 | wyk: B | EAN ~ 150020  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Przedłużone, ostre napady drgawkowe u niemowląt, dzieci i młodzieży (od 6 miesięcy do 18 lat) | Kat. ciąży: T1:C, T2:C, T3:D  
Exeltis Poland Sp. z o.o.

Soloxelam: roztw. do stos. w j. ustnej 5 mg/1 ml - 4 strzyk. 1 ml ◆	Rx	100%	274,67
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Midazolam** | ATC: N05CD08 | wyk: B | EAN ~ 150022

(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Przedłużone, ostre napady drgawkowe u niemowląt, dzieci i młodzieży (od 6 miesięcy do 18 lat) | Kat. ciąży: T1:C, T2:C, T3:D

Exeltis Poland Sp. z o.o.

**Soloxelam:** roztw. do stos. w j. ustnej **7,5 mg/1,5 ml**  
- 4 strzyk. 1,5 ml

Rx	100%	274,67
	Limit	0,00
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
	R <sup>(2)</sup>	3,20

INN: **Midazolam** | ATC: N05CD08 | wyk: EAN ~ 150024  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Przedłużone, ostre napady drgawkowe u niemowląt, dzieci i młodzieży (od 6 miesięcy do 18 lat) | Kat. ciąży: T1:C, T2:C, T3:D

**Soloxelam:** roztw. do stos. w j. ustnej **10 mg/2 ml**  
- 4 strzyk. 2 ml

Rx	100%	274,67
	Limit	0,00
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
	R <sup>(2)</sup>	3,20

INN: **Midazolam** | ATC: N05CD08 | wyk: EAN ~ 150026  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Przedłużone, ostre napady drgawkowe u niemowląt, dzieci i młodzieży (od 6 miesięcy do 18 lat) | Kat. ciąży: T1:C, T2:C, T3:D

**Solu-Medrol:** inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] **500 mg**  
- 1 fiol.+ rozp. 8 ml

Rx	100%	44,50
	Limit	0,00
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
	R <sup>(2)</sup>	14,42
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Methylprednisolone** | ATC: H02AB04 | wyk: B EAN ~ 236718  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

**Somatuline Autogel:** inj. [roztw.] **60 mg** - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml

Rx	100%	2837,21
	Limit	2514,16
	B <sup>(1)</sup>	bezpł.

INN: **Lanreotide** | ATC: H01CB03 | wyk: EAN ~ 094416  
(1) Chemioterapia ICD10: C.37.a.; C.37.b. | Kat. ciąży: C

**Somatuline Autogel:** inj. [roztw.] **90 mg** - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml

Rx	100%	3771,24
	Limit	4467,34
	B <sup>(1)</sup>	44,92
	B <sup>(2)</sup>	bezpł.
	R <sup>(3)</sup>	48,12
	R <sup>(4)</sup>	48,12
	S <sup>(5)</sup>	bezpł.

INN: **Lanreotide** | ATC: H01CB03 | wyk: EAN ~ 094515  
(1) Leczenie guzów neuroendokrynnych żołądkowo-jelitowo-trzustkowych GEP-NET G1 i części G2 (index Ki67 do maksymalnie 10%) środkowej części prajelita, trzustki, po wykluczeniu ognisk pierwotnych w końcowej części prajelita, u dorosłych pacjentów z nieoperacyjnymi guzami miejscowo zaawansowanymi lub z przerzutami (2) Chemioterapia ICD10: C.37.a.; C.37.b. (3) Leczenie objawów hipersekcji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych (4) Akromegalia WP: Hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL (5) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

**Somatuline Autogel:** inj. [roztw.] **120 mg** - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml

Rx	100%	4713,78
	Limit	5956,45
	B <sup>(1)</sup>	bezpł.
	B <sup>(2)</sup>	bezpł.
	R <sup>(3)</sup>	4,27
	R <sup>(4)</sup>	4,27
	S <sup>(5)</sup>	bezpł.

INN: **Lanreotide** | ATC: H01CB03 | wyk: EAN ~ 094614  
(1) Leczenie guzów neuroendokrynnych żołądkowo-jelitowo-trzustkowych GEP-NET G1 i części G2 (index Ki67 do maksymalnie 10%) środkowej części prajelita, trzustki, po wykluczeniu ognisk pierwotnych w końcowej części prajelita, u dorosłych pacjentów z nieoperacyjnymi guzami miejscowo zaawansowanymi lub z przerzutami (2) Chemioterapia ICD10: C.37.a.; C.37.b. (3) Leczenie objawów hipersekcji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych (4) Akromegalia WP: Hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL (5) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

**Sorbalgon:** opatrunek leczniczy **5x5 cm** - 1 szt.

WM	100%	4,52
	Limit	2,41
	30% <sup>(1)</sup>	2,83
	B <sup>(2)</sup>	2,11

INN: **Emplastrum alginatosa et hydrofibrica** | ATC: V20 | wyk: EAN ~ 217965  
(1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N

**Sorbalgon:** opatrunek leczniczy **10x10 cm** - 1 szt.

WM	100%	10,84
	Limit	9,62
	30% <sup>(1)</sup>	4,11
	B <sup>(2)</sup>	1,22

INN: **Emplastrum alginatosa et hydrofibrica** | ATC: V20 | wyk: EAN ~ 217958  
(1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N

**Sorbalgon:** opatrunek leczniczy **10x20 cm** - 1 szt.

WM	100%	20,59
	Limit	19,24
	30% <sup>(1)</sup>	7,12
	B <sup>(2)</sup>	1,35

INN: **Emplastrum alginatosa et hydrofibrica** | ATC: V20 | wyk: EAN ~ 217927  
(1) Przewlekłe owrzodzenia (2) Epidermolysis bullosa | Kat. ciąży: N

**Soreca:** tabl. powł. **5 mg** - 30 szt. ◆

Rx	100%	18,54
	Limit	17,65
	30% <sup>(1)</sup>	6,19
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Solifenacin succinate** | ATC: G04BD08 | wyk: B EAN ~ 137175  
(1) Zespół pęcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

**Soreca:** tabl. powł. **10 mg** - 30 szt. ◆

Rx	100%	34,95
	Limit	34,95
	30% <sup>(1)</sup>	10,49
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Solifenacin succinate** | ATC: G04BD08 | wyk: B EAN ~ 137177  
(1) Zespół pęcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C

**Sorelex:** opatrunek leczniczy **10x10 cm** - 1 szt.

WM	100%	38,90
	Limit	38,90
	30% <sup>(1)</sup>	11,67

INN: **Emplastrum collagenosa** | ATC: V20 | wyk: EAN ~ 717817  
(1) Przewlekłe owrzodzenia | Kat. ciąży: C

**Sotahexal 80:** tabl. **80 mg** - 20 szt. ◆

Rx	100%	8,80
	Limit	7,44
	30% <sup>(1)</sup>	3,59
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Sotalol hydrochloride** | ATC: C07AA07 | wyk: B EAN ~ 309016  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

**Sotahexal 160:** tabl. **160 mg** - 20 szt. ◆

Rx	100%	15,45
	Limit	14,88
	30% <sup>(1)</sup>	5,03
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Sotalol hydrochloride** | ATC: C07AA07 | wyk: B EAN ~ 309115  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

**Spamilan®:** tabl. **5 mg** - 60 szt. ◆

Rx	100%	20,03
	Limit	13,84
	30% <sup>(1)</sup>	10,34
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Buspiron hydrochloride** | ATC: N05BE01 | wyk: B EAN ~ 073597  
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

**Spamilan®:** tabl. **10 mg** - 60 szt. ◆

Rx	100%	35,14
	Limit	27,68
	30% <sup>(1)</sup>	15,76
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Buspiron hydrochloride** | ATC: N05BE01 | wyk: B EAN ~ 073603  
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

**Spamilan® - (IR):** tabl. **10 mg** - 60 szt. ◆

Rx	100%	27,68
	Limit	27,68
	30% <sup>(1)</sup>	8,30
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Buspiron hydrochloride** | ATC: N05BE01 | wyk: B EAN ~ 201450  
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

**Spamilan® - (IR):** tabl. **10 mg** - 60 szt. ◆

Rx	100%	27,64
	Limit	27,64
	30% <sup>(1)</sup>	8,29
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Buspiron hydrochloride** | ATC: N05BE01 | wyk: B EAN ~ 213538  
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B

**Spamilan® - (IR):** tabl. **10 mg** - 60 szt. ◆

Rx	100%	27,64
	Limit	27,64
	30% <sup>(1)</sup>	8,29
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Buspiron hydrochloride** | ATC: N05BE01 | wyk: B EAN ~ 213538  
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B



ZAKODOWANY DO WALKI  
Z ZAKAŻENIEM

<p><b>Spiolto Respimat:</b> roztw. do inhal. <b>2,5/2,5 µg/dawkę</b> - 1 wkł. (30 dawek + inhal.) ◆</p> <p>INN: <i>Tiotropium + Olodaterol</i>   ATC: R03AL06   wyk: B   EAN ~ 257439 (1) Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>177,58</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>134,31</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>83,56</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	177,58	Limit	134,31	30% <sup>(1)</sup>	83,56	S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Spirotonol®:</b> tabl. powł. <b>50 mg</b> - 60 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Spirolactone</i>   ATC: C03DA01   wyk: B   EAN ~ 244668 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>22,84</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>22,84</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>6,16</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	22,84	Limit	22,84	30% <sup>(1)</sup>	6,16	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
100%	177,58																						
Limit	134,31																						
30% <sup>(1)</sup>	83,56																						
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
100%	22,84																						
Limit	22,84																						
30% <sup>(1)</sup>	6,16																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
<p><b>Spiolto Respimat:</b> roztw. do inhal. <b>2,5/2,5 µg/dawkę</b> - 1 wkł. uzup. (30 dawek) ◆</p> <p>INN: <i>Tiotropium + Olodaterol</i>   ATC: R03AL06   wyk: B   EAN ~ 143203 (1) Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>171,68</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>134,31</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>77,66</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	171,68	Limit	134,31	30% <sup>(1)</sup>	77,66	S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Spirotonol® 100:</b> tabl. powł. <b>100 mg</b> - 20 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Spirolactone</i>   ATC: C03DA01   wyk: B   EAN ~ 673124 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>14,76</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>14,76</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>3,99</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	14,76	Limit	14,76	30% <sup>(1)</sup>	3,99	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
100%	171,68																						
Limit	134,31																						
30% <sup>(1)</sup>	77,66																						
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
100%	14,76																						
Limit	14,76																						
30% <sup>(1)</sup>	3,99																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
<p><b>Spiriva Respimat®:</b> roztw. do inhal. <b>2,5 µg/dawkę</b> - 1 wkł. (30 dawek + inhal. Respimat) ◆</p> <p>INN: <i>Tiotropium</i>   ATC: R03BB04   wyk: B   EAN ~ 735839 (1) Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>122,63</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>104,30</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>49,62</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	122,63	Limit	104,30	30% <sup>(1)</sup>	49,62	S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Spiriva®:</b> prosz. do inhal. [kaps. twarde] <b>18 µg/dawkę</b> - 30 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Tiotropium</i>   ATC: R03BB04   wyk: B   EAN ~ 985111 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV<sub>1</sub> &lt;50% oraz ujemną próbą rozkurczową(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Srivasso [104,30], Spiriva® [116,33]</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>104,30</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>104,30</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>31,29</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	104,30	Limit	104,30	30% <sup>(1)</sup>	31,29	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.		
100%	122,63																						
Limit	104,30																						
30% <sup>(1)</sup>	49,62																						
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
100%	104,30																						
Limit	104,30																						
30% <sup>(1)</sup>	31,29																						
R <sup>(2)</sup>	3,20																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
<p><b>Spiriva®:</b> prosz. do inhal. [kaps. twarde] <b>18 µg/dawkę</b> - 30 szt. (+ inhal. HandiHaler) ◆</p> <p>INN: <i>Tiotropium</i>   ATC: R03BB04   wyk: B   EAN ~ 985128 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV<sub>1</sub> &lt;50% oraz ujemną próbą rozkurczową(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Srivasso [104,30], Spiriva® [116,33]</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>116,33</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>104,30</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>43,32</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>15,23</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	116,33	Limit	104,30	30% <sup>(1)</sup>	43,32	R <sup>(2)</sup>	15,23	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Srivasso:</b> prosz. do inhal. [kaps. twarde] <b>18 µg/dawkę</b> - 30 szt. (+ inhal. HandiHaler)</p> <p>INN: <i>Tiotropium</i>   ATC: R03BB04   wyk: B   EAN ~ 253998 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV<sub>1</sub> &lt;50% oraz ujemną próbą rozkurczową(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Srivasso [104,30], Spiriva® [116,33]</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>104,30</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>104,30</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>31,29</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	104,30	Limit	104,30	30% <sup>(1)</sup>	31,29	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	116,33																						
Limit	104,30																						
30% <sup>(1)</sup>	43,32																						
R <sup>(2)</sup>	15,23																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	104,30																						
Limit	104,30																						
30% <sup>(1)</sup>	31,29																						
R <sup>(2)</sup>	3,20																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
<p><b>Spirotonol®:</b> tabl. <b>25 mg</b> - 20 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Spirolactone</i>   ATC: C03DA01   wyk: B   EAN ~ 110216 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Ismian [X], Verospiron® [6,54], Spirotonol® [6,54]</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>6,54</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>4,00</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>3,37</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	6,54	Limit	4,00	30% <sup>(1)</sup>	3,37	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztozcy kurzu domowego:</b> roztw. podjęzykowy [alergeny roztozcy kurzu domowego 350-D.pter/D.far 50%/50%] - 2 fiol. 10 ml zestaw do lecz. podtrzymującego</p> <p>INN: <i>Allergen extracts</i>   ATC: V01AA   wyk: B   EAN ~ 106122 (1) Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztozcy kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E)   Kat. ciąży: C Stallergenes S.A.S.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>306,62</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>306,62</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>91,99</td></tr> </table>	100%	306,62	Limit	306,62	30% <sup>(1)</sup>	91,99				
100%	6,54																						
Limit	4,00																						
30% <sup>(1)</sup>	3,37																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	306,62																						
Limit	306,62																						
30% <sup>(1)</sup>	91,99																						
<p><b>Spirotonol®:</b> tabl. <b>25 mg</b> - 100 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Spirolactone</i>   ATC: C03DA01   wyk: B   EAN ~ 110223 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Ismian [X], Finospir [20,98], Spirotonol® [24,64]</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>24,64</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>20,02</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>9,57</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	24,64	Limit	20,02	30% <sup>(1)</sup>	9,57	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztozcy kurzu domowego:</b> roztw. podjęzykowy [alergeny roztozcy kurzu domowego 350-D.pter/D.far 50%/50%] - 3 fiol. 10 ml zestaw do lecz. podstawowego</p> <p>INN: <i>Allergen extracts</i>   ATC: V01AA   wyk: B   EAN ~ 106121 (1) Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztozcy kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E)   Kat. ciąży: C Stallergenes S.A.S.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>306,62</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>306,62</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>91,99</td></tr> </table>	100%	306,62	Limit	306,62	30% <sup>(1)</sup>	91,99				
100%	24,64																						
Limit	20,02																						
30% <sup>(1)</sup>	9,57																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	306,62																						
Limit	306,62																						
30% <sup>(1)</sup>	91,99																						
<p><b>Spirotonol®:</b> tabl. powł. <b>50 mg</b> - 30 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Spirolactone</i>   ATC: C03DA01   wyk: B   EAN ~ 244651 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.</p> <p>Odpowiedniki: Ismian [X], Spirotonol® [12,01], Verospiron® [12,77], Finospir [13,10]</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>12,01</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>12,01</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>3,24</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	12,01	Limit	12,01	30% <sup>(1)</sup>	3,24	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Staveran®:</b> tabl. powł. <b>40 mg</b> - 20 szt.</p> <p>INN: <i>Verapamil hydrochloride</i>   ATC: C08DA01   wyk: B   EAN ~ 045211 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>3,91</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,52</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	3,91	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,52	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	12,01																						
Limit	12,01																						
30% <sup>(1)</sup>	3,24																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	3,91																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	3,52																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
<p><b>Spirotonol®:</b> tabl. powł. <b>80 mg</b> - 20 szt.</p> <p>INN: <i>Verapamil hydrochloride</i>   ATC: C08DA01   wyk: B   EAN ~ 045310 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>6,43</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,47</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	6,43	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,47	S <sup>(3)</sup>	bezpł.												
100%	6,43																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	3,47																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						



Skuteczny przepływ

pentoxifylline  
**polfilin**  
 prolongatum

400 mg x 20 tabl. ♥ 400 mg x 60 tabl.

Staveran®: tabl. powł. 120 mg - 20 szt.	Rx	100%	8,67
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(1)</sup>	2,88
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Verapamil hydrochloride* ATC: C08DA01 wyk: B EAN ~ 045419  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Stediril 30: tabl. 0,03 mg+ 0,15 mg - 21 szt.	Rx	100%	8,51
		Limit	7,60
		30% <sup>(1)</sup>	3,19
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Ethinylestradiol + Levonorgestrel* ATC: G03AA07 wyk: B EAN ~ 072514  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach | Kat. ciąży: X  
 Pfizer Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Rigevidon® - (IR) [8,29], Rigevidon® [8,51], Stediril 30 [8,51]

Stimuloton®: tabl. powł. 50 mg - 30 szt. ♦	Rx	100%	17,27
		Limit	14,11
		30% <sup>(1)</sup>	7,39
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Sertraline* ATC: N06AB06 wyk: B EAN ~ 994816  
 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 PROTERAPIA Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: ApoSerta/Sertraline Aurovitas [11,80], Sastium [11,92], Sertralina Krka [12,56], Miravil [13,64], Sertranom [13,73], Setalof [14,07], Aserin® 50 [15,07], Stimuloton® [17,27]

Storvas CRT: tabl. powł. 10 mg - 30 szt.	Rx	100%	6,04
		Limit	4,21
		30% <sup>(1)</sup>	3,09
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 042097  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
 Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medreg [4,58], Atorvastatin Genoptim [5,28], Atorvastatin Bluefish AB [5,50], Storvas CRT [6,04], Lambrinex [7,12], Torvacard® 10 [8,79], Atorvox [9,06], Atrox® 10 [9,49], Atoris® [9,56], Tulip® [9,60], Apo-Atorva [9,65], Atorvasterol® [9,81]

Storvas CRT: tabl. powł. 20 mg - 30 szt.	Rx	100%	11,17
		Limit	8,43
		30% <sup>(1)</sup>	5,27
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 042103  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
 Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [8,20], Atorvastatin Medreg [8,26], Atorvastatin Aurovitas [8,89], Atorvastatin Bluefish AB [9,61], Atorvastatin Genoptim [9,88], Atorvagen [9,97], Storvas CRT [11,17], Lambrinex [11,67], Torvacard® 20 [12,94], Atoris® [13,71], Atrox® 20 [15,01], Atorvox [15,23], Tulip® [15,42], Apo-Atorva [17,75], Atorvasterol® [19,11]

Storvas CRT: tabl. powł. 30 mg - 30 szt.	Rx	100%	12,00
		Limit	12,00
		30% <sup>(1)</sup>	3,60
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 141597  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
 Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Storvas CRT [12,00], Apo-Atorva [12,05], Atorvastatin Bluefish AB [14,32], Atoris® [19,02]

Storvas CRT: tabl. powł. 40 mg - 30 szt.	Rx	100%	21,57
		Limit	16,86
		30% <sup>(1)</sup>	9,77
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 042134  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
 Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [15,27], Atorvastatin Medreg [15,38], Atorvastatin Aurovitas [16,06], Atorvastatin Bluefish AB [18,30], Atorvastatin Genoptim [18,81], Atorvagen [19,02], Storvas CRT [21,57], Lambrinex [22,63], Tulip® [23,91], Torvacard® 40 [24,03], Atoris® [26,75], Atorvox [27,97], Atrox® 40 [29,46], Apo-Atorva [32,04], Atorvasterol® [37,58]

Storvas CRT: tabl. powł. 60 mg - 30 szt.	Rx	100%	22,51
		Limit	22,51
		30% <sup>(1)</sup>	6,75
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 141904  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
 Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Storvas CRT [22,51], Apo-Atorva [22,63], Atorvastatin Bluefish AB [22,65], Atoris® [39,46]

Storvas CRT: tabl. powł. 80 mg - 30 szt.	Rx	100%	40,48
		Limit	33,72
		30% <sup>(1)</sup>	16,88
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Atorvastatin* ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 042141  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
 Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Atorvastatin Medreg [28,80], Atorvastatin Bluefish AB [29,14], Atorvastatin Genoptim [32,49], Atorvasterol® [37,24], Storvas CRT [40,48], Atrox® 80 [41,34], Torvacard® 80 [47,35], Atoris® [51,54], Tulip® [52,79]

Submena: tabl. podjęzykowe 100 µg - 30 szt. ♦	Rx-w	100%	460,08
		Limit	460,08
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Fentanyl* ATC: N02AB03 wyk: N EAN ~ 201439  
 (1) Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 G.L. Pharma GmbH

Submena: tabl. podjęzykowe 200 µg - 30 szt. ♦	Rx-w	100%	460,08
		Limit	460,08
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Fentanyl* ATC: N02AB03 wyk: N EAN ~ 201440  
 (1) Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 G.L. Pharma GmbH

Submena: tabl. podjęzykowe 400 µg - 30 szt. ♦	Rx-w	100%	460,08
		Limit	460,08
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Fentanyl* ATC: N02AB03 wyk: N EAN ~ 201441  
 (1) Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 G.L. Pharma GmbH  
 Odpowiedniki: Submena [460,08], Vellofent [609,28]

Submena: tabl. podjęzykowe 800 µg - 30 szt. ♦	Rx-w	100%	460,08
		Limit	460,08
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Fentanyl* ATC: N02AB03 wyk: N EAN ~ 201442  
 (1) Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 G.L. Pharma GmbH  
 Odpowiedniki: Submena [460,08], Vellofent [609,28]

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

Sulfasalazin EN: tabl. dojelitowe 500 mg - 50 szt.	Rx	100%	32,18
		Limit	28,09
		30% <sup>(1)</sup>	12,52
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	7,29
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Sulfasalazine</i>		ATC: A07EC01	wyk: B EAN ~ 283316
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Wrzodzące zapalenie jelita grubego, Choroba Leśniowskiego-Crohna WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Odpowiedniki: Salazopyrin™ EN [31,15], Sulfasalazin Krka [31,15], Sulfasalazin EN [32,18]			

Sulfasalazin EN: tabl. dojelitowe 500 mg - 100 szt.	Rx	100%	60,51
		Limit	56,18
		30% <sup>(1)</sup>	21,18
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	7,53
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Sulfasalazine</i>		ATC: A07EC01	wyk: B EAN ~ 283323
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Wrzodzące zapalenie jelita grubego, Choroba Leśniowskiego-Crohna WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Odpowiedniki: Salazopyrin™ EN [58,17], Sulfasalazin EN [60,51]			

Sulfasalazin Krka: tabl. 500 mg - 50 szt.	Rx	100%	31,15
		Limit	28,09
		30% <sup>(1)</sup>	11,49
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	6,26
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Sulfasalazine</i>		ATC: A07EC01	wyk: B EAN ~ 283217
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Wrzodzące zapalenie jelita grubego, Choroba Leśniowskiego-Crohna WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Odpowiedniki: Salazopyrin™ EN [31,15], Sulfasalazin Krka [31,15], Sulfasalazin EN [32,18]			

Suliqua: inj. [roztw.] 100 j./ml+ 33 µg/ml - 3 wstrzyk. 3 ml ◆	Rx	100%	315,07
		Limit	315,07
		30% <sup>(1)</sup>	94,52
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Insulin glargine + Lixisenatide</i>		ATC: A10AE54	wyk: B EAN ~ 131594
(1) Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c $\geq 7,5\%$ , z otężoną chorobą sercowo-naczyniową oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek $\geq 55$ lat dla mężczyzn, $\geq 60$ lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Sanofi Winthrop Industrie			

Suliqua: inj. [roztw.] 100 j./ml+ 50 µg/ml - 3 wstrzyk. 3 ml ◆	Rx	100%	405,16
		Limit	394,08
		30% <sup>(1)</sup>	129,30
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Insulin glargine + Lixisenatide</i>		ATC: A10AE54	wyk: B EAN ~ 131592
(1) Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c $\geq 7,5\%$ , z otężoną chorobą sercowo-naczyniową oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek $\geq 55$ lat dla mężczyzn, $\geq 60$ lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Sanofi Winthrop Industrie			

Sulpiryd Hasco: tabl. 50 mg - 24 szt. ◆	Rx	100%	4,71
		Limit	1,90
		B <sup>(1)</sup>	2,81
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Sulpiride</i>		ATC: N05AL01	wyk: B EAN ~ 138037
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Zespół Tourette'a (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Sulpiryd Hasco [4,71], Sulpiryd Teva [5,56]			

Sulpiryd Hasco: tabl. 100 mg - 24 szt. ◆	Rx	100%	6,21
		Limit	3,79
		B <sup>(1)</sup>	2,42
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Sulpiride</i>		ATC: N05AL01	wyk: B EAN ~ 138041
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Zespół Tourette'a (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Sulpiryd Hasco [6,21], Sulpiryd Teva [7,47]			

Sulpiryd Hasco: tabl. 200 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	9,48
		Limit	9,48
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Sulpiride</i>		ATC: N05AL01	wyk: B EAN ~ 138046
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Zespół Tourette'a (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Sulpiryd Hasco [9,48], Sulpiryd Teva [13,77]			

Sulpiryd Teva: kaps. twarde 50 mg - 24 szt. ◆	Rx	100%	5,56
		Limit	1,90
		B <sup>(1)</sup>	3,66
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Sulpiride</i>		ATC: N05AL01	wyk: B EAN ~ 159512
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Zespół Tourette'a (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Sulpiryd Hasco [4,71], Sulpiryd Teva [5,56]			

Sulpiryd Teva: kaps. twarde 100 mg - 24 szt. ◆	Rx	100%	7,47
		Limit	3,79
		B <sup>(1)</sup>	3,68
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Sulpiride</i>		ATC: N05AL01	wyk: B EAN ~ 159314
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Zespół Tourette'a (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Sulpiryd Hasco [6,21], Sulpiryd Teva [7,47]			

Sulpiryd Teva: tabl. 200 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	13,77
		Limit	9,48
		B <sup>(1)</sup>	4,29
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Sulpiride</i>		ATC: N05AL01	wyk: B EAN ~ 159437
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Zespół Tourette'a (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Odpowiedniki: Sulpiryd Hasco [9,48], Sulpiryd Teva [13,77]			

Sumamed®: granulaty do przyg. zaw. 100 mg/5 ml - 1 but. 20 ml	Rx	100%	16,93
		Limit	7,86
		50% <sup>(1)</sup>	13,00
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Azithromycin</i>		ATC: J01FA10	wyk: B EAN ~ 742110
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Odpowiedniki: AzitroLek [16,93], Sumamed® [16,93]			

Sumamed®: kaps. twarde 250 mg - 6 szt.	Rx	100%	24,39
		Limit	12,92
		50% <sup>(1)</sup>	17,93
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Azithromycin</i>		ATC: J01FA10	wyk: B EAN ~ 742318
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Odpowiedniki: AzitroLek - (IR) [15,22], AzitroLek - (IR) [15,80], AzitroLek [22,67], Sumamed® [24,39], Azycyna [26,68], Azimycin® [30,18]			

Sumamed®: tabl. powl. 125 mg - 6 szt.	Rx	100%	23,24
		Limit	6,46
		50% <sup>(1)</sup>	20,01
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Azithromycin</i>		ATC: J01FA10	wyk: B EAN ~ 846214
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Odpowiedniki: Sulpiryd Hasco [4,71], Sulpiryd Teva [5,56]			

Sumamed®: tabl. powl. 500 mg - 3 szt.	Rx	100%	24,39
		Limit	12,92
		50% <sup>(1)</sup>	17,93
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Azithromycin</i>		ATC: J01FA10	wyk: B EAN ~ 742417
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Odpowiedniki: Nobaxin [10,00], Azithromycin Genoptim [10,85], Azitrox 500 [14,64], AzitroLek - (IR) [15,22], Macromax [15,22], AzitroLek - (IR) [15,80], Azycyna [17,29], Azimycin® [19,31], Azibio® [19,75], AzitroLek [19,81], Sumamed® [24,39]			



<b>Sumamed® forte:</b> granulat do przyg. zaw. <b>200 mg/5 ml</b> - 1 but. 30 ml	Rx	100%	<b>42,40</b>	INN: <b>Azithromycin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Azycyna [27,17], Azitrol Lek [42,40], Sumamed® forte [42,40]
		Limit	<b>23,58</b>	
		50% <sup>(1)</sup>	<b>30,61</b>	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
	S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
<b>Sumamed® forte:</b> granulat do przyg. zaw. <b>200 mg/5 ml</b> - 1 but. 20 ml	Rx	100%	<b>29,79</b>	INN: <b>Azithromycin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Mukowiscydoza(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Azycyna [22,26], Azitrol Lek [29,79], Sumamed® forte [29,79]
		Limit	<b>15,72</b>	
		50% <sup>(1)</sup>	<b>21,93</b>	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
	S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
<b>Sumilar:</b> kaps. twarde <b>5/5 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>9,16</b>	INN: <b>Ramipril + Amlodipine</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Sandoz GmbH Odpowiedniki: Sumilar Duo [8,45], Ramizek Combi [9,16], Rimal [9,16], Sumilar [9,16], Egramol [9,23]
		Limit	<b>8,67</b>	
		30% <sup>(1)</sup>	<b>3,09</b>	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
	S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
<b>Sumilar:</b> kaps. twarde <b>5/10 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>17,33</b>	INN: <b>Ramipril + Amlodipine</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Sandoz GmbH Odpowiedniki: Sumilar Duo [16,31], Ramizek Combi [17,33], Sumilar [17,33], Rimal [17,34], Egramol [17,49]
		Limit	<b>17,33</b>	
		30% <sup>(1)</sup>	<b>5,20</b>	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
	S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
<b>Sumilar:</b> kaps. twarde <b>10/10</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>17,33</b>	INN: <b>Ramipril + Amlodipine</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Sandoz GmbH Odpowiedniki: Sumilar Duo [8,45], Ramizek Combi [9,16], Rimal [9,16], Sumilar [9,16], Egramol [9,23]
		Limit	<b>17,33</b>	
		30% <sup>(1)</sup>	<b>5,20</b>	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
	S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
<b>Sumilar:</b> kaps. twarde <b>10/5 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>9,16</b>	INN: <b>Ramipril + Amlodipine</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Sandoz GmbH Odpowiedniki: Sumilar Duo [8,45], Ramizek Combi [9,16], Rimal [9,16], Sumilar [9,16], Egramol [9,23]
		Limit	<b>8,67</b>	
		30% <sup>(1)</sup>	<b>3,09</b>	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
	S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
<b>Suprasorb® P sensitive border:</b> opatrunek piankowy z silikonem <b>7,5x8,5 cm</b> - 1 szt.	WM	100%	<b>8,85</b>	INN: <b>Emplastri polyurethanum spumatum</b> (1) Przewlekłe owróżdzenia   Kat. ciąży: N Lohmann & Rauscher
		Limit	<b>7,27</b>	
		30% <sup>(1)</sup>	<b>3,76</b>	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
	S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
<b>Suprasorb® P sensitive border:</b> opatrunek piankowy z silikonem <b>10x10 cm</b> - 1 szt.	WM	100%	<b>13,12</b>	INN: <b>Emplastri polyurethanum spumatum</b> (1) Przewlekłe owróżdzenia   Kat. ciąży: N Lohmann & Rauscher
		Limit	<b>11,40</b>	
		30% <sup>(1)</sup>	<b>5,14</b>	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
	S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
<b>Suprasorb® P sensitive border:</b> opatrunek piankowy z silikonem <b>12,5x12,5 cm</b> - 1 szt.	WM	100%	<b>19,47</b>	INN: <b>Emplastri polyurethanum spumatum</b> (1) Przewlekłe owróżdzenia   Kat. ciąży: N Lohmann & Rauscher
		Limit	<b>17,81</b>	
		30% <sup>(1)</sup>	<b>7,00</b>	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
	S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
<b>Suprasorb® P sensitive border:</b> opatrunek piankowy z silikonem <b>15x15 cm</b> - 1 szt.	WM	100%	<b>27,85</b>	INN: <b>Emplastri polyurethanum spumatum</b> (1) Przewlekłe owróżdzenia   Kat. ciąży: N Lohmann & Rauscher
		Limit	<b>25,65</b>	
		30% <sup>(1)</sup>	<b>9,90</b>	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
	S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
<b>Suprasorb® P sensitive border:</b> opatrunek piankowy z silikonem <b>20x20 cm</b> - 1 szt.	WM	100%	<b>47,76</b>	INN: <b>Emplastri polyurethanum spumatum</b> (1) Przewlekłe owróżdzenia   Kat. ciąży: N Lohmann & Rauscher
		Limit	<b>45,60</b>	
		30% <sup>(1)</sup>	<b>15,84</b>	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
	S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
<b>Suprasorb® P sensitive border lite:</b> opatrunek piankowy z silikonem <b>10x10 cm</b> - 1 szt.	WM	100%	<b>13,12</b>	INN: <b>Emplastri polyurethanum spumatum</b> (1) Przewlekłe owróżdzenia   Kat. ciąży: N Lohmann & Rauscher
		Limit	<b>11,40</b>	
		30% <sup>(1)</sup>	<b>5,14</b>	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
	S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
<b>Suprasorb® P sensitive heel:</b> opatrunek piankowy z silikonem <b>25x23,5 cm</b> - 1 szt.	WM	100%	<b>56,76</b>	INN: <b>Emplastri polyurethanum spumatum</b> (1) Przewlekłe owróżdzenia   Kat. ciąży: N Lohmann & Rauscher
		Limit	<b>56,76</b>	
		30% <sup>(1)</sup>	<b>17,03</b>	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
	S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
<b>Suprasorb® P sensitive multisite:</b> opatrunek piankowy z silikonem <b>12x15 cm</b> - 1 szt.	WM	100%	<b>21,95</b>	INN: <b>Emplastri polyurethanum spumatum</b> (1) Przewlekłe owróżdzenia   Kat. ciąży: N Lohmann & Rauscher
		Limit	<b>20,52</b>	
		30% <sup>(1)</sup>	<b>7,59</b>	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
	S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
<b>Suprasorb® P sensitive sacrum:</b> opatrunek piankowy z silikonem <b>17x17,5 cm</b> - 1 szt.	WM	100%	<b>36,06</b>	INN: <b>Emplastri polyurethanum spumatum</b> (1) Przewlekłe owróżdzenia   Kat. ciąży: N Lohmann & Rauscher
		Limit	<b>33,91</b>	
		30% <sup>(1)</sup>	<b>12,32</b>	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
	S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
<b>Sustonit®:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>6,5 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>8,80</b>	INN: <b>Glyceril trinitrate</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Polfa Warszawa SA
		Limit	<b>8,80</b>	
		R <sup>(1)</sup>	<b>3,74</b>	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
	S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
<b>Suwardio:</b> tabl. powl. <b>5 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>4,81</b>	INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Sandoz Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Astrium [X], Rosuvastatin Medical Valley [4,65], Aporoza [4,80], Zahron [4,80], Suwardio [4,81], Rosutrox [4,82], Ridlip [5,15], Roswera [5,16], Crosuvo [12,30], Zaranta [14,20]
		Limit	<b>3,93</b>	
		30% <sup>(1)</sup>	<b>2,06</b>	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
	S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
<b>Suwardio:</b> tabl. powl. <b>10 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>8,80</b>	INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Sandoz Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Astrium [X], Rosuvastatin Medical Valley [8,41], Crosuvo [8,73], Zahron [8,73], Suwardio [8,80], Rosutrox [8,82], Zaranta [9,13], Ridlip [9,40], Roswera [9,42]
		Limit	<b>7,87</b>	
		30% <sup>(1)</sup>	<b>3,29</b>	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
	S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
<b>Suwardio:</b> tabl. powl. <b>10 mg</b> - 84 szt.	Rx	100%	<b>23,53</b>	INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Sandoz Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Astrium [X], Rosuvastatin Medical Valley [15,81], Aporoza [16,47], Rosutrox [16,64], Suwardio [16,64], Zaranta [17,35], Ridlip [17,92], Roswera [17,96], Crosuvo [18,03], Zahron [18,03]
		Limit	<b>23,53</b>	
		30% <sup>(1)</sup>	<b>7,06</b>	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
	S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
<b>Suwardio:</b> tabl. powl. <b>20 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>16,64</b>	INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Sandoz Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Astrium [X], Rosuvastatin Medical Valley [15,81], Aporoza [16,47], Rosutrox [16,64], Suwardio [16,64], Zaranta [17,35], Ridlip [17,92], Roswera [17,96], Crosuvo [18,03], Zahron [18,03]
		Limit	<b>15,74</b>	
		30% <sup>(1)</sup>	<b>5,62</b>	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
	S <sup>(3)</sup>		bezpł.	
<b>Suwardio:</b> tabl. powl. <b>20 mg</b> - 84 szt.	Rx	100%	<b>44,08</b>	INN: <b>Rosuvastatin</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Sandoz Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Astrium [X], Rosuvastatin Medical Valley [15,81], Aporoza [16,47], Rosutrox [16,64], Suwardio [16,64], Zaranta [17,35], Ridlip [17,92], Roswera [17,96], Crosuvo [18,03], Zahron [18,03]
		Limit	<b>44,08</b>	
		30% <sup>(1)</sup>	<b>13,22</b>	
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
	S <sup>(3)</sup>		bezpł.	

<b>Suvardio:</b> tabl. powł. <b>40 mg</b> - 28 szt.  INN: <b>Rosuvastatin</b>   ATC: <b>C10AA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>792009</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Sandoz Polska Sp. z o.o.	Rx	100%	<b>31,23</b>	<b>Symago:</b> tabl. powł. <b>25 mg</b> - 28 szt. ♦  INN: <b>Agomelatine</b>   ATC: <b>N06AX22</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>139142</b> (1) Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku, lub anhedonii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Symphar Sp. z o.o. Odpowiedniki: Agomelatine Adamed [X], Agomelatine G.L. Pharma [62,11], Lamegom [62,94], <b>Symago</b> [62,94], Agomelatyna Egis [63,20], Sedival® [63,25], Agolek [64,28]	Rx	100%	<b>62,94</b>
		Limit	<b>31,23</b>			Limit	<b>62,94</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>9,37</b>			30% <sup>(1)</sup>	<b>18,88</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>			DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>			S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
<b>Suvardio:</b> tabl. powł. <b>40 mg</b> - 84 szt.  INN: <b>Rosuvastatin</b>   ATC: <b>C10AA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>079206</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Sandoz Polska Sp. z o.o.	Rx	100%	<b>83,15</b>	<b>Symamis:</b> tabl. <b>200 mg</b> - 30 szt. ♦  INN: <b>Amisulpride</b>   ATC: <b>N05AL05</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>141077</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Symphar Sp. z o.o. Odpowiedniki: Amisan [56,96], Masultab [58,38], Amipryd [59,75], <b>Symamis</b> [59,75], ApoSuprid [59,84], Solian® [60,62]	Rx	100%	<b>59,75</b>
		Limit	<b>83,15</b>			Limit	<b>0,00</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>24,95</b>			DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>			R <sup>(3)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>			S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
<b>Suvardio Plus:</b> tabl. <b>5/10 mg</b> - 30 szt.  INN: <b>Rosuvastatin + Ezetimibe</b>   ATC: <b>C10BA06</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>708486</b> (1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Sandoz GmbH	Rx	100%	<b>24,46</b>	<b>Symamis:</b> tabl. <b>400 mg</b> - 30 szt. ♦  INN: <b>Amisulpride</b>   ATC: <b>N05AL05</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>141080</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Symphar Sp. z o.o. Odpowiedniki: Solian® - (IR) [110,34], Solian® - (IR) [110,34], Masultab [110,46], Solian® - (IR) [110,46], Amipryd [113,21], <b>Symamis</b> [113,21], ApoSuprid [113,37], Amisan [113,44], Solian® [114,92]	Rx	100%	<b>113,21</b>
		Limit	<b>14,23</b>			Limit	<b>0,00</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>14,50</b>			DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>			R <sup>(3)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>			S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
<b>Suvardio Plus:</b> tabl. <b>5/10 mg</b> - 60 szt.  INN: <b>Rosuvastatin + Ezetimibe</b>   ATC: <b>C10BA06</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>670930</b> (1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Sandoz GmbH	Rx	100%	<b>47,49</b>	<b>Symapamid SR:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>1,5 mg</b> - 30 szt.  INN: <b>Indapamide</b>   ATC: <b>C03BA11</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>734993</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Symphar Sp. z o.o. Odpowiedniki: Ipres long 1,5 [X], Indapamide SR Genoptim [8,02], <b>Symapamid SR</b> [8,10], Rawel® SR [8,14], Indix SR [8,30], Opamid [9,37], Indapen® SR [11,52], Diuresin® SR [11,53], Tertensi® SR [13,48]	Rx	100%	<b>8,10</b>
		Limit	<b>28,46</b>			Limit	<b>8,10</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>27,57</b>			30% <sup>(1)</sup>	<b>2,43</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>			DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>			S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
<b>Suvardio Plus:</b> tabl. <b>10/10 mg</b> - 30 szt.  INN: <b>Rosuvastatin + Ezetimibe</b>   ATC: <b>C10BA06</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>708493</b> (1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Sandoz GmbH	Rx	100%	<b>24,46</b>	<b>Symasteride:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 30 szt.  INN: <b>Finasteride</b>   ATC: <b>G04CB01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>074105</b> (1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>N</b>   Symphar Sp. z o.o. Odpowiedniki: Finahit [X], Finaride [X], Finasteridum Bluefish [22,20], Finasterid Stada [24,01], Finamef - (IR) [26,17], Uronezyl [27,24], Finaran [28,33], <b>Symasteride</b> [28,38], Finpros [28,45], Penester® [29,58], Hyplafin [29,82], Antiprost [29,85], Adaster [29,86], Androster [30,02], Finamef [30,07], Apo-Fina [30,11], Finaster® [30,19]	Rx	100%	<b>28,38</b>
		Limit	<b>14,23</b>			Limit	<b>26,72</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>14,50</b>			R <sup>(1)</sup>	<b>4,86</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>			DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>			S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
<b>Suvardio Plus:</b> tabl. <b>10/10 mg</b> - 60 szt.  INN: <b>Rosuvastatin + Ezetimibe</b>   ATC: <b>C10BA06</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>670931</b> (1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Sandoz GmbH	Rx	100%	<b>47,49</b>	<b>Symasteride:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 90 szt.  INN: <b>Finasteride</b>   ATC: <b>G04CB01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>107871</b> (1) Przerost gruczołu krokowego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>N</b>   Symphar Sp. z o.o. Odpowiedniki: Finahit [X], Finasteridum Bluefish [58,50], Finasterid Stada [62,95], <b>Symasteride</b> [73,12], Penester® [79,74], Finaster® [80,15], Apo-Fina [80,81], Adaster [81,49], Androster [81,97], Finamef [82,11]	Rx	100%	<b>73,12</b>
		Limit	<b>28,46</b>			Limit	<b>73,12</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>27,57</b>			R <sup>(1)</sup>	<b>9,60</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>			DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>			S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
<b>Suvardio Plus:</b> tabl. <b>20/10 mg</b> - 30 szt.  INN: <b>Rosuvastatin + Ezetimibe</b>   ATC: <b>C10BA06</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>708509</b> (1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Sandoz GmbH	Rx	100%	<b>47,49</b>	<b>Symazide MR:</b> tabl. o zmodyf. uwalnianiu <b>60 mg</b> - 30 szt.  INN: <b>Gliclazide</b>   ATC: <b>A10BB09</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>125739</b> (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Symphar Sp. z o.o. Odpowiedniki: Gliclazide Zentiva [X], Clazicon [12,09], Diagen [12,09], Salson [12,36], <b>Symazide MR</b> [13,05], Gliclada® [15,50], Oziclide MR [15,62], Diaprel® MR [23,50]	Rx	100%	<b>13,05</b>
		Limit	<b>28,46</b>			Limit	<b>9,83</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>27,57</b>			R <sup>(1)</sup>	<b>6,42</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>			DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>			S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
<b>Suvardio Plus:</b> tabl. <b>20/10 mg</b> - 60 szt.  INN: <b>Rosuvastatin + Ezetimibe</b>   ATC: <b>C10BA06</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>670932</b> (1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Sandoz GmbH	Rx	100%	<b>24,46</b>	<b>Symazide MR 30:</b> tabl. o zmodyf. uwalnianiu <b>30 mg</b> - 60 szt.  INN: <b>Gliclazide</b>   ATC: <b>A10BB09</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>129164</b> (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Symphar Sp. z o.o. Odpowiedniki: Symazide MR [X], Clazicon [12,09], <b>Symazide MR 30</b> [12,20], Gliclada® [15,62], Diaprel® MR [24,95]	Rx	100%	<b>12,20</b>
		Limit	<b>14,23</b>			Limit	<b>9,83</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>13,20</b>			R <sup>(1)</sup>	<b>5,57</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>			DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>			S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
<b>Suvardio Plus:</b> tabl. <b>40/10 mg</b> - 30 szt.  INN: <b>Rosuvastatin + Ezetimibe</b>   ATC: <b>C10BA06</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>110176</b> (1) Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Sandoz GmbH	Rx	100%	<b>23,16</b>	<b>Symazide MR 60:</b> tabl. o zmodyf. uwalnianiu <b>60 mg</b> - 60 szt.  INN: <b>Gliclazide</b>   ATC: <b>A10BB09</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>125740</b> (1) Cukrzyca (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Symphar Sp. z o.o. Odpowiedniki: <b>Symazide MR 60</b> [23,55], Salson [23,90], Gliclada® [30,20], Oziclide MR [30,42]	Rx	100%	<b>23,55</b>
		Limit	<b>14,23</b>			Limit	<b>19,65</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>13,20</b>			R <sup>(1)</sup>	<b>10,30</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>			DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>			S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>



Naszym wyborem

enarenal  
enalaprilil maleas

<b>Symbicort®:</b> aerozol inhal. [zaw.] <b>160/4,5 µg/dawkę</b> - 1 inhal. (120 dawek)	Rx	100% <b>128,03</b> Limit <b>93,99</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>62,24</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Budesonide + Formoterol</b> (1) Przewłoka obturacyjna choroba płuc (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: <b>R03AK07</b> wyk: <b>A</b> EAN ~ <b>601164</b>	AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.
<b>Symbicort® Turbuhaler®:</b> inhal. proszkowy <b>80/4,5 µg/dawkę</b> - 1 inhal. (60 dawek)	Rx	100% <b>75,20</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>24,44</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Budesonide + Formoterol</b> (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Astma, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: <b>R03AK07</b> wyk: <b>A</b> EAN ~ <b>872886</b>	AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.
<b>Symbicort® Turbuhaler®:</b> inhal. proszkowy <b>160/4,5 µg/dawkę</b> - 1 inhal. (120 dawek)	Rx	100% <b>128,03</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>37,24</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Budesonide + Formoterol</b> (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Astma, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: <b>R03AK07</b> wyk: <b>A</b> EAN ~ <b>873074</b>	AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.
<b>Symbicort® Turbuhaler®:</b> inhal. proszkowy <b>320/9 µg/dawkę</b> - 1 inhal. (60 dawek)	Rx	100% <b>127,44</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>36,65</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Budesonide + Formoterol</b> (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Astma, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: <b>R03AK07</b> wyk: <b>A</b> EAN ~ <b>873241</b>	AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.
<b>Symcloza:</b> tabl. <b>25 mg</b> - 50 szt. ◆	Rx	100% <b>6,92</b> Limit <b>5,27</b> B <sup>(1)</sup> <b>1,65</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Clozapine</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>	ATC: <b>N05AH02</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>137338</b>	Symphar Sp. z o.o.
Odpowiedniki: <b>Symcloza</b> [6,92], Clopizam [7,04], Klozapol® [9,22]		
<b>Symcloza:</b> tabl. <b>100 mg</b> - 50 szt. ◆	Rx	100% <b>25,12</b> Limit <b>21,07</b> B <sup>(1)</sup> <b>4,05</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Clozapine</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>	ATC: <b>N05AH02</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>137344</b>	Symphar Sp. z o.o.
Odpowiedniki: <b>Symcloza</b> [25,12], Clopizam [25,63], Klozapol® [31,44]		
<b>Symcloza:</b> tabl. <b>200 mg</b> - 50 szt. ◆	Rx	100% <b>47,88</b> Limit <b>42,13</b> B <sup>(1)</sup> <b>5,75</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Clozapine</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>	ATC: <b>N05AH02</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>137346</b>	Symphar Sp. z o.o.
<b>Symdio:</b> tabl. powł. <b>2 mg</b> - 28 szt.	Rx	100% <b>39,59</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>6,37</b>
INN: <b>Dienogest</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Endometrioza   Kat. ciąży: <b>X</b>	ATC: <b>G03DB08</b> wyk: <b>A</b> EAN ~ <b>139287</b>	Symphar Sp. z o.o.
Odpowiedniki: <b>Diemono</b> - (IR) [37,59], <b>Diemono</b> - (IR) [37,65], <b>Zafrilla</b> [37,76], <b>Aridya</b> [38,45], <b>Symdio</b> [39,59], <b>Endovelle</b> [39,82], <b>Probella</b> [42,10], <b>Diemono</b> [42,11], <b>Visanne®</b> [62,37]		

<b>Symetlip:</b> tabl. powł. <b>50/850 mg</b> - 56 szt.	Rx	100% <b>30,73</b> Limit <b>29,23</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>10,27</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Sitagliptin + Metformin hydrochloride</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>	ATC: <b>A10BD07</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>973959</b>	Symphar Sp. z o.o.
Odpowiedniki: <b>Symetlip</b> [30,73], <b>Metsigletic</b> [30,75], <b>Maymetsi</b> [38,76], <b>Jamesi®</b> [42,67]		
<b>Symetlip:</b> tabl. powł. <b>50/1000 mg</b> - 56 szt.	Rx	100% <b>30,73</b> Limit <b>29,23</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>10,27</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Sitagliptin + Metformin hydrochloride</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>	ATC: <b>A10BD07</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>973968</b>	Symphar Sp. z o.o.
Odpowiedniki: <b>Symetlip</b> [30,73], <b>Metsigletic</b> [30,75], <b>Maymetsi</b> [38,76], <b>Combodiab</b> [39,85], <b>Eprocliv</b> [43,94], <b>Jamesi®</b> [46,80]		
<b>Symex:</b> tabl. draż. <b>25 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100% <b>76,42</b> Limit <b>56,72</b> B <sup>(1)</sup> <b>19,70</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Exemestane</b> (1) Rak piersi w II rzucie hormonoterapii WP: Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b>	ATC: <b>L02BG06</b> wyk: <b>E</b> EAN ~ <b>335489</b>	Symphar Sp. z o.o.
Odpowiedniki: <b>Symex</b> [76,42], <b>Glandex</b> [76,55]		
<b>Symfaksin ER®:</b> kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde <b>37,5 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>10,37</b> Limit <b>10,37</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>3,11</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Venlafaxine</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: <b>N06AX16</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>135096</b>	Symphar Sp. z o.o.
Odpowiedniki: <b>Symfaksin ER®</b> [10,37], <b>Oriven</b> [10,53], <b>Faxigen XL</b> [11,02], <b>Efevelon SR</b> [11,39], <b>Lafactin</b> [12,03], <b>Velaxin® ER</b> 37,5 [12,56], <b>Venlectine</b> [12,69], <b>Alventa®</b> [12,77], <b>Venlafaxine Apotex</b> [12,82], <b>Faxolet ER</b> [13,10], <b>Axyven</b> [13,37], <b>Prefaxine</b> [13,80]		
<b>Symfaksin ER®:</b> kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde <b>75 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>19,46</b> Limit <b>19,46</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,84</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Venlafaxine</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: <b>N06AX16</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>091996</b>	Symphar Sp. z o.o.
Odpowiedniki: <b>Venlafaxine Bluefish XL</b> [17,37], <b>Alventa® - (IR)</b> [17,75], <b>Symfaksin ER®</b> [19,46], <b>Oriven</b> [19,60], <b>Faxigen XL</b> [20,62], <b>Lafactin</b> [22,78], <b>Alventa®</b> [23,03], <b>Efevelon SR</b> [23,60], <b>Velaxin® ER</b> 75 [23,91], <b>Venlectine</b> [24,18], <b>Venlafaxine Apotex</b> [24,46], <b>Faxolet ER</b> [24,62], <b>Axyven</b> [25,04], <b>Efectin® ER</b> 75 [25,55], <b>Prefaxine</b> [26,50]		
<b>Symfaksin ER®:</b> kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde <b>150 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>32,21</b> Limit <b>32,21</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>9,66</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Venlafaxine</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: <b>N06AX16</b> wyk: <b>B</b> EAN ~ <b>092030</b>	Symphar Sp. z o.o.
Odpowiedniki: <b>Venlafaxine Bluefish XL</b> [31,86], <b>Symfaksin ER®</b> [32,21], <b>Alventa® - (IR)</b> [32,27], <b>Oriven</b> [32,80], <b>Faxigen XL</b> [38,30], <b>Lafactin</b> [42,60], <b>Alventa®</b> [43,10], <b>Efevelon SR</b> [44,25], <b>Efectin® ER</b> 150 [44,82], <b>Velaxin® ER</b> 150 [44,84], <b>Venlectine</b> [45,62], <b>Axyven</b> [46,26], <b>Venlafaxine Apotex</b> [46,77], <b>Faxolet ER</b> [47,11], <b>Prefaxine</b> [50,06]		
<b>Symflusal:</b> prosz. do inhal. <b>500/50 µg/dawkę</b> - 1 blist. (60 dawek + inhal. Elphenhaler)	Rx	100% <b>104,54</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>13,75</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Fluticasone propionate + Salmeterol</b> (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewłoka obturacyjna choroba płuc, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Astma (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: <b>R03AK06</b> wyk: <b>A</b> EAN ~ <b>079055</b>	Symphar Sp. z o.o.





ZAKODOWANY DO WALKI  
Z ZAKAŻENIEM

<p><b>Symformin XR:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>500 mg</b> - 30 szt.</p> <p>INN: <i>Metformin hydrochloride</i>   ATC: A10BA02   wyk: B   EAN ~ 271695 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1; T2:B, T3:B Odpowiedniki: Zenoform SR [6,57], Etfom SR [6,76], Metcrean XR [6,86], Siofor® XR 500 mg [7,71], Symformin XR [7,81], Avamina SR [9,31], Glucophage® XR [9,32], Metformax® SR 500 [9,48]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>7,81</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>7,12</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	7,81		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	7,12		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Symglic®:</b> tabl. <b>3 mg</b> - 30 szt.</p> <p>INN: <i>Glimepiride</i>   ATC: A10BB12   wyk: B   EAN ~ 570362 (1) Cukrzyca(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Glimepiride Aurovitas [X], Glitoprel [X], Symglic® [12,32], GlimeHEXAL 3 [13,55], Diaril® [14,14], Glibetic 3 mg [16,34], Amaryl® 3 [17,61]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>12,32</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>12,32</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(1)</sup></td><td>4,80</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	12,32		Limit	12,32		R <sup>(1)</sup>	4,80		S <sup>(2)</sup>	bezpł.						
Rx	100%	7,81																																		
	Limit	0,00																																		
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																																		
	R <sup>(2)</sup>	7,12																																		
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																																		
Rx	100%	12,32																																		
	Limit	12,32																																		
	R <sup>(1)</sup>	4,80																																		
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																																		
<p><b>Symformin XR:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>500 mg</b> - 60 szt.</p> <p>INN: <i>Metformin hydrochloride</i>   ATC: A10BA02   wyk: B   EAN ~ 271701 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1; T2:B, T3:B Odpowiedniki: Diabufor XR [10,85], Ranmet XR [10,85], Zenoform SR [12,29], Etfom SR [12,68], Metcrean XR [12,89], Symformin XR [14,89], Avamina SR [17,25], Metformax® SR 500 [18,58], Glucophage® XR [18,87]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>14,89</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>10,30</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	14,89		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	10,30		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Symglic®:</b> tabl. <b>4 mg</b> - 30 szt.</p> <p>INN: <i>Glimepiride</i>   ATC: A10BB12   wyk: B   EAN ~ 573196 (1) Cukrzyca(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Glimepiride Aurovitas [X], Glitoprel [X], Symglic® [16,46], Diaril® [17,55], GlimeHEXAL 4 [17,55], Amaryl® 4 [17,60], Glibetic 4 mg [19,65]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>16,46</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>16,46</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(1)</sup></td><td>6,40</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	16,46		Limit	16,46		R <sup>(1)</sup>	6,40		S <sup>(2)</sup>	bezpł.						
Rx	100%	14,89																																		
	Limit	0,00																																		
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																																		
	R <sup>(2)</sup>	10,30																																		
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																																		
Rx	100%	16,46																																		
	Limit	16,46																																		
	R <sup>(1)</sup>	6,40																																		
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																																		
<p><b>Symformin XR:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>750 mg</b> - 30 szt.</p> <p>INN: <i>Metformin hydrochloride</i>   ATC: A10BA02   wyk: B   EAN ~ 271732 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1; T2:B, T3:B Odpowiedniki: Zenoform SR [9,43], Etfom SR [9,69], Siofor® XR 750 mg [10,82], Symformin XR [11,26], Metformax® SR 750 [11,46], Avamina SR [13,07], Glucophage® XR [13,67]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>11,26</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>8,62</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	11,26		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	8,62		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Symglic®:</b> tabl. <b>6 mg</b> - 30 szt.</p> <p>INN: <i>Glimepiride</i>   ATC: A10BB12   wyk: B   EAN ~ 570379 (1) Cukrzyca(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Symglic® [25,52], GlimeHEXAL 6 [25,76]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>25,52</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>25,52</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(1)</sup></td><td>9,60</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	25,52		Limit	25,52		R <sup>(1)</sup>	9,60		S <sup>(2)</sup>	bezpł.						
Rx	100%	11,26																																		
	Limit	0,00																																		
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																																		
	R <sup>(2)</sup>	8,62																																		
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																																		
Rx	100%	25,52																																		
	Limit	25,52																																		
	R <sup>(1)</sup>	9,60																																		
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																																		
<p><b>Symformin XR:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>750 mg</b> - 60 szt.</p> <p>INN: <i>Metformin hydrochloride</i>   ATC: A10BA02   wyk: B   EAN ~ 271749 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1; T2:B, T3:B Odpowiedniki: Diabufor XR [16,01], Ranmet XR [16,01], Zenoform SR [18,27], Etfom SR [18,84], Symformin XR [22,16], Metformax® SR 750 [22,57], Avamina SR [24,11], Glucophage® XR [28,12]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>22,16</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>13,68</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	22,16		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	13,68		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Symgliptin:</b> tabl. powl. <b>100 mg</b> - 28 szt.</p> <p>INN: <i>Sitagliptin</i>   ATC: A10BH01   wyk: B   EAN ~ 973935 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Jazeta [29,23], Lonamo [30,25], Symgliptin [30,32], Sigletic [30,34], Sitagliptin Adamed [30,34], Sitagliptin STADA [30,34], Sitagliptin Medical Valley [37,64], Maysiglu [38,21], Sitagliptin Bioton [39,93], Simlerid [43,94], JUZINA® [44,51], Sitagliptin SUN [46,80], Januvia® [80,57]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>30,32</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>29,23</td></tr> <tr><td></td><td>30%(1)</td><td>9,86</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	30,32		Limit	29,23		30%(1)	9,86		S <sup>(2)</sup>	bezpł.						
Rx	100%	22,16																																		
	Limit	0,00																																		
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																																		
	R <sup>(2)</sup>	13,68																																		
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																																		
Rx	100%	30,32																																		
	Limit	29,23																																		
	30%(1)	9,86																																		
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																																		
<p><b>Symformin XR:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>1000 mg</b> - 30 szt.</p> <p>INN: <i>Metformin hydrochloride</i>   ATC: A10BA02   wyk: B   EAN ~ 271756 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1; T2:B, T3:B Odpowiedniki: Glucophage® XR [X], Zenoform SR [12,29], Etfom SR [12,68], Siofor® XR 1000 mg [14,27], Metformax® SR 1000 [14,79], Symformin XR [14,86], Avamina SR [16,50]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>14,86</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>10,27</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	14,86		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	10,27		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Symla:</b> tabl. <b>25 mg</b> - 30 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Lamotrigine</i>   ATC: N03AX09   wyk: B   EAN ~ 097241 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrębie OUN - postępowanie wspomagające; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Lamilept [X], Symla [6,98], Lamotrix [7,48], Lamitrin® [15,26]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>6,98</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(3)</sup></td><td>5,44</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	6,98		Limit	0,00		C <sup>(1)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	5,44		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
Rx	100%	14,86																																		
	Limit	0,00																																		
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																																		
	R <sup>(2)</sup>	10,27																																		
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																																		
Rx	100%	6,98																																		
	Limit	0,00																																		
	C <sup>(1)</sup>	bezpł.																																		
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																																		
	R <sup>(3)</sup>	5,44																																		
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.																																		
<p><b>Symformin XR:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>1000 mg</b> - 60 szt.</p> <p>INN: <i>Metformin hydrochloride</i>   ATC: A10BA02   wyk: B   EAN ~ 271763 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1; T2:B, T3:B Odpowiedniki: Diabufor XR [21,05], Ranmet XR [21,05], Zenoform SR [24,04], Etfom SR [24,81], Metformax® SR 1000 [28,92], Symformin XR [29,21], Avamina SR [32,48], Glucophage® XR [37,21]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>29,21</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(2)</sup></td><td>16,84</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	29,21		Limit	0,00		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.		R <sup>(2)</sup>	16,84		S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<p><b>Symla:</b> tabl. <b>50 mg</b> - 30 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Lamotrigine</i>   ATC: N03AX09   wyk: B   EAN ~ 097251 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrębie OUN - postępowanie wspomagające; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Lamilept [X], Epritrigine 50 mg [12,71], Symla [13,11], Lamotrix [14,15], Lamitrin® [26,32]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>13,11</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(3)</sup></td><td>6,82</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	13,11		Limit	0,00		C <sup>(1)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	6,82		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
Rx	100%	29,21																																		
	Limit	0,00																																		
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																																		
	R <sup>(2)</sup>	16,84																																		
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.																																		
Rx	100%	13,11																																		
	Limit	0,00																																		
	C <sup>(1)</sup>	bezpł.																																		
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																																		
	R <sup>(3)</sup>	6,82																																		
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.																																		
<p><b>Symglic®:</b> tabl. <b>1 mg</b> - 30 szt.</p> <p>INN: <i>Glimepiride</i>   ATC: A10BB12   wyk: B   EAN ~ 570348 (1) Cukrzyca(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Glitoprel [X], Symglic® [4,89], GlimeHEXAL 1 [5,14], Diaril® [6,00], Glibetic 1 mg [6,05], Amaryl® 1 [6,63]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>4,89</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>4,89</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(1)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	4,89		Limit	4,89		R <sup>(1)</sup>	3,20		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Symla:</b> tabl. <b>100 mg</b> - 30 szt. ◆</p> <p>INN: <i>Lamotrigine</i>   ATC: N03AX09   wyk: B   EAN ~ 097261 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrębie OUN - postępowanie wspomagające; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Lamitrin® [20,15], Epritrigine 100 mg [24,57], Lamilept - (IR) [25,37], Symla [25,38], Lamilept [25,50], Lamotrix [27,43]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>25,38</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(3)</sup></td><td>9,60</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	25,38		Limit	0,00		C <sup>(1)</sup>	bezpł.		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.		R <sup>(3)</sup>	9,60		S <sup>(4)</sup>	bezpł.			
Rx	100%	4,89																																		
	Limit	4,89																																		
	R <sup>(1)</sup>	3,20																																		
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																																		
Rx	100%	25,38																																		
	Limit	0,00																																		
	C <sup>(1)</sup>	bezpł.																																		
	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																																		
	R <sup>(3)</sup>	9,60																																		
	S <sup>(4)</sup>	bezpł.																																		
<p><b>Symglic®:</b> tabl. <b>2 mg</b> - 30 szt.</p> <p>INN: <i>Glimepiride</i>   ATC: A10BB12   wyk: B   EAN ~ 570355 (1) Cukrzyca(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Glimepiride Aurovitas [X], Glitoprel [X], Symglic® [9,02], GlimeHEXAL 2 [9,39], Diaril® [10,09], Amaryl® 2 [11,23], Glibetic 2 mg [11,30]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>9,02</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>9,02</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(1)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	9,02		Limit	9,02		R <sup>(1)</sup>	3,20		S <sup>(2)</sup>	bezpł.	<p><b>Symlosin SR®:</b> kaps. o przedl. uwalnianiu <b>0,4 mg</b> - 30 szt.</p> <p>INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i>   ATC: G04CA02   wyk: B   EAN ~ 004438 (1) Przerost gruczołu krokowego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Odpowiedniki: Omsal - (IR) [X], Urostat 0,4 mg [X], Urostat 0,4 mg - (IR) [X], Tamsiger [16,35], Urostat 0,4 mg - (IR) [16,35], Tamiron [16,49], Bazetham Retard [23,61], Omsal [23,81], Symlosin SR® [23,81], Tanyz® ERAS [23,90], Uprox XR [23,98], Adatam XR [23,99], Ranlosin [23,99], TamisPras [24,34], Apo-Tamis [24,38], Omnic Ocas® 0,4 [25,18]</p>	<table border="1"> <tr><td>Rx</td><td>100%</td><td>23,81</td></tr> <tr><td></td><td>Limit</td><td>19,21</td></tr> <tr><td></td><td>R<sup>(1)</sup></td><td>7,80</td></tr> <tr><td></td><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	Rx	100%	23,81		Limit	19,21		R <sup>(1)</sup>	7,80		S <sup>(2)</sup>	bezpł.									
Rx	100%	9,02																																		
	Limit	9,02																																		
	R <sup>(1)</sup>	3,20																																		
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																																		
Rx	100%	23,81																																		
	Limit	19,21																																		
	R <sup>(1)</sup>	7,80																																		
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.																																		



<b>Symlosin SR®</b> : kaps. o przedl. uwalnianiu <b>0,4 mg</b> - 90 szt.	Rx	100% <b>50,85</b> Limit <b>50,85</b> R <sup>(1)</sup> <b>9,60</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i>   ATC: G04CA02   wyk: B   EAN ~ 136321 (1)Przerost gruczołu krokowego(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Odpowiedniki: Symlosin SR® [50,85], Bazetham Retard [65,74], Ranlosin [66,31], Uprox XR [66,83], Adatam XR [66,87], Apo-Tamis [68,02]		
<b>Symquel® XR</b> : tabl. o przedl. uwalnianiu <b>50 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx	100% <b>25,25</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(1)</sup> <b>6,25</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Quetiapine</i>   ATC: N05AH04   wyk: B   EAN ~ 087005 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Symquel® XR [25,25], Kventiax® SR [26,17], Ketiilep® Retard [26,22]		
<b>Symquel® XR</b> : tabl. o przedl. uwalnianiu <b>200 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx	100% <b>88,92</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,30</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Quetiapine</i>   ATC: N05AH04   wyk: B   EAN ~ 087180 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Bonogren SR [85,48], Symquel® XR [88,92], Kventiax® SR [92,35], Kvelux SR [92,58], Ketiilep® Retard [92,80], Kwetaplex XR [93,50]		
<b>Symquel® XR</b> : tabl. o przedl. uwalnianiu <b>300 mg</b> - 60 szt. ◆	Rx	100% <b>128,70</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(1)</sup> <b>4,80</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Quetiapine</i>   ATC: N05AH04   wyk: B   EAN ~ 087258 (1)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Odpowiedniki: Bonogren SR [125,26], Symquel® XR [128,70], Kventiax® SR [133,85], Kvelux SR [134,19], Ketiilep® Retard [134,54], Kwetaplex XR [135,56]		
<b>Syntarpen®</b> : tabl. powł. <b>500 mg</b> - 16 szt.	Rx	100% <b>40,21</b> Limit <b>40,21</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>18,10</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Cloxacillin</i>   ATC: J01CF02   wyk: B   EAN ~ 295715 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA		
<b>System® 50</b> : system transdermalny <b>50 µg/24 h</b> - 6 szt.	Rx	100% <b>23,39</b> Limit <b>23,39</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>7,02</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Estradiol hemihydrate</i>   ATC: G03CA03   wyk: B   EAN ~ 169214 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Transseksualizm (F64.0)(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Theramex Ireland Limited		
<b>System® Conti</b> : system transdermalny <b>3,2 mg+ 11,2 mg</b> - 8 szt.	Rx	100% <b>38,94</b> Limit <b>23,39</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>22,57</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Estradiol + Norethisterone (stałe dawki)</i>   ATC: G03FA01   wyk: B   EAN ~ 444717 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Theramex Ireland Limited		
<b>System® Sequi</b> : system transdermalny <b>3,2 mg+ 11,2 mg</b> - 8 szt. (4 plastry System 50 + 4 plastry System Conti)	Rx	100% <b>30,07</b> Limit <b>23,39</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>13,70</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Estradiol + Norethisterone (dawki sekwencyjne)</i>   ATC: G03FB05   wyk: B   EAN ~ 444816 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Theramex Ireland Limited		
<b>Taclar®</b> : tabl. powł. <b>500 mg</b> - 14 szt.	Rx	100% <b>34,88</b> Limit <b>34,88</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>15,70</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Clarithromycin</i>   ATC: J01FA09   wyk: B   EAN ~ 023416 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA		
Odpowiedniki: Klabax® [27,21], Fromilid® 500 [28,07], Klarmin® [30,36], Taclar® [34,88], Klacid® [42,72]		

<b>Taftotan Multi</b> : krople do oczu [roztw.] <b>15 µg/ml</b> - 1 but. 3 ml	Rx	100% <b>64,67</b> Limit <b>35,44</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>39,86</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Taftuprost</i>   ATC: S01EE05   wyk: B   EAN ~ 137292 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Santen Oy SA Przedstawicielstwo w Polsce		
<b>Tamiron</b> : kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde <b>0,4 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>16,49</b> Limit <b>16,49</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i>   ATC: G04CA02   wyk: B   EAN ~ 133270 (1)Przerost gruczołu krokowego(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Orion Pharma Poland Sp. o.o.		
<b>TamisPras</b> : tabl. o przedl. uwalnianiu <b>0,4 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>24,34</b> Limit <b>19,21</b> R <sup>(1)</sup> <b>8,33</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i>   ATC: G04CA02   wyk: B   EAN ~ 980451 (1)Przerost gruczołu krokowego(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce		
<b>Tamoptim</b> : kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde <b>0,4 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% <b>19,96</b> Limit <b>19,21</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,95</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i>   ATC: G04CA   wyk: B   EAN ~ 057038 (1)Przerost gruczołu krokowego(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Synoptis Pharma Sp. z o.o.		
<b>Tamoptim</b> : kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde <b>0,4 mg</b> - 60 szt.	Rx	100% <b>37,71</b> Limit <b>37,71</b> R <sup>(1)</sup> <b>6,40</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i>   ATC: G04CA   wyk: B   EAN ~ 708400 (1)Przerost gruczołu krokowego(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Synoptis Pharma Sp. z o.o.		
<b>Tamoptim</b> : kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde <b>0,4 mg</b> - 90 szt.	Rx	100% <b>54,74</b> Limit <b>54,74</b> R <sup>(1)</sup> <b>9,60</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i>   ATC: G04CA   wyk: B   EAN ~ 708417 (1)Przerost gruczołu krokowego(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Synoptis Pharma Sp. z o.o.		
<b>Tamoxifen-EGIS</b> : tabl. <b>20 mg</b> - 30 szt. (3 blistry) ◆	Rx	100% <b>15,11</b> Limit <b>20,24</b> B <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Tamoxifen</i>   ATC: L02BA01   wyk: B   EAN ~ 775316 (1)Nowotwory złośliwe(2)Chemioterapia ICD10: C.52.(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Egis Polska Sp. z o.o.		
<b>Tamoxifen Sandoz</b> : tabl. <b>20 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100% <b>15,55</b> Limit <b>15,55</b> B <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Tamoxifen</i>   ATC: L02BA01   wyk: B   EAN ~ 331017 (1)Nowotwory złośliwe(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Sandoz GmbH		
<b>Tamsiger</b> : tabl. o przedl. uwalnianiu <b>0,4 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100% <b>16,35</b> Limit <b>16,35</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i>   ATC: G04CA02   wyk: B   EAN ~ 201184 (1)Przerost gruczołu krokowego(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N G.L. Pharma GmbH		
Odpowiedniki: Omsal - (IR) [X], Urostat 0,4 mg [X], Urostat 0,4 mg - (IR) [X], Tamsiger [16,35], Tamiron [16,49], Bazetham Retard [23,61], Omsal [23,81], Symlosin SR® [23,81], Tanyz® ERAS [23,90], Uprox XR [23,98], Adatam XR [23,99], Ranlosin [23,99], TamisPras [24,34], Apo-Tamis [24,38], Omnic Ocas® 0,4 [25,18]		

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

<b>Tamsudil:</b> kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde <b>0,4 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% Limit R <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	24,84 19,21 8,83 bezpł.
INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i>   ATC: G04CA02   wyk: B   EAN ~ 565948 (1)Przerost gruczołu krokowego(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Actavis Group PTC ehf.			
Odpowiedniki: TamsuGen® [17,94], Tamoptim [19,96], Adatam [23,97], Uprox [23,98], Prostammic [24,04], Tanyz® [24,10], Tamsudil [24,84], Omnic® 0,4 [24,85]			
<b>TamsuGen®:</b> kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde <b>0,4 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% Limit R <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	17,94 17,94 3,20 bezpł.
INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i>   ATC: G04CA02   wyk: B   EAN ~ 570690 (1)Przerost gruczołu krokowego(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Mylan Ireland Limited			
Odpowiedniki: TamsuGen® [17,94], Tamoptim [19,96], Adatam [23,97], Uprox [23,98], Prostammic [24,04], Tanyz® [24,10], Tamsudil [24,84], Omnic® 0,4 [24,85]			
<b>Tamsulosin Medreg:</b> kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde <b>0,4 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% Limit R <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	15,80 15,80 3,20 bezpł.
INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i>   ATC: G04CA02   wyk: B   EAN ~ 645399 (1)Przerost gruczołu krokowego(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X MedReg sro			
<b>Tamsulosin Medreg:</b> kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde <b>0,4 mg</b> - 90 szt.	Rx	100% Limit R <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	42,27 42,27 9,60 bezpł.
INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i>   ATC: G04CA02   wyk: B   EAN ~ 645403 (1)Przerost gruczołu krokowego(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X MedReg sro			
<b>Tanyz®:</b> kaps. o zmod. uwalnianiu <b>0,4 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% Limit R <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	24,10 19,21 8,09 bezpł.
INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i>   ATC: G04CA02   wyk: B   EAN ~ 430895 (1)Przerost gruczołu krokowego(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: TamsuGen® [17,94], Tamoptim [19,96], Adatam [23,97], Uprox [23,98], Prostammic [24,04], Tanyz® [24,10], Tamsudil [24,84], Omnic® 0,4 [24,85]			
<b>Tanyz® ERAS:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>0,4 mg</b> - 30 szt.	Rx	100% Limit R <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	23,90 19,21 7,89 bezpł.
INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i>   ATC: G04CA02   wyk: B   EAN ~ 847808 (1)Przerost gruczołu krokowego(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Omsal - (IR) [X], Urostat 0,4 mg [X], Urostat 0,4 mg - (IR) [X], Tamsiger [16,35], Urostat 0,4 mg - (IR) [16,35], Tamiron [16,49], Bazetham Retard [23,61], Omsal [23,81], Symlosin SR® [23,81], Tanyz® ERAS [23,90], Uprox XR [23,98], Adatam XR [23,99], Ranlosin [23,99], TamisPras [24,34], Apo-Tamis [24,38], Omnic Ocas® 0,4 [25,18]			
<b>Taptiqom:</b> krople do oczu [roztw.] ( <b>15 µg+ 5 mg</b> )/ml - 30 poj. 0,3 ml	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	83,54 37,98 56,95 bezpł. bezpł.
INN: <i>Taftuprost + Timolol</i>   ATC: S01ED51   wyk: B   EAN ~ 122032 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Santen Oy SA Przedstawicielstwo w Polsce			
<b>Targin:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>5 mg+ 2,5 mg</b> - 60 szt. ◊	Rx-w	100% Limit B <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	47,47 43,24 4,23 bezpł.
INN: <i>Oxycodone hydrochloride + Naloxone hydrochloride</i>   ATC: N02AA55   wyk: B   EAN ~ 741878 (1)Ból w przebiegu chorób nowotworowych – u pacjentów, u których występują zaparcia poopoiidowe(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Mundipharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Oxyduo [47,45], Targin [47,47]			
<b>Targin:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>10 mg+ 5 mg</b> - 60 szt. ◊	Rx-w	100% Limit B <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	99,29 86,48 12,81 bezpł.
INN: <i>Oxycodone hydrochloride + Naloxone hydrochloride</i>   ATC: N02AA55   wyk: B   EAN ~ 741366 (1)Ból w przebiegu chorób nowotworowych – u pacjentów, u których występują zaparcia poopoiidowe(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Mundipharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Oxyduo [90,09], Targin [99,29]			
<b>Targin:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>20 mg+ 10 mg</b> - 60 szt. ◊	Rx-w	100% Limit B <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	171,98 171,98 bezpł. bezpł.
INN: <i>Oxycodone hydrochloride + Naloxone hydrochloride</i>   ATC: N02AA55   wyk: B   EAN ~ 741472 (1)Ból w przebiegu chorób nowotworowych – u pacjentów, u których występują zaparcia poopoiidowe(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Mundipharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Targin [171,98], Oxyduo [180,24]			
<b>Targin:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu <b>40 mg+ 20 mg</b> - 60 szt. ◊	Rx-w	100% Limit B <sup>(1)</sup> S <sup>(2)</sup>	331,97 331,97 bezpł. bezpł.
INN: <i>Oxycodone hydrochloride + Naloxone hydrochloride</i>   ATC: N02AA55   wyk: B   EAN ~ 741595 (1)Ból w przebiegu chorób nowotworowych – u pacjentów, u których występują zaparcia poopoiidowe(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Mundipharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Targin [331,97], Oxyduo [348,50]			
<b>Tarivid® 200:</b> tabl. powl. <b>200 mg</b> - 10 szt.	Rx	100% Limit 50% <sup>(1)</sup> B <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	17,04 11,80 11,14 5,24 bezpł.
INN: <i>Ofloxacin</i>   ATC: J01MA01   wyk: B   EAN ~ 111213 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy(3)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Sanofi-Aventis Deutschland GmbH			
<b>Taromentin®:</b> prosz. do przyg. zaw. doust. <b>457 mg/5 ml</b> - 1 but. 35 ml	Rx	100% Limit 50% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	14,20 8,88 8,78 bezpł. bezpł.
INN: <i>Amoxicillin + Clavulanic acid</i>   ATC: J01CR02   wyk: B   EAN ~ 793594 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA			
<b>Taromentin®:</b> prosz. do przyg. zaw. doust. <b>457 mg/5 ml</b> - 1 but. 140 ml	Rx	100% Limit 50% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	39,95 35,54 19,96 bezpł. bezpł.
INN: <i>Amoxicillin + Clavulanic acid</i>   ATC: J01CR02   wyk: B   EAN ~ 793587 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA			
Odpowiedniki: Auglavin PPH [33,32], Taromentin® [39,95]			
<b>Taromentin®:</b> prosz. do przyg. zaw. doust. <b>457 mg/5 ml</b> - 1 but. 70 ml	Rx	100% Limit 50% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	26,43 17,77 15,80 bezpł. bezpł.
INN: <i>Amoxicillin + Clavulanic acid</i>   ATC: J01CR02   wyk: B   EAN ~ 793600 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA			
Odpowiedniki: Auglavin PPH [17,67], Taromentin® [26,43]			
<b>Taromentin®:</b> tabl. powl. <b>625 mg</b> - 14 szt.	Rx	100% Limit 50% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	23,98 17,14 13,87 bezpł. bezpł.
INN: <i>Amoxicillin + Clavulanic acid</i>   ATC: J01CR02   wyk: B   EAN ~ 430628 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA			
Odpowiedniki: Auglavin PPH [18,54], Amoksiklav® [18,71], Augmentin® [19,92], Taromentin® [23,98]			
<b>Taromentin®:</b> tabl. powl. <b>625 mg</b> - 21 szt.	Rx	100% Limit 50% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	34,22 25,70 19,23 bezpł. bezpł.
INN: <i>Amoxicillin + Clavulanic acid</i>   ATC: J01CR02   wyk: B   EAN ~ 430611 (1)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA			
Odpowiedniki: Amoksiklav® [23,16], Taromentin® [34,22]			



# ZOLPIC

Daj owcom odpocząć.  
zolpidem



Taromentin®: tabl. powł. 1 g - 14 szt.	Rx	100%	40,04
		Limit	29,99
		50% <sup>(1)</sup>	22,55
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Amoxicillin + Clavulanic acid* ATC: J01CR02 wyk: B EAN ~ 087715

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA

Odpowiedniki: Amoksyklaw® - (IR) [X], Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas [25,22], Amoksyklaw® - (IR) [26,86], Co-amoxiclav Bluefish [27,29], Penlac [27,29], Amoksyklaw® - (IR) [27,45], Ramoclav [28,48], Augmentin® - (IR) [29,11], Augmentin® - (IR) [29,16], Augmentin® - (IR) [29,23], Auglavin PPH [31,00], Polamoklav [31,00], Amoksyklaw® [31,35], Augmentin® - (IR) [32,30], Augmentin® - (IR) [32,32], Augmentin® [34,92], Taromentin® [40,04]

Taromentin®: tabl. powł. 1 g - 21 szt.	Rx	100%	52,77
		Limit	44,98
		50% <sup>(1)</sup>	27,25
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Amoxicillin + Clavulanic acid* ATC: J01CR02 wyk: B EAN ~ 601244

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA

Odpowiedniki: Ramoclav [41,04], Taromentin® [52,77]

Tecfidera: kaps. dojelitowe, twarde 120 mg - 14 szt.	Rx-z	100%	1082,98
		Limit	541,49
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Dimethyl fumarate* ATC: N07XX09 wyk: B EAN ~ 415445

(1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego | Kat. ciąży: C  
Biogen Poland Sp. z o.o.

Tecfidera: kaps. dojelitowe, twarde 240 mg - 56 szt.	Rx-z	100%	4331,92
		Limit	4331,92
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Dimethyl fumarate* ATC: N07XX09 wyk: B EAN ~ 415452

(1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego | Kat. ciąży: C  
Biogen Poland Sp. z o.o.

Tegreto®: zaw. doust. 100 mg/5 ml - 1 but. 250 ml ◆	Rx	100%	21,39
		Limit	21,39
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(4)</sup>	3,20
S <sup>(5)</sup>	bezpł.		

INN: *Carbamazepine* ATC: N03AF01 wyk: B EAN ~ 341924

(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie OUN; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające; neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach innych niż określone w ChPL (5) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
Novartis Poland Sp. z o.o.

Tegreto®: zaw. doust. 100 mg/5 ml - 1 but. 100 ml ◆	Rx	100%	9,61
		Limit	8,56
		B <sup>(1)</sup>	1,05
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(4)</sup>	4,25
S <sup>(5)</sup>	bezpł.		

INN: *Carbamazepine* ATC: N03AF01 wyk: B EAN ~ 341917

(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie OUN; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające; neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach innych niż określone w ChPL (5) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
Novartis Poland Sp. z o.o.

Tegreto® CR 200: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 200 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	13,57
		Limit	11,34
		B <sup>(1)</sup>	2,23
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(4)</sup>	5,43
S <sup>(5)</sup>	bezpł.		

INN: *Carbamazepine* ATC: N03AF01 wyk: B EAN ~ 120215

(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie OUN; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające; neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach innych niż określone w ChPL (5) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
Novartis Poland Sp. z o.o.

Tegreto® CR 400: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 400 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	16,29
		Limit	13,61
		B <sup>(1)</sup>	2,68
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(4)</sup>	5,88
S <sup>(5)</sup>	bezpł.		

INN: *Carbamazepine* ATC: N03AF01 wyk: B EAN ~ 120116

(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacdzka WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie OUN; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające; neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach innych niż określone w ChPL (5) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
Novartis Poland Sp. z o.o.

Telam: tabl. 40/10 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	12,16
		Limit	10,70
		30% <sup>(1)</sup>	4,20
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Telmisartan + Amlodipine* ATC: C09DB04 wyk: B EAN ~ 061668

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciski tętna u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określone w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:D, T2:X, T3:X  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Telam [12,16], Teldipin® [13,40]

Telam: tabl. 40/5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	12,16
		Limit	10,70
		30% <sup>(1)</sup>	4,20
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Telmisartan + Amlodipine* ATC: C09DB04 wyk: B EAN ~ 061666

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciski tętna u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określone w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:D, T2:X, T3:X  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Telam [12,16], Teldipin® [13,40]

Telam: tabl. 80/10 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	23,30
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	7,49
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Telmisartan + Amlodipine* ATC: C09DB04 wyk: B EAN ~ 061672

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciski tętna u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określone w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:D, T2:X, T3:X  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Telam [23,30], Teldipin® [25,83]

Telam: tabl. 80/5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	23,30
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	7,49
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Telmisartan + Amlodipine* ATC: C09DB04 wyk: B EAN ~ 061670

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciski tętna u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określone w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:D, T2:X, T3:X  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Odpowiedniki: Telam [23,30], Teldipin® [25,83]

Teldipin®: tabl. 40/5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	13,40
		Limit	10,70
		30% <sup>(1)</sup>	5,91
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Telmisartan + Amlodipine* ATC: C09DB04 wyk: B EAN ~ 133854

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciski tętna u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określone w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:D, T2:X, T3:X  
Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Telam [12,16], Teldipin® [13,40]

Teldipin®: tabl. 40/10 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	13,40
		Limit	10,70
		30% <sup>(1)</sup>	5,91
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Telmisartan + Amlodipine* ATC: C09DB04 wyk: B EAN ~ 133862

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciski tętna u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określone w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:D, T2:X, T3:X  
Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Telam [12,16], Teldipin® [13,40]

Teldipin®: tabl. 80/5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	25,83
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	10,85
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Telmisartan + Amlodipine* ATC: C09DB04 wyk: B EAN ~ 133870

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciski tętna u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określone w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:D, T2:X, T3:X  
Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Telam [23,30], Teldipin® [25,83]

<b>Teldipin®: tabl. 80/10 mg - 28 szt. ◆</b> Rx 100% <b>25,83</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>10,85</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>		<b>Telexer: kaps. twarde 150 mg - 30 szt.</b> Rx 100% <b>72,31</b> Limit <b>70,28</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>23,11</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Telmisartan + Amlodipine</i>   ATC: C09DB04   wyk.: EAN ~ 133878 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:D, T2:X, T3:X <b>Krka Polska Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: Telam [23,30], Teldipin® [25,83]		INN: <i>Dabigatran etexilate</i>   ATC: B01AE07   wyk.: EAN ~ 403328 (1) Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płuca oraz prewencja nawrotów zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: Daxanlo [63,18], Telexer [72,31], Pradaxa® [133,36]	
<b>Teldipin®: tabl. 40/5 mg - 56 szt. ◆</b> Rx 100% <b>23,28</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>8,30</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>		<b>Telexer: kaps. twarde 150 mg - 60 szt.</b> Rx 100% <b>137,18</b> Limit <b>137,18</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>41,15</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Telmisartan + Amlodipine</i>   ATC: C09DB04   wyk.: EAN ~ 133856 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:D, T2:X, T3:X <b>Krka Polska Sp. z o.o.</b>		INN: <i>Dabigatran etexilate</i>   ATC: B01AE07   wyk.: EAN ~ 403329 (1) Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płuca oraz prewencja nawrotów zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: Daxanlo [118,93], Telexer [137,18], Pradaxa® [385,20]	
<b>Teldipin®: tabl. 40/5 mg - 84 szt. ◆</b> Rx 100% <b>33,84</b> Limit <b>32,10</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>11,37</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>		<b>Telexer: kaps. twarde 150 mg - 180 szt.</b> Rx 100% <b>388,19</b> Limit <b>388,19</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>116,46</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Telmisartan + Amlodipine</i>   ATC: C09DB04   wyk.: EAN ~ 133858 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:D, T2:X, T3:X <b>Krka Polska Sp. z o.o.</b>		INN: <i>Dabigatran etexilate</i>   ATC: B01AE07   wyk.: EAN ~ 403330 (1) Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płuca oraz prewencja nawrotów zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.</b>	
<b>Teldipin®: tabl. 80/5 mg - 56 szt. ◆</b> Rx 100% <b>43,99</b> Limit <b>42,80</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>14,03</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>		<b>Telmabax: tabl. 40 mg - 28 szt.</b> Rx 100% <b>12,07</b> Limit <b>10,70</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>4,58</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Telmisartan + Amlodipine</i>   ATC: C09DB04   wyk.: EAN ~ 133872 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:D, T2:X, T3:X <b>Krka Polska Sp. z o.o.</b>		INN: <i>Telmisartan</i>   ATC: C09CA07   wyk.: B   EAN ~ 060220 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D <b>Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tezeo - (IR) [11,23], Tezeo - (IR) [11,24], Telmisartan Bluefish [11,80], Telmisartan Mylan [11,91], <b>Telmabax [12,07]</b> , Zanacodar [12,77], Telmisartan Genoptim [12,86], Toplevelmi [13,41], Tezeo [13,46], Telmisartan EGIS [13,58], Actelsar [13,75], Tolura [14,61], Telmix [15,74], Telmizek [16,88], Polsart [17,16], Pritor® [18,81], Micardis® [24,02]	
<b>Teldipin®: tabl. 80/5 mg - 84 szt. ◆</b> Rx 100% <b>63,91</b> Limit <b>63,91</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>19,17</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>		<b>Telmabax: tabl. 80 mg - 28 szt.</b> Rx 100% <b>22,53</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>7,55</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Telmisartan + Amlodipine</i>   ATC: C09DB04   wyk.: EAN ~ 133874 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:D, T2:X, T3:X <b>Krka Polska Sp. z o.o.</b>		INN: <i>Telmisartan</i>   ATC: C09CA07   wyk.: B   EAN ~ 060268 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D <b>Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tolura - (IR) [X], Tolura - (IR) [20,22], Telmisartan EGIS - (IR) [21,31], Tezeo - (IR) [21,34], Tezeo - (IR) [21,34], <b>Telmabax [22,53]</b> , Telmisartan Mylan [22,65], Telmisartan Bluefish [22,75], Telmisartan EGIS - (IR) [22,99], Zanacodar [24,59], Telmisartan Genoptim [24,76], Pritor® [24,98], Toplevelmi [25,85], Tezeo [25,97], Telmisartan EGIS [26,19], Actelsar [26,88], Tolura [28,26], Telmix [30,52], Telmizek [32,79], Polsart [33,36], Micardis® [33,56]	
<b>Teldipin®: tabl. 80/10 mg - 56 szt. ◆</b> Rx 100% <b>43,99</b> Limit <b>42,80</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>14,03</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>		<b>Telmisartan + HCT Genoptim: tabl. 40/12,5 mg - 28 szt. ◆</b> Rx 100% <b>13,24</b> Limit <b>10,70</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,75</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	
INN: <i>Telmisartan + Amlodipine</i>   ATC: C09DB04   wyk.: EAN ~ 133880 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:D, T2:X, T3:X <b>Krka Polska Sp. z o.o.</b>		INN: <i>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09DA07   wyk.: EAN ~ 138815 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D <b>Synoptis Pharma Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: Toplevelmi HCT [12,31], <b>Telmisartan + HCT Genoptim [13,24]</b> , Telmix Plus [14,21], Tezeo HCT [15,23], Tolucombi [15,75], Telmisartan HCT EGIS [15,87], Zanacodar Combi [16,04], Polsart Plus [16,30], Telmizek HCT [17,47], PritorPlus® [28,41]	
<b>Teldipin®: tabl. 80/10 mg - 84 szt. ◆</b> Rx 100% <b>63,91</b> Limit <b>63,91</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>19,17</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>		<b>Telmisartan + HCT Genoptim: tabl. 80/12,5 mg - 28 szt. ◆</b> Rx 100% <b>25,51</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>10,53</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	
<b>Telexer: kaps. twarde 110 mg - 30 szt.</b> Rx 100% <b>54,45</b> Limit <b>51,54</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>18,37</b> R <sup>(2)</sup> <b>6,11</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>		INN: <i>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09DA07   wyk.: EAN ~ 138818 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D <b>Synoptis Pharma Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: Toplevelmi HCT [23,61], <b>Telmisartan + HCT Genoptim [25,51]</b> , Telmix Plus [27,46], Tezeo HCT [29,52], Tolucombi [30,55], Actelsar HCT [31,00], Telmisartan HCT EGIS [31,00], Gisartan [31,12], Zanacodar Combi [31,12], Polsart Plus [31,65], Telmizek HCT [33,98], PritorPlus® [35,35], MicardisPlus [38,59]	
INN: <i>Dabigatran etexilate</i>   ATC: B01AE07   wyk.: EAN ~ 403325 (1) Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płuca oraz prewencja nawrotów zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych(2) Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: Daxanlo [47,76], Telexer [54,45], Pradaxa® [131,73]		<b>Telmisartan + HCT Genoptim: tabl. 80/12,5 mg - 28 szt. ◆</b> Rx 100% <b>103,08</b> Limit <b>103,08</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>30,92</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	
<b>Telexer: kaps. twarde 110 mg - 60 szt.</b> Rx 100% <b>103,08</b> Limit <b>103,08</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>30,92</b> R <sup>(2)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>		INN: <i>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</i>   ATC: C09DA07   wyk.: EAN ~ 138818 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D <b>Synoptis Pharma Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: Toplevelmi HCT [23,61], <b>Telmisartan + HCT Genoptim [25,51]</b> , Telmix Plus [27,46], Tezeo HCT [29,52], Tolucombi [30,55], Actelsar HCT [31,00], Telmisartan HCT EGIS [31,00], Gisartan [31,12], Zanacodar Combi [31,12], Polsart Plus [31,65], Telmizek HCT [33,98], PritorPlus® [35,35], MicardisPlus [38,59]	
INN: <i>Dabigatran etexilate</i>   ATC: B01AE07   wyk.: EAN ~ 403326 (1) Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płuca oraz prewencja nawrotów zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych(2) Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: Pradaxa® [X], Daxanlo [89,71], Telexer [103,08]		<b>Telmisartan + HCT Genoptim: tabl. 80/12,5 mg - 28 szt. ◆</b> Rx 100% <b>25,51</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>10,53</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	



Naszym wyborem

**enarenal**  
 enalapryli maleas

<b>Telmisartan + HCT Genoptim: tabl. 80/25 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100%	<b>25,51</b>
		Limit	<b>21,40</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>10,53</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan + Hydrochlorothiazide** ATC: **C09DA07** wyk: **B** EAN ~ **138821**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**

Synoptis Pharma Sp. z o.o.  
**Odpowiedniki:** Toptelmi HCT [23,61], **Telmisartan + HCT Genoptim [25,51]**, Telmix Plus [27,46], Tezeo HCT [29,52], Tolucombi [30,55], Actelsar HCT [31,00], **Telmisartan HCT EGIS [31,00]**, Gisartan [31,12], Zanacodar Combi [31,12], Polsart Plus [31,65], **Telmizek HCT [33,98]**, PridorPlus® [35,35], **MicardisPlus [39,36]**

<b>Telmisartan Bluefish: tabl. 40 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	<b>11,80</b>
		Limit	<b>10,70</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>4,31</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan** ATC: **C09CA07** wyk: **B** EAN ~ **139171**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.: leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż.  
 (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**

Bluefish Pharmaceuticals  
**Odpowiedniki:** **Telmisartan Orion [X]**, **Telmisartanum Teva B.V. [X]**, Tezeo - (IR) [11,23], Tezeo - (IR) [11,24], **Telmisartan Bluefish [11,80]**, **Telmisartan Mylan [11,91]**, **Telmabax [12,07]**, **Zanacodar [12,77]**, **Telmisartan Mylan [22,65]**, **Telmisartan Bluefish [12,86]**, **Toptelmi [13,41]**, **Tezeo [13,46]**, **Telmisartan EGIS [13,58]**, **Actelsar [13,75]**, **Tolura [14,61]**, **Telmix [15,74]**, **Telmizek [16,88]**, **Polsart [17,16]**, **Pridor® [18,81]**, **Micardis® [24,02]**

<b>Telmisartan Bluefish: tabl. 80 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	<b>22,75</b>
		Limit	<b>21,40</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>7,77</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan** ATC: **C09CA07** wyk: **B** EAN ~ **139172**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.: leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż.  
 (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**

Bluefish Pharmaceuticals  
**Odpowiedniki:** **Telmisartan Orion [X]**, **Telmisartanum Teva B.V. [X]**, **Tolura - (IR) [X]**, **Tolura - (IR) [20,22]**, **Telmisartan EGIS - (IR) [21,31]**, **Tezeo - (IR) [21,34]**, **Tezeo - (IR) [21,34]**, **Telmabax [22,53]**, **Telmisartan Mylan [22,65]**, **Telmisartan Bluefish [22,75]**, **Telmisartan EGIS - (IR) [22,99]**, **Zanacodar [24,59]**, **Telmisartan Genoptim [24,76]**, **Pridor® [24,98]**, **Toptelmi [25,85]**, **Tezeo [25,97]**, **Telmisartan EGIS [26,19]**, **Actelsar [26,88]**, **Tolura [28,26]**, **Telmix [30,52]**, **Telmizek [32,79]**, **Polsart [33,36]**, **Micardis® [33,56]**

<b>Telmisartan EGIS: tabl. powł. 40 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	<b>13,58</b>
		Limit	<b>10,70</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>6,09</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan** ATC: **C09CA07** wyk: **B** EAN ~ **036768**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.: leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż.  
 (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**

Egis Polska Sp. z o.o.  
**Odpowiedniki:** **Telmisartan Orion [X]**, **Telmisartanum Teva B.V. [X]**, **Tezeo - (IR) [11,23]**, **Tezeo - (IR) [11,24]**, **Telmisartan Bluefish [11,80]**, **Telmisartan Mylan [11,91]**, **Telmabax [12,07]**, **Zanacodar [12,77]**, **Telmisartan Genoptim [12,86]**, **Toptelmi [13,41]**, **Tezeo [13,46]**, **Telmisartan EGIS [13,58]**, **Actelsar [13,75]**, **Tolura [14,61]**, **Telmix [15,74]**, **Telmizek [16,88]**, **Polsart [17,16]**, **Pridor® [18,81]**, **Micardis® [24,02]**

<b>Telmisartan EGIS: tabl. powł. 80 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	<b>26,19</b>
		Limit	<b>21,40</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>11,21</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan** ATC: **C09CA07** wyk: **B** EAN ~ **036867**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.: leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż.  
 (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**

Egis Polska Sp. z o.o.  
**Odpowiedniki:** **Telmisartan Orion [X]**, **Telmisartanum Teva B.V. [X]**, **Tolura - (IR) [X]**, **Tolura - (IR) [20,22]**, **Telmisartan EGIS - (IR) [21,31]**, **Tezeo - (IR) [21,34]**, **Tezeo - (IR) [21,34]**, **Telmabax [22,53]**, **Telmisartan Mylan [22,65]**, **Telmisartan Bluefish [22,75]**, **Telmisartan EGIS - (IR) [22,99]**, **Zanacodar [24,59]**, **Telmisartan Genoptim [24,76]**, **Pridor® [24,98]**, **Toptelmi [25,85]**, **Tezeo [25,97]**, **Telmisartan EGIS [26,19]**, **Actelsar [26,88]**, **Tolura [28,26]**, **Telmix [30,52]**, **Telmizek [32,79]**, **Polsart [33,36]**, **Micardis® [33,56]**

<b>Telmisartan EGIS - (IR): tabl. powł. 80 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	<b>22,99</b>
		Limit	<b>21,40</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>8,01</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan** ATC: **C09CA07** wyk: **B** EAN ~ **229801**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.: leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż.  
 (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**

Inpharm Sp. z o.o.  
**Odpowiedniki:** **Telmisartan Orion [X]**, **Telmisartanum Teva B.V. [X]**, **Tolura - (IR) [X]**, **Tolura - (IR) [20,22]**, **Telmisartan EGIS - (IR) [21,31]**, **Tezeo - (IR) [21,34]**, **Tezeo - (IR) [21,34]**, **Telmabax [22,53]**, **Telmisartan Mylan [22,65]**, **Telmisartan Bluefish [22,75]**, **Telmisartan EGIS - (IR) [22,99]**, **Zanacodar [24,59]**, **Telmisartan Genoptim [24,76]**, **Pridor® [24,98]**, **Toptelmi [25,85]**, **Tezeo [25,97]**, **Telmisartan EGIS [26,19]**, **Actelsar [26,88]**, **Tolura [28,26]**, **Telmix [30,52]**, **Telmizek [32,79]**, **Polsart [33,36]**, **Micardis® [33,56]**

<b>Telmisartan EGIS - (IR): tabl. powł. 80 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	<b>21,31</b>
		Limit	<b>21,31</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>6,39</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan** ATC: **C09CA07** wyk: **B** EAN ~ **146135**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.: leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż.  
 (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**

Delfarma Sp. z o.o.  
**Odpowiedniki:** **Telmisartan Orion [X]**, **Telmisartanum Teva B.V. [X]**, **Tolura - (IR) [X]**, **Tolura - (IR) [20,22]**, **Telmisartan EGIS - (IR) [21,31]**, **Tezeo - (IR) [21,34]**, **Tezeo - (IR) [21,34]**, **Telmabax [22,53]**, **Telmisartan Mylan [22,65]**, **Telmisartan Bluefish [22,75]**, **Telmisartan EGIS - (IR) [22,99]**, **Zanacodar [24,59]**, **Telmisartan Genoptim [24,76]**, **Pridor® [24,98]**, **Toptelmi [25,85]**, **Tezeo [25,97]**, **Telmisartan EGIS [26,19]**, **Actelsar [26,88]**, **Tolura [28,26]**, **Telmix [30,52]**, **Telmizek [32,79]**, **Polsart [33,36]**, **Micardis® [33,56]**

<b>Telmisartan Genoptim: tabl. 40 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	<b>12,86</b>
		Limit	<b>10,70</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>5,37</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan** ATC: **C09CA07** wyk: **B** EAN ~ **138800**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.: leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż.  
 (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**

Synoptis Pharma Sp. z o.o.  
**Odpowiedniki:** **Telmisartan Orion [X]**, **Telmisartanum Teva B.V. [X]**, **Tezeo - (IR) [11,23]**, **Tezeo - (IR) [11,24]**, **Telmisartan Bluefish [11,80]**, **Telmisartan Mylan [11,91]**, **Telmabax [12,07]**, **Zanacodar [12,77]**, **Telmisartan Genoptim [12,86]**, **Toptelmi [13,41]**, **Tezeo [13,46]**, **Telmisartan EGIS [13,58]**, **Actelsar [13,75]**, **Tolura [14,61]**, **Telmix [15,74]**, **Telmizek [16,88]**, **Polsart [17,16]**, **Pridor® [18,81]**, **Micardis® [24,02]**

<b>Telmisartan Genoptim: tabl. 80 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	<b>24,76</b>
		Limit	<b>21,40</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>9,78</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan** ATC: **C09CA07** wyk: **B** EAN ~ **138803**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.: leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż.  
 (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**

Synoptis Pharma Sp. z o.o.  
**Odpowiedniki:** **Telmisartan Orion [X]**, **Telmisartanum Teva B.V. [X]**, **Tolura - (IR) [X]**, **Tolura - (IR) [20,22]**, **Telmisartan EGIS - (IR) [21,31]**, **Tezeo - (IR) [21,34]**, **Tezeo - (IR) [21,34]**, **Telmabax [22,53]**, **Telmisartan Mylan [22,65]**, **Telmisartan Bluefish [22,75]**, **Telmisartan EGIS - (IR) [22,99]**, **Zanacodar [24,59]**, **Telmisartan Genoptim [24,76]**, **Pridor® [24,98]**, **Toptelmi [25,85]**, **Tezeo [25,97]**, **Telmisartan EGIS [26,19]**, **Actelsar [26,88]**, **Tolura [28,26]**, **Telmix [30,52]**, **Telmizek [32,79]**, **Polsart [33,36]**, **Micardis® [33,56]**

<b>Telmisartan HCT EGIS: tabl. 40/12,5 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	<b>15,87</b>
		Limit	<b>10,70</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>8,38</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan + Hydrochlorothiazide** ATC: **C09DA07** wyk: **B** EAN ~ **073732**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**

Egis Polska Sp. z o.o.  
**Odpowiedniki:** **Toptelmi HCT [12,31]**, **Telmisartan + HCT Genoptim [13,24]**, **Telmix Plus [14,21]**, **Tezeo HCT [15,23]**, **Tolucombi [15,75]**, **Telmisartan HCT EGIS [15,87]**, **Zanacodar Combi [16,04]**, **Polsart Plus [16,30]**, **Telmizek HCT [17,47]**, **PridorPlus® [28,41]**

<b>Telmisartan HCT EGIS: tabl. 80/12,5 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	<b>31,00</b>
		Limit	<b>21,40</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>16,02</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan + Hydrochlorothiazide** ATC: **C09DA07** wyk: **B** EAN ~ **073848**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**

Egis Polska Sp. z o.o.  
**Odpowiedniki:** **Toptelmi HCT [23,61]**, **Telmisartan + HCT Genoptim [25,51]**, **Telmix Plus [27,46]**, **Tezeo HCT [29,52]**, **Tolucombi [30,55]**, **Actelsar HCT [31,00]**, **Telmisartan HCT EGIS [31,00]**, **Gisartan [31,12]**, **Zanacodar Combi [31,12]**, **Polsart Plus [31,65]**, **Telmizek HCT [33,98]**, **PridorPlus® [35,35]**, **MicardisPlus [38,59]**

<b>Telmisartan HCT EGIS: tabl. 80/25 mg - 28 szt.</b>	Rx	100%	<b>31,00</b>
		Limit	<b>21,40</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>16,02</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan + Hydrochlorothiazide** ATC: **C09DA07** wyk: **B** EAN ~ **073909**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**

Egis Polska Sp. z o.o.  
**Odpowiedniki:** **Toptelmi HCT [23,61]**, **Telmisartan + HCT Genoptim [25,51]**, **Telmix Plus [27,46]**, **Tezeo HCT [29,52]**, **Tolucombi [30,55]**, **Actelsar HCT [31,00]**, **Telmisartan HCT EGIS [31,00]**, **Gisartan [31,12]**, **Zanacodar Combi [31,12]**, **Polsart Plus [31,65]**, **Telmizek HCT [33,98]**, **PridorPlus® [35,35]**, **MicardisPlus [39,36]**

<b>Telmisartan Mylan: tabl. 40 mg - 28 szt.</b>	Rx 100% <b>11,91</b> Limit <b>10,70</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>4,42</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Telmix Plus: tabl. 40/12,5 mg - 28 szt.</b>	Rx 100% <b>14,21</b> Limit <b>10,70</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>6,72</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Telmisartan</b>   ATC: <b>C09CA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>018429</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP</b> : Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>   <b>Viatris Ltd</b> Odpowiedniki: Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tezeo - (IR) [11,23], Tezeo - (IR) [11,24], Telmisartan Bluefish [11,80], <b>Telmisartan Mylan [11,91]</b> , Telmabax [12,07], Znacodar [12,77], Telmisartan Genoptim [12,86], Topleftmi [13,41], Tezeo [13,46], Telmisartan EGIS [13,58], Actelsar [13,75], Tolura [14,61], Telmix [15,74], Telmizek [16,88], Polsart [17,16], Pritor® [18,81], Micardis® [24,02]		INN: <b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: <b>C09DA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>141793</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP</b> : Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>   <b>Biofarm Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: Topleftmi HCT [12,31], Telmisartan + HCT Genoptim [13,24], <b>Telmix Plus [14,21]</b> , Tezeo HCT [15,23], Tolucombi [15,75], Telmisartan HCT EGIS [15,87], Znacodar Combi [16,04], Polsart Plus [16,30], Telmizek HCT [17,47], PritorPlus® [28,41]	
<b>Telmisartan Mylan: tabl. 80 mg - 28 szt.</b>	Rx 100% <b>22,65</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>7,67</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Telmix Plus: tabl. 80/25 mg - 28 szt.</b>	Rx 100% <b>27,46</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>12,48</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Telmisartan</b>   ATC: <b>C09CA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>018436</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP</b> : Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>   <b>Viatris Ltd</b> Odpowiedniki: Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tolura - (IR) [X], Tolura - (IR) [20,22], Telmisartan EGIS - (IR) [21,31], Tezeo - (IR) [21,34], Telmabax [22,53], <b>Telmisartan Mylan [22,65]</b> , Telmisartan Bluefish [22,75], Telmisartan EGIS - (IR) [22,99], Znacodar [24,59], Telmisartan Genoptim [24,76], Pritor® [24,98], Topleftmi [25,85], Tezeo [25,97], Telmisartan EGIS [26,19], Actelsar [26,88], Tolura [28,26], Telmix [30,52], Telmizek [32,79], Polsart [33,36], Micardis® [33,56]		INN: <b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: <b>C09DA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>141800</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP</b> : Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>   <b>Biofarm Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: Topleftmi HCT [23,61], Telmisartan + HCT Genoptim [25,51], <b>Telmix Plus [27,46]</b> , Tezeo HCT [29,52], Tolucombi [30,55], Actelsar HCT [31,00], Telmisartan HCT EGIS [31,00], Gisartan [31,12], Znacodar Combi [31,12], Polsart Plus [31,65], Telmizek HCT [33,98], PritorPlus® [35,35], MicardisPlus [39,36]	
<b>Telmix: tabl. 40 mg - 28 szt.</b>	Rx 100% <b>15,74</b> Limit <b>10,70</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>8,25</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Telmix Plus: tabl. 80/12,5 mg - 28 szt.</b>	Rx 100% <b>27,46</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>12,48</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Telmisartan</b>   ATC: <b>C09CA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>974863</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP</b> : Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>   <b>Biofarm Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tezeo - (IR) [11,23], Tezeo - (IR) [11,24], Telmisartan Bluefish [11,80], Telmisartan Mylan [11,91], Telmabax [12,07], Znacodar [12,77], Telmisartan Genoptim [12,86], Topleftmi [13,41], Tezeo [13,46], Telmisartan EGIS [13,58], Actelsar [13,75], Tolura [14,61], <b>Telmix [15,74]</b> , Telmizek [16,88], Polsart [17,16], Pritor® [18,81], Micardis® [24,02]		INN: <b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: <b>C09DA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>141796</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP</b> : Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>   <b>Biofarm Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: Topleftmi HCT [23,61], Telmisartan + HCT Genoptim [25,51], <b>Telmix Plus [27,46]</b> , Tezeo HCT [29,52], Tolucombi [30,55], Actelsar HCT [31,00], Telmisartan HCT EGIS [31,00], Gisartan [31,12], Znacodar Combi [31,12], Polsart Plus [31,65], Telmizek HCT [33,98], PritorPlus® [35,35], MicardisPlus [38,59]	
<b>Telmix: tabl. 40 mg - 56 szt.</b>	Rx 100% <b>26,74</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>11,76</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Telmizek: tabl. 40 mg - 28 szt.</b>	Rx 100% <b>16,88</b> Limit <b>10,70</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>9,39</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Telmisartan</b>   ATC: <b>C09CA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>974887</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP</b> : Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b>   <b>Biofarm Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: Tezeo - (IR) [21,34], Tezeo - (IR) [21,34], Topleftmi [21,38], Tezeo [25,85], <b>Telmix [26,74]</b> , Tolura [32,04]		INN: <b>Telmisartan</b>   ATC: <b>C09CA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>902002</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP</b> : Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>   <b>Adamed Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tezeo - (IR) [11,23], Tezeo - (IR) [11,24], Telmisartan Bluefish [11,80], Telmisartan Mylan [11,91], Telmabax [12,07], Znacodar [12,77], Telmisartan Genoptim [12,86], Topleftmi [13,41], Tezeo [13,46], Telmisartan EGIS [13,58], Actelsar [13,75], Tolura [14,61], Telmix [15,74], <b>Telmizek [16,88]</b> , Polsart [17,16], Pritor® [18,81], Micardis® [24,02]	
<b>Telmix: tabl. 80 mg - 28 szt.</b>	Rx 100% <b>30,52</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>15,54</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Telmizek: tabl. 80 mg - 28 szt.</b>	Rx 100% <b>32,79</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>17,81</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Telmisartan</b>   ATC: <b>C09CA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>974979</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP</b> : Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b>   <b>Biofarm Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tolura - (IR) [X], Tolura - (IR) [20,22], Telmisartan EGIS - (IR) [21,31], Tezeo - (IR) [21,34], Tezeo - (IR) [21,34], Telmabax [22,53], Telmisartan Mylan [22,65], Telmisartan Bluefish [22,75], Telmisartan EGIS - (IR) [22,99], Znacodar [24,59], Telmisartan Genoptim [24,76], Pritor® [24,98], Topleftmi [25,85], Tezeo [25,97], Telmisartan EGIS [26,19], Actelsar [26,88], Tolura [28,26], <b>Telmix [30,52]</b> , Telmizek [32,79], Polsart [33,36], Micardis® [33,56]		INN: <b>Telmisartan</b>   ATC: <b>C09CA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>902095</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP</b> : Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>   <b>Adamed Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tezeo - (IR) [11,23], Tezeo - (IR) [11,24], Telmisartan EGIS - (IR) [21,31], Tezeo - (IR) [21,34], Tezeo - (IR) [21,34], Telmabax [22,53], Telmisartan Mylan [22,65], Telmisartan Bluefish [22,75], Telmisartan EGIS - (IR) [22,99], Znacodar [24,59], Telmisartan Genoptim [24,76], Pritor® [24,98], Topleftmi [25,85], Tezeo [25,97], Telmisartan EGIS [26,19], Actelsar [26,88], Tolura [28,26], Telmix [30,52], <b>Telmizek [32,79]</b> , Polsart [33,36], Micardis® [33,56]	<b>Telmizek HCT: tabl. 40/12,5 mg - 28 szt.</b>
<b>Telmix: tabl. 80 mg - 56 szt.</b>	Rx 100% <b>50,93</b> Limit <b>42,80</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>20,97</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	<b>Telmix HCT: tabl. 40/12,5 mg - 28 szt.</b>	Rx 100% <b>17,47</b> Limit <b>10,70</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>9,98</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Telmisartan</b>   ATC: <b>C09CA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>974993</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP</b> : Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>   <b>Biofarm Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: Tolura - (IR) [X], Tolura - (IR) [37,88], Tezeo - (IR) [40,11], Tezeo - (IR) [40,13], Topleftmi [40,19], Tezeo [49,15], <b>Telmix [50,93]</b> , Tolura [61,51]		INN: <b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: <b>C09DA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>082338</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP</b> : Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>   <b>Adamed Sp. z o.o.</b> Odpowiedniki: Topleftmi HCT [23,61], Telmisartan + HCT Genoptim [25,51], <b>Telmix Plus [27,46]</b> , Tezeo HCT [29,52], Tolucombi [30,55], Actelsar HCT [31,00], Telmisartan HCT EGIS [31,00], Gisartan [31,12], Znacodar Combi [31,12], Polsart Plus [31,65], <b>Telmizek HCT [33,98]</b> , PritorPlus® [35,35], MicardisPlus [38,59]	<b>Telmizek HCT: tabl. 80/12,5 mg - 28 szt.</b>



**METRONIDAZOL**  
METRONIDAZOL  
POLPHARMA  
Metronidazolium

**ZAKODOWANY DO WALKI  
Z ZAKAŻENIEM**

<b>Telmizek HCT:</b> tabl. 80/25 mg - 28 szt.	Rx	100% <b>33,98</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>19,00</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: <b>C09DA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>082598</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> <b>Adamed Sp. z o.o.</b>		
<b>Opowiedniki:</b> Toptelmi HCT [23,61], Telmisartan + HCT Genoptim [25,51], Telmix Plus [27,46], Tezeo HCT [29,52], Tolucombi [30,55], Actelsar HCT [31,00], Telmisartan HCT EGIS [31,00], Gisartan [31,12], Zanacodar Combi [31,12], Polsart Plus [31,65], <b>Telmizek HCT [33,98]</b> , PritorPlus® [35,35], MicardisPlus [39,36]		
<b>Tenox®:</b> tabl. 5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100% <b>8,48</b> Limit <b>8,48</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>2,54</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Amlodipine</b>   ATC: <b>C08CA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>963010</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Objaw Raynauda związany z twardzina układową - leczenie pierwszoliniowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> <b>Krka Polska Sp. z o.o.</b>		
<b>Opowiedniki:</b> Almiden [X], Amlodipine Aurobindo [X], Finamlox [X], Amlodipine Aurovitas [6,15], Amlodipine Bluefish [6,86], Amlomyl [7,02], Normodipine® [7,34], Amlonor® [7,56], ApoAmlo 5 [7,78], Cardiolipin [7,99], Agen® 5 [8,03], Adipine [8,21], Vilpin® [8,26], Alneta [8,48], <b>Tenox® [8,48]</b> , Aldan® [8,64], Amlopin® [9,23], Amlozek® [13,79]		
<b>Tenox®:</b> tabl. 5 mg - 90 szt. ◆	Rx	100% <b>23,14</b> Limit <b>23,14</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>6,94</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Amlodipine</b>   ATC: <b>C08CA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>421824</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Objaw Raynauda związany z twardzina układową - leczenie pierwszoliniowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> <b>Krka Polska Sp. z o.o.</b>		
<b>Opowiedniki:</b> Almiden [X], <b>Tenox® [23,14]</b>		
<b>Tenox®:</b> tabl. 10 mg - 30 szt. ◆	Rx	100% <b>15,88</b> Limit <b>15,88</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>4,76</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Amlodipine</b>   ATC: <b>C08CA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>963119</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Objaw Raynauda związany z twardzina układową - leczenie pierwszoliniowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> <b>Krka Polska Sp. z o.o.</b>		
<b>Opowiedniki:</b> Almiden [X], Amlodipine Aurobindo [X], Finamlox [X], Amlodipine Aurovitas [11,03], Amlodipine Bluefish [11,72], Amlomyl [12,00], Normodipine® [13,58], Adipine [13,62], Amlonor® [14,55], Amlopin® - (IR) [14,68], Amlopin® - (IR) [14,68], Amlopin® - (IR) [14,73], Cardiolipin [14,85], Agen® 10 [14,90], ApoAmlo 10 [14,98], Vilpin® [15,65], Aldan® [15,88], Alneta [15,88], <b>Tenox® [15,88]</b> , Amlopin® [17,54], Amlozek® [20,26]		
<b>Tensart:</b> tabl. powł. 80 mg - 28 szt.	Rx	100% <b>13,46</b> Limit <b>10,70</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,97</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Valsartan</b>   ATC: <b>C09CA03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>681877</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> <b>Egis Polska Sp. z o.o.</b>		
<b>Opowiedniki:</b> Apo-Valsart [X], AuroValsart [17,89], Valsartan Medical Valley [17,89], Valtap [18,18], Valzek [24,82], <b>Tensart [25,22]</b> , Bespres [26,19], Avasart [26,77], Valsacor® 80 mg tabletki powlekane [14,02], Avasart [14,15], Dipper-Mono [14,15], Vanatex® [14,15], Diovan® [22,42]		
<b>Tensart:</b> tabl. powł. 160 mg - 28 szt.	Rx	100% <b>25,22</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>10,24</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Valsartan</b>   ATC: <b>C09CA03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>682065</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> <b>Egis Polska Sp. z o.o.</b>		
<b>Opowiedniki:</b> Apo-Valsart [X], AuroValsart [17,89], Valsartan Medical Valley [17,89], Valtap [18,18], Valzek [24,82], <b>Tensart [25,22]</b> , Bespres [26,19], Avasart [26,77], Valsacor® 160 mg tabletki powlekane [27,09], Dipper-Mono [27,34], Vanatex® [27,34], Diovan® [33,54]		
<b>Tensart HCT:</b> tabl. powł. 160/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100% <b>25,22</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>10,24</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Valsartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: <b>C09DA03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>704132</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> <b>Egis Polska Sp. z o.o.</b>		
<b>Opowiedniki:</b> AuroValsart HCT [18,18], Valtap HCT [18,18], <b>Tensart HCT [25,22]</b> , Co-Valsacor [27,09], Co-Bespres [27,34], Co-Dipper [27,40], Vanatex® HCT [28,20]		

<b>Tensart HCT:</b> tabl. powł. 160/25 mg - 28 szt.	Rx	100% <b>25,22</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>10,24</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Valsartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: <b>C09DA03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>704262</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> <b>Egis Polska Sp. z o.o.</b>		
<b>Opowiedniki:</b> AuroValsart HCT [18,18], Valtap HCT [18,30], Co-Bespres - (IR) [22,19], <b>Tensart HCT [25,22]</b> , Co-Valsacor [27,09], Co-Dipper [27,40], Co-Bespres [27,46], Vanatex® HCT [28,20]		
<b>Tertensif® Bi-Kombi:</b> tabl. powł. 10/2,5 mg - 30 szt.	Rx	100% <b>41,02</b> Limit <b>11,17</b> R <sup>(1)</sup> <b>36,25</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Perindopril arginine + Indapamide</b>   ATC: <b>C09BA04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>715206</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> <b>Servier Polska Sp. z o.o.</b>		
<b>Opowiedniki:</b> Noliprel® Bi-Forte [41,02], <b>Tertensif® Bi-Kombi [41,02]</b>		
<b>Tertensif® Kombi:</b> tabl. powł. 5/1,25 mg - 30 szt.	Rx	100% <b>26,67</b> Limit <b>5,58</b> R <sup>(1)</sup> <b>24,29</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Perindopril arginine + Indapamide</b>   ATC: <b>C09BA04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>055678</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> <b>Servier Polska Sp. z o.o.</b>		
<b>Opowiedniki:</b> Noliprel® Forte [26,67], <b>Tertensif® Kombi [26,67]</b>		
<b>Tertensif® SR:</b> tabl. powł. o przedl. uwalnianiu 1,5 mg - 30 szt.	Rx	100% <b>13,48</b> Limit <b>9,18</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>7,05</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Indapamide</b>   ATC: <b>C03BA11</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>738212</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> <b>Servier Polska Sp. z o.o.</b>		
<b>Opowiedniki:</b> Ipres long 1,5 [X], Indapamide SR Genoptim [8,02], Sympamid SR [8,10], Rawel® SR [8,14], Indix SR [8,30], Opamid [9,37], Indapen® SR [11,52], Diuresin® SR [11,53], <b>Tertensif® SR [13,48]</b>		
<b>Tetmodis:</b> tabl. 25 mg - 112 szt.	Rx	100% <b>434,06</b> Limit <b>434,06</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Tetrabenazine</b>   ATC: <b>N07XX06</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>805594</b> (1) Hiperkinetyczne zaburzenia motoryczne w chorobie Huntingtona(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> <b>Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH</b>		
<b>Texibax:</b> tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt.	Rx	100% <b>9,15</b> Limit <b>8,29</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>5,01</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Esomeprazole</b>   ATC: <b>A02BC05</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>268275</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> <b>Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.</b>		
<b>Opowiedniki:</b> <b>Texibax [9,15]</b> , Emanara [9,27], Helides [9,59]		
<b>Texibax:</b> tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt.	Rx	100% <b>17,30</b> Limit <b>16,58</b> 50% <sup>(1)</sup> <b>9,01</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Esomeprazole</b>   ATC: <b>A02BC05</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>268282</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> <b>Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.</b>		
<b>Opowiedniki:</b> <b>Texibax [17,30]</b> , Emanara [17,55], Helides [18,21]		
<b>Tezeo:</b> tabl. 40 mg - 28 szt.	Rx	100% <b>13,46</b> Limit <b>10,70</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,97</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Telmisartan</b>   ATC: <b>C09CA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>818082</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> <b>Zentiva PL Sp. z o.o.</b>		
<b>Opowiedniki:</b> Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tezeo - (IR) [11,23], Tezeo - (IR) [11,24], Telmisartan Bluefish [11,80], Telmisartan Mylan [11,91], Telmixab [12,07], Zanacodar [12,77], Telmisartan Genoptim [12,86], Toptelmi [13,41], <b>Tezeo [13,46]</b> , Telmisartan EGIS [13,58], Actelsar [13,75], Tolura [14,61], Telmix [15,74], Telmizek [16,88], Polsart [17,16], Pritor® [18,81], Micardis® [24,02]		





Tezeo: tabl. 40 mg - 56 szt.	Rx	100%	25,85
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	10,87
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Telmisartan</b>	ATC: <b>C09CA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>086626</b>
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>			
Zentiva PL Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Tezeo - (IR) [21,34], Tezeo - (IR) [21,34], Toplevelmi [21,38], Tezeo [25,85], Telmix [26,74], Tolura [32,04]			

Tezeo: tabl. 80 mg - 28 szt.	Rx	100%	25,97
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	10,99
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Telmisartan</b>	ATC: <b>C09CA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>818150</b>
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>			
Zentiva PL Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tolura - (IR) [X], Tolura - (IR) [20,22], Telmisartan EGIS - (IR) [21,31], Tezeo - (IR) [21,34], Tezeo - (IR) [21,34], Telmabax [22,53], Telmisartan Mylan [22,65], Telmisartan Bluefish [22,75], Telmisartan EGIS - (IR) [22,99], Zanafadar [24,59], Telmisartan Genoptim [24,76], Pritor® [24,98], Toplevelmi [25,85], Tezeo [25,97], Telmisartan EGIS [26,19], Actelsar [26,88], Tolura [28,26], Telmix [30,52], Telmizek [32,79], Polsart [33,36], Micardis® [33,56]			

Tezeo: tabl. 80 mg - 56 szt.	Rx	100%	49,15
		Limit	42,80
		30% <sup>(1)</sup>	19,19
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Telmisartan</b>	ATC: <b>C09CA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>086633</b>
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>			
Zentiva PL Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Tolura - (IR) [X], Tolura - (IR) [37,88], Tezeo - (IR) [40,11], Tezeo - (IR) [40,13], Toplevelmi [40,19], Tezeo [49,15], Telmix [50,93], Tolura [61,51]			

Tezeo - (IR): tabl. 40 mg - 28 szt.	Rx	100%	11,23
		Limit	10,70
		30% <sup>(1)</sup>	3,74
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Telmisartan</b>	ATC: <b>C09CA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>142355</b>
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> Inpharm Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tezeo - (IR) [11,23], Tezeo - (IR) [11,24], Telmisartan Bluefish [11,80], Telmisartan Mylan [11,91], Telmabax [12,07], Zanafadar [12,77], Telmisartan Genoptim [12,86], Toplevelmi [13,41], Tezeo [13,46], Telmisartan EGIS [13,58], Actelsar [13,75], Tolura [14,61], Telmix [15,74], Telmizek [16,88], Polsart [17,16], Pritor® [18,81], Micardis® [24,02]			

Tezeo - (IR): tabl. 40 mg - 28 szt.	Rx	100%	11,24
		Limit	10,70
		30% <sup>(1)</sup>	3,75
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Telmisartan</b>	ATC: <b>C09CA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>142356</b>
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> Delfarma Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tezeo - (IR) [11,23], Tezeo - (IR) [11,24], Telmisartan Bluefish [11,80], Telmisartan Mylan [11,91], Telmabax [12,07], Zanafadar [12,77], Telmisartan Genoptim [12,86], Toplevelmi [13,41], Tezeo [13,46], Telmisartan EGIS [13,58], Actelsar [13,75], Tolura [14,61], Telmix [15,74], Telmizek [16,88], Polsart [17,16], Pritor® [18,81], Micardis® [24,02]			

Tezeo - (IR): tabl. 40 mg - 56 szt.	Rx	100%	21,34
		Limit	21,34
		30% <sup>(1)</sup>	6,40
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Telmisartan</b>	ATC: <b>C09CA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>142356</b>
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> Inpharm Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Tezeo - (IR) [21,34], Tezeo - (IR) [21,34], Toplevelmi [21,38], Tezeo [25,85], Telmix [26,74], Tolura [32,04]			

Tezeo - (IR): tabl. 40 mg - 56 szt.	Rx	100%	21,34
		Limit	21,34
		30% <sup>(1)</sup>	6,40
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Telmisartan</b>	ATC: <b>C09CA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>145307</b>
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> Delfarma Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Tezeo - (IR) [21,34], Tezeo - (IR) [21,34], Toplevelmi [21,38], Tezeo [25,85], Telmix [26,74], Tolura [32,04]			

Tezeo - (IR): tabl. 80 mg - 28 szt.	Rx	100%	21,34
		Limit	21,34
		30% <sup>(1)</sup>	6,40
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Telmisartan</b>	ATC: <b>C09CA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>142357</b>
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> Inpharm Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tolura - (IR) [X], Tolura - (IR) [20,22], Telmisartan EGIS - (IR) [21,31], Tezeo - (IR) [21,34], Tezeo - (IR) [21,34], Telmabax [22,53], Telmisartan Mylan [22,65], Telmisartan Bluefish [22,75], Telmisartan EGIS - (IR) [22,99], Zanafadar [24,59], Telmisartan Genoptim [24,76], Pritor® [24,98], Toplevelmi [25,85], Tezeo [25,97], Telmisartan EGIS [26,19], Actelsar [26,88], Tolura [28,26], Telmix [30,52], Telmizek [32,79], Polsart [33,36], Micardis® [33,56]			

Tezeo - (IR): tabl. 80 mg - 28 szt.	Rx	100%	21,34
		Limit	21,34
		30% <sup>(1)</sup>	6,40
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Telmisartan</b>	ATC: <b>C09CA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>145329</b>
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> Delfarma Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tolura - (IR) [X], Tolura - (IR) [20,22], Telmisartan EGIS - (IR) [21,31], Tezeo - (IR) [21,34], Tezeo - (IR) [21,34], Telmabax [22,53], Telmisartan Mylan [22,65], Telmisartan Bluefish [22,75], Telmisartan EGIS - (IR) [22,99], Zanafadar [24,59], Telmisartan Genoptim [24,76], Pritor® [24,98], Toplevelmi [25,85], Tezeo [25,97], Telmisartan EGIS [26,19], Actelsar [26,88], Tolura [28,26], Telmix [30,52], Telmizek [32,79], Polsart [33,36], Micardis® [33,56]			

Tezeo - (IR): tabl. 80 mg - 56 szt.	Rx	100%	40,11
		Limit	40,11
		30% <sup>(1)</sup>	12,03
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Telmisartan</b>	ATC: <b>C09CA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>142358</b>
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> Inpharm Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Tolura - (IR) [X], Tolura - (IR) [37,88], Tezeo - (IR) [40,11], Tezeo - (IR) [40,13], Toplevelmi [40,19], Tezeo [49,15], Telmix [50,93], Tolura [61,51]			

Tezeo - (IR): tabl. 80 mg - 56 szt.	Rx	100%	40,13
		Limit	40,13
		30% <sup>(1)</sup>	12,04
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Telmisartan</b>	ATC: <b>C09CA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>145330</b>
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> Delfarma Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Tolura - (IR) [X], Tolura - (IR) [37,88], Tezeo - (IR) [40,11], Tezeo - (IR) [40,13], Toplevelmi [40,19], Tezeo [49,15], Telmix [50,93], Tolura [61,51]			

Tezeo HCT: tabl. 40/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	15,23
		Limit	10,70
		30% <sup>(1)</sup>	7,74
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b>	ATC: <b>C09DA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>095994</b>
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> Zentiva PL Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Toplevelmi HCT [13,21], Telmisartan + HCT Genoptim [13,24], Telmix Plus [14,21], Tezeo HCT [15,23], Tolucombi [15,75], Telmisartan HCT EGIS [15,87], Zanafadar Combi [16,04], Polsart Plus [16,30], Telmizek HCT [17,47], PritorPlus® [28,41]			

Tezeo HCT: tabl. 40/12,5 mg - 56 szt.	Rx	100%	29,52
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	14,54
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b>	ATC: <b>C09DA07</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>096007</b>
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> Zentiva PL Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Toplevelmi HCT [23,61], Zanafadar Combi [24,23], Tezeo HCT [29,52], Tolucombi [30,55]			

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

<b>Tezeo HCT: tabl. 80/25 mg - 28 szt.</b>	Rx	100% <b>29,52</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>14,54</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: <b>C09DA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>096069</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP</b> : Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>   Zentiva PL Sp. z o.o.		
<b>Tezeo HCT: tabl. 80/12,5 mg - 28 szt.</b>	Rx	100% <b>29,52</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>14,54</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: <b>C09DA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>096038</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP</b> : Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>   Zentiva PL Sp. z o.o.		
<b>Tezeo HCT: tabl. 80/12,5 mg - 56 szt.</b>	Rx	100% <b>56,47</b> Limit <b>42,80</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>26,51</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: <b>C09DA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>096045</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP</b> : Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>   Zentiva PL Sp. z o.o.		
<b>Tezeo HCT: tabl. 80/25 mg - 56 szt.</b>	Rx	100% <b>56,47</b> Limit <b>42,80</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>26,51</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: <b>C09DA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>096076</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP</b> : Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>   Zentiva PL Sp. z o.o.		
<b>Theospirex® retard: tabl. powł. o przedł. uwalnianiu 150 mg - 50 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>9,28</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>4,11</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Theophylline</b>   ATC: <b>R03DA04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>803910</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP</b> : Bradykardia u dzieci do 18 r. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Biofarm Sp. z o.o.		
<b>Theospirex® retard 300 mg: tabl. o przedł. uwalnianiu 300 mg - 50 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>16,74</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>4,00</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Theophylline</b>   ATC: <b>R03DA04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>261215</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP</b> : Bradykardia u dzieci do 18 r. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Biofarm Sp. z o.o.		
<b>Tialorid®: tabl. 50 mg/5 mg - 50 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>10,68</b> Limit <b>10,68</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>2,72</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Amiloride + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: <b>C03EA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>206025</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP</b> : Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; moczówka nerkopochodna (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA		
<b>Tialorid® mite: tabl. 25 mg/2,5 mg - 50 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>8,48</b> Limit <b>6,37</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>3,42</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Amiloride + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: <b>C03EA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>373819</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP</b> : Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; moczówka nerkopochodna (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA		
<b>Tianesal: tabl. powł. 12,5 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>20,48</b> Limit <b>10,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>13,20</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Tianeptine sodium</b>   ATC: <b>N06AX14</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>875245</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Adamed Sp. z o.o.		

<b>Tianesal: tabl. powł. 12,5 mg - 90 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>50,13</b> Limit <b>31,20</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>28,29</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Tianeptine sodium</b>   ATC: <b>N06AX14</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>201821</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Adamed Sp. z o.o.		
<b>Tilaprox: krople do oczu [roztw.] (50 µg+ 5 mg)/ml - 1 but. 2,5 ml ◆</b>	Rx	100% <b>36,80</b> Limit <b>0,00</b> DZ <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(2)</sup> <b>8,35</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Latanoprost + Timolol</b>   ATC: <b>S01ED51</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>946587</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Apotec Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce		
<b>Tisercin®: tabl. powł. 25 mg - 50 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>11,97</b> Limit <b>11,97</b> B <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Levomopromazine</b>   ATC: <b>N05AA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>193912</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b>   PROTERRAPIA Sp. z o.o.		
<b>Titlodine: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde 2 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>14,91</b> Limit <b>8,23</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>9,15</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Tolterodine tartrate</b>   ATC: <b>G04BD07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>035235</b> (1) Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Symphar Sp. z o.o.		
<b>Titlodine: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde 4 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>29,18</b> Limit <b>16,47</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>17,65</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Tolterodine tartrate</b>   ATC: <b>G04BD07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>035549</b> (1) Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Symphar Sp. z o.o.		
<b>Tizanor: tabl. 4 mg - 30 szt. ◆</b>	Rx	100% <b>30,11</b> Limit <b>30,11</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>9,03</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Tizanidine</b>   ATC: <b>M03BX02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>784486</b> (1) Stwardnienie rozsiane (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Orion Pharma Poland Sp. o.o.		
<b>Tolucombi: tabl. 40/12,5 mg - 28 szt.</b>	Rx	100% <b>15,75</b> Limit <b>10,70</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>8,26</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: <b>C09DA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>045180</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP</b> : Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>   Krka Polska Sp. z o.o.		
<b>Tolucombi: tabl. 40/12,5 mg - 56 szt.</b>	Rx	100% <b>30,55</b> Limit <b>21,40</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>15,57</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: <b>C09DA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>045203</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP</b> : Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>   Krka Polska Sp. z o.o.		



# ZOLPIC

zolpidem

Daj owcom odpocząć.



Tolucombi: tabl. 80/12,5 mg - 28 szt.		Rx	100%	30,55	
			Limit	21,40	
			30% <sup>(1)</sup>	15,57	
			S <sup>(2)</sup>	bezpł.	
INN: <b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA07		wyk: B	EAN ~ 045692		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Toplevelmi HCT [23,61], Telmisartan + HCT Genoptim [25,51], Telmix Plus [27,46], Tezeo HCT [29,52], Tolucombi [30,55], Actelsar HCT [31,00], Telmisartan HCT EGIS [31,00], Gisartan [31,12], Znacodar Combi [31,12], Polsart Plus [31,65], Telmizek HCT [33,98], PritorPlus® [35,35], MicardisPlus [38,59]					
Tolucombi: tabl. 80/12,5 mg - 56 szt.		Rx	100%	58,53	
			Limit	42,80	
			30% <sup>(1)</sup>	28,57	
			S <sup>(2)</sup>	bezpł.	
INN: <b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA07		wyk: B	EAN ~ 045722		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Toplevelmi HCT [44,66], Znacodar Combi [45,90], Tezeo HCT [56,47], Tolucombi [58,53]					
Tolucombi: tabl. 80/25 mg - 28 szt.		Rx	100%	30,55	
			Limit	21,40	
			30% <sup>(1)</sup>	15,57	
			S <sup>(2)</sup>	bezpł.	
INN: <b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA07		wyk: B	EAN ~ 045807		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Toplevelmi HCT [23,61], Telmisartan + HCT Genoptim [25,51], Telmix Plus [27,46], Tezeo HCT [29,52], Tolucombi [30,55], Actelsar HCT [31,00], Telmisartan HCT EGIS [31,00], Gisartan [31,12], Znacodar Combi [31,12], Polsart Plus [31,65], Telmizek HCT [33,98], PritorPlus® [35,35], MicardisPlus [39,36]					
Tolucombi: tabl. 80/25 mg - 56 szt.		Rx	100%	58,53	
			Limit	42,80	
			30% <sup>(1)</sup>	28,57	
			S <sup>(2)</sup>	bezpł.	
INN: <b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA07		wyk: B	EAN ~ 045852		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Toplevelmi HCT [44,66], Znacodar Combi [45,90], Tezeo HCT [56,47], Tolucombi [58,53]					
Tolucombi: tabl. 40/12,5 mg - 84 szt.		Rx	100%	47,49	
			Limit	32,10	
			30% <sup>(1)</sup>	25,02	
			S <sup>(2)</sup>	bezpł.	
INN: <b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA07		wyk: B	EAN ~ 045265		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.					
Tolucombi: tabl. 80/12,5 mg - 84 szt.		Rx	100%	91,22	
			Limit	64,20	
			30% <sup>(1)</sup>	46,28	
			S <sup>(2)</sup>	bezpł.	
INN: <b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA07		wyk: B	EAN ~ 045746		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.					
Tolucombi: tabl. 80/25 mg - 84 szt.		Rx	100%	91,22	
			Limit	64,20	
			30% <sup>(1)</sup>	46,28	
			S <sup>(2)</sup>	bezpł.	
INN: <b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA07		wyk: B	EAN ~ 045876		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.					
Tolura: tabl. 40 mg - 28 szt.		Rx	100%	14,61	
			Limit	10,70	
			30% <sup>(1)</sup>	7,12	
			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
			S <sup>(2)</sup>	bezpł.	
INN: <b>Telmisartan</b>   ATC: C09CA07		wyk: B	EAN ~ 077604		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tezeo - (IR) [11,23], Tezeo - (IR) [11,24], Telmisartan Bluefish [11,80], Telmisartan Mylan [11,91], Telmabax [12,07], Znacodar [12,77], Telmisartan Genoptim [12,86], Toplevelmi [13,41], Tezeo [13,46], Telmisartan EGIS [13,58], Actelsar [13,75], Tolura [14,61], Telmix [15,74], Telmizek [16,88], Polsart [17,16], Pritor® [18,81], Micardis® [24,02]					
Tolura: tabl. 40 mg - 56 szt.		Rx	100%	32,04	
			Limit	21,40	
			30% <sup>(1)</sup>	17,06	
			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
			S <sup>(2)</sup>	bezpł.	
INN: <b>Telmisartan</b>   ATC: C09CA07		wyk: B	EAN ~ 077628		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Tezeo - (IR) [21,34], Tezeo - (IR) [21,34], Toplevelmi [21,38], Tezeo [25,85], Telmix [26,74], Tolura [32,04]					
Tolura: tabl. 40 mg - 84 szt.		Rx	100%	38,79	
			Limit	32,10	
			30% <sup>(1)</sup>	16,32	
			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
			S <sup>(2)</sup>	bezpł.	
INN: <b>Telmisartan</b>   ATC: C09CA07		wyk: B	EAN ~ 077635		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Tezeo - (IR) [21,34], Tezeo - (IR) [21,34], Toplevelmi [21,38], Tezeo [25,85], Telmix [26,74], Tolura [32,04]					
Tolura: tabl. 80 mg - 28 szt.		Rx	100%	28,26	
			Limit	21,40	
			30% <sup>(1)</sup>	13,28	
			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
			S <sup>(2)</sup>	bezpł.	
INN: <b>Telmisartan</b>   ATC: C09CA07		wyk: B	EAN ~ 077673		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tolura - (IR) [X], Tolura - (IR) [20,22], Telmisartan EGIS - (IR) [21,31], Tezeo - (IR) [21,34], Tezeo - (IR) [21,34], Telmabax [22,53], Telmisartan Mylan [22,65], Telmisartan Bluefish [22,75], Telmisartan EGIS - (IR) [22,99], Znacodar [24,59], Telmisartan Genoptim [24,76], Pritor® [24,98], Toplevelmi [25,85], Tezeo [25,97], Telmisartan EGIS [26,19], Actelsar [26,88], Tolura [28,26], Telmix [30,52], Telmizek [32,79], Polsart [33,36], Micardis® [33,56]					
Tolura: tabl. 80 mg - 56 szt.		Rx	100%	61,51	
			Limit	42,80	
			30% <sup>(1)</sup>	31,55	
			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
			S <sup>(2)</sup>	bezpł.	
INN: <b>Telmisartan</b>   ATC: C09CA07		wyk: B	EAN ~ 077697		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Tolura - (IR) [X], Tolura - (IR) [37,88], Tezeo - (IR) [40,11], Tezeo - (IR) [40,13], Toplevelmi [40,19], Tezeo [49,15], Telmix [50,93], Tolura [61,51]					
Tolura: tabl. 80 mg - 84 szt.		Rx	100%	73,82	
			Limit	64,20	
			30% <sup>(1)</sup>	28,88	
			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
			S <sup>(2)</sup>	bezpł.	
INN: <b>Telmisartan</b>   ATC: C09CA07		wyk: B	EAN ~ 077703		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Krka Polska Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Tolura - (IR) [X], Tolura - (IR) [54,74], Tolura [73,82]					
Tolura - (IR): tabl. 80 mg - 28 szt.		Rx	100%	20,22	
			Limit	20,22	
			30% <sup>(1)</sup>	6,07	
			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
			S <sup>(2)</sup>	bezpł.	
INN: <b>Telmisartan</b>   ATC: C09CA07		wyk: B	EAN ~ 860090		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Delfarma Sp. z o.o.					
Odpowiedniki: Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tolura - (IR) [X], Tolura - (IR) [20,22], Telmisartan EGIS - (IR) [21,31], Tezeo - (IR) [21,34], Tezeo - (IR) [21,34], Telmabax [22,53], Telmisartan Mylan [22,65], Telmisartan Bluefish [22,75], Telmisartan EGIS - (IR) [22,99], Znacodar [24,59], Telmisartan Genoptim [24,76], Pritor® [24,98], Toplevelmi [25,85], Tezeo [25,97], Telmisartan EGIS [26,19], Actelsar [26,88], Tolura [28,26], Telmix [30,52], Telmizek [32,79], Polsart [33,36], Micardis® [33,56]					

**ADRENALINA WZF**

Adrenalinum

Zawsze pod ręką!

**Refundacja** od lipca 2015  
Poziom odpłatności 50%

ADR-WZF/131/06-2015

Tolura - (IR): tabl. 80 mg - 30 szt.	Rx	100%	21,50
		Limit	21,50
		30% <sup>(1)</sup>	6,45
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan** ATC: C09CA07 wyk: B EAN ~ 274358  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewłoka choroba nerek u dzieci do 18 rż.: leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż.  
 (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Inpharm Sp. z o.o.

Tolura - (IR): tabl. 80 mg - 56 szt.	Rx	100%	37,88
		Limit	37,88
		30% <sup>(1)</sup>	11,36
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan** ATC: C09CA07 wyk: B EAN ~ 860086  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewłoka choroba nerek u dzieci do 18 rż.: leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż.  
 (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Delfarma Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Tolura - (IR) [X], Tolura - (IR) [37,88], Tezeo - (IR) [40,11], Tezeo - (IR) [40,13], Toplevelmi [40,19], Tezeo [49,15], Telmix [50,93], Tolura [61,51]

Tolura - (IR): tabl. 80 mg - 84 szt.	Rx	100%	54,74
		Limit	54,74
		30% <sup>(1)</sup>	16,42
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan** ATC: C09CA07 wyk: B EAN ~ 860087  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewłoka choroba nerek u dzieci do 18 rż.: leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż.  
 (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Delfarma Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Tolura - (IR) [X], Tolura - (IR) [54,74], Tolura [73,82]

Tolzurin: kaps. o przedl. uwalnianiu 4 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	24,46
		Limit	16,47
		30% <sup>(1)</sup>	12,93
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Tolterodine tartrate** ATC: G04BD07 wyk: B EAN ~ 023522  
 (1) Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 RECORDATI Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Defur [24,11], Tolzurin [24,46], Tiflodine [29,18]

Topamax®: tabl. powł. 25 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	14,74
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	9,32
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Topiramate** ATC: N03AX11 wyk: B EAN ~ 758814  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka oporna na leczenie WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Eptoram [10,40], Etopro® [10,76], Topamax® [14,74]

Topamax®: tabl. powł. 50 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	20,30
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,26
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Topiramate** ATC: N03AX11 wyk: B EAN ~ 758913  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka oporna na leczenie WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Eptoram [19,78], Topamax® [20,30], Etopro® [20,53]

Topamax®: tabl. powł. 100 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	38,37
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,10
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Topiramate** ATC: N03AX11 wyk: B EAN ~ 759019  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka oporna na leczenie WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Eptoram [37,31], Topamax® [38,37], Etopro® [39,23]

Topamax®: tabl. powł. 200 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	68,94
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Topiramate** ATC: N03AX11 wyk: B EAN ~ 759118  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka oporna na leczenie WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Topamax® [68,94], Eptoram [70,39], Etopro® [73,40]

Toplevelmi: tabl. 40 mg - 28 szt.	Rx	100%	13,41
		Limit	10,70
		30% <sup>(1)</sup>	5,92
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan** ATC: C09CA07 wyk: B EAN ~ 840472  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewłoka choroba nerek u dzieci do 18 rż.: leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż.  
 (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Sandoz GmbH

Odpowiedniki: Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tezeo - (IR) [11,23], Tezeo - (IR) [11,24], Telmisartan Bluefish [11,80], Telmisartan Mylan [11,91], Telmabax [12,07], Zanacodar [12,77], Telmisartan Genoptim [12,86], Toplevelmi [13,41], Tezeo [13,46], Telmisartan EGIS [13,58], Actelsar [13,75], Tolura [14,61], Telmix [15,74], Telmizek [16,88], Polsart [17,16], Pritor® [18,81], Micardis® [24,02]

Toplevelmi: tabl. 40 mg - 56 szt.	Rx	100%	21,38
		Limit	21,38
		30% <sup>(1)</sup>	6,41
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan** ATC: C09CA07 wyk: B EAN ~ 084048  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewłoka choroba nerek u dzieci do 18 rż.: leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż.  
 (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Sandoz GmbH

Odpowiedniki: Tezeo - (IR) [21,34], Tezeo - (IR) [21,34], Toplevelmi [21,38], Tezeo [25,85], Telmix [26,74], Tolura [32,04]

Toplevelmi: tabl. 80 mg - 28 szt.	Rx	100%	25,85
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	10,87
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan** ATC: C09CA07 wyk: B EAN ~ 840557  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewłoka choroba nerek u dzieci do 18 rż.: leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż.  
 (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Sandoz GmbH

Odpowiedniki: Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tolura - (IR) [X], Tolura - (IR) [20,22], Telmisartan EGIS - (IR) [21,31], Tezeo - (IR) [21,34], Tezeo - (IR) [21,34], Telmabax [22,53], Telmisartan Mylan [22,65], Telmisartan Bluefish [22,75], Telmisartan EGIS - (IR) [22,99], Zanacodar [24,59], Telmisartan Genoptim [24,76], Pritor® [24,98], Toplevelmi [25,85], Tezeo [25,97], Telmisartan EGIS [26,19], Actelsar [26,88], Tolura [28,26], Telmix [30,52], Telmizek [32,79], Polsart [33,36], Micardis® [33,56]

Toplevelmi: tabl. 80 mg - 56 szt.	Rx	100%	40,19
		Limit	40,19
		30% <sup>(1)</sup>	12,06
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan** ATC: C09CA07 wyk: B EAN ~ 084056  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewłoka choroba nerek u dzieci do 18 rż.: leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 rż.  
 (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Sandoz GmbH

Odpowiedniki: Tolura - (IR) [X], Tolura - (IR) [37,88], Tezeo - (IR) [40,11], Tezeo - (IR) [40,13], Toplevelmi [40,19], Tezeo [49,15], Telmix [50,93], Tolura [61,51]

Toplevelmi HCT: tabl. draż. 40/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	12,31
		Limit	10,70
		30% <sup>(1)</sup>	4,82
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan + Hydrochlorothiazide** ATC: C09DA07 wyk: B EAN ~ 108187  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Sandoz GmbH

Odpowiedniki: Toplevelmi HCT [12,31], Telmisartan + HCT Genoptim [13,24], Telmix Plus [14,21], Tezeo HCT [15,23], Tolucombi [15,75], Telmisartan HCT EGIS [15,87], Zanacodar Combi [16,04], Polsart Plus [16,30], Telmizek HCT [17,47], PritorPlus® [28,41]

Toplevelmi HCT: tabl. draż. 40/12,5 mg - 56 szt.	Rx	100%	23,61
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	8,63
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan + Hydrochlorothiazide** ATC: C09DA07 wyk: B EAN ~ 108189  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Sandoz GmbH

Odpowiedniki: Toplevelmi HCT [23,61], Zanacodar Combi [24,23], Tezeo HCT [29,52], Tolucombi [30,55]

Toplevelmi HCT: tabl. draż. 80/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	23,61
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	8,63
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan + Hydrochlorothiazide** ATC: C09DA07 wyk: B EAN ~ 108194  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Sandoz GmbH

Odpowiedniki: Toplevelmi HCT [23,61], Telmisartan + HCT Genoptim [25,51], Telmix Plus [27,46], Tezeo HCT [29,52], Tolucombi [30,55], Actelsar HCT [31,00], Telmisartan HCT EGIS [31,00], Gisartan [31,12], Zanacodar Combi [31,12], Polsart Plus [31,65], Telmizek HCT [33,98], PritorPlus® [35,35], Micardis® [38,59]



Naszym wyborem

**enarenal**  
 enalapril maleas

<b>Toptelmi HCT:</b> tabl. draż. <b>80/25 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>23,61</b>
		Limit	<b>21,40</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>8,63</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA07   wyk: B   EAN ~ 108206			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: <b>Toptelmi HCT</b> [23,61], Telmisartan + HCT Genoptim [25,51], Telmix Plus [27,46], Tezeo HCT [29,52], Tolucombi [30,55], Actelsar HCT [31,00], Telmisartan HCT EGIS [31,00], Gisartan [31,12], Zanicodar Combi [31,12], Polsart Plus [31,65], Telmizek HCT [33,98], PritorPlus® [35,35], MicardisPlus [39,36]			
<b>Toptelmi HCT:</b> tabl. draż. <b>80/12,5 mg</b> - 56 szt.	Rx	100%	<b>44,66</b>
		Limit	<b>42,80</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>14,70</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA07   wyk: B   EAN ~ 108196			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: <b>Toptelmi HCT</b> [44,66], Zanicodar Combi [45,90], Tezeo HCT [56,47], Tolucombi [58,53]			
<b>Toptelmi HCT:</b> tabl. draż. <b>80/25 mg</b> - 56 szt.	Rx	100%	<b>44,66</b>
		Limit	<b>42,80</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>14,70</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: C09DA07   wyk: B   EAN ~ 108208			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: <b>Toptelmi HCT</b> [44,66], Zanicodar Combi [45,90], Tezeo HCT [56,47], Tolucombi [58,53]			
<b>Toramat:</b> tabl. powł. <b>25 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>10,78</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>4,75</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Topiramate</b>   ATC: N03AX11   wyk: B   EAN ~ 671472			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka oporna na leczenie WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Neuraxpharm Arzneimittel GmbH			
<b>Toramat:</b> tabl. powł. <b>50 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>20,45</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>5,18</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Topiramate</b>   ATC: N03AX11   wyk: B   EAN ~ 671489			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka oporna na leczenie WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Neuraxpharm Arzneimittel GmbH			
<b>Toramat:</b> tabl. powł. <b>100 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>38,46</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>4,73</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Topiramate</b>   ATC: N03AX11   wyk: B   EAN ~ 671496			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka oporna na leczenie WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Neuraxpharm Arzneimittel GmbH			
<b>Toramat:</b> tabl. powł. <b>200 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx	100%	<b>72,44</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Topiramate</b>   ATC: N03AX11   wyk: B   EAN ~ 671502			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Padaczka oporna na leczenie WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Neuraxpharm Arzneimittel GmbH			
<b>Torecan:</b> tabl. powł. <b>6,5 mg</b> - 50 szt. ◆	Rx	100%	<b>25,68</b>
		Limit	<b>25,68</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>7,70</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <b>Thiethylperazine maleate</b>   ATC: A04AD, R06AD03   wyk: B   EAN ~ 242511			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Nowotwory złośliwe(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.			
<b>Torendo® Q-Tab®:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>1 mg</b> - 20 szt. ◆	Rx	100%	<b>8,83</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>4,61</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Risperidone</b>   ATC: N05AX08   wyk: B   EAN ~ 034932			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.			

<b>Torendo® Q-Tab®:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>1 mg</b> - 50 szt. ◆	Rx	100%	<b>19,11</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,75</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Risperidone</b>   ATC: N05AX08   wyk: B   EAN ~ 680849			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.			
<b>Torendo® Q-Tab®:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>2 mg</b> - 20 szt. ◆	Rx	100%	<b>16,80</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>5,15</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Risperidone</b>   ATC: N05AX08   wyk: B   EAN ~ 034994			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.			
<b>Torendo® Q-Tab®:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>2 mg</b> - 50 szt. ◆	Rx	100%	<b>36,02</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Risperidone</b>   ATC: N05AX08   wyk: B   EAN ~ 680863			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.			
<b>Torvacard® 10:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>8,79</b>
		Limit	<b>4,21</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>5,84</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Atorvastatin</b>   ATC: C10AA05   wyk: B   EAN ~ 338290			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczykowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Zentiva PL Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medreg [4,58], Atorvastatin Genoptim [5,28], Atorvastatin Bluefish AB [5,50], Storvas CRT [6,04], Lambrinex [7,12], <b>Torvacard® 10</b> [8,79], Atorvox [9,06], Atox® 10 [9,49], Atoris® [9,56], Tulip® [9,60], Apo-Atorva [9,65], Atorvasterol® [9,81]			
<b>Torvacard® 20:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>12,94</b>
		Limit	<b>8,43</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>7,04</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Atorvastatin</b>   ATC: C10AA05   wyk: B   EAN ~ 338368			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczykowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Zentiva PL Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [8,20], Atorvastatin Medreg [8,26], Atorvastatin Aurovitas [8,89], Atorvastatin Bluefish AB [9,61], Atorvastatin Genoptim [9,88], Atorvagen [9,97], Storvas CRT [11,17], Lambrinex [11,67], <b>Torvacard® 20</b> [12,94], Atoris® [13,71], Atox®20 [15,01], Atorvox [15,23], Tulip® [15,42], Apo-Atorva [17,75], Atorvasterol® [19,11]			
<b>Torvacard® 40:</b> tabl. powł. <b>40 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>24,03</b>
		Limit	<b>16,86</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>12,23</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Atorvastatin</b>   ATC: C10AA05   wyk: B   EAN ~ 338436			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczykowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Zentiva PL Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [15,27], Atorvastatin Medreg [15,38], Atorvastatin Aurovitas [16,06], Atorvastatin Bluefish AB [18,30], Atorvastatin Genoptim [18,81], Atorvagen [19,02], Storvas CRT [21,57], Lambrinex [22,63], Tulip® [23,91], <b>Torvacard® 40</b> [24,03], Atoris® [26,75], Atorvox [27,97], Atox® 40 [29,46], Apo-Atorva [32,04], Atorvasterol® [37,58]			

Torvacard® 40: tabl. powł. 40 mg - 90 szt.	Rx	100%	68,07
		Limit	50,58
		30% <sup>(1)</sup>	32,66
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Atorvastatin</i> ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 338443			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtorna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrawirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Zentiva PL Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Atorvastatin Aurovitas [X], Atorvastatin Genoptim [47,25], Lambrinex [49,88], Atrox® 40 [50,68], Tulip® [55,59], Torvacard® 40 [68,07], Atoris® [72,77]			
Torvacard® 80: tabl. powł. 80 mg - 30 szt.	Rx	100%	47,35
		Limit	33,72
		30% <sup>(1)</sup>	23,75
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Atorvastatin</i> ATC: C10AA05 wyk: B EAN ~ 957071			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtorna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrawirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Zentiva PL Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Atorvastatin Medreg [28,80], Atorvastatin Bluefish AB [29,14], Atorvastatin Genoptim [32,49], Atorvastatol® [37,24], Storvas CRT [40,48], Atrox® 80 [41,34], Torvacard® 80 [47,35], Atoris® [51,54], Tulip® [52,79]			
Toujeo: inj. [roztw.] 300 j.m./ml - 10 wstrzyk. 1,5 ml (SoloStar) ◆	Rx	100%	534,88
		Limit	464,87
		30% <sup>(1)</sup>	209,47
		C <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.
INN: <i>Insulin glargine</i> ATC: A10AE04 wyk: B EAN ~ 231538			
(1) Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥ 8% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dorosłych o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO), Cukrzyca typu I u dorosłych(2) Kobiety w ciąży(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A Sanofi-Aventis Deutschland GmbH			
Tramadol + Paracetamol Medreg: tabl. powł. 37,5 mg+ 325 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	8,22
		Limit	7,10
		30% <sup>(1)</sup>	3,25
		B <sup>(2)</sup>	1,12
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tramadol hydrochloride + Paracetamol</i> ATC: N02AJ13 wyk: B EAN ~ 645223			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C MedReg sro			
Odpowiedniki: Tramadol + Paracetamol Medreg [8,22], Exbol [8,26]			
Tramadol + Paracetamol Medreg: tabl. powł. 37,5 mg+ 325 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	15,50
		Limit	14,20
		30% <sup>(1)</sup>	5,56
		B <sup>(2)</sup>	1,30
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tramadol hydrochloride + Paracetamol</i> ATC: N02AJ13 wyk: B EAN ~ 645224			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C MedReg sro			
Odpowiedniki: Tramadol + Paracetamol Medreg [15,50], Exbol [15,53]			
Tramadol + Paracetamol Medreg: tabl. powł. 37,5 mg+ 325 mg - 90 szt. ◆	Rx	100%	22,38
		Limit	21,30
		30% <sup>(1)</sup>	7,47
		B <sup>(2)</sup>	1,08
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tramadol hydrochloride + Paracetamol</i> ATC: N02AJ13 wyk: B EAN ~ 645225			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C MedReg sro			
Odpowiedniki: Tramadol + Paracetamol Medreg [22,38], Exbol [22,64]			

Tramadol Aurovitas: kaps. twarde 50 mg - 20 szt. ◆	Rx	100%	7,65
		Limit	6,31
		30% <sup>(1)</sup>	3,23
		B <sup>(2)</sup>	1,34
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tramadol hydrochloride</i> ATC: N02AX02 wyk: B EAN ~ 136230			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Tramadol Aurovitas [7,65], Tramadol Krka [7,84], Trama® [8,28], Poltram® [8,50], Tramadol Synteza [9,90]			
Tramadol Krka: kaps. twarde 50 mg - 20 szt. ◆	Rx	100%	7,84
		Limit	6,31
		30% <sup>(1)</sup>	3,42
		B <sup>(2)</sup>	1,53
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tramadol hydrochloride</i> ATC: N02AX02 wyk: B EAN ~ 137681			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Tramadol Aurovitas [7,65], Tramadol Krka [7,84], Trama® [8,28], Poltram® [8,50], Tramadol Synteza [9,90]			
Tramadol Synteza: kaps. twarde 50 mg - 20 szt. ◆	Rx	100%	9,90
		Limit	6,31
		30% <sup>(1)</sup>	5,48
		B <sup>(2)</sup>	3,59
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tramadol hydrochloride</i> ATC: N02AX02 wyk: B EAN ~ 294619			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Synteza Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Tramadol Aurovitas [7,65], Tramadol Krka [7,84], Trama® [8,28], Poltram® [8,50], Tramadol Synteza [9,90]			
Tramadol Synteza: krople doustne 100 mg/ml - 1 op. 10 ml ◆	Rx	100%	12,50
		Limit	8,16
		30% <sup>(1)</sup>	6,79
		B <sup>(2)</sup>	4,34
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tramadol hydrochloride</i> ATC: N02AX02 wyk: B EAN ~ 294718			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Synteza Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Poltram® [9,83], Tramadol Synteza [12,50]			
Trama®: kaps. twarde 50 mg - 20 szt. ◆	Rx	100%	8,28
		Limit	6,31
		30% <sup>(1)</sup>	3,86
		B <sup>(2)</sup>	1,97
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tramadol hydrochloride</i> ATC: N02AX02 wyk: B EAN ~ 253616			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C STADA Poland Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Tramadol Aurovitas [7,65], Tramadol Krka [7,84], Trama® [8,28], Poltram® [8,50], Tramadol Synteza [9,90]			
Trama®: krople doustne 100 mg/ml - 1 but. 96 ml (z dozownikiem) ◆	Rx	100%	78,29
		Limit	78,29
		30% <sup>(1)</sup>	23,49
		B <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tramadol hydrochloride</i> ATC: N02AX02 wyk: B EAN ~ 253920			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C STADA Poland Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Tramadol Aurovitas [7,65], Tramadol Krka [7,84], Trama® [8,28], Poltram® [8,50], Tramadol Synteza [9,90]			
Trama®: krople doustne 100 mg/ml - 1 but. 10 ml (z kropłomierzem) ◆	Rx	100%	9,57
		Limit	8,16
		30% <sup>(1)</sup>	3,86
		B <sup>(2)</sup>	1,41
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Tramadol hydrochloride</i> ATC: N02AX02 wyk: B EAN ~ 253913			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C STADA Poland Sp. z o.o.			



<b>Tramal® 50:</b> inj. [roztw.] 50 mg/ml - 5 amp. 2 ml ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>15,66</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>15,66</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>4,70</td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	15,66	Limit	15,66	30% <sup>(1)</sup>	4,70	B <sup>(2)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Tramal® Retard 100:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu 100 mg - 50 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>36,53</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>31,55</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>14,45</td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td>4,98</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	36,53	Limit	31,55	30% <sup>(1)</sup>	14,45	B <sup>(2)</sup>	4,98	DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	15,66																										
Limit	15,66																										
30% <sup>(1)</sup>	4,70																										
B <sup>(2)</sup>	bezpł.																										
DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
100%	36,53																										
Limit	31,55																										
30% <sup>(1)</sup>	14,45																										
B <sup>(2)</sup>	4,98																										
DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
INN: <i>Tramadol hydrochloride</i>   ATC: N02AX02   wyk: B   EAN ~ 253821 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C STADA Poland Sp. z o.o. Odpowiedniki: Poltram® 100 [8,76], Tramal® 50 [15,66]		INN: <i>Tramadol hydrochloride</i>   ATC: N02AX02   wyk: B   EAN ~ 786237 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C STADA Poland Sp. z o.o. Odpowiedniki: Tramal® Retard 100 [36,53], Poltram® Retard 100 [38,00]																									
<b>Tramal® 50:</b> inj. [roztw.] 50 mg/ml - 5 amp. 1 ml ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>9,15</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>7,83</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>3,67</td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td>1,32</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	9,15	Limit	7,83	30% <sup>(1)</sup>	3,67	B <sup>(2)</sup>	1,32	DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Tramal® Retard 150:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu 150 mg - 10 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>11,55</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>9,46</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>4,93</td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td>2,09</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	11,55	Limit	9,46	30% <sup>(1)</sup>	4,93	B <sup>(2)</sup>	2,09	DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	9,15																										
Limit	7,83																										
30% <sup>(1)</sup>	3,67																										
B <sup>(2)</sup>	1,32																										
DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
100%	11,55																										
Limit	9,46																										
30% <sup>(1)</sup>	4,93																										
B <sup>(2)</sup>	2,09																										
DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
INN: <i>Tramadol hydrochloride</i>   ATC: N02AX02   wyk: B   EAN ~ 253814 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C STADA Poland Sp. z o.o. Odpowiedniki: Poltram® 50 [5,65], Tramal® 50 [9,15]		INN: <i>Tramadol hydrochloride</i>   ATC: N02AX02   wyk: B   EAN ~ 786312 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C STADA Poland Sp. z o.o. Odpowiedniki: Tramal® Retard 150 [11,55], Poltram® Retard 150 [12,34]																									
<b>Tramal® Retard 50:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu 50 mg - 10 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>7,17</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>3,15</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>4,97</td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td>4,02</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	7,17	Limit	3,15	30% <sup>(1)</sup>	4,97	B <sup>(2)</sup>	4,02	DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Tramal® Retard 150:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu 150 mg - 30 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>33,21</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>28,39</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>13,34</td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td>4,82</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	33,21	Limit	28,39	30% <sup>(1)</sup>	13,34	B <sup>(2)</sup>	4,82	DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	7,17																										
Limit	3,15																										
30% <sup>(1)</sup>	4,97																										
B <sup>(2)</sup>	4,02																										
DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
100%	33,21																										
Limit	28,39																										
30% <sup>(1)</sup>	13,34																										
B <sup>(2)</sup>	4,82																										
DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
INN: <i>Tramadol hydrochloride</i>   ATC: N02AX02   wyk: B   EAN ~ 780303 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C STADA Poland Sp. z o.o.		INN: <i>Tramadol hydrochloride</i>   ATC: N02AX02   wyk: B   EAN ~ 786329 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C STADA Poland Sp. z o.o. Odpowiedniki: Tramal® Retard 150 - (IR) [30,55], Tramal® Retard 150 [33,21], Poltram® Retard 150 [36,50]																									
<b>Tramal® Retard 50:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu 50 mg - 30 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>11,86</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>9,46</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>5,24</td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td>2,40</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	11,86	Limit	9,46	30% <sup>(1)</sup>	5,24	B <sup>(2)</sup>	2,40	DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Tramal® Retard 150:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu 150 mg - 50 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>53,11</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>47,32</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>19,99</td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td>5,79</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	53,11	Limit	47,32	30% <sup>(1)</sup>	19,99	B <sup>(2)</sup>	5,79	DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	11,86																										
Limit	9,46																										
30% <sup>(1)</sup>	5,24																										
B <sup>(2)</sup>	2,40																										
DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
100%	53,11																										
Limit	47,32																										
30% <sup>(1)</sup>	19,99																										
B <sup>(2)</sup>	5,79																										
DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
INN: <i>Tramadol hydrochloride</i>   ATC: N02AX02   wyk: B   EAN ~ 780334 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C STADA Poland Sp. z o.o.		INN: <i>Tramadol hydrochloride</i>   ATC: N02AX02   wyk: B   EAN ~ 786336 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C STADA Poland Sp. z o.o. Odpowiedniki: Tramal® Retard 150 - (IR) [48,70], Tramal® Retard 150 [53,11], Poltram® Retard 150 [55,63]																									
<b>Tramal® Retard 50:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu 50 mg - 50 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>19,20</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>15,77</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>8,16</td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td>3,43</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	19,20	Limit	15,77	30% <sup>(1)</sup>	8,16	B <sup>(2)</sup>	3,43	DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Tramal® Retard 150 - (IR):</b> tabl. o przedl. uwalnianiu 150 mg - 30 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>30,55</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>28,39</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>10,68</td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td>2,16</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	30,55	Limit	28,39	30% <sup>(1)</sup>	10,68	B <sup>(2)</sup>	2,16	DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	19,20																										
Limit	15,77																										
30% <sup>(1)</sup>	8,16																										
B <sup>(2)</sup>	3,43																										
DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
100%	30,55																										
Limit	28,39																										
30% <sup>(1)</sup>	10,68																										
B <sup>(2)</sup>	2,16																										
DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
INN: <i>Tramadol hydrochloride</i>   ATC: N02AX02   wyk: B   EAN ~ 780341 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C STADA Poland Sp. z o.o.		INN: <i>Tramadol hydrochloride</i>   ATC: N02AX02   wyk: B   EAN ~ 148069 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Delfarma Sp. z o.o. Odpowiedniki: Tramal® Retard 150 - (IR) [30,55], Tramal® Retard 150 [33,21], Poltram® Retard 150 [36,50]																									
<b>Tramal® Retard 100:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu 100 mg - 10 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>8,01</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>6,31</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>3,59</td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td>1,70</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	8,01	Limit	6,31	30% <sup>(1)</sup>	3,59	B <sup>(2)</sup>	1,70	DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Tramal® Retard 150 - (IR):</b> tabl. o przedl. uwalnianiu 150 mg - 50 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>48,70</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>47,32</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>15,58</td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td>1,38</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	48,70	Limit	47,32	30% <sup>(1)</sup>	15,58	B <sup>(2)</sup>	1,38	DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	8,01																										
Limit	6,31																										
30% <sup>(1)</sup>	3,59																										
B <sup>(2)</sup>	1,70																										
DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
100%	48,70																										
Limit	47,32																										
30% <sup>(1)</sup>	15,58																										
B <sup>(2)</sup>	1,38																										
DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
INN: <i>Tramadol hydrochloride</i>   ATC: N02AX02   wyk: B   EAN ~ 786213 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C STADA Poland Sp. z o.o. Odpowiedniki: Tramal® Retard 100 [8,01], Poltram® Retard 100 [8,52]		INN: <i>Tramadol hydrochloride</i>   ATC: N02AX02   wyk: B   EAN ~ 148070 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Delfarma Sp. z o.o. Odpowiedniki: Tramal® Retard 150 - (IR) [48,70], Tramal® Retard 150 [53,11], Poltram® Retard 150 [55,63]																									
<b>Tramal® Retard 100:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu 100 mg - 30 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>22,77</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>18,93</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>9,52</td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td>3,84</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	22,77	Limit	18,93	30% <sup>(1)</sup>	9,52	B <sup>(2)</sup>	3,84	DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Tramal® Retard 200:</b> tabl. o przedl. uwalnianiu 200 mg - 10 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>15,26</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>12,62</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>6,43</td></tr> <tr><td>B<sup>(2)</sup></td><td>2,64</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	15,26	Limit	12,62	30% <sup>(1)</sup>	6,43	B <sup>(2)</sup>	2,64	DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	22,77																										
Limit	18,93																										
30% <sup>(1)</sup>	9,52																										
B <sup>(2)</sup>	3,84																										
DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
100%	15,26																										
Limit	12,62																										
30% <sup>(1)</sup>	6,43																										
B <sup>(2)</sup>	2,64																										
DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.																										
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																										
INN: <i>Tramadol hydrochloride</i>   ATC: N02AX02   wyk: B   EAN ~ 786220 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C STADA Poland Sp. z o.o. Odpowiedniki: Tramal® Retard 100 [22,77], Poltram® Retard 100 [23,87]		INN: <i>Tramadol hydrochloride</i>   ATC: N02AX02   wyk: B   EAN ~ 786411 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C STADA Poland Sp. z o.o. Odpowiedniki: Tramal® Retard 200 [15,26], Poltram® Retard 200 [16,32]																									



Tramal® Retard 200: tabl. o przedl. uwalnianiu 200 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	43,16
		Limit	37,86
		30% <sup>(1)</sup>	16,66
		B <sup>(2)</sup>	5,30
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Tramadol hydrochloride* | ATC: N02AX02 | wyk: B | EAN ~ 786428  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 STADA Poland Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Tramal® Retard 200 [43,16], Poltram® Retard 200 [44,99]

Tramal® Retard 200: tabl. o przedl. uwalnianiu 200 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	69,16
		Limit	63,10
		30% <sup>(1)</sup>	24,99
		B <sup>(2)</sup>	6,06
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Tramadol hydrochloride* | ATC: N02AX02 | wyk: B | EAN ~ 786435  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 STADA Poland Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Tramal® Retard 200 [69,16], Poltram® Retard 200 [72,60]

Tramapar: tabl. powl. 37,5/325 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	8,33
		Limit	7,10
		30% <sup>(1)</sup>	3,36
		B <sup>(2)</sup>	1,23
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Tramadol hydrochloride + Paracetamol* | ATC: N02AX52 | wyk: B | EAN ~ 959457  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Polfarmex S.A.  
 Odpowiedniki: Padolten [8,24], Poltram® Combo [8,33], Tramapar [8,33], Doreta [25,42]

Tramapar: tabl. powl. 37,5/325 mg - 60 szt. ◆	Rx	100%	15,76
		Limit	14,20
		30% <sup>(1)</sup>	5,82
		B <sup>(2)</sup>	1,56
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Tramadol hydrochloride + Paracetamol* | ATC: N02AX52 | wyk: B | EAN ~ 959488  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Polfarmex S.A.  
 Odpowiedniki: Padolten [15,56], Doreta [15,63], Poltram® Combo [15,76], Tramapar [15,76]

Tramapar: tabl. powl. 37,5/325 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	25,00
		Limit	23,66
		30% <sup>(1)</sup>	8,44
		B <sup>(2)</sup>	1,34
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Tramadol hydrochloride + Paracetamol* | ATC: N02AX52 | wyk: B | EAN ~ 959563  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Nowotwory złośliwe (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Polfarmex S.A.

Transec® 35 µg/h: system transdermalny 35 µg/h - 5 szt. (20 mg w plastrze) ◆	Rx	100%	59,19
		Limit	54,94
		B <sup>(1)</sup>	4,25
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	7,45
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Buprenorphine* | ATC: N02AE01 | wyk: B | EAN ~ 966127  
 (1) Nowotwory złośliwe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 STADA Poland Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Melodyn [56,73], Transec® 35 µg/h [59,19]

Transec® 52,5 µg/h: system transdermalny 52,5 µg/h - 5 szt. (30 mg w plastrze) ◆	Rx	100%	84,97
		Limit	82,41
		B <sup>(1)</sup>	2,56
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	5,76
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Buprenorphine* | ATC: N02AE01 | wyk: B | EAN ~ 966226  
 (1) Nowotwory złośliwe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 STADA Poland Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Melodyn [82,41], Transec® 52,5 µg/h [84,97]

Transec® 70 µg/h: system transdermalny 70 µg/h - 5 szt. (40 mg w plastrze) ◆	Rx	100%	110,06
		Limit	109,88
		B <sup>(1)</sup>	0,18
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,38
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: *Buprenorphine* | ATC: N02AE01 | wyk: B | EAN ~ 966325  
 (1) Nowotwory złośliwe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 STADA Poland Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Melodyn [107,44], Transec® 70 µg/h [110,06]

Travatan®: krople do oczu [roztw.] 40 µg/ml - 1 but. 2,5 ml	Rx	100%	38,76
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	10,31
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Travoprost* | ATC: S01EE04 | wyk: B | EAN ~ 942619  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
 Novartis Europharm Limited  
 Odpowiedniki: Travoprost Genoptim [36,44], Travatan® [38,76]

Travoprost+Timolol Genoptim: krople do oczu [roztw.] (40 µg+ 5 mg/ml) - 1 but. 2,5 ml ◆	Rx	100%	39,27
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	10,82
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Travoprost + Timolol* | ATC: S01ED51 | wyk: B | EAN ~ 135042  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
 Synoptis Pharma Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Travoprost + Timolol Medical Valley [32,69], Rozaduo [39,27], Travoprost+Timolol Genoptim [39,27], DuoTrav [45,46]

Travoprost + Timolol Medical Valley: krople do oczu [roztw.] (40 µg+ 5 mg/ml) - 1 but. 2,5 ml ◆	Rx	100%	32,69
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	4,24
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Travoprost + Timolol* | ATC: S01ED51 | wyk: B | EAN ~ 144710  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
 Medical Valley Invest AB  
 Odpowiedniki: Travoprost + Timolol Medical Valley [32,69], Rozaduo [39,27], Travoprost+Timolol Genoptim [39,27], DuoTrav [45,46]

Travoprost Genoptim: krople do oczu [roztw.] 40 µg/ml - 1 but. 2,5 ml ◆	Rx	100%	36,44
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,99
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Travoprost* | ATC: S01EE04 | wyk: B | EAN ~ 197629  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: D  
 Synoptis Pharma Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Travoprost Genoptim [36,44], Travatan® [38,76]

Trelegy Ellipta: prosz. do inhal., podzielony 92/55/22 µg/dawkę - 1 inhal. (30 dawek)	Rx	100%	235,72
		Limit	205,27
		30% <sup>(1)</sup>	92,03
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Fluticasone furoate + Umeclidinium + Vilanterol* | ATC: R03AL08 | wyk: B | EAN ~ 135063  
 (1) Leczenie podtrzymujące u pacjentów dorosłych z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), u których nie uzyskuje się odpowiedniego efektu leczenia podczas jednoczesnego stosowania kortykosteroidu wziewnego i długo działającego agonisty receptorów β<sub>2</sub> lub jednoczesnego stosowania długo działającego agonisty receptorów β<sub>2</sub> i długo działającego antagonisty receptorów muskarynowych (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 GlaxoSmithKline Trading Services

Trelema: tabl. powl. 50 mg - 14 szt. ◆	Rx	100%	12,09
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	4,72
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Lacosamide* | ATC: N03AX18 | wyk: B | EAN ~ 138419  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana u chorych poniżej 16 rż. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C  
 G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.  
 Odpowiedniki: Vimpat [X], Epilantin [12,09], Trelema [12,09], Lacosamide Neuraxpharm [12,47], Lacosamide Teva [12,53], Lacosamide Glenmark [12,60], Lacosamide Accord [12,81]



W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

Trelema: tabl. powł. 100 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	80,78
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lacosamide</i>	ATC: N03AX18	wyk: B	EAN ~ 138423
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana u chorych poniżej 16 rż. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Vimpat [X], Epilintan [80,78], Trelema [80,78], Lacosamide Neuraxpharm [84,13], Lacosamide Teva [84,53], Lacosamide Glenmark [85,21], Lacosamide Accord [86,92]			

Trelema: tabl. powł. 150 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	117,09
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lacosamide</i>	ATC: N03AX18	wyk: B	EAN ~ 138424
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana u chorych poniżej 16 rż. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Vimpat [X], Epilintan [117,09], Trelema [117,09], Zilibra [120,78], Lacosamide Neuraxpharm [122,13], Lacosamide Teva [122,73], Lacosamide Glenmark [123,73], Lacosamide Accord [126,30]			

Trelema: tabl. powł. 200 mg - 56 szt. ◆	Rx	100%	153,01
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,98
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lacosamide</i>	ATC: N03AX18	wyk: B	EAN ~ 138425
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana u chorych poniżej 16 rż. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Vimpat [X], Epilintan [153,01], Trelema [153,01], Zilibra [158,21], Lacosamide Neuraxpharm [159,71], Lacosamide Teva [160,52], Lacosamide Glenmark [161,86], Lacosamide Accord [165,27]			

▼ Tresiba® Penfill®: inj. [roztw.] 100 j./ml - 10 wkł. 3 ml	Rx	100%	402,12
		Limit	309,91
		30% <sup>(1)</sup>	185,18
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <i>Insulin degludec</i>	ATC: A10AE06	wyk: B	EAN ~ 912444
(1) Cukrzyca typu 1 u dorosłych, Cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c $\geq$ 7,5% oraz cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c $\geq$ 8% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c $\geq$ 8% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dorosłych o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO), Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dorosłych o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO) (2) Kobiety w ciąży (3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: A			
Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.			

Trevicta: inj. [zaw. o przedl. uwalnianiu] 263 mg - 1 amp.-strzyk. 1,315 ml (+2 igły)	Rx	100%	1310,68
		Limit	1280,81
		B <sup>(1)</sup>	29,87
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Paliperidone</i>	ATC: N05AX13	wyk: B	EAN ~ 128146
(1) Leczenie podtrzymujące schizofrenii u dorosłych pacjentów ustabilizowanych klinicznie na palmitynianie paliperidonu podawanym we wstrzyknięciach co 1 miesiąc   Kat. ciąży: C			
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.			
Trevicta: inj. [zaw. o przedl. uwalnianiu] 350 mg - 1 amp.-strzyk. 1,75 ml (+2 igły)	Rx	100%	1738,38
		Limit	1704,50
		B <sup>(1)</sup>	33,88
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Paliperidone</i>	ATC: N05AX13	wyk: B	EAN ~ 128147
(1) Leczenie podtrzymujące schizofrenii u dorosłych pacjentów ustabilizowanych klinicznie na palmitynianie paliperidonu podawanym we wstrzyknięciach co 1 miesiąc   Kat. ciąży: C			
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.			

Trevicta: inj. [zaw. o przedl. uwalnianiu] 525 mg - 1 amp.-strzyk. 2,625 ml (+2 igły)	Rx	100%	2598,69
		Limit	2556,75
		B <sup>(1)</sup>	41,94
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Paliperidone</i>	ATC: N05AX13	wyk: B	EAN ~ 128148
(1) Leczenie podtrzymujące schizofrenii u dorosłych pacjentów ustabilizowanych klinicznie na palmitynianie paliperidonu podawanym we wstrzyknięciach co 1 miesiąc   Kat. ciąży: C			
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.			

Trexan® Neo: tabl. 2,5 mg - 100 szt. (blister) ◆	Rx	100%	25,65
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	14,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Methotrexate</i>	ATC: L04AX03	wyk: A	EAN ~ 130357
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X			
Orion Pharma Poland Sp. o.o.			

Trexan® Neo: tabl. 10 mg - 100 szt. (blister) ◆	Rx	100%	88,47
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	42,67
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Methotrexate</i>	ATC: L04AX03	wyk: B	EAN ~ 005860
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X			
Orion Pharma Poland Sp. o.o.			

Trileptal®: tabl. powł. 300 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	49,97
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	8,93
INN: <i>Oxcarbazepine</i>	ATC: N03AF02	wyk: B	EAN ~ 825615
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka oporna na leczenie (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Novartis Poland Sp. z o.o.			

Trileptal®: tabl. powł. 600 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	94,42
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	9,15
INN: <i>Oxcarbazepine</i>	ATC: N03AF02	wyk: B	EAN ~ 825714
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka oporna na leczenie (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Novartis Poland Sp. z o.o.			

Trileptal®: zaw. doust. 60 mg/1 ml - 1 fi. 250 ml ◆	Rx	100%	84,41
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	3,20
INN: <i>Oxcarbazepine</i>	ATC: N03AF02	wyk: B	EAN ~ 747115
(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka oporna na leczenie (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Novartis Poland Sp. z o.o.			

Trimbow®: aerozol inhal. [roztw.] 87/5/9 µg/dawkę - 1 poj. (180 dawek)	Rx	100%	307,90
		Limit	307,90
		30% <sup>(1)</sup>	92,37
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Beclometasone dipropionate + Formoterol + Glycopyrronium bromide</i>	ATC: R03AL02	wyk: A	EAN ~ 300815
(1) Leczenie podtrzymujące u pacjentów dorosłych z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), u których nie uzyskuje się odpowiedniego efektu leczenia podczas jednoczesnego stosowania kortykosteroidu wziewnego i długo działającego agonisty receptorów $\beta_2$ lub jednoczesnego stosowania długo działającego agonisty receptorów $\beta_2$ i długo działającego antagonisty receptorów muskarynowych. Leczenie podtrzymujące astmy u pacjentów z niewystarczającą kontrolą objawów choroby po zastosowaniu produktu złożonego z długo działającego agonisty receptorów $\beta_2$ i średnich dawek kortykosteroidu wziewnego, u których wystąpiło jedno lub więcej zaostrzeń astmy w ciągu poprzedniego roku (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Chiesi Farmaceutici S.p.A.			

Trioxal®: kaps. 100 mg - 4 szt.	Rx	100%	15,11
		Limit	11,87
		50% <sup>(1)</sup>	9,18
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Itraconazole</i>	ATC: J02AC02	wyk: B	EAN ~ 053819
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zakażenia grzybicze u pacjentów po przeszczepie szpiku - profilaktyka (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			

Odpowiedniki: Orungal® [12,85], Itrax [13,31], Trioxal® [15,11]			
-----------------------------------------------------------------	--	--	--



# ZOLPIC

Daj owcom odpocząć.  
zolidem



Trioxal®: kaps. 100 mg - 28 szt.	Rx	100%	85,82
		Limit	83,06
		50% <sup>(1)</sup>	44,29
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Itraconazole** ATC: **J02AC02** wyk: **B** EAN ~ **053826**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Zakażenia grzybicze u pacjentów po przeszczepieniu szpiku – profilaktyka (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Tritace® 2,5: tabl. 2,5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	9,63
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,62
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Ramipril** ATC: **C09AA05** wyk: **B** EAN ~ **478217**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Przewłoka choroby nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**  
 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tritace® 2,5 comb: tabl. 2,5/12,5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	10,31
		Limit	5,21
		R <sup>(1)</sup>	8,30
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Ramipril + Hydrochlorothiazide** ATC: **C09BA05** wyk: **B** EAN ~ **885312**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Naciski tętna u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określone w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**  
 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tritace® 5: tabl. 5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	13,50
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	9,04
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Ramipril** ATC: **C09AA05** wyk: **B** EAN ~ **478316**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Przewłoka choroby nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**  
 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Ramikor® [8,70], Ramipril Genoptim [9,56], Vivace - (IR) [10,52], Vivace - (IR) [10,53], Vivace - (IR) [10,63], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Polpri® [10,97], Polpri® [11,49], Tritace® 5 [13,50]

Tritace® 5 - (IR): tabl. 5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	10,86
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,40
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Ramipril** ATC: **C09AA05** wyk: **B** EAN ~ **148052**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Przewłoka choroby nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**  
 Inpharm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Ramikor® [8,70], Ramipril Genoptim [9,56], Vivace - (IR) [10,52], Vivace - (IR) [10,53], Vivace - (IR) [10,63], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Polpri® [10,97], Polpri® [11,49], Tritace® 5 [13,50]

Tritace® 5 - (IR): tabl. 5 mg - 28 szt.	Rx	100%	10,86
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,40
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Ramipril** ATC: **C09AA05** wyk: **B** EAN ~ **148239**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Przewłoka choroby nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
 Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Ramikor® [8,70], Ramipril Genoptim [9,56], Vivace - (IR) [10,52], Vivace - (IR) [10,53], Vivace - (IR) [10,63], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Polpri® [10,97], Polpri® [11,49], Tritace® 5 [13,50]

Tritace® 5 - (IR): tabl. 5 mg - 28 szt.	Rx	100%	10,86
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	6,40
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Ramipril** ATC: **C09AA05** wyk: **B** EAN ~ **148044**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Przewłoka choroby nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
 Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Ramikor® [8,70], Ramipril Genoptim [9,56], Vivace - (IR) [10,52], Vivace - (IR) [10,53], Vivace - (IR) [10,63], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Polpri® [10,97], Polpri® [11,49], Tritace® 5 [13,50]

Tritace® 5 comb: tabl. 5/25 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	13,50
		Limit	10,43
		R <sup>(1)</sup>	9,04
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Ramipril + Hydrochlorothiazide** ATC: **C09BA05** wyk: **B** EAN ~ **885411**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Naciski tętna u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określone w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**  
 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tritace® 10: tabl. 10 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	22,20
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	13,30
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Ramipril** ATC: **C09AA05** wyk: **B** EAN ~ **916016**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Przewłoka choroby nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**  
 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Tritace® 10 - (IR) [X], Ramikor® [15,95], Ramipril Genoptim [17,84], Tritace® 10 - (IR) [19,44], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,65], Tritace® 10 - (IR) [19,68], Vivace - (IR) [19,91], Vivace - (IR) [20,08], Piramil 10 mg [20,13], Vivace - (IR) [20,25], Polpri® [20,85], Polpri® [22,18], Tritace® 10 [22,20]

Tritace® 10 - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt.	Rx	100%	19,54
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	11,95
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Ramipril** ATC: **C09AA05** wyk: **B** EAN ~ **142715**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Przewłoka choroby nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
 Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Tritace® 10 - (IR) [X], Ramikor® [15,95], Ramipril Genoptim [17,84], Tritace® 10 - (IR) [19,44], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,65], Tritace® 10 - (IR) [19,68], Vivace - (IR) [19,91], Vivace - (IR) [20,08], Piramil 10 mg [20,13], Vivace - (IR) [20,25], Polpri® [20,85], Polpri® [22,18], Tritace® 10 [22,20]

Tritace® 10 - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt.	Rx	100%	19,54
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	11,95
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Ramipril** ATC: **C09AA05** wyk: **B** EAN ~ **141164**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Przewłoka choroby nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
 Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Tritace® 10 - (IR) [X], Ramikor® [15,95], Ramipril Genoptim [17,84], Tritace® 10 - (IR) [19,44], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,65], Tritace® 10 - (IR) [19,68], Vivace - (IR) [19,91], Vivace - (IR) [20,08], Piramil 10 mg [20,13], Vivace - (IR) [20,25], Polpri® [20,85], Polpri® [22,18], Tritace® 10 [22,20]

Tritace® 10 - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	19,54
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	11,95
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Ramipril** ATC: **C09AA05** wyk: **B** EAN ~ **144754**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Przewłoka choroby nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D**  
 Inpharm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Tritace® 10 - (IR) [X], Ramikor® [15,95], Ramipril Genoptim [17,84], Tritace® 10 - (IR) [19,44], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,65], Tritace® 10 - (IR) [19,68], Vivace - (IR) [19,91], Vivace - (IR) [20,08], Piramil 10 mg [20,13], Vivace - (IR) [20,25], Polpri® [20,85], Polpri® [22,18], Tritace® 10 [22,20]

Tritace® 10 - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt.	Rx	100%	19,54
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	11,95
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Ramipril** ATC: **C09AA05** wyk: **B** EAN ~ **145834**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP**: Przewłoka choroby nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
 Inpharm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Tritace® 10 - (IR) [X], Ramikor® [15,95], Ramipril Genoptim [17,84], Tritace® 10 - (IR) [19,44], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,65], Tritace® 10 - (IR) [19,68], Vivace - (IR) [19,91], Vivace - (IR) [20,08], Piramil 10 mg [20,13], Vivace - (IR) [20,25], Polpri® [20,85], Polpri® [22,18], Tritace® 10 [22,20]

<b>Tritace® 10 - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt.</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>19,65</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>11,95</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	19,65	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	11,95	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Trittico® XR: tabl. powł. o przedł. uwalnianiu 300 mg - 30 szt. ◇</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>65,32</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>31,20</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>43,48</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	65,32	Limit	31,20	30% <sup>(1)</sup>	43,48	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	19,65																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	11,95																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	65,32																						
Limit	31,20																						
30% <sup>(1)</sup>	43,48																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <b>Ramipril</b>   ATC: <b>C09AA05</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>146340</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>   Delfarma Sp. z o.o.		INN: <b>Trazodone hydrochloride</b>   ATC: <b>N06AX05</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>094799</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.																					
<b>Tritace® 10 - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>19,68</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>11,95</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	19,68	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	11,95	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Trixeo Aerosphere: aerozol inhal. [zaw.] 5 µg+ 7,2 µg+ 160 µg - 1 poj. 120 dawek</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>259,48</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>205,27</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>115,79</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	259,48	Limit	205,27	30% <sup>(1)</sup>	115,79	S <sup>(2)</sup>	bezpł.		
100%	19,68																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	11,95																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	259,48																						
Limit	205,27																						
30% <sup>(1)</sup>	115,79																						
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
INN: <b>Ramipril</b>   ATC: <b>C09AA05</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>140156</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>   Inpharm Sp. z o.o.		INN: <b>Formoterol fumarate dihydric + Glycopyrronium + Budesonide</b>   ATC: <b>R03AL11</b>   wyk: <b>A</b>   EAN ~ <b>607150</b> (1) Leczenie podtrzymujące u pacjentów dorosłych z umiarkowaną lub ciężką przewłokłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), u których nie uzyskuje się odpowiedniego efektu leczenia podczas jednoczesnego stosowania kortykosteroidu wziewnego i długo działającego agonisty receptorów beta 2 lub jednoczesnego stosowania długo działającego agonisty receptorów beta 2 i długo działającego antagonisty receptorów muskarynowych (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.																					
<b>Tritace® 10 - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>19,44</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>11,95</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	19,44	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	11,95	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Tropicamidum WZF 0,5%: krople do oczu [roztw.] 5 mg/ml - 2 but. 5 ml ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>12,76</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	12,76	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	19,44																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	11,95																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	12,76																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	3,20																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <b>Ramipril</b>   ATC: <b>C09AA05</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>145210</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>   Medezin		INN: <b>Tropicamide</b>   ATC: <b>S01FA06</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>125524</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Polfa Warszawa SA																					
<b>Tritace® 10 - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>19,44</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>11,95</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	19,44	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	11,95	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Tropicamidum WZF 1%: krople do oczu [roztw.] 10 mg/ml - 2 but. 5 ml ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>16,81</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	16,81	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	19,44																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	11,95																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	16,81																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	3,20																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <b>Ramipril</b>   ATC: <b>C09AA05</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>145210</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>   Medezin		INN: <b>Tropicamide</b>   ATC: <b>S01FA06</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>125623</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Polfa Warszawa SA																					
<b>Trittico® CR: tabl. o przedł. uwalnianiu 75 mg - 30 szt. ◇</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>18,78</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>7,80</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>13,32</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	18,78	Limit	7,80	30% <sup>(1)</sup>	13,32	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>▼Trulicity: inj. [roztw.] 0,75 mg/0,5 ml - 2 wstrzyk. 0,5 ml</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>197,04</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>197,04</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>59,11</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	197,04	Limit	197,04	30% <sup>(1)</sup>	59,11	S <sup>(2)</sup>	bezpł.		
100%	18,78																						
Limit	7,80																						
30% <sup>(1)</sup>	13,32																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	197,04																						
Limit	197,04																						
30% <sup>(1)</sup>	59,11																						
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
INN: <b>Trazodone hydrochloride</b>   ATC: <b>N06AX05</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>918621</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.		INN: <b>Dulaglutide</b>   ATC: <b>A10BX14</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>121913</b> (1) Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c $\geq 7,5\%$ , z otyłością definiowaną jako BMI $\geq 30$ kg/m <sup>2</sup> oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek $\geq 60$ lat dla mężczyzn, $\geq 60$ lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Eli Lilly Polska Sp. z o.o.																					
<b>Trittico® CR: tabl. o przedł. uwalnianiu 150 mg - 20 szt. ◇</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>24,58</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>10,40</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>17,30</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	24,58	Limit	10,40	30% <sup>(1)</sup>	17,30	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>▼Trulicity: inj. [roztw.] 1,5 mg/0,5 ml - 2 wstrzyk. 0,5 ml</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>197,04</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>197,04</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>59,11</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	197,04	Limit	197,04	30% <sup>(1)</sup>	59,11	S <sup>(2)</sup>	bezpł.		
100%	24,58																						
Limit	10,40																						
30% <sup>(1)</sup>	17,30																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	197,04																						
Limit	197,04																						
30% <sup>(1)</sup>	59,11																						
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
INN: <b>Trazodone hydrochloride</b>   ATC: <b>N06AX05</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>918720</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.		INN: <b>Dulaglutide</b>   ATC: <b>A10BX14</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>121916</b> (1) Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c $\geq 7,5\%$ , z otyłością definiowaną jako BMI $\geq 30$ kg/m <sup>2</sup> oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek $\geq 55$ lat dla mężczyzn, $\geq 60$ lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Eli Lilly Polska Sp. z o.o.																					
<b>Trittico® CR: tabl. o przedł. uwalnianiu 150 mg - 60 szt. ◇</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>64,80</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>31,20</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>42,96</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	64,80	Limit	31,20	30% <sup>(1)</sup>	42,96	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>▼Trulicity: inj. [roztw.] 3 mg/0,5 ml - 2 wstrzyk. 0,5 ml</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>197,04</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>197,04</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>59,11</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	197,04	Limit	197,04	30% <sup>(1)</sup>	59,11	S <sup>(2)</sup>	bezpł.		
100%	64,80																						
Limit	31,20																						
30% <sup>(1)</sup>	42,96																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	197,04																						
Limit	197,04																						
30% <sup>(1)</sup>	59,11																						
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
INN: <b>Trazodone hydrochloride</b>   ATC: <b>N06AX05</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>715497</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.		INN: <b>Dulaglutide</b>   ATC: <b>A10BX14</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>269763</b> (1) Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c $\geq 7,5\%$ , z otyłością definiowaną jako BMI $\geq 30$ kg/m <sup>2</sup> oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek $\geq 55$ lat dla mężczyzn, $\geq 60$ lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Eli Lilly Polska Sp. z o.o.																					
<b>Trittico® XR: tabl. powł. o przedł. uwalnianiu 150 mg - 30 szt. ◇</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>35,25</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>15,60</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>24,33</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	35,25	Limit	15,60	30% <sup>(1)</sup>	24,33	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>▼Trulicity: inj. [roztw.] 4,5 mg/0,5 ml - 2 wstrzyk. 0,5 ml</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>197,04</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>197,04</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>59,11</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	197,04	Limit	197,04	30% <sup>(1)</sup>	59,11	S <sup>(2)</sup>	bezpł.		
100%	35,25																						
Limit	15,60																						
30% <sup>(1)</sup>	24,33																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	197,04																						
Limit	197,04																						
30% <sup>(1)</sup>	59,11																						
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
INN: <b>Trazodone hydrochloride</b>   ATC: <b>N06AX05</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>109464</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.		INN: <b>Dulaglutide</b>   ATC: <b>A10BX14</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>269764</b> (1) Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c $\geq 7,5\%$ , z otyłością definiowaną jako BMI $\geq 30$ kg/m <sup>2</sup> oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek $\geq 55$ lat dla mężczyzn, $\geq 60$ lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>   Eli Lilly Polska Sp. z o.o.																					



Naszym wyborem

**enarenal**  
 enalapryli maleas

Trund: tabl. powł. 250 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	16,85
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	7,86
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Levetiracetam** | ATC: **N03AX14** | wyk: **B** | EAN ~ **925858**  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Neuroxpharm Arzneimittel GmbH

Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam NeuroPharma [X], Levetiracetam Aurovitas [14,36], Levetiracetam Accord [14,46], Polkepral [14,46], Normeg [15,94], Trund [16,85], Cezarius [19,72], Vetrica [19,95], Keppra® [47,97]

Trund: tabl. powł. 500 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	32,26
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	11,09
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Levetiracetam** | ATC: **N03AX14** | wyk: **B** | EAN ~ **925872**  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Neuroxpharm Arzneimittel GmbH

Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam Aurovitas [27,30], Polkepral [27,47], Levetiracetam Accord [27,48], Normeg [30,42], Levebon [31,07], Cezarius [32,26], Levetiracetam NeuroPharma [32,26], Trund [32,26], Vetrica [38,47], Keppra® [94,41]

Trund: tabl. powł. 500 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	61,07
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	15,89
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Levetiracetam** | ATC: **N03AX14** | wyk: **B** | EAN ~ **925889**  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Neuroxpharm Arzneimittel GmbH

Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Normeg [51,15], Levetiracetam Accord [51,52], Polkepral [51,52], Levetiracetam NeuroPharma [61,07], Trund [61,07], Keppra® [186,26]

Trund: tabl. powł. 750 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	46,71
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	13,35
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Levetiracetam** | ATC: **N03AX14** | wyk: **B** | EAN ~ **925926**  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Neuroxpharm Arzneimittel GmbH

Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam Aurovitas [39,27], Levetiracetam Accord [39,53], Polkepral [39,53], Normeg [43,96], Levetiracetam NeuroPharma [46,71], Trund [46,71], Cezarius [55,30], Vetrica [56,01], Keppra® [140,37]

Trund: tabl. powł. 1000 mg - 50 szt. ◆	Rx	100%	61,07
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	15,89
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Levetiracetam** | ATC: **N03AX14** | wyk: **B** | EAN ~ **925940**  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Neuroxpharm Arzneimittel GmbH

Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam Aurovitas [51,15], Levetiracetam Accord [51,52], Polkepral [51,52], Normeg [57,40], Levebon [58,70], Cezarius [61,07], Levetiracetam NeuroPharma [61,07], Trund [61,07], Vetrica [73,46]

Trund: tabl. powł. 1000 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	115,82
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	25,44
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Levetiracetam** | ATC: **N03AX14** | wyk: **B** | EAN ~ **925957**  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Neuroxpharm Arzneimittel GmbH

Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Normeg [96,75], Levetiracetam Accord [97,49], Polkepral [97,49], Trund [115,82], Levetiracetam NeuroPharma [116,58]

Trusopt®: krople do oczu [roztw.] 20 mg/ml - 1 but. 5 ml ◆	Rx	100%	21,36
		Limit	0,00
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	6,90
		S <sup>(4)</sup>	bezpł.

INN: **Dorzolamide** | ATC: **S01EC03** | wyk: **B** | EAN ~ **661329**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Santen Oy SA Przedstawicielstwo w Polsce

Odpowiedniki: Dorzolamid STADA [X], Dorzostill [X], Oftidor [X], Vizidor [19,67], Nodofree [19,84], Trusopt® [21,36], Nedom [22,90], Rozalin [24,04]

Tulip Combo: tabl. powł. 10 mg+ 40 mg - 30 szt.	Rx	100%	20,15
		Limit	14,23
		30% <sup>(1)</sup>	10,19
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Ezetimibe + Atorvastatine** | ATC: **C10BA05** | wyk: **B** | EAN ~ **054571**

(1) Leczenie wspomagające do stosowania wraz z dietą u pacjentów dorosłych z pierwotną hipercholesterolemią (heterozygotyczną i homozygotyczną rodzinną i nierodzinną) lub mieszaną hiperlipidemią już kontrolowaną za pomocą atorwastatyny i ezetymibu, które są podawane w takich samych dawkach(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **X**  
 Sandoz GmbH

Tulip Combo: tabl. powł. 10 mg+ 10 mg - 30 szt.	Rx	100%	20,15
		Limit	14,23
		30% <sup>(1)</sup>	10,19
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Ezetimibe + Atorvastatine** | ATC: **C10BA05** | wyk: **B** | EAN ~ **105455**

(1) Leczenie wspomagające do stosowania wraz z dietą u pacjentów dorosłych z pierwotną hipercholesterolemią (heterozygotyczną i homozygotyczną rodzinną i nierodzinną) lub mieszaną hiperlipidemią już kontrolowaną za pomocą atorwastatyny i ezetymibu, które są podawane w takich samych dawkach(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **X**  
 Sandoz GmbH

Tulip Combo: tabl. powł. 10 mg+ 20 mg - 30 szt.	Rx	100%	20,15
		Limit	14,23
		30% <sup>(1)</sup>	10,19
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Ezetimibe + Atorvastatine** | ATC: **C10BA05** | wyk: **B** | EAN ~ **105456**

(1) Leczenie wspomagające do stosowania wraz z dietą u pacjentów dorosłych z pierwotną hipercholesterolemią (heterozygotyczną i homozygotyczną rodzinną i nierodzinną) lub mieszaną hiperlipidemią już kontrolowaną za pomocą atorwastatyny i ezetymibu, które są podawane w takich samych dawkach(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **X**  
 Sandoz GmbH

Tulip®: tabl. powł. 10 mg - 30 szt.	Rx	100%	9,60
		Limit	4,21
		30% <sup>(1)</sup>	6,65
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** | ATC: **C10AA05** | wyk: **B** | EAN ~ **998814**

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **X**  
 Sandoz GmbH

Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medreg [4,58], Atorvastatin Genoptim [5,28], Atorvastatin Bluefish AB [5,50], Storvas CRT [6,04], Lambrinex [7,12], Torvacard® 10 [8,79], Atorvox [9,06], Atrrox® 10 [9,49], Atroris® [9,56], Tulip® [9,60], Apo-Atorva [9,65], Atorasterol® [9,81]

Tulip®: tabl. powł. 10 mg - 60 szt.	Rx	100%	18,67
		Limit	8,43
		30% <sup>(1)</sup>	12,77
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** | ATC: **C10AA05** | wyk: **B** | EAN ~ **998821**

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **X**  
 Sandoz GmbH

Odpowiedniki: Lambrinex [9,98], Atrrox® 10 [10,69], Tulip® [18,67]

Tulip®: tabl. powł. 10 mg - 90 szt.	Rx	100%	27,83
		Limit	12,64
		30% <sup>(1)</sup>	18,98
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Atorvastatin** | ATC: **C10AA05** | wyk: **B** | EAN ~ **998838**

(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **X**  
 Sandoz GmbH

Odpowiedniki: Lambrinex [14,49], Atrrox® 10 [14,84], Atroris® [27,65], Tulip® [27,83]

Tulip®: tabl. powł. 20 mg - 30 szt.		Rx	100%	15,42	
			Limit	8,43	
			30% <sup>(1)</sup>	9,52	
			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
			S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
INN: <i>Atorvastatin</i>	ATC: C10AA05	wyk: B	EAN ~ 998913		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X					
Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [8,20], Atorvastatin Medreg [8,26], Atorvastatin Aurovitas [8,89], Atorvastatin Bluefish AB [9,61], Atorvastatin Genoptim [9,88], Atorvagen [9,97], Stovras CRT [11,17], Lambrinex [11,67], Torvacard® 20 [12,94], Atoris® [13,71], Atox® 20 [15,01], Atorvax [15,23], Tulip® [15,42], Apo-Atorva [17,75], Atorvasterol® [19,11]					
Tulip®: tabl. powł. 20 mg - 60 szt.		Rx	100%	28,43	
			Limit	16,86	
			30% <sup>(1)</sup>	16,63	
			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
			S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
INN: <i>Atorvastatin</i>	ATC: C10AA05	wyk: B	EAN ~ 998920		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X					
Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [8,20], Atorvastatin Medreg [8,26], Atorvastatin Aurovitas [8,89], Atorvastatin Bluefish AB [9,61], Atorvastatin Genoptim [9,88], Atorvagen [9,97], Stovras CRT [11,17], Lambrinex [11,67], Torvacard® 20 [12,94], Atoris® [13,71], Atox® 20 [15,01], Atorvax [15,23], Tulip® [15,42], Apo-Atorva [17,75], Atorvasterol® [19,11]					
Tulip®: tabl. powł. 20 mg - 90 szt.		Rx	100%	41,80	
			Limit	25,29	
			30% <sup>(1)</sup>	24,10	
			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
			S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
INN: <i>Atorvastatin</i>	ATC: C10AA05	wyk: B	EAN ~ 998937		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X					
Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [8,20], Atorvastatin Medreg [8,26], Atorvastatin Aurovitas [8,89], Atorvastatin Bluefish AB [9,61], Atorvastatin Genoptim [9,88], Atorvagen [9,97], Stovras CRT [11,17], Lambrinex [11,67], Torvacard® 20 [12,94], Atoris® [13,71], Atox® 20 [15,01], Atorvax [15,23], Tulip® [15,42], Apo-Atorva [17,75], Atorvasterol® [19,11]					
Tulip®: tabl. powł. 40 mg - 30 szt.		Rx	100%	23,91	
			Limit	16,86	
			30% <sup>(1)</sup>	12,11	
			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
			S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
INN: <i>Atorvastatin</i>	ATC: C10AA05	wyk: B	EAN ~ 810161		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X					
Odpowiedniki: Atractin [X], Olvastim [X], Torvalipin [X], Atorvastatin Medical Valley [15,27], Atorvastatin Medreg [15,38], Atorvastatin Aurovitas [16,06], Atorvastatin Bluefish AB [18,30], Atorvastatin Genoptim [18,81], Atorvagen [19,02], Stovras CRT [21,57], Lambrinex [22,63], Tulip® [23,91], Torvacard® 40 [24,03], Atoris® [26,75], Atorvax [27,97], Atox® 40 [29,46], Apo-Atorva [32,04], Atorvasterol® [37,58]					
Tulip®: tabl. powł. 40 mg - 60 szt.		Rx	100%	38,57	
			Limit	33,72	
			30% <sup>(1)</sup>	14,97	
			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
			S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
INN: <i>Atorvastatin</i>	ATC: C10AA05	wyk: B	EAN ~ 810178		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X					
Odpowiedniki: Olvastim [12,00], Atorvastatin Genoptim [32,62], Atox® 40 [34,02], Lambrinex [34,94], Tulip® [38,57], Atoris® [48,61]					
Tulip®: tabl. powł. 40 mg - 90 szt.		Rx	100%	55,59	
			Limit	50,58	
			30% <sup>(1)</sup>	20,18	
			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
			S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
INN: <i>Atorvastatin</i>	ATC: C10AA05	wyk: B	EAN ~ 810185		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X					
Odpowiedniki: Atorvastatin Aurovitas [X], Atorvastatin Genoptim [47,25], Lambrinex [49,88], Atox® 40 [50,68], Tulip® [55,59], Torvacard® 40 [68,07], Atoris® [72,77]					
Tulip®: tabl. powł. 80 mg - 30 szt.		Rx	100%	52,79	
			Limit	33,72	
			30% <sup>(1)</sup>	29,19	
			DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	
			S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
INN: <i>Atorvastatin</i>	ATC: C10AA05	wyk: B	EAN ~ 810208		
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X					
Odpowiedniki: Atorvastatin Medreg [28,80], Atorvastatin Bluefish AB [29,14], Atorvastatin Genoptim [32,49], Atorvasterol® [37,24], Stovras CRT [40,48], Atox® 80 [41,34], Torvacard® 80 [47,35], Atoris® [51,54], Tulip® [52,79]					
Tullex: inj. [roztw.] 7,5 mg - 4 amp.-strzyk. 0,2 ml ◆		Rx	100%	81,73	
			Limit	0,00	
			DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	
			R <sup>(2)</sup>	3,20	
			S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
INN: <i>Methotrexate</i>	ATC: L04AX03	wyk: A	EAN ~ 718702		
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X					
Egis Polska Sp. z o.o.					
Tullex: inj. [roztw.] 7,5 mg - 12 amp.-strzyk. 0,2 ml ◆		Rx	100%	225,93	
			Limit	0,00	
			DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	
			R <sup>(2)</sup>	3,84	
			S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
INN: <i>Methotrexate</i>	ATC: L04AX03	wyk: A	EAN ~ 718703		
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X					
Egis Polska Sp. z o.o.					
Tullex: inj. [roztw.] 10 mg - 4 amp.-strzyk. 0,267 ml ◆		Rx	100%	106,51	
			Limit	0,00	
			DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	
			R <sup>(2)</sup>	3,20	
			S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
INN: <i>Methotrexate</i>	ATC: L04AX03	wyk: A	EAN ~ 718705		
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X					
Egis Polska Sp. z o.o.					
Tullex: inj. [roztw.] 10 mg - 12 amp.-strzyk. 0,267 ml ◆		Rx	100%	298,15	
			Limit	0,00	
			DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	
			R <sup>(2)</sup>	5,12	
			S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
INN: <i>Methotrexate</i>	ATC: L04AX03	wyk: A	EAN ~ 718706		
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X					
Egis Polska Sp. z o.o.					
Tullex: inj. [roztw.] 12,5 mg - 4 amp.-strzyk. 0,333 ml ◆		Rx	100%	130,80	
			Limit	0,00	
			DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	
			R <sup>(2)</sup>	3,20	
			S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
INN: <i>Methotrexate</i>	ATC: L04AX03	wyk: A	EAN ~ 718708		
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X					
Egis Polska Sp. z o.o.					
Tullex: inj. [roztw.] 12,5 mg - 12 amp.-strzyk. 0,333 ml ◆		Rx	100%	367,92	
			Limit	0,00	
			DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	
			R <sup>(2)</sup>	6,40	
			S <sup>(3)</sup>	bezpł.	
INN: <i>Methotrexate</i>	ATC: L04AX03	wyk: A	EAN ~ 718709		
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X					
Egis Polska Sp. z o.o.					



Tullex: inj. [roztw.] 15 mg - 4 amp.-strzyk. 0,4 ml ◆	Rx	100% 155,10 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 3,20 S <sup>(3)</sup> bezpł.	INN: <i>Methotrexate</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: L04AX03	wyk: A	EAN ~ 718711 Egis Polska Sp. z o.o.
Tullex: inj. [roztw.] 15 mg - 12 amp.-strzyk. 0,4 ml ◆	Rx	100% 440,74 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 7,68 S <sup>(3)</sup> bezpł.	INN: <i>Methotrexate</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: L04AX03	wyk: A	EAN ~ 718712 Egis Polska Sp. z o.o.
Tullex: inj. [roztw.] 17,5 mg - 4 amp.-strzyk. 0,467 ml ◆	Rx	100% 179,31 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 3,20 S <sup>(3)</sup> bezpł.	INN: <i>Methotrexate</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: L04AX03	wyk: A	EAN ~ 718714 Egis Polska Sp. z o.o.
Tullex: inj. [roztw.] 17,5 mg - 12 amp.-strzyk. 0,467 ml ◆	Rx	100% 509,90 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 8,96 S <sup>(3)</sup> bezpł.	INN: <i>Methotrexate</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: L04AX03	wyk: A	EAN ~ 718715 Egis Polska Sp. z o.o.
Tullex: inj. [roztw.] 20 mg - 4 amp.-strzyk. 0,533 ml ◆	Rx	100% 203,08 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 3,41 S <sup>(3)</sup> bezpł.	INN: <i>Methotrexate</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: L04AX03	wyk: A	EAN ~ 718717 Egis Polska Sp. z o.o.
Tullex: inj. [roztw.] 20 mg - 12 amp.-strzyk. 0,533 ml ◆	Rx	100% 583,34 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 10,24 S <sup>(3)</sup> bezpł.	INN: <i>Methotrexate</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: L04AX03	wyk: A	EAN ~ 718718 Egis Polska Sp. z o.o.
Tullex: inj. [roztw.] 25 mg - 4 amp.-strzyk. 0,667 ml ◆	Rx	100% 250,61 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 4,27 S <sup>(3)</sup> bezpł.	INN: <i>Methotrexate</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: L04AX03	wyk: A	EAN ~ 718723 Egis Polska Sp. z o.o.
Tullex: inj. [roztw.] 25 mg - 12 amp.-strzyk. 0,667 ml ◆	Rx	100% 725,49 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 12,80 S <sup>(3)</sup> bezpł.	INN: <i>Methotrexate</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: L04AX03	wyk: A	EAN ~ 718724 Egis Polska Sp. z o.o.
Tullex: inj. [roztw.] 30 mg - 4 amp.-strzyk. 0,8 ml ◆	Rx	100% 298,15 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 5,12 S <sup>(3)</sup> bezpł.	INN: <i>Methotrexate</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: L04AX03	wyk: A	EAN ~ 718729 Egis Polska Sp. z o.o.
Tullex: inj. [roztw.] 30 mg - 12 amp.-strzyk. 0,8 ml ◆	Rx	100% 863,38 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 15,36 S <sup>(3)</sup> bezpł.	INN: <i>Methotrexate</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X	ATC: L04AX03	wyk: A	EAN ~ 718730 Egis Polska Sp. z o.o.
▼ Ultibro Breezhaler: prosz. do inhal. [kaps. twarde] 85/43 µg - 30 szt.	Rx	100% 134,31 Limit 134,31 30% <sup>(4)</sup> 40,29 S <sup>(2)</sup> bezpł.	INN: <i>Glycopyrronium bromide + Indacaterol</i> (1) Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: R03AL04	wyk: A	EAN ~ 080921 Novartis Europharm Limited
Uitop: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 28 szt.	Rx	100% 16,26 Limit 12,43 50% <sup>(4)</sup> 10,05 DZ <sup>(2)</sup> bezpł. S <sup>(3)</sup> bezpł.	INN: <i>Omeprazole</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r.ż.(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: A02BC01	wyk: B	EAN ~ 796298 Krka Polska Sp. z o.o.
Uitop: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 56 szt.	Rx	100% 30,13 Limit 24,87 50% <sup>(4)</sup> 17,70 DZ <sup>(2)</sup> bezpł. S <sup>(3)</sup> bezpł.	INN: <i>Omeprazole</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r.ż.(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: A02BC01	wyk: B	EAN ~ 796359 Krka Polska Sp. z o.o.
Uitop: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 28 szt.	Rx	100% 30,13 Limit 24,87 50% <sup>(4)</sup> 17,70 DZ <sup>(2)</sup> bezpł. S <sup>(3)</sup> bezpł.	INN: <i>Omeprazole</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 r.ż.(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	ATC: A02BC01	wyk: B	EAN ~ 796533 Krka Polska Sp. z o.o.
Uprox: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde 0,4 mg - 30 szt.	Rx	100% 23,98 Limit 19,21 R <sup>(1)</sup> 7,97 S <sup>(2)</sup> bezpł.	INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i> (1) Przerost gruczołu krokowego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N	ATC: G04CA02	wyk: B	EAN ~ 566068 RECORDATI Polska Sp. z o.o.
Uprox: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde 0,4 mg - 60 szt.	Rx	100% 45,76 Limit 38,42 R <sup>(1)</sup> 13,74 S <sup>(2)</sup> bezpł.	INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i> (1) Przerost gruczołu krokowego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N	ATC: G04CA02	wyk: B	EAN ~ 566075 RECORDATI Polska Sp. z o.o.
Uprox: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde 0,4 mg - 90 szt.	Rx	100% 66,83 Limit 57,63 R <sup>(1)</sup> 18,80 S <sup>(2)</sup> bezpł.	INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i> (1) Przerost gruczołu krokowego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N	ATC: G04CA02	wyk: B	EAN ~ 609235 RECORDATI Polska Sp. z o.o.
Uprox XR: tabl. o przedl. uwalnianiu 0,4 mg - 30 szt.	Rx	100% 23,98 Limit 19,21 R <sup>(1)</sup> 7,97 S <sup>(2)</sup> bezpł.	INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i> (1) Przerost gruczołu krokowego(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N	ATC: G04CA02	wyk: B	EAN ~ 191221 RECORDATI Polska Sp. z o.o.



W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

<b>UrgoTul Ag/Silver:</b> opatrunek na rany 15x20 cm - 1 szt.	WM	100% <b>62,99</b> Limit <b>62,99</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>18,90</b> B <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(2)</sup>	INN: <i>Emplastrum antimicrobium</i> (1)Przewlekłe owrzodzenia(2)Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: <b>URGO sp. z o.o.</b>	ATC: V20 wyk: EAN ~ 518024
<b>Urimper:</b> kaps. o przedl. uwalnianiu 2 mg - 60 szt. ◆	Rx	100% <b>24,55</b> Limit <b>17,65</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>12,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Tolterodine tartrate</i> (1)Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: G04BD07 wyk: B EAN ~ 008642 RIVOPHARM UK LTD
<b>Urimper:</b> kaps. o przedl. uwalnianiu 4 mg - 30 szt. ◆	Rx	100% <b>24,55</b> Limit <b>17,65</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>12,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Tolterodine tartrate</i> (1)Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: G04BD07 wyk: B EAN ~ 008666 RIVOPHARM UK LTD
<b>Urimper:</b> kaps. o przedl. uwalnianiu 4 mg - 60 szt. ◆	Rx	100% <b>46,97</b> Limit <b>35,29</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>22,27</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Tolterodine tartrate</i> (1)Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: G04BD07 wyk: B EAN ~ 008680 RIVOPHARM UK LTD
<b>Uroflow 2:</b> tabl. powl. 2 mg - 28 szt. ◆	Rx	100% <b>14,93</b> Limit <b>8,23</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>9,17</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Tolterodine tartrate</i> (1)Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: G04BD07 wyk: B EAN ~ 648641 Zentiva PL Sp. z o.o.
<b>Uroflow SR:</b> kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde 4 mg - 30 szt. ◆	Rx	100% <b>24,55</b> Limit <b>17,65</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>12,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Tolterodine tartrate</i> (1)Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: G04BD07 wyk: B EAN ~ 143747 Zentiva PL Sp. z o.o.
<b>Uronezyr:</b> tabl. powl. 5 mg - 30 szt.	Rx	100% <b>27,24</b> Limit <b>26,72</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,72</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Finasteride</i> (1)Przerost gruczołu krokowego(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>N</b>	ATC: G04CB01 wyk: B EAN ~ 088842 Aristo Pharma Sp. z o.o.
<b>Uronorm:</b> tabl. powl. 5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100% <b>20,85</b> Limit <b>17,65</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>8,50</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Solifenacin succinate</i> (1)Zespół pęcherza nadreaktywnego(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: G04BD08 wyk: B EAN ~ 131263 Orion Pharma Poland Sp. o.o.
<b>Uronorm:</b> tabl. powl. 10 mg - 30 szt. ◆	Rx	100% <b>39,57</b> Limit <b>35,29</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>14,87</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Solifenacin succinate</i> (1)Zespół pęcherza nadreaktywnego(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: G04BD08 wyk: B EAN ~ 131264 Orion Pharma Poland Sp. o.o.

<b>Urostat 0,4 mg - (IR):</b> kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde 0,4 mg - 30 szt.	Rx	100% <b>16,35</b> Limit <b>16,35</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Tamsulosin hydrochloride</i> (1)Przerost gruczołu krokowego(2)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>N</b>	ATC: G04CA02 wyk: B EAN ~ 216393 Delfarma Sp. z o.o.
<b>Ursocam:</b> tabl. 250 mg - 90 szt.	Rx	100% <b>89,59</b> Limit <b>75,09</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>37,03</b> C <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Ursodeoxycholic acid</i> (1)Pierwotna żółciowa marskość wątroby w początkowym stadium choroby(2)Kobiety w ciąży(3)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: A05AA02 wyk: B EAN ~ 314675 Polfarmex S.A.
<b>Ursocam:</b> tabl. 250 mg - 100 szt. (poj.)	Rx	100% <b>98,48</b> Limit <b>83,43</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>40,08</b> C <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Ursodeoxycholic acid</i> (1)Pierwotna żółciowa marskość wątroby w początkowym stadium choroby(2)Kobiety w ciąży(3)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: A05AA02 wyk: B EAN ~ 414741 Polfarmex S.A.
<b>Ursopol®:</b> kaps. 300 mg - 50 szt.	Rx	100% <b>61,13</b> Limit <b>50,06</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>26,09</b> C <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Ursodeoxycholic acid</i> (1)Pierwotna żółciowa marskość wątroby w początkowym stadium choroby. Wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych(2)Kobiety w ciąży(3)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: A05AA02 wyk: B EAN ~ 798223 Bausch Health
<b>Ursoxyn:</b> kaps. twarde 250 mg - 100 szt.	Rx	100% <b>83,43</b> Limit <b>83,43</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>25,03</b> C <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Ursodeoxycholic acid</i> (1)Pierwotna żółciowa marskość wątroby w początkowym stadium choroby, Zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych związane z mukowiscydozą(2)Kobiety w ciąży(3)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: A05AA02 wyk: B EAN ~ 132579 AS Grindex
<b>Utrogestan:</b> kaps. dopochwowe, miękkie 200 mg - 15 szt.	Rx	100% <b>42,84</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>3,56</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>	INN: <i>Progesterone</i> (1)Kobiety w ciąży(2)Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3)We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Profilaktyka i wspomaganie leczenia ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym, w przypadkach innych niż określone w ChPL(4)Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b>	ATC: G03DA04 wyk: B EAN ~ 140145 Besins Healthcare Ltd





# ZOLPIC

zolidem

Daj owcom odpocząć.



<p><b>Valcyte:</b> roztw. doust. [prosz.] <b>50 mg/ml</b> - 1 but. 12 g</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>788,43</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>3,20</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>788,43</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>	R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<p><b>Valsacor® 160 mg tabletki powlekane:</b> tabl. powl. <b>160 mg</b> - 60 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>55,07</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>45,86</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>22,97</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>55,07</b>	Limit	<b>45,86</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>22,97</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>788,43</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
100%	<b>55,07</b>																						
Limit	<b>45,86</b>																						
30% <sup>(1)</sup>	<b>22,97</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
<p>INN: <b>Valganciclovir</b>   ATC: <b>J05AB14</b>   wyk: <b>Rx</b>   EAN ~ <b>001082</b></p> <p>(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów mięszkowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej; Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej; Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej; zakażenia wirusem cytomegalii po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej; zakażenia wirusem Ebsteina-Barr po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b></p>	<p>Roche Polska Sp. z o.o.</p>	<p>INN: <b>Valsartan</b>   ATC: <b>C09CA03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>818983</b></p> <p>(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> <b>Krka Polska Sp. z o.o.</b></p>	<p>Roche Polska Sp. z o.o.</p>																				
<p><b>Valhit:</b> tabl. powl. <b>450 mg</b> - 60 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>483,46</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>3,20</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>483,46</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>	R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<p><b>Valsacor® 160 mg tabletki powlekane:</b> tabl. powl. <b>160 mg</b> - 90 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>78,38</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>68,79</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>30,23</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>78,38</b>	Limit	<b>68,79</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>30,23</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>483,46</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
100%	<b>78,38</b>																						
Limit	<b>68,79</b>																						
30% <sup>(1)</sup>	<b>30,23</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
<p>INN: <b>Valganciclovir</b>   ATC: <b>J05AB14</b>   wyk: <b>Rx</b>   EAN ~ <b>284381</b></p> <p>(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów mięszkowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie WP: Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie; zakażenia wirusem cytomegalii po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie; zakażenia wirusem Ebsteina-Barr po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b></p>	<p>Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.</p>	<p><b>Valsacor® 320 mg tabletki powlekane:</b> tabl. powl. <b>320 mg</b> - 28 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>51,62</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>42,80</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>21,66</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>51,62</b>	Limit	<b>42,80</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>21,66</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>										
100%	<b>51,62</b>																						
Limit	<b>42,80</b>																						
30% <sup>(1)</sup>	<b>21,66</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
<p><b>Valsacor® 80 mg tabletki powlekane:</b> tabl. powl. <b>80 mg</b> - 28 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>14,02</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>10,70</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>6,53</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>14,02</b>	Limit	<b>10,70</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>6,53</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<p><b>Valsacor® 320 mg tabletki powlekane - (IR):</b> tabl. powl. <b>320 mg</b> - 28 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>33,23</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>33,23</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>9,97</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>33,23</b>	Limit	<b>33,23</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>9,97</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>14,02</b>																						
Limit	<b>10,70</b>																						
30% <sup>(1)</sup>	<b>6,53</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
100%	<b>33,23</b>																						
Limit	<b>33,23</b>																						
30% <sup>(1)</sup>	<b>9,97</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
<p>INN: <b>Valsartan</b>   ATC: <b>C09CA03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>074945</b></p> <p>(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> <b>Krka Polska Sp. z o.o.</b></p> <p>Odpowiedniki: Apo-Valsart [X], AuroValsart [9,61], Valsartan Medical Valley [9,61], Valtap [9,75], Valzek [12,89], Tensart [13,46], Bespres [13,58], <b>Valsacor® 80 mg tabletki powlekane [14,02]</b>, Avasart [14,15], Dipper-Mono [14,15], Vanatex® [14,15], Diovan® [22,42]</p>	<p>Krka Polska Sp. z o.o.</p>	<p>INN: <b>Valsartan</b>   ATC: <b>C09CA03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>146091</b></p> <p>(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> <b>Delfarma Sp. z o.o.</b></p> <p>Odpowiedniki: <b>Valsacor® 320 mg tabletki powlekane - (IR) [33,23]</b>, Dipper-Mono [48,23], <b>Valsacor® 320 mg tabletki powlekane [51,62]</b></p>	<p>Delfarma Sp. z o.o.</p>																				
<p><b>Valsacor® 80 mg tabletki powlekane:</b> tabl. powl. <b>80 mg</b> - 60 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>28,93</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>22,93</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>12,88</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>28,93</b>	Limit	<b>22,93</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>12,88</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<p><b>Valsacor® 320 mg tabletki powlekane - (IR):</b> tabl. powl. <b>320 mg</b> - 30 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>35,35</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>35,35</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>10,61</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>35,35</b>	Limit	<b>35,35</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>10,61</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>28,93</b>																						
Limit	<b>22,93</b>																						
30% <sup>(1)</sup>	<b>12,88</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
100%	<b>35,35</b>																						
Limit	<b>35,35</b>																						
30% <sup>(1)</sup>	<b>10,61</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
<p>INN: <b>Valsartan</b>   ATC: <b>C09CA03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>818853</b></p> <p>(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> <b>Krka Polska Sp. z o.o.</b></p>	<p>Krka Polska Sp. z o.o.</p>	<p><b>Valsartan Medical Valley:</b> tabl. powl. <b>80 mg</b> - 28 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>9,61</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>9,61</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>2,88</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>9,61</b>	Limit	<b>9,61</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>2,88</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>										
100%	<b>9,61</b>																						
Limit	<b>9,61</b>																						
30% <sup>(1)</sup>	<b>2,88</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
<p><b>Valsacor® 80 mg tabletki powlekane:</b> tabl. powl. <b>80 mg</b> - 90 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>41,15</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>34,39</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>17,08</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>41,15</b>	Limit	<b>34,39</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>17,08</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<p>INN: <b>Valsartan</b>   ATC: <b>C09CA03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>128245</b></p> <p>(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b> <b>Medical Valley Invest AB</b></p> <p>Odpowiedniki: Apo-Valsart [X], AuroValsart [17,89], <b>Valsartan Medical Valley [9,61]</b>, Valtap [9,75], Valzek [12,89], Tensart [13,46], Bespres [13,58], <b>Valsacor® 80 mg tabletki powlekane [14,02]</b>, Avasart [14,15], Dipper-Mono [14,15], Vanatex® [14,15], Diovan® [22,42]</p>	<p>Medical Valley Invest AB</p>										
100%	<b>41,15</b>																						
Limit	<b>34,39</b>																						
30% <sup>(1)</sup>	<b>17,08</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
<p><b>Valsacor® 160 mg tabletki powlekane:</b> tabl. powl. <b>160 mg</b> - 28 szt.</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>27,09</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>21,40</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>12,11</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>27,09</b>	Limit	<b>21,40</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>12,11</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>	<p><b>Valsartan Medical Valley:</b> tabl. powl. <b>160 mg</b> - 28 szt. ◆</p>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>17,89</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>17,89</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>5,37</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td><b>bezpł.</b></td></tr> </table>	100%	<b>17,89</b>	Limit	<b>17,89</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>5,37</b>	DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>	S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>
100%	<b>27,09</b>																						
Limit	<b>21,40</b>																						
30% <sup>(1)</sup>	<b>12,11</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
100%	<b>17,89</b>																						
Limit	<b>17,89</b>																						
30% <sup>(1)</sup>	<b>5,37</b>																						
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>																						
<p>INN: <b>Valsartan</b>   ATC: <b>C09CA03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>074969</b></p> <p>(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> <b>Krka Polska Sp. z o.o.</b></p> <p>Odpowiedniki: Apo-Valsart [X], AuroValsart [17,89], <b>Valsartan Medical Valley [17,89]</b>, Valtap [18,18], Valzek [24,82], Tensart [25,22], Bespres [26,19], Avasart [26,77], <b>Valsacor® 160 mg tabletki powlekane [27,09]</b>, Dipper-Mono [27,34], Vanatex® [27,34], Diovan® [33,54]</p>	<p>Krka Polska Sp. z o.o.</p>	<p>INN: <b>Valsartan</b>   ATC: <b>C09CA03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>128260</b></p> <p>(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b> <b>Medical Valley Invest AB</b></p> <p>Odpowiedniki: Apo-Valsart [X], AuroValsart [17,89], <b>Valsartan Medical Valley [17,89]</b>, Valtap [18,18], Valzek [24,82], Tensart [25,22], Bespres [26,19], Avasart [26,77], <b>Valsacor® 160 mg tabletki powlekane [27,09]</b>, Dipper-Mono [27,34], Vanatex® [27,34], Diovan® [33,54]</p>	<p>Medical Valley Invest AB</p>																				

Valtap: tabl. powł. 80 mg - 28 szt.	Rx	100%	9,75
		Limit	9,75
		30% <sup>(1)</sup>	2,93
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Valsartan** ATC: C09CA03 wyk: B EAN ~ 804542  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D **Zentiva PL Sp. z o.o.**  
 Odpowiedniki: Apo-Valsart [X], AuroValsart [9,61], Valsartan Medical Valley [9,61], Valtap [9,75], Valzek [12,89], Tensart [13,46], Bespres [13,58], Valsacor® 80 mg tabletki powlekane [14,02], Avasart [14,15], Dipper-Mono [14,15], Vanatex® [14,15], Diovan® [22,42]

Valtap: tabl. powł. 160 mg - 28 szt.	Rx	100%	18,18
		Limit	18,18
		30% <sup>(1)</sup>	5,45
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Valsartan** ATC: C09CA03 wyk: B EAN ~ 804580  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D **Zentiva PL Sp. z o.o.**  
 Odpowiedniki: Apo-Valsart [X], AuroValsart [17,89], Valsartan Medical Valley [17,89], Valtap [18,18], Valzek [24,82], Tensart [25,22], Bespres [26,19], Avasart [26,77], Valsacor® 160 mg tabletki powlekane [27,09], Dipper-Mono [27,34], Vanatex® [27,34], Diovan® [33,54]

Valtap HCT: tabl. powł. 160/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	18,18
		Limit	18,18
		30% <sup>(1)</sup>	5,45
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Valsartan + Hydrochlorothiazide** ATC: C09DA03 wyk: B EAN ~ 080196  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D **Zentiva PL Sp. z o.o.**  
 Odpowiedniki: AuroValsart HCT [18,18], Valtap HCT [18,18], Tensart HCT [25,22], Co-Valsacor [27,09], Co-Bespres [27,34], Co-Dipper [27,40], Vanatex® HCT [28,20]

Valtap HCT: tabl. powł. 160/25 mg - 28 szt.	Rx	100%	18,30
		Limit	18,30
		30% <sup>(1)</sup>	5,49
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Valsartan + Hydrochlorothiazide** ATC: C09DA03 wyk: B EAN ~ 080200  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D **Zentiva PL Sp. z o.o.**  
 Odpowiedniki: AuroValsart HCT [18,18], Valtap HCT [18,30], Co-Bespres - (IR) [22,19], Tensart HCT [25,22], Co-Valsacor [27,09], Co-Dipper [27,40], Co-Bespres [27,46], Vanatex® HCT [28,20]

Valtricom: tabl. powł. 5/160/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	26,47
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	11,49
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amlodipine + Valsartan + Hydrochlorothiazide** ATC: C09DX01 wyk: B EAN ~ 970862  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D **Krka Polska Sp. z o.o.**  
 Odpowiedniki: Dipperam HCT [21,40], Valtricom [26,47]

Valtricom: tabl. powł. 10/160/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	26,47
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	11,49
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amlodipine + Valsartan + Hydrochlorothiazide** ATC: C09DX01 wyk: B EAN ~ 970861  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D **Krka Polska Sp. z o.o.**  
 Odpowiedniki: Dipperam HCT [21,40], Valtricom [26,47]

Valtricom: tabl. powł. 10/160/25 mg - 28 szt.	Rx	100%	26,47
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	11,49
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amlodipine + Valsartan + Hydrochlorothiazide** ATC: C09DX01 wyk: B EAN ~ 970863  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D **Krka Polska Sp. z o.o.**  
 Odpowiedniki: Dipperam HCT [21,40], Valtricom [26,47]

Valzek: tabl. 80 mg - 28 szt.	Rx	100%	12,89
		Limit	10,70
		30% <sup>(1)</sup>	4,86
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Valsartan** ATC: C09CA03 wyk: B EAN ~ 202286  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D **Celcon Pharma Sp. z o.o.**  
 Odpowiedniki: Apo-Valsart [X], AuroValsart [9,61], Valsartan Medical Valley [9,61], Valtap [9,75], Valzek [12,89], Tensart [13,46], Bespres [13,58], Valsacor® 80 mg tabletki powlekane [14,02], Avasart [14,15], Dipper-Mono [14,15], Vanatex® [14,15], Diovan® [22,42]

Odpowiedniki: Apo-Valsart [X], AuroValsart [9,61], Valsartan Medical Valley [9,61], Valtap [9,75], Valzek [12,89], Tensart [13,46], Bespres [13,58], Valsacor® 80 mg tabletki powlekane [14,02], Avasart [14,15], Dipper-Mono [14,15], Vanatex® [14,15], Diovan® [22,42]

Valzek: tabl. 160 mg - 28 szt.	Rx	100%	24,82
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	8,86
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Valsartan** ATC: C09CA03 wyk: B EAN ~ 202330  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D **Celcon Pharma Sp. z o.o.**  
 Odpowiedniki: Apo-Valsart [X], AuroValsart [17,89], Valsartan Medical Valley [17,89], Valtap [18,18], Valzek [24,82], Tensart [25,22], Bespres [26,19], Avasart [26,77], Valsacor® 160 mg tabletki powlekane [27,09], Dipper-Mono [27,34], Vanatex® [27,34], Diovan® [33,54]

Odpowiedniki: Apo-Valsart [X], AuroValsart [17,89], Valsartan Medical Valley [17,89], Valtap [18,18], Valzek [24,82], Tensart [25,22], Bespres [26,19], Avasart [26,77], Valsacor® 160 mg tabletki powlekane [27,09], Dipper-Mono [27,34], Vanatex® [27,34], Diovan® [33,54]

Vanatex®: tabl. powł. 80 mg - 28 szt.	Rx	100%	14,15
		Limit	10,70
		30% <sup>(1)</sup>	5,99
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Valsartan** ATC: C09CA03 wyk: B EAN ~ 827459  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D **Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA**  
 Odpowiedniki: Apo-Valsart [X], AuroValsart [9,61], Valsartan Medical Valley [9,61], Valtap [9,75], Valzek [12,89], Tensart [13,46], Bespres [13,58], Valsacor® 80 mg tabletki powlekane [14,02], Avasart [14,15], Dipper-Mono [14,15], Vanatex® [14,15], Diovan® [22,42]

Odpowiedniki: Apo-Valsart [X], AuroValsart [9,61], Valsartan Medical Valley [9,61], Valtap [9,75], Valzek [12,89], Tensart [13,46], Bespres [13,58], Valsacor® 80 mg tabletki powlekane [14,02], Avasart [14,15], Dipper-Mono [14,15], Vanatex® [14,15], Diovan® [22,42]

Vanatex®: tabl. powł. 160 mg - 28 szt.	Rx	100%	27,34
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	11,12
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Valsartan** ATC: C09CA03 wyk: B EAN ~ 827480  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 r.ż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r.ż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D **Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA**  
 Odpowiedniki: Apo-Valsart [X], AuroValsart [17,89], Valsartan Medical Valley [17,89], Valtap [18,18], Valzek [24,82], Tensart [25,22], Bespres [26,19], Avasart [26,77], Valsacor® 160 mg tabletki powlekane [27,09], Dipper-Mono [27,34], Vanatex® [27,34], Diovan® [33,54]

Odpowiedniki: Apo-Valsart [X], AuroValsart [17,89], Valsartan Medical Valley [17,89], Valtap [18,18], Valzek [24,82], Tensart [25,22], Bespres [26,19], Avasart [26,77], Valsacor® 160 mg tabletki powlekane [27,09], Dipper-Mono [27,34], Vanatex® [27,34], Diovan® [33,54]

Vanatex® HCT: tabl. powł. 80/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	14,04
		Limit	10,70
		30% <sup>(1)</sup>	5,57
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Valsartan + Hydrochlorothiazide** ATC: C09DA03 wyk: B EAN ~ 862351  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D **Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA**  
 Odpowiedniki: AuroValsart HCT [9,75], Co-Valsacor [13,30], Co-Bespres [13,50], Vanatex® HCT [14,04], Co-Dipper [14,19]

Odpowiedniki: AuroValsart HCT [9,75], Co-Valsacor [13,30], Co-Bespres [13,50], Vanatex® HCT [14,04], Co-Dipper [14,19]

Vanatex® HCT: tabl. powł. 160/25 mg - 28 szt.	Rx	100%	28,20
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	11,24
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Valsartan + Hydrochlorothiazide** ATC: C09DA03 wyk: B EAN ~ 862399  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D **Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA**  
 Odpowiedniki: AuroValsart HCT [18,18], Valtap HCT [18,30], Co-Bespres - (IR) [22,19], Tensart HCT [25,22], Co-Valsacor [27,09], Co-Dipper [27,40], Co-Bespres [27,46], Vanatex® HCT [28,20]

Odpowiedniki: AuroValsart HCT [18,18], Valtap HCT [18,30], Co-Bespres - (IR) [22,19], Tensart HCT [25,22], Co-Valsacor [27,09], Co-Dipper [27,40], Co-Bespres [27,46], Vanatex® HCT [28,20]



Naszym wyborem

**enarenal**  
 enalaprilii maleas

<b>Vanatex® HCT:</b> tabl. powł. <b>160/12,5 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>28,20</b>
		Limit	<b>21,40</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>11,24</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Valsartan + Hydrochlorothiazide</b>   ATC: <b>C09DA03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>862375</b>			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadku innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>			
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			
<b>Odpowiedniki:</b> AuroValsart HCT [18,18], Valtap HCT [18,18], Tensart HCT [25,22], Co-Valsacor [27,09], Co-Bespres [27,34], Co-Dipper [27,40], <b>Vanatex® HCT [28,20]</b>			
<b>Vasilip®:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>6,68</b>
		Limit	<b>2,62</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>4,85</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Simvastatin</b>   ATC: <b>C10AA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>914012</b>			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b>			
<b>Odpowiedniki:</b> Simvastatinum Accord [X], Simvastatin Bluefish [4,68], Simvachol® [5,06], Simvacard® 10 [6,25], Vastan® [6,40], <b>Vasilip® [6,68]</b> , Simratio 10 [6,89], Zocor® 10 [7,00], Simvastero® [7,54]			
<b>Vasilip®:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>13,21</b>
		Limit	<b>5,25</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>9,54</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Simvastatin</b>   ATC: <b>C10AA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>914111</b>			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b>			
<b>Odpowiedniki:</b> Simvastatinum Accord [X], Simvastatin Aurovitas [4,26], Simvastatin Bluefish [6,72], Simvagen 20 [7,35], Simvachol® [9,23], Simvacard® 20 [11,07], Vastan® [12,49], Simratio 20 [12,77], Ximve [12,91], <b>Vasilip® [13,21]</b> , Zocor® 20 [13,22], Simvastero® [14,29]			
<b>Vasilip®:</b> tabl. powł. <b>40 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>21,52</b>
		Limit	<b>10,49</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>14,18</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Simvastatin</b>   ATC: <b>C10AA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>982714</b>			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b>			
<b>Odpowiedniki:</b> Simvastatinum Accord [X], Simvastatin Aurovitas [7,63], Simvastatin Bluefish [11,70], Simvagen 40 [13,87], Simcovas [16,02], <b>Vasilip® [21,52]</b> , Simvacard® 40 [21,74], Simratio 40 [25,30], Zocor® 40 [25,52], Simvastero® [26,55]			
<b>Vastan®:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>6,40</b>
		Limit	<b>2,62</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>4,57</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Simvastatin</b>   ATC: <b>C10AA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>073114</b>			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b>			
<b>Odpowiedniki:</b> Simvastatinum Accord [X], Simvastatin Bluefish [4,68], Simvachol® [5,06], Simvacard® 10 [6,25], Vastan® [6,40], <b>Vasilip® [6,68]</b> , Simratio 10 [6,89], Zocor® 10 [7,00], Simvastero® [7,54]			
<b>Vastan®:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>12,49</b>
		Limit	<b>5,25</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>8,82</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Simvastatin</b>   ATC: <b>C10AA01</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>073213</b>			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b>			
<b>Odpowiedniki:</b> Simvastatinum Accord [X], Simvastatin Aurovitas [4,26], Simvastatin Bluefish [6,72], Simvagen 20 [7,35], Simvachol® [9,23], Simvacard® 20 [11,07], <b>Vastan® [12,49]</b> , Simratio 20 [12,77], Ximve [12,91], <b>Vasilip® [13,21]</b> , Zocor® 20 [13,22], Simvastero® [14,29]			

<b>VaxigripTetra 2023/2024:</b> inj. [zaw.] <b>0,5 ml</b> - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml (+ igła)	Rx	100%	<b>53,20</b>
		Limit	<b>53,20</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>26,60</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Quadrivalent influenza vaccine</b>   ATC: <b>J07BB02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>130210</b>			
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Kobiety w ciąży(3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
<b>Sanofi Pasteur Sp. z o.o.</b>			
<b>Velaxin® ER 37,5:</b> kaps. o przedl. uwalnianiu <b>37,5 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>12,56</b>
		Limit	<b>10,92</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>4,92</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Venlafaxine</b>   ATC: <b>N06AX16</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>055982</b>			
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe <b>WP:</b> Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
<b>Odpowiedniki:</b> Symfaksin ER® [10,37], Oriven [10,53], Faxigen XL [11,02], Efevelon SR [11,39], Lafactin [12,03], <b>Velaxin® ER 37,5 [12,56]</b> , Venlectine [12,69], Alventa® [12,77], Venlafaxine Apotex [12,82], Faolet ER [13,10], Axyven [13,37], Prefaxine [13,80]			
<b>Velaxin® ER 75:</b> kaps. o przedl. uwalnianiu <b>75 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>23,91</b>
		Limit	<b>21,84</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>8,62</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Venlafaxine</b>   ATC: <b>N06AX16</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>056279</b>			
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe <b>WP:</b> Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
<b>Odpowiedniki:</b> Venlafaxine Bluefish XL [17,37], Alventa® - (IR) [17,75], Symfaksin ER® [19,46], Oriven [19,60], Faxigen XL [20,62], Lafactin [22,78], Alventa® [23,03], Efevelon SR [23,60], <b>Velaxin® ER 75 [23,91]</b> , Venlectine [24,18], Venlafaxine Apotex [24,46], Faolet ER [24,62], Axyven [25,04], Efectin® ER 75 [25,55], Prefaxine [26,50]			
<b>Velaxin® ER 150:</b> kaps. o przedl. uwalnianiu <b>150 mg</b> - 28 szt.	Rx	100%	<b>44,84</b>
		Limit	<b>43,68</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>14,26</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Venlafaxine</b>   ATC: <b>N06AX16</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>056293</b>			
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe <b>WP:</b> Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
<b>Odpowiedniki:</b> Venlafaxine Bluefish XL [31,86], Symfaksin ER® [32,21], Alventa® - (IR) [32,27], Oriven [32,80], Faxigen XL [38,30], Lafactin [42,60], Alventa® [43,10], Efevelon SR [44,25], Efectin® ER 150 [44,82], <b>Velaxin® ER 150 [44,84]</b> , Venlectine [45,62], Axyven [46,26], Venlafaxine Apotex [46,77], Faolet ER [47,11], Prefaxine [50,06]			
<b>Vellofent:</b> tabl. podjęzykowe <b>67 µg</b> - 30 szt.	Rx-w	100%	<b>609,28</b>
		Limit	<b>608,74</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>3,74</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Fentanyl</b>   ATC: <b>N02AB03</b>   wyk: <b>N</b>   EAN ~ <b>074593</b>			
(1) Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
<b>Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.</b>			
<b>Vellofent:</b> tabl. podjęzykowe <b>133 µg</b> - 30 szt.	Rx-w	100%	<b>609,28</b>
		Limit	<b>608,74</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>3,74</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Fentanyl</b>   ATC: <b>N02AB03</b>   wyk: <b>N</b>   EAN ~ <b>074647</b>			
(1) Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
<b>Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.</b>			
<b>Vellofent:</b> tabl. podjęzykowe <b>267 µg</b> - 30 szt.	Rx-w	100%	<b>609,28</b>
		Limit	<b>608,74</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>3,74</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Fentanyl</b>   ATC: <b>N02AB03</b>   wyk: <b>N</b>   EAN ~ <b>074685</b>			
(1) Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>			
<b>Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.</b>			

<b>Vellofent:</b> tabl. podjęzykowe <b>400 µg</b> - 30 szt. ◊			Rx-w	100% <b>609,28</b> Limit <b>608,74</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,74</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fentanyl</i>	ATC: N02AB03	wyk: N	EAN ~ 074739	
(1) Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Angelini Pharma Polska Sp. z o. o.				
Odpowiedniki: Submena [460,08], Vellofent [609,28]				
<b>Vellofent:</b> tabl. podjęzykowe <b>533 µg</b> - 30 szt. ◊			Rx-w	100% <b>609,28</b> Limit <b>608,74</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,74</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fentanyl</i>	ATC: N02AB03	wyk: N	EAN ~ 074777	
(1) Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Angelini Pharma Polska Sp. z o. o.				
Odpowiedniki: Submena [460,08], Vellofent [609,28]				
<b>Vellofent:</b> tabl. podjęzykowe <b>800 µg</b> - 30 szt. ◊			Rx-w	100% <b>609,28</b> Limit <b>608,74</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,74</b> S <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Fentanyl</i>	ATC: N02AB03	wyk: N	EAN ~ 074821	
(1) Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Angelini Pharma Polska Sp. z o. o.				
Odpowiedniki: Submena [460,08], Vellofent [609,28]				
<b>Veltassa:</b> prosz. do sporz. zaw. doustnej <b>8,4 mg</b> - 30 sasz.			Rx	100% <b>958,91</b> Limit <b>958,91</b> R <sup>(1)</sup> <b>3,20</b>
INN: <i>Patiromer calcium</i>	ATC: V03AE09	wyk:	EAN ~ 681145	
(1) Leczenie hiperkaliemii u dorosłych pacjentów w przebiegu przewlekłej choroby nerek w stopniu 3b-5, u chorych przyjmujących leki z grupy inhibitorów układu renina-angiotensyna-aldosteron (inhibitory ACE oraz inhibitory receptora dla angiotensyny)   Kat. ciąży: C Vifor France SA				
<b>Vendal® retard:</b> tabl. powł. o przedł. uwalnianiu <b>10 mg</b> - 30 szt. ◊			Rx-w	100% <b>9,35</b> Limit <b>6,78</b> B <sup>(1)</sup> <b>2,57</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>5,77</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Morphine hydrochloride</i>	ATC: N02AA01	wyk: N	EAN ~ 743827	
(1) Nowotwory złośliwe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulalgia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C G.L. Pharma Poland Sp. z o. o.				
<b>Vendal® retard:</b> tabl. powł. o przedł. uwalnianiu <b>30 mg</b> - 30 szt. ◊			Rx-w	100% <b>24,15</b> Limit <b>20,33</b> B <sup>(1)</sup> <b>3,82</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>7,02</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Morphine hydrochloride</i>	ATC: N02AA01	wyk: N	EAN ~ 743926	
(1) Nowotwory złośliwe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulalgia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C G.L. Pharma Poland Sp. z o. o.				
<b>Vendal® retard:</b> tabl. powł. o przedł. uwalnianiu <b>60 mg</b> - 30 szt. ◊			Rx-w	100% <b>39,93</b> Limit <b>39,93</b> B <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Morphine hydrochloride</i>	ATC: N02AA01	wyk: N	EAN ~ 744022	
(1) Nowotwory złośliwe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulalgia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C G.L. Pharma Poland Sp. z o. o.				
<b>Vendal® retard:</b> tabl. powł. o przedł. uwalnianiu <b>100 mg</b> - 30 szt. ◊			Rx-w	100% <b>68,35</b> Limit <b>67,78</b> B <sup>(1)</sup> <b>0,57</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>3,77</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Morphine hydrochloride</i>	ATC: N02AA01	wyk: N	EAN ~ 744121	
(1) Nowotwory złośliwe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulalgia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C G.L. Pharma Poland Sp. z o. o.				

<b>Venda® retard:</b> tabl. powł. o przedł. uwalnianiu <b>200 mg</b> - 30 szt. ◊			Rx-w	100% <b>111,03</b> Limit <b>111,03</b> B <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>6,40</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Morphine hydrochloride</i>	ATC: N02AA01	wyk: N	EAN ~ 744220	
(1) Nowotwory złośliwe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulalgia(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C G.L. Pharma Poland Sp. z o. o.				
<b>Venlafaxine Bluefish XL:</b> kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde <b>75 mg</b> - 28 szt. ◆			Rx	100% <b>17,37</b> Limit <b>17,37</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,21</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Venlafaxine</i>	ATC: N06AX16	wyk: B	EAN ~ 767601	
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Bluefish Pharmaceuticals				
Odpowiedniki: Venlafaxine Bluefish XL [17,37], Alventa® - (IR) [17,75], Symfaksin ER® [19,46], Oriven [19,60], Faxigen XL [20,62], Lafactin [22,78], Alventa® [23,03], Efevelon SR [23,60], Velaxin® ER 75 [23,91], Venlectine [24,18], Venlafaxine Apotex [24,46], Faxelet ER [24,62], Axysten [25,04], Efectin® ER 75 [25,55], Prefaxine [26,50]				
<b>Venlafaxine Bluefish XL:</b> kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde <b>150 mg</b> - 28 szt. ◆			Rx	100% <b>31,86</b> Limit <b>31,86</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>9,56</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Venlafaxine</i>	ATC: N06AX16	wyk: B	EAN ~ 767625	
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Bluefish Pharmaceuticals				
Odpowiedniki: Venlafaxine Bluefish XL [31,86], Symfaksin ER® [32,21], Alventa® - (IR) [32,27], Oriven [32,80], Faxigen XL [38,30], Lafactin [42,60], Alventa® [43,10], Efevelon SR [44,25], Efectin® ER 150 [44,82], Velaxin® ER 150 [44,84], Venlectine [45,62], Axysten [46,26], Venlafaxine Apotex [46,77], Faxelet ER [47,11], Prefaxine [50,06]				
<b>Venlectine:</b> kaps. o przedł. uwalnianiu <b>37,5 mg</b> - 28 szt. ◆			Rx	100% <b>12,69</b> Limit <b>10,92</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>5,05</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Venlafaxine</i>	ATC: N06AX16	wyk: B	EAN ~ 040971	
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Bausch Health				
Odpowiedniki: Symfaksin ER® [10,37], Oriven [10,53], Faxigen XL [11,02], Efevelon SR [11,39], Lafactin [12,03], Velaxin® ER 37,5 [12,56], Venlectine [12,69], Alventa® [12,77], Venlafaxine Apotex [12,82], Faxelet ER [13,10], Axysten [13,37], Prefaxine [13,80]				
<b>Venlectine:</b> kaps. o przedł. uwalnianiu <b>75 mg</b> - 28 szt. ◆			Rx	100% <b>24,18</b> Limit <b>21,84</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>8,89</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Venlafaxine</i>	ATC: N06AX16	wyk: B	EAN ~ 040995	
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Bausch Health				
Odpowiedniki: Venlafaxine Bluefish XL [17,37], Alventa® - (IR) [17,75], Symfaksin ER® [19,46], Oriven [19,60], Faxigen XL [20,62], Lafactin [22,78], Alventa® [23,03], Efevelon SR [23,60], Velaxin® ER 75 [23,91], Venlectine [24,18], Venlafaxine Apotex [24,46], Faxelet ER [24,62], Axysten [25,04], Efectin® ER 75 [25,55], Prefaxine [26,50]				
<b>Venlectine:</b> kaps. o przedł. uwalnianiu <b>150 mg</b> - 28 szt. ◆			Rx	100% <b>45,62</b> Limit <b>43,68</b> 30% <sup>(1)</sup> <b>15,04</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> S <sup>(3)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Venlafaxine</i>	ATC: N06AX16	wyk: B	EAN ~ 424672	
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe WP: Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Bausch Health				
Odpowiedniki: Venlafaxine Bluefish XL [31,86], Symfaksin ER® [32,21], Alventa® - (IR) [32,27], Oriven [32,80], Faxigen XL [38,30], Lafactin [42,60], Alventa® [43,10], Efevelon SR [44,25], Efectin® ER 150 [44,82], Velaxin® ER 150 [44,84], Venlectine [45,62], Axysten [46,26], Venlafaxine Apotex [46,77], Faxelet ER [47,11], Prefaxine [50,06]				
<b>Ventolin®:</b> aerozol bezfreonowy [zaw.] <b>100 µg/dawkę</b> - 1 poj. (200 dawek)			Rx	100% <b>10,61</b> Limit <b>0,00</b> C <sup>(1)</sup> <b>bezpł.</b> DZ <sup>(2)</sup> <b>bezpł.</b> R <sup>(3)</sup> <b>3,20</b> S <sup>(4)</sup> <b>bezpł.</b>
INN: <i>Salbutamol</i>	ATC: R03AC02	wyk: B	EAN ~ 442010	
(1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C GlaxoSmithKline (Ireland) Limited				
Odpowiedniki: Sabumalin [X], Ventolin® [10,61], Aspulmo [12,30]				


**ZAKODOWANY DO WALKI  
Z ZAKAŻENIEM**

<b>Veriflo:</b> aerozol inhal. [zaw.] 50/25 µg/dawkę - 1 poj. 120 dawek	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>65,89</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	65,89	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	3,20	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Verospiron®:</b> kaps. 100 mg - 30 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>22,27</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>22,27</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>6,68</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	22,27	Limit	22,27	30% <sup>(1)</sup>	6,68	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	65,89																								
Limit	0,00																								
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	3,20																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
100%	22,27																								
Limit	22,27																								
30% <sup>(1)</sup>	6,68																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
INN: <i>Fluticasono propionato + Salmeterol</i>   ATC: R03AK06 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewłoka Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Astma (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	wyk: A   EAN ~ 147757 obturacyjna choroba płuc, <b>Zentiva PL Sp. z o.o.</b>	INN: <i>Spirolactone</i>   ATC: C03DA01   wyk: B   EAN ~ 488513 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nacisnienie tętnicze inne niż określone w ChPL-u u dzieci do 18 rż.; pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.</b>	Odpowiedniki: Ismian [X], Verospiron® [22,27], Finospir [22,96]																						
<b>Veriflo:</b> aerozol inhal. [zaw.] 125/25 µg/dawkę - 1 poj. 120 dawek	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>83,01</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>7,89</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	83,01	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	7,89	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Vesisol:</b> tabl. powł. 5 mg - 30 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>20,21</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>17,65</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>7,86</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	20,21	Limit	17,65	30% <sup>(1)</sup>	7,86	S <sup>(2)</sup>	bezpł.		
100%	83,01																								
Limit	0,00																								
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	7,89																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
100%	20,21																								
Limit	17,65																								
30% <sup>(1)</sup>	7,86																								
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
INN: <i>Fluticasono propionato + Salmeterol</i>   ATC: R03AK06 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Przewłoka Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Astma (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	wyk: A   EAN ~ 147758 obturacyjna choroba płuc, <b>Zentiva PL Sp. z o.o.</b>	INN: <i>Solifenacin succinate</i>   ATC: G04BD08   wyk: B   EAN ~ 113999 (1) Zespół pęcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.</b>	Odpowiedniki: Solifenacin Stada [X], Solifurin [X], Beloflow [15,41], Silamil [16,15], Soreca [18,54], Aurosolin [18,55], Solinco [18,85], Vesisol [20,21], Afenix [20,38], Zevesin [20,39], Uronorm [20,85], Vesoligo [20,85], Adablock [21,99]																						
<b>Veriflo:</b> aerozol inhal. [zaw.] 250/25 µg/dawkę - 1 poj. 120 dawek	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>99,96</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>9,17</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	99,96	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	9,17	S <sup>(4)</sup>	bezpł.	<b>Vesisol:</b> tabl. powł. 10 mg - 30 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>37,63</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>35,29</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>12,93</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	37,63	Limit	35,29	30% <sup>(1)</sup>	12,93	S <sup>(2)</sup>	bezpł.		
100%	99,96																								
Limit	0,00																								
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	9,17																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
100%	37,63																								
Limit	35,29																								
30% <sup>(1)</sup>	12,93																								
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
INN: <i>Fluticasono propionato + Salmeterol</i>   ATC: R03AK06 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Astma, Przewłoka obturacyjna choroba płuc (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C	wyk: A   EAN ~ 147759 zapalenie oskrzeli, Astma, <b>Zentiva PL Sp. z o.o.</b>	INN: <i>Solifenacin succinate</i>   ATC: G04BD08   wyk: B   EAN ~ 114006 (1) Zespół pęcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.</b>	Odpowiedniki: Solifenacin Stada [X], Beloflow [28,70], Soreca [34,95], Aurosolin [34,97], Silamil [35,29], Solifenacin Medreg [35,29], Solinco [35,57], Solifurin [36,14], Vesisol [37,63], Afenix [38,65], Zevesin [38,66], Uronorm [39,57], Vesoligo [39,57], Adablock [41,86]																						
<b>Vermox:</b> tabl. 100 mg - 6 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>12,38</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	12,38	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Vesoligo:</b> tabl. powł. 5 mg - 30 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>20,85</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>17,65</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>8,50</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	20,85	Limit	17,65	30% <sup>(1)</sup>	8,50	S <sup>(2)</sup>	bezpł.				
100%	12,38																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	3,20																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	20,85																								
Limit	17,65																								
30% <sup>(1)</sup>	8,50																								
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
INN: <i>Mebendazole</i>   ATC: P02CA01   wyk: B   EAN ~ 250615 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.</b>	Odpowiedniki: Vermox - (IR) [9,99], Vermox - (IR) [10,00], Vermox [12,38]	INN: <i>Solifenacin succinate</i>   ATC: G04BD08   wyk: B   EAN ~ 053611 (1) Zespół pęcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.</b>	Odpowiedniki: Solifenacin Stada [X], Solifurin [X], Beloflow [15,41], Silamil [16,15], Soreca [18,54], Aurosolin [18,55], Solinco [18,85], Vesisol [20,21], Afenix [20,38], Zevesin [20,39], Uronorm [20,85], Vesoligo [20,85], Adablock [21,99]																						
<b>Vermox - (IR):</b> tabl. 100 mg - 6 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>9,99</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	9,99	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Vesoligo:</b> tabl. powł. 10 mg - 30 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>39,57</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>35,29</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>14,87</td></tr> <tr><td>S<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	39,57	Limit	35,29	30% <sup>(1)</sup>	14,87	S <sup>(2)</sup>	bezpł.				
100%	9,99																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	3,20																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	39,57																								
Limit	35,29																								
30% <sup>(1)</sup>	14,87																								
S <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
INN: <i>Mebendazole</i>   ATC: P02CA01   wyk: B   EAN ~ 150910 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>Delfarma Sp. z o.o.</b>	Odpowiedniki: Vermox - (IR) [9,99], Vermox - (IR) [10,00], Vermox [12,38]	INN: <i>Solifenacin succinate</i>   ATC: G04BD08   wyk: B   EAN ~ 053614 (1) Zespół pęcherza nadreaktywnego (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.</b>	Odpowiedniki: Solifenacin Stada [X], Beloflow [28,70], Soreca [34,95], Aurosolin [34,97], Silamil [35,29], Solifenacin Medreg [35,29], Solinco [35,57], Solifurin [36,14], Vesisol [37,63], Afenix [38,65], Zevesin [38,66], Uronorm [39,57], Vesoligo [39,57], Adablock [41,86]																						
<b>Vermox - (IR):</b> tabl. 100 mg - 6 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>10,00</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	10,00	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Vetira:</b> roztw. doust. 100 mg/ml - 1 but. 300 ml ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>74,42</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	74,42	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	3,20	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	10,00																								
Limit	0,00																								
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(2)</sup>	3,20																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	74,42																								
Limit	0,00																								
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	3,20																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
INN: <i>Mebendazole</i>   ATC: P02CA01   wyk: B   EAN ~ 217963 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>Inpharm Sp. z o.o.</b>	Odpowiedniki: Vermox - (IR) [9,99], Vermox - (IR) [10,00], Vermox [12,38]	INN: <i>Levetiracetam</i>   ATC: N03AX14   wyk: B   EAN ~ 935901 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>Adamed Sp. z o.o.</b>	Odpowiedniki: Trund [X], Levetiracetam NeuroPharma [71,16], Cezarius [74,42], Vetira [74,42], Keppra® [108,89]																						
<b>Verospiron®:</b> tabl. 25 mg - 20 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>6,54</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>4,00</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>3,74</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	6,54	Limit	4,00	30% <sup>(1)</sup>	3,74	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Vetira:</b> roztw. doust. 100 mg/ml - 1 but. 150 ml ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>39,63</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>5,62</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	39,63	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	5,62	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	6,54																								
Limit	4,00																								
30% <sup>(1)</sup>	3,74																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	39,63																								
Limit	0,00																								
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	5,62																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
INN: <i>Spirolactone</i>   ATC: C03DA01   wyk: B   EAN ~ 117215 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nacisnienie tętnicze inne niż określone w ChPL-u u dzieci do 18 rż.; pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.</b>	Odpowiedniki: Ismian [X], Spirolon® [6,54], Verospiron® [6,54]	INN: <i>Levetiracetam</i>   ATC: N03AX14   wyk: B   EAN ~ 935895 (1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>Adamed Sp. z o.o.</b>	Odpowiedniki: Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam NeuroPharma [X], Levetiracetam Aurovitas [14,36], Levetiracetam Accord [14,46], Polkepral [14,46], Normeg [15,94], Trund [16,85], Cezarius [19,72], Vetira [19,95], Keppra® [47,97]																						
<b>Verospiron®:</b> kaps. 50 mg - 30 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>12,77</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>12,01</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>4,36</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	12,77	Limit	12,01	30% <sup>(1)</sup>	4,36	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Vetira:</b> tabl. powł. 250 mg - 50 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>19,95</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(3)</sup></td><td>10,96</td></tr> <tr><td>S<sup>(4)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	19,95	Limit	0,00	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(3)</sup>	10,96	S <sup>(4)</sup>	bezpł.
100%	12,77																								
Limit	12,01																								
30% <sup>(1)</sup>	4,36																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																								
100%	19,95																								
Limit	0,00																								
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																								
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																								
R <sup>(3)</sup>	10,96																								
S <sup>(4)</sup>	bezpł.																								
INN: <i>Spirolactone</i>   ATC: C03DA01   wyk: B   EAN ~ 488414 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nacisnienie tętnicze inne niż określone w ChPL-u u dzieci do 18 rż.; pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.</b>	Odpowiedniki: Ismian [X], Spirolon® [12,01], Verospiron® [12,77], Finospir [13,10]	(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>Adamed Sp. z o.o.</b>	(1) Kobiety w ciąży (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Padaczka (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C <b>Adamed Sp. z o.o.</b>																						



Skuteczny przepływ



400 mg x 20 tabl. ♥ 400 mg x 60 tabl.

<b>Vetira:</b> tabl. powł. 500 mg - 50 szt. ♦	Rx	100%	38,47
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	17,30

INN: **Levetiracetam** ATC: **N03AX14** wyk: **B** EAN ~ **936052**  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Adamed Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam Aurovitas [27,30], Polkepral [27,47], Levetiracetam Accord [27,48], Normeg [30,42], Levebon [31,07], Cezarius [32,26], Levetiracetam NeuroPharma [32,26], Trund [32,26], **Vetira** [38,47], Kepra® [94,41]

<b>Vetira:</b> tabl. powł. 750 mg - 50 szt. ♦	Rx	100%	56,01
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	22,65

INN: **Levetiracetam** ATC: **N03AX14** wyk: **B** EAN ~ **936151**  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Adamed Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam Aurovitas [39,27], Levetiracetam Accord [39,53], Polkepral [39,53], Normeg [43,96], Levetiracetam NeuroPharma [46,71], Trund [46,71], Cezarius [55,30], **Vetira** [56,01], Kepra® [140,37]

<b>Vetira:</b> tabl. powł. 1000 mg - 50 szt. ♦	Rx	100%	73,46
		Limit	0,00
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	28,28

INN: **Levetiracetam** ATC: **N03AX14** wyk: **B** EAN ~ **936250**  
 (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Padaczka(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Adamed Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** Levetiracetam Actavis [X], Levetiracetam Aurovitas [51,15], Levetiracetam Accord [51,52], Polkepral [51,52], Normeg [57,40], Levebon [58,70], Cezarius [61,07], Levetiracetam NeuroPharma [61,07], Trund [61,07], **Vetira** [73,46]

<b>Vidotin®:</b> tabl. 4 mg - 30 szt.	Rx	100%	10,45
		Limit	5,58
		R <sup>(1)</sup>	7,26
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Perindopril tert-butylamine** ATC: **C09AA04** wyk: **B** EAN ~ **653614**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**  
 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** Perindanor [X], **Vidotin®** [10,45]

<b>Vidotin®:</b> tabl. 8 mg - 30 szt.	Rx	100%	18,73
		Limit	11,17
		R <sup>(1)</sup>	12,56
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Perindopril tert-butylamine** ATC: **C09AA04** wyk: **B** EAN ~ **653621**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**  
 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** Perindanor [X], **Vidotin®** [18,73]

<b>Viglita:</b> tabl. 50 mg - 28 szt.	Rx	100%	15,61
		Limit	14,62
		30% <sup>(1)</sup>	5,38
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Vildagliptin** ATC: **A10BH02** wyk: **B** EAN ~ **140186**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Zentiva PL Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** **Viglita** [15,61], Kwikaton [15,83], Gliptivil [21,33], Anvidis [28,00], Galvus® [67,73]

<b>Viglita:</b> tabl. 50 mg - 56 szt.	Rx	100%	29,63
		Limit	29,23
		30% <sup>(1)</sup>	9,17
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Vildagliptin** ATC: **A10BH02** wyk: **B** EAN ~ **140188**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Zentiva PL Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** **Viglita** [29,63], Kwikaton [30,32], Anvidis [41,07], Gliptivil [41,07], Galvus® [133,92]

<b>Vilpin Combi:</b> tabl. 5/10 mg - 30 szt.	Rx	100%	12,34
		Limit	5,58
		R <sup>(1)</sup>	9,96
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.

INN: **Perindopril tosylate + Amlodipine** ATC: **C09BB04** wyk: **B** EAN ~ **146767**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP:** Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**  
 Teva B.V.

**Odpowiedniki:** **Vilpin Combi** [12,34], Perindopril + Amlodipine Teva Pharmaceuticals [17,39]

<b>Vilpin Combi:</b> tabl. 5/5 mg - 30 szt.	Rx	100%	12,34
		Limit	5,58
		R <sup>(1)</sup>	9,96
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.

INN: **Perindopril tosylate + Amlodipine** ATC: **C09BB04** wyk: **B** EAN ~ **146764**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP:** Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**  
 Teva B.V.

**Odpowiedniki:** **Vilpin Combi** [12,34], Perindopril + Amlodipine Teva Pharmaceuticals [17,39]

<b>Vilpin Combi:</b> tabl. 10/5 mg - 30 szt.	Rx	100%	24,34
		Limit	11,17
		R <sup>(1)</sup>	19,57
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.

INN: **Perindopril tosylate + Amlodipine** ATC: **C09BB04** wyk: **B** EAN ~ **146768**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP:** Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**  
 Teva B.V.

**Odpowiedniki:** **Vilpin Combi** [24,34], Perindopril + Amlodipine Teva Pharmaceuticals [28,92]

<b>Vilpin Combi:</b> tabl. 10/10 mg - 30 szt.	Rx	100%	24,34
		Limit	11,17
		R <sup>(1)</sup>	19,57
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		C <sup>(1)</sup>	bezpł.

INN: **Perindopril tosylate + Amlodipine** ATC: **C09BB04** wyk: **B** EAN ~ **146771**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP:** Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **T1:C, T2:D, T3:D**  
 Teva B.V.

**Odpowiedniki:** **Vilpin Combi** [24,34], Perindopril + Amlodipine Teva Pharmaceuticals [28,92]

<b>Vilpin®:</b> tabl. 5 mg - 30 szt. ♦	Rx	100%	8,26
		Limit	8,26
		30% <sup>(1)</sup>	2,48
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amlodipine** ATC: **C08CA01** wyk: **B** EAN ~ **621217**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP:** Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** Almiden [X], Amlodipine Aurobindo [X], Finamlox [X], Amlodipine Aurovitas [6,15], Amlodipine Bluefish [6,86], Amlomyl [7,02], Normodipine® [7,34], Adipine [13,62], Amlonor® [7,56], ApoAml 5 [7,78], Cardilopin [7,99], Agen® 5 [8,03], Adipine [8,21], **Vilpin®** [8,26], Alneta [8,48], Tenox® [8,48], Aldan® [8,64], Amlopin® [9,23], Amlomez® [13,79]

<b>Vilpin®:</b> tabl. 10 mg - 30 szt. ♦	Rx	100%	15,65
		Limit	15,65
		30% <sup>(1)</sup>	4,70
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Amlodipine** ATC: **C08CA01** wyk: **B** EAN ~ **042912**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach **WP:** Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** Almiden [X], Amlodipine Aurobindo [X], Finamlox [X], Amlodipine Aurovitas [11,03], Amlodipine Bluefish [11,72], Amlomyl [12,00], Normodipine® [13,58], Adipine [13,62], Amlonor® [14,55], Amlopin® - (IR) [14,68], Amlopin® - (IR) [14,68], Amlopin® - (IR) [14,73], Cardilopin [14,85], Agen® 10 [14,90], ApoAml 10 [14,98], **Vilpin®** [15,65], Aldan® [15,88], Alneta [15,88], Tenox® [15,88], Amlopin® [17,54], Amlomez® [20,26]

<b>Vimetto:</b> tabl. powł. 50/1000 mg - 60 szt.	Rx	100%	41,29
		Limit	31,32
		30% <sup>(1)</sup>	19,37
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Vildagliptin + Metformin hydrochloride** ATC: **A10BD08** wyk: **B** EAN ~ **973624**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Krka Polska Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** Anvidis Duo [32,71], **Vimetto** [41,29]

<b>Vimetto:</b> tabl. powł. 50/850 mg - 60 szt.	Rx	100%	41,29
		Limit	31,32
		30% <sup>(1)</sup>	19,37
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: **Vildagliptin + Metformin hydrochloride** ATC: **A10BD08** wyk: **B** EAN ~ **973625**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Krka Polska Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** Anvidis Duo [32,71], **Vimetto** [41,29]

<b>Vimpat:</b> syrop 10 mg/ml - 1 op. 200 ml ♦	Rx	100%	129,55
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Lacosamide** ATC: **N03AX18** wyk: **B** EAN ~ **935505**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do leczenia w formie stałych doustnych postaci farmaceutycznych **WP:** Terapia dodana u chorych poniżej 16 rż. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do leczenia w formie stałych doustnych postaci farmaceutycznych(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 UCB Pharma Sp. z o.o.





# ZOLPIC

Daj owcom odpocząć.  
zolidem



Vitaflo PKU Express 20: prosz. [smak owoce tropikalne] 20 g/34 g - 30 sasz. 34 g	100%	1243,83
	Limit	1243,83
	R <sup>(1)</sup>	3,20

INN: *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* | ATC: V06CA | wyk: EAN ~ 942390  
(1) Fenyloketonuria | Kat. ciąży: N | Nestle Polska SA

Vitaflo PKU Express 20: prosz. [smak pomarańczowy] 20 g/34 g - 30 sasz. 34 g	100%	1243,83
	Limit	1243,83
	R <sup>(1)</sup>	3,20

INN: *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* | ATC: V06CA | wyk: EAN ~ 942413  
(1) Fenyloketonuria | Kat. ciąży: N | Nestle Polska SA

Odpowiedniki: Vitaflo PKU Express 20 [1243,83], Vitaflo PKU Express 20 [1243,83], Vitaflo PKU Express 20 [1243,83]

Vitaminum B12 WZF: inj. [roztw.] 500 µg/ml - 5 amp. 2 ml	100%	12,89
	Limit	12,89
	30% <sup>(1)</sup>	3,48
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
	S <sup>(2)</sup>	bezpł.

INN: *Cyanocobalamin* | ATC: B03BA | wyk: B | EAN ~ 244010  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: C | Polfa Warszawa SA

Vivace: tabl. 2,5 mg - 30 szt. ◆	100%	6,24
	Limit	0,00
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
	R <sup>(2)</sup>	3,86
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril* | ATC: C09AA05 | wyk: B | EAN ~ 610440  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Actavis Group PTC ehf.

Odpowiedniki: Ramipril Aurovitas [X], Ampril 2,5 mg [5,58], Vivace [6,24], Axtil® [6,31], Piramil 2,5 mg [6,99]

Vivace: tabl. 2,5 mg - 90 szt. ◆	100%	16,81
	Limit	0,00
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
	R <sup>(2)</sup>	9,66
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril* | ATC: C09AA05 | wyk: B | EAN ~ 004378  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Actavis Group PTC ehf.

Vivace: tabl. 5 mg - 30 szt. ◆	100%	11,60
	Limit	0,00
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
	R <sup>(2)</sup>	6,83
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril* | ATC: C09AA05 | wyk: B | EAN ~ 610495  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Actavis Group PTC ehf.

Odpowiedniki: Ampril 5 mg [9,87], Piramil 5 mg - (IR) [10,99], Piramil 5 mg - (IR) [10,99], Piramil 5 mg - (IR) [11,00], Piramil 5 mg - (IR) [11,00], Ramipril Aurovitas [11,27], Piramil 5 mg [11,38], Vivace [11,60], Axtil® [11,74]

Vivace: tabl. 5 mg - 90 szt. ◆	100%	31,77
	Limit	0,00
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
	R <sup>(2)</sup>	19,20
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril* | ATC: C09AA05 | wyk: B | EAN ~ 004385  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Actavis Group PTC ehf.

Vivace: tabl. 10 mg - 30 szt. ◆	100%	22,01
	Limit	0,00
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
	R <sup>(2)</sup>	12,80
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril* | ATC: C09AA05 | wyk: B | EAN ~ 610532  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Actavis Group PTC ehf.

Odpowiedniki: Piramil 10 mg - (IR) [16,06], Piramil 10 mg - (IR) [16,06], Ampril 10 mg - (IR) [16,17], Piramil 10 mg - (IR) [16,17], Ampril 10 mg - (IR) [16,20], Piramil 10 mg - (IR) [16,98], Ampril 10 mg [18,35], Ramipril Aurovitas [21,33], Vivace [22,01], Axtil® [22,39]

Vivace: tabl. 10 mg - 90 szt. ◆	100%	59,67
	Limit	0,00
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
	R <sup>(2)</sup>	38,40
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril* | ATC: C09AA05 | wyk: B | EAN ~ 004392  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Actavis Group PTC ehf.

Vivace - (IR): tabl. 5 mg - 28 szt. ◆	100%	10,63
	Limit	0,00
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
	R <sup>(2)</sup>	6,17
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril* | ATC: C09AA05 | wyk: B | EAN ~ 146195  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Ramacor® [8,70], Ramipril Genoptim [9,56], Vivace - (IR) [10,52], Vivace - (IR) [10,53], Vivace - (IR) [10,63], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Polpril® [10,97], Polpril® [11,49], Tritace® 5 [13,50]

Vivace - (IR): tabl. 5 mg - 28 szt. ◆	100%	10,53
	Limit	0,00
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
	R <sup>(2)</sup>	6,07
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril* | ATC: C09AA05 | wyk: B | EAN ~ 144795  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Inpharm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Ramacor® [8,70], Ramipril Genoptim [9,56], Vivace - (IR) [10,52], Vivace - (IR) [10,53], Vivace - (IR) [10,63], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Polpril® [10,97], Polpril® [11,49], Tritace® 5 [13,50]

Vivace - (IR): tabl. 5 mg - 28 szt. ◆	100%	10,52
	Limit	0,00
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
	R <sup>(2)</sup>	6,06
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril* | ATC: C09AA05 | wyk: B | EAN ~ 142725  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Ramacor® [8,70], Ramipril Genoptim [9,56], Vivace - (IR) [10,52], Vivace - (IR) [10,53], Vivace - (IR) [10,63], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Tritace® 5 - (IR) [10,86], Polpril® [10,97], Polpril® [11,49], Tritace® 5 [13,50]

Vivace - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt. ◆	100%	20,08
	Limit	0,00
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
	R <sup>(2)</sup>	11,95
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril* | ATC: C09AA05 | wyk: B | EAN ~ 142727  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Tritace® 10 - (IR) [X], Ramacor® [15,95], Ramipril Genoptim [17,84], Tritace® 10 - (IR) [19,44], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,65], Tritace® 10 - (IR) [19,68], Vivace - (IR) [19,91], Vivace - (IR) [20,08], Piramil 10 mg [20,13], Vivace - (IR) [20,25], Polpril® [20,85], Polpril® [22,18], Tritace® 10 [22,20]

Vivace - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt. ◆	100%	20,25
	Limit	0,00
	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
	R <sup>(2)</sup>	11,95
	S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Ramipril* | ATC: C09AA05 | wyk: B | EAN ~ 146197  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D | Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Apo-Rami [X], Ivipril [X], Tritace® 10 - (IR) [X], Ramacor® [15,95], Ramipril Genoptim [17,84], Tritace® 10 - (IR) [19,44], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,54], Tritace® 10 - (IR) [19,65], Tritace® 10 - (IR) [19,68], Vivace - (IR) [19,91], Vivace - (IR) [20,08], Piramil 10 mg [20,13], Vivace - (IR) [20,25], Polpril® [20,85], Polpril® [22,18], Tritace® 10 [22,20]



<b>Vivace - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt. ◆</b>	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	19,91 0,00 bezpł. 11,95 bezpł.
INN: <b>Ramipril</b>   ATC: <b>C09AA05</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>144793</b>			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> PROTERAPIA Sp.z o.o.			
<b>Vivacor®: tabl. 25 mg - 30 szt. (3 blistry) ◆</b>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	15,10 8,67 9,03 bezpł. bezpł.
INN: <b>Carvedilol</b>   ATC: <b>C07AG02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>687862</b>			
(1) Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II - NYHA IV WP: Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> PROTERAPIA Sp.z o.o.			
<b>Vivacor®: tabl. 25 mg - 60 szt. (6 blistrów) ◆</b>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	29,62 17,34 17,48 bezpł. bezpł.
INN: <b>Carvedilol</b>   ATC: <b>C07AG02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>687879</b>			
(1) Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II - NYHA IV WP: Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> PROTERAPIA Sp.z o.o.			
<b>VivaChek Ino: test paskowy - 50 szt.</b>	WM	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup>	38,33 38,33 11,50 3,20
INN: <b>Glukoza we krwi</b>   ATC: <b>V07AD</b>   wyk: <b>EAN ~ 464934</b>			
(1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej   Kat. ciąży: <b>N</b> DIATHER			
<b>VivaChek Ino: test paskowy - 50 szt.</b>	WM	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup>	38,33 38,33 11,50 3,20
INN: <b>Glukoza we krwi</b>   ATC: <b>V07AD</b>   wyk: <b>EAN ~ 762749</b>			
(1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej   Kat. ciąży: <b>N</b> DIATHER			
<b>Vivacor®: tabl. 6,25 mg - 30 szt. (3 blistry) ◆</b>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	7,91 2,17 6,39 bezpł. bezpł.
INN: <b>Carvedilol</b>   ATC: <b>C07AG02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>687886</b>			
(1) Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II - NYHA IV WP: Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> PROTERAPIA Sp.z o.o.			
<b>Vivacor®: tabl. 6,25 mg - 60 szt. (6 blistrów) ◆</b>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	15,17 4,34 12,13 bezpł. bezpł.
INN: <b>Carvedilol</b>   ATC: <b>C07AG02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>687893</b>			
(1) Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II - NYHA IV WP: Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> PROTERAPIA Sp.z o.o.			
<b>Vivacor®: tabl. 12,5 mg - 30 szt. (3 blistry) ◆</b>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	11,39 4,34 8,35 bezpł. bezpł.
INN: <b>Carvedilol</b>   ATC: <b>C07AG02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>687909</b>			
(1) Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II - NYHA IV WP: Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> PROTERAPIA Sp.z o.o.			
<b>Vivacor®: tabl. 12,5 mg - 60 szt. (6 blistrów) ◆</b>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	22,43 8,67 16,36 bezpł. bezpł.
INN: <b>Carvedilol</b>   ATC: <b>C07AG02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>687930</b>			
(1) Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II - NYHA IV WP: Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> PROTERAPIA Sp.z o.o.			
<b>Vivacor®: tabl. 25 mg - 30 szt. (3 blistry) ◆</b>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	19,91 0,00 9,03 bezpł. bezpł.
INN: <b>Ramipril</b>   ATC: <b>C09AA05</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>144793</b>			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> PROTERAPIA Sp.z o.o.			
<b>Vivacor®: tabl. 25 mg - 60 szt. (6 blistrów) ◆</b>	Rx	100% Limit 30% <sup>(1)</sup> DZ <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	29,62 17,34 17,48 bezpł. bezpł.
INN: <b>Carvedilol</b>   ATC: <b>C07AG02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>687862</b>			
(1) Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II - NYHA IV WP: Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> PROTERAPIA Sp.z o.o.			
<b>Vizibim: krople do oczu [roztw.] 0,3 mg/ml - 1 but. 3 ml ◆</b>	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	39,73 0,00 bezpł. 7,49 bezpł.
INN: <b>Bimatoprost</b>   ATC: <b>S01EE03</b>   wyk: <b>EAN ~ 310769</b>			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Bausch Health			
<b>Vizibim: krople do oczu [roztw.] 0,3 mg/ml - 3 but. 3 ml ◆</b>	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	109,20 0,00 bezpł. 11,83 bezpł.
INN: <b>Bimatoprost</b>   ATC: <b>S01EE03</b>   wyk: <b>EAN ~ 310776</b>			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Bausch Health			
<b>Vizidor: krople do oczu [roztw.] 20 mg/ml - 1 but. 5 ml ◆</b>	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	19,67 0,00 bezpł. 5,21 bezpł.
INN: <b>Dorzolamide</b>   ATC: <b>S01EC03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>310936</b>			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b> Bausch Health			
<b>Vizidor: krople do oczu [roztw.] 20 mg/ml - 3 but. 5 ml ◆</b>	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	54,31 0,00 bezpł. 6,66 bezpł.
INN: <b>Dorzolamide</b>   ATC: <b>S01EC03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>310943</b>			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b> Bausch Health			
<b>Vizidor Duo: krople do oczu [roztw.] (20 mg + 5 mg/ml) - 1 but. 5 ml ◆</b>	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	26,39 0,00 bezpł. 3,20 bezpł.
INN: <b>Dorzolamide + Timolol</b>   ATC: <b>S01ED51</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>311049</b>			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b> Bausch Health			
<b>Vizidor Duo: krople do oczu [roztw.] (20 mg + 5 mg/ml) - 3 but. 5 ml ◆</b>	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	71,46 0,00 bezpł. 8,00 bezpł.
INN: <b>Dorzolamide + Timolol</b>   ATC: <b>S01ED51</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>311056</b>			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b> Bausch Health			
<b>Vizitrav: krople do oczu [roztw.] 40 µg/ml - 1 poj. 2,5 ml</b>	Rx	100% Limit DZ <sup>(1)</sup> R <sup>(2)</sup> S <sup>(3)</sup>	36,44 0,00 bezpł. 7,99 bezpł.
INN: <b>Travoprost</b>   ATC: <b>S01EE04</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>321949</b>			
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>D</b> Bausch Health			



Naszym wyborem

**enarenal**  
 enalapryli maleas

Vizitrav: krople do oczu [roztw.] 40 µg/ml - 3 poj. 2,5 ml	Rx	100%	100,32
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	13,38
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: Travoprost	ATC: S01EE04	wyk: B	EAN ~ 321956
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Bausch Health			
Vliwasorb® adhesive: opatrunek z superabsorbentem [samoprzylepny] 12x12 cm - 1 szt.	WM	100%	17,19
		Limit	17,06
		30% <sup>(1)</sup>	5,25
		30% <sup>(1)</sup>	2,74
INN: Emplastri microfibricum cellulosae	ATC: V20AA	wyk:	EAN ~ 587721
(1) Przewlekłe owróżdzenia   Kat. ciąży: N Lohmann & Rauscher			
Vliwasorb® Pro: opatrunek z superabsorbentem [samoprzylepny] 10x10 cm - 1 szt.	WM	100%	9,13
		Limit	9,13
		30% <sup>(1)</sup>	2,74
		30% <sup>(1)</sup>	2,74
INN: Emplastri microfibricum cellulosae	ATC: V20AA	wyk:	EAN ~ 067429
(1) Przewlekłe owróżdzenia   Kat. ciąży: N Lohmann & Rauscher			
Vliwasorb® Pro: opatrunek z superabsorbentem [samoprzylepny] 12,5x12,5 cm - 1 szt.	WM	100%	10,96
		Limit	10,96
		30% <sup>(1)</sup>	3,29
		30% <sup>(1)</sup>	3,29
INN: Emplastri microfibricum cellulosae	ATC: V20AA	wyk:	EAN ~ 067443
(1) Przewlekłe owróżdzenia   Kat. ciąży: N Lohmann & Rauscher			
Vliwasorb® Pro: opatrunek z superabsorbentem [samoprzylepny] 12,5x22,5 cm - 1 szt.	WM	100%	16,84
		Limit	16,84
		30% <sup>(1)</sup>	5,05
		30% <sup>(1)</sup>	5,05
INN: Emplastri microfibricum cellulosae	ATC: V20AA	wyk:	EAN ~ 067467
(1) Przewlekłe owróżdzenia   Kat. ciąży: N Lohmann & Rauscher			
Vliwasorb® Pro: opatrunek z superabsorbentem [samoprzylepny] 22x22 cm - 1 szt.	WM	100%	26,20
		Limit	26,20
		30% <sup>(1)</sup>	7,86
		30% <sup>(1)</sup>	7,86
INN: Emplastri microfibricum cellulosae	ATC: V20AA	wyk:	EAN ~ 067481
(1) Przewlekłe owróżdzenia   Kat. ciąży: N Lohmann & Rauscher			
Vliwasorb® Pro: opatrunek z superabsorbentem [samoprzylepny] 22x32 cm - 1 szt.	WM	100%	35,26
		Limit	35,26
		30% <sup>(1)</sup>	10,58
		30% <sup>(1)</sup>	10,58
INN: Emplastri microfibricum cellulosae	ATC: V20AA	wyk:	EAN ~ 067504
(1) Przewlekłe owróżdzenia   Kat. ciąży: N Lohmann & Rauscher			
Vliwasorb® sensitive: opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową 10x20 cm - 1 szt.	WM	100%	23,17
		Limit	23,17
		30% <sup>(1)</sup>	6,95
		30% <sup>(1)</sup>	6,95
INN: Emplastri microfibricum cellulosae	ATC: V20AA	wyk:	EAN ~ 104740
(1) Przewlekłe owróżdzenia   Kat. ciąży: N Lohmann & Rauscher			
Vliwasorb® sensitive: opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową 12,5x12,5 cm - 1 szt.	WM	100%	18,38
		Limit	18,38
		30% <sup>(1)</sup>	5,51
		30% <sup>(1)</sup>	5,51
INN: Emplastri microfibricum cellulosae	ATC: V20AA	wyk:	EAN ~ 104733
(1) Przewlekłe owróżdzenia   Kat. ciąży: N Lohmann & Rauscher			
Vliwasorb® sensitive: opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową 15x25 cm - 1 szt.	WM	100%	40,60
		Limit	40,60
		30% <sup>(1)</sup>	12,18
		30% <sup>(1)</sup>	12,18
INN: Emplastri microfibricum cellulosae	ATC: V20AA	wyk:	EAN ~ 104757
(1) Przewlekłe owróżdzenia   Kat. ciąży: N Lohmann & Rauscher			
Vliwasorb® sensitive: opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową 20x30 cm - 1 szt.	WM	100%	61,56
		Limit	61,56
		30% <sup>(1)</sup>	18,47
		30% <sup>(1)</sup>	18,47
INN: Emplastri microfibricum cellulosae	ATC: V20AA	wyk:	EAN ~ 104771
(1) Przewlekłe owróżdzenia   Kat. ciąży: N Lohmann & Rauscher			
Voriconazole Accord: tabl. powł. 200 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	188,89
		Limit	188,89
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
INN: Voriconazole	ATC: J02AC03	wyk: B	EAN ~ 573153
(1) Chemioterapia ICD10: C.0.15. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka z zespołami przebiegającymi z niedoborami odporności (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.			

Voriconazol Polpharma: tabl. powł. 200 mg - 20 szt. ◆	Rx	100%	143,93
		Limit	125,93
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	22,28
INN: Voriconazole	ATC: J02AC03	wyk: B	EAN ~ 063177
(1) Chemioterapia ICD10: C.0.15. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka z zespołami przebiegającymi z niedoborami odporności (4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA			
Warfin: tabl. 3 mg - 100 szt.	Rx	100%	18,77
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	10,91
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: Warfarin	ATC: B01AA03	wyk: B	EAN ~ 622368
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Orion Pharma Poland Sp. o.o.			
Warfin: tabl. 5 mg - 100 szt.	Rx	100%	29,75
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	16,64
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: Warfarin	ATC: B01AA03	wyk: B	EAN ~ 622382
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Orion Pharma Poland Sp. o.o.			
Wellion SymPhar: test diagnostyczny do szybkich oznaczeń - 50 szt.	WM	100%	36,63
		Limit	36,63
		30% <sup>(1)</sup>	10,99
		30% <sup>(1)</sup>	3,20
INN: Glukoza we krwi	ATC: V07AD	wyk:	EAN ~ 788258
(1) Cukrzyca (2) Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej   Kat. ciąży: N Symphar Sp. z o.o.			
Xalacom®: krople do oczu [roztw.] (50 µg+ 5 mg)/ml - 1 but. 2,5 ml ◆	Rx	100%	40,08
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	11,63
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: Latanoprost + Timolol	ATC: S01ED51	wyk: B	EAN ~ 057213
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D Upjohn EESV			
Odpowiedniki: Latanoprost + Timolol Genoptim [30,76], Akistan Duo [31,83], Tilaprox [36,80], Xalacom® [40,08], Latacom [41,79], Xaloptic Combi [41,84]			
Xalacom®: krople do oczu [roztw.] (50 µg+ 5 mg)/ml - 3 but. 2,5 ml ◆	Rx	100%	84,87
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	8,00
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: Latanoprost + Timolol	ATC: S01ED51	wyk: B	EAN ~ 234360
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Upjohn EESV			
Odpowiedniki: Xalacom® [84,87], Latacom [85,61], Xaloptic Combi [95,87]			
Xalatan®: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml - 1 but. 2,5 ml	Rx	100%	37,26
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	8,81
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: Latanoprost	ATC: S01EE01	wyk:	EAN ~ 411818
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Upjohn EESV			
Odpowiedniki: Akistan [31,83], Latanoprost Genoptim [33,92], Latalux [36,12], Xalatan® [37,26], Rozaprost [38,06], Xaloptic [41,83]			
Xalatan®: krople do oczu [roztw.] 50 µg/ml - 3 but. 2,5 ml	Rx	100%	96,50
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	9,56
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: Latanoprost	ATC: S01EE01	wyk:	EAN ~ 041182
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Jaskra (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Upjohn EESV			
Odpowiedniki: Akistan [86,49], Xalatan® [96,50], Rozaprost [101,65], Xaloptic [105,38]			

**Loperamid WZF**  
Loperamidi hydrochloridum

Przerwij niekończące się wizyty

Nowe opakowanie:  
**2 mg x 15 tabl.**

<b>Xalofree:</b> krople do oczu [roztw.] <b>50 µg/ml</b> - 1 but. 7,5 ml	Rx	100%	<b>96,50</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>9,56</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Latanoprost</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>710255</b>	Polfa Warszawa SA
<b>Xaloptix:</b> krople do oczu [roztw.] <b>50 µg/ml</b> - 1 but. 2,5 ml	Rx	100%	<b>41,83</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>13,38</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Latanoprost</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>741311</b>	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
Odpowiedniki: Akistan [31,83], Latanoprost Genoptim [33,92], Latalux [36,12], Xalatan® [37,26], Rozaprost [38,06], <b>Xaloptix [41,83]</b>			
<b>Xaloptix:</b> krople do oczu [roztw.] <b>50 µg/ml</b> - 3 but. 2,5 ml	Rx	100%	<b>105,38</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>18,44</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Latanoprost</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>601673</b>	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
Odpowiedniki: Akistan [86,49], Xalatan® [96,50], Rozaprost [101,65], <b>Xaloptix [105,38]</b>			
<b>Xaloptix Combi:</b> krople do oczu [roztw.] ( <b>50 µg+ 5 mg/ml</b> ) - 1 but. 2,5 ml ◆	Rx	100%	<b>41,84</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>13,39</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Latanoprost + Timolol</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>894543</b>	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
Odpowiedniki: Latanoprost + Timolol Genoptim [30,76], Akistan Duo [31,83], Tilaprox [36,80], Xalacom® [40,08], Latacom [41,79], <b>Xaloptix Combi [41,84]</b>			
<b>Xaloptix Combi:</b> krople do oczu [roztw.] ( <b>50 µg+ 5 mg/ml</b> ) - 3 but. 2,5 ml ◆	Rx	100%	<b>95,87</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>8,93</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Latanoprost + Timolol</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>606630</b>	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
Odpowiedniki: Xalacom® [84,87], Latacom [85,61], <b>Xaloptix Combi [95,87]</b>			
<b>Xaloptix Free:</b> krople do oczu [roztw.] <b>50 µg/ml</b> - 30 poj. 0,2 ml ◆	Rx	100%	<b>44,92</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>10,14</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Latanoprost</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>220365</b>	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
Odpowiedniki: Rozaprost Mono [43,22], <b>Xaloptix Free [44,92]</b>			
<b>Xaloptix Free:</b> krople do oczu [roztw.] <b>50 µg/ml</b> - 90 poj. 0,2 ml ◆	Rx	100%	<b>124,10</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	<b>19,77</b>
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Latanoprost</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Jaskra(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>220396</b>	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
Odpowiedniki: Rozaprost Mono [120,79], <b>Xaloptix Free [124,10]</b>			
<b>Xanderla:</b> implant w amp.-strzyk. <b>3,6 mg</b> - 1 amp.-strzyk.	Rx	100%	<b>177,55</b>
		Limit	<b>175,95</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>4,80</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Goserelin</b> (1) Zahamowanie czynności przysadki u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, w przygotowaniu do kontrolowanej hiperstimulacji jajników w programach wspomaganego rozrodu – refundacja do 3 cykli, Rak piersi i rak trzonu macicy, Rak prostaty <b>WP:</b> Obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>N</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>335564</b>	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

<b>Xanderla LA:</b> implant w amp.-strzyk. <b>10,8 mg</b> - 1 amp.-strzyk.	Rx	100%	<b>506,28</b>
		Limit	<b>506,28</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>8,96</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Goserelin</b> (1) Rak prostaty <b>WP:</b> Obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>N</b>	ATC: <b>L02AE03</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>335595</b>
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.			
<b>Xarelto®:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 10 szt. ◆	Rx	100%	<b>93,10</b>
		Limit	<b>34,36</b>
		R <sup>(1)</sup>	<b>61,94</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Rivaroxaban</b> (1) Żylna powłknięta zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: <b>B01AX06</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>658145</b>
Bayer Sp. z o.o.			
<b>Xarelto® 15:</b> tabl. powł. <b>15 mg</b> - 14 szt. ◆	Rx	100%	<b>131,00</b>
		Limit	<b>72,16</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>80,49</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Rivaroxaban</b> (1) Leczenie zakrzepicy żył głębokich oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia. Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: <b>B01AX06</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>910601</b>
Bayer Sp. z o.o.			
<b>Xarelto® 15:</b> tabl. powł. <b>15 mg</b> - 42 szt. ◆	Rx	100%	<b>376,31</b>
		Limit	<b>216,47</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>224,78</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Rivaroxaban</b> (1) Leczenie zakrzepicy żył głębokich oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia. Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: <b>B01AX06</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>910663</b>
Bayer Sp. z o.o.			
<b>Xarelto® 20:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 14 szt. ◆	Rx	100%	<b>132,92</b>
		Limit	<b>96,21</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>65,57</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Rivaroxaban</b> (1) Leczenie zakrzepicy żył głębokich oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia. Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: <b>B01AX06</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>910700</b>
Bayer Sp. z o.o.			
<b>Xartan®:</b> tabl. powł. <b>50 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>23,13</b>
		Limit	<b>11,46</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>13,60</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <b>Losartan potassium</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach <b>WP:</b> Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b>	ATC: <b>C09CA01</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>481118</b>
Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Losartanum 123ratio [X], Presartan [12,26], Lakea® [14,05], Losartan Krka [14,81], Lozap® 50 [15,15], Losacor® [15,61], <b>Xartan® [23,13]</b>			
<b>Xeljanz:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 56 szt.	Rx-z	100%	<b>2907,79</b>
		Limit	<b>2907,79</b>
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
INN: <b>Tofacitinib</b> (1) Program lekowy: leczenie łuszczykowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS), Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zeszlizwiającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZKSK), Program lekowy: indukcja remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym   Kat. ciąży: <b>X</b>	ATC: <b>L04AA29</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>977100</b>
Pfizer Polska Sp. z o.o.			
<b>Xetanor 20 mg:</b> tabl. powł. <b>20 mg</b> - 30 szt.	Rx	100%	<b>16,36</b>
		Limit	<b>14,11</b>
		30% <sup>(1)</sup>	<b>6,48</b>
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
INN: <b>Paroxetine</b> (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b>	ATC: <b>N06AB05</b>	wyk: <b>B</b>	EAN ~ <b>570515</b>
Neuraxpharm Arzneimittel GmbH			
Odpowiedniki: Paroxetine Aurovitas [13,55], Paroxinor [13,78], <b>Xetanor 20 mg [16,36]</b> , Arketis [17,79], Parogen [19,16], Rextin® [19,39], Paxtin 20 [19,50]			



Xevoben: tabl. 50 mg+ 12,5 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	21,39
		Limit	20,10
		R <sup>(1)</sup>	4,49
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Levodopa + Benserazide</i>	ATC: N04BA02	wyk: B	EAN ~ 107014
(1) Choroba i zespół Parkinsona WP: Dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Symphar Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Xevoben [21,39], Madopar® 62,5 [27,86]			

Xevoben: tabl. 100 mg+ 25 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	40,21
		Limit	40,21
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Levodopa + Benserazide</i>	ATC: N04BA02	wyk: B	EAN ~ 107020
(1) Choroba i zespół Parkinsona WP: Dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Symphar Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Xevoben [40,21], Madopar® 125 [53,15], Madopar® HBS [53,15]			

Xevoben: tabl. 200 mg+ 50 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	75,87
		Limit	75,87
		R <sup>(1)</sup>	3,56
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Levodopa + Benserazide</i>	ATC: N04BA02	wyk: B	EAN ~ 107023
(1) Choroba i zespół Parkinsona WP: Dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Symphar Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Xevoben [75,87], Madopar® 250 [97,62], Madopar® 250 [97,62]			

Xevoben XR: kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde 100 mg+ 25 mg - 100 szt. ◆	Rx	100%	40,21
		Limit	40,21
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		S <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Levodopa + Benserazide</i>	ATC: N04BA02	wyk: B	EAN ~ 107028
(1) Choroba i zespół Parkinsona WP: Dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C			
Symphar Sp. z o.o.			

Ximve: tabl. powł. 20 mg - 28 szt.	Rx	100%	12,91
		Limit	5,25
		30% <sup>(1)</sup>	9,24
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Simvastatin</i>	ATC: C10AA01	wyk: B	EAN ~ 055722
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niestandardowego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczykowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X			
RECORDATI Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Simvastatin Accord [X], Simvastatin Aurovitas [4,26], Simvastatin Bluefish [6,72], Simvagen 20 [7,35], Simvachol® [9,23], Simvacard® 20 [11,07], Vastan® [12,49], Simratio 20 [12,77], Ximve [12,91], Vaslip® [13,21], Zocor® 20 [13,22], Simvasterol® [14,29]			

Ximve: tabl. powł. 20 mg - 30 szt.	Rx	100%	13,82
		Limit	5,62
		30% <sup>(1)</sup>	9,89
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Simvastatin</i>	ATC: C10AA01	wyk: B	EAN ~ 935215
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niestandardowego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczykowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X			
RECORDATI Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Simvastatin Accord [X], Simvastatin Bluefish [7,12], Apo-Simva 20 [13,33], SimvaHEXAL 20 [13,67], Ximve [13,82]			

Ximve: tabl. powł. 40 mg - 30 szt.	Rx	100%	23,53
		Limit	11,24
		30% <sup>(1)</sup>	15,66
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Simvastatin</i>	ATC: C10AA01	wyk: B	EAN ~ 935214
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niestandardowego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczykowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X			
RECORDATI Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Simvastatin Accord [X], Apo-Simva 40 [22,30], Ximve [23,53], SimvaHEXAL 40 [24,36]			

Xorimax® 250: tabl. draż. 250 mg - 10 szt. ◆	Rx	100%	20,42
		Limit	17,93
		50% <sup>(1)</sup>	11,46
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Cefuroxime</i>	ATC: J01DC02	wyk: B	EAN ~ 224951
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: Zamur 250 [19,87], Xorimax® 250 [20,42]			

Xorimax® 250: tabl. draż. 250 mg - 14 szt. ◆	Rx	100%	26,22
		Limit	25,10
		50% <sup>(1)</sup>	13,67
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Cefuroxime</i>	ATC: J01DC02	wyk: B	EAN ~ 701753
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: Xorimax® 250 [26,22], Zamur 250 [27,24]			

Xorimax® 500: tabl. draż. 500 mg - 10 szt. ◆	Rx	100%	38,51
		Limit	35,85
		50% <sup>(1)</sup>	20,59
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Cefuroxime</i>	ATC: J01DC02	wyk: B	EAN ~ 224456
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: Cefuroxime Axtell Aurovitas [33,92], Furocef [35,20], Xorimax® 500 - (IR) [35,52], Zamur 500 [37,48], Xorimax® 500 [38,51]			

Xorimax® 500: tabl. draż. 500 mg - 14 szt. ◆	Rx	100%	49,27
		Limit	49,27
		50% <sup>(1)</sup>	24,64
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Cefuroxime</i>	ATC: J01DC02	wyk: B	EAN ~ 701760
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Sandoz GmbH			
Odpowiedniki: Cefuroxime Axtell Aurovitas [46,12], Furocef [47,90], Xorimax® 500 [49,27], Zamur 500 [51,10]			

Xorimax® 500 - (IR): tabl. powł. 500 mg - 10 szt. ◆	Rx	100%	35,52
		Limit	35,52
		50% <sup>(1)</sup>	17,76
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Cefuroxime</i>	ATC: J01DC02	wyk: B	EAN ~ 265328
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
Delfarma Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Cefuroxime Axtell Aurovitas [33,92], Furocef [35,20], Xorimax® 500 - (IR) [35,52], Zamur 500 [37,48], Xorimax® 500 [38,51]			

XP Analog LCP: prosz. do przyg. zaw. odżywczej 1950 kJ/100 g - 1 op. 400 g	Ś	100%	154,44
		Limit	154,44
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i>	ATC: V06CA	wyk: B	EAN ~ 644456
(1) Fenylketonuria   Kat. ciąży: N			
Nutricia Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: XP Maxamum: prosz. do przyg. zaw. odżywczej [smak pomarańczowy] 1260 kJ/100 g - 30 sasz. 50 g (1500 g)			

XP Maxamum: prosz. do przyg. zaw. odżywczej [smak pomarańczowy] 1260 kJ/100 g - 30 sasz. 50 g (1500 g)	Ś	100%	967,45
		Limit	967,45
		R <sup>(1)</sup>	3,20
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Dieta eliminacyjna w fenylketonurii</i>	ATC: V06CA	wyk: B	EAN ~ 620368
(1) Fenylketonuria   Kat. ciąży: N			
Nutricia Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Lirra [22,82], Xyzal® - (IR) [23,04], Contrahist [24,44], Xyzal® [26,00]			

Xyzal®: roztw. doust. 0,5 mg/ml - 1 but. 200 ml ◆	Rx	100%	26,00
		Limit	22,78
		30% <sup>(1)</sup>	10,05
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>	ATC: R06AE09	wyk: B	EAN ~ 619627
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B			
VEDIM Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Lirra [22,82], Xyzal® - (IR) [23,04], Contrahist [24,44], Xyzal® [26,00]			



<b>Xyzal® - (IR):</b> roztw. doust. <b>0,5 mg/ml</b> - 1 but. 200 ml ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>23,04</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>22,78</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>7,09</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>23,04</b>	Limit	<b>22,78</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>7,09</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>37,76</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>4,54</b></td></tr> </table>	100%	<b>37,76</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>4,54</b>				
100%	<b>23,04</b>																							
Limit	<b>22,78</b>																							
30% <sup>(1)</sup>	<b>7,09</b>																							
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																							
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																							
100%	<b>37,76</b>																							
Limit	<b>0,00</b>																							
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																							
R <sup>(2)</sup>	<b>4,54</b>																							
INN: <b>Levocetirizine dihydrochloride</b>   ATC: <b>R06AE09</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>135810</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke'go - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>B</b> Odpowiedniki: Lirra [22,82], Xyzal® - (IR) [23,04], Contrahist [24,44], Xyzal® [26,00]	Rx	INN: <b>Dienogest</b>   ATC: <b>G03DB08</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>403255</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Endometrioza   Kat. ciąży: <b>X</b>   Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. Odpowiedniki: Diemono - (IR) [37,59], Diemono - (IR) [37,65], Zafrilla [37,76], Aridya [38,45], Symdiono [39,59], Endovelle [39,82], Probella [42,10], Diemono [42,11], Visanne® [62,37]																						
<b>Yasnal®:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 28 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>25,41</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>18,79</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>12,26</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>25,41</b>	Limit	<b>18,79</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>12,26</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>4,80</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>3,93</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>1,85</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>4,80</b>	Limit	<b>3,93</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>1,85</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.				
100%	<b>25,41</b>																							
Limit	<b>18,79</b>																							
30% <sup>(1)</sup>	<b>12,26</b>																							
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																							
100%	<b>4,80</b>																							
Limit	<b>3,93</b>																							
30% <sup>(1)</sup>	<b>1,85</b>																							
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																							
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																							
INN: <b>Donepezil hydrochloride</b>   ATC: <b>N06DA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>993215</b> (1) Choroba Alzheimera WP: Otepienie z ciałami Lewy'ego; otepienie w przebiegu choroby Parkinsona(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Odpowiedniki: Apo-Doperil [X], Donecetil [X], Donepestan [X], Donepezil Polfarmex [X], Memorion [18,46], Pamigen [19,76], Donepezil Bluefish [19,83], Doneprion [20,33], Donecept [20,64], Donesyn [20,82], Donepex [22,17], Yasnal® [25,41], Cogiton® 5 [25,68]	Rx	INN: <b>Rosuvastatin</b>   ATC: <b>C10AA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>802562</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Odpowiedniki: Astrium [X], Rosuvastatin Medical Valley [4,65], Aporoza [4,80], Zahron [4,80], Suvardio [4,81], Rosutrox [4,82], Ridlip [5,15], Roswera [5,16], Crosovo [12,30], Zaranta [14,20]																						
<b>Yasnal®:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 28 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>39,29</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>37,57</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>12,99</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>39,29</b>	Limit	<b>37,57</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>12,99</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>8,73</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>7,87</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>2,90</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>8,73</b>	Limit	<b>7,87</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>2,90</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.				
100%	<b>39,29</b>																							
Limit	<b>37,57</b>																							
30% <sup>(1)</sup>	<b>12,99</b>																							
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																							
100%	<b>8,73</b>																							
Limit	<b>7,87</b>																							
30% <sup>(1)</sup>	<b>2,90</b>																							
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																							
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																							
INN: <b>Donepezil hydrochloride</b>   ATC: <b>N06DA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>993314</b> (1) Choroba Alzheimera WP: Otepienie z ciałami Lewy'ego; otepienie w przebiegu choroby Parkinsona(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Odpowiedniki: Apo-Doperil [X], Donepestan [X], Donepezil Polfarmex [X], Donepezil Bluefish [32,71], Memorion [34,02], Doneprion [35,27], Donecetil [37,35], Donecept - (IR) [37,52], Pamigen [37,54], Donepex [37,57], Donesyn [38,15], Donecept [38,95], Yasnal® [39,29], Cogiton® 10 [43,87]	Rx	INN: <b>Rosuvastatin</b>   ATC: <b>C10AA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>802586</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Odpowiedniki: Zahron [8,73], Rosutrox [8,80], Zaranta [20,89]																						
<b>Yasnal® Q-Tab:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>5 mg</b> - 28 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>25,41</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>18,79</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>12,26</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>25,41</b>	Limit	<b>18,79</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>12,26</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>8,73</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>7,87</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>2,90</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>8,73</b>	Limit	<b>7,87</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>2,90</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.				
100%	<b>25,41</b>																							
Limit	<b>18,79</b>																							
30% <sup>(1)</sup>	<b>12,26</b>																							
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																							
100%	<b>8,73</b>																							
Limit	<b>7,87</b>																							
30% <sup>(1)</sup>	<b>2,90</b>																							
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																							
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																							
INN: <b>Donepezil hydrochloride</b>   ATC: <b>N06DA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>850075</b> (1) Choroba Alzheimera WP: Otepienie z ciałami Lewy'ego; otepienie w przebiegu choroby Parkinsona(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Odpowiedniki: Yasnal® Q-Tab [25,41], Ricordo [27,78]	Rx	INN: <b>Rosuvastatin</b>   ATC: <b>C10AA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>802623</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Odpowiedniki: Astrium [X], Rosuvastatin Medical Valley [8,41], Crosovo [8,73], Zahron [8,73], Suvardio [8,80], Rosutrox [8,82], Zaranta [9,13], Ridlip [9,40], Roswera [9,42]																						
<b>Yasnal® Q-Tab:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>10 mg</b> - 28 szt. ◆	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>39,29</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>37,57</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>12,99</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>39,29</b>	Limit	<b>37,57</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>12,99</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>16,55</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>15,74</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>4,98</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>16,55</b>	Limit	<b>15,74</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>4,98</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.				
100%	<b>39,29</b>																							
Limit	<b>37,57</b>																							
30% <sup>(1)</sup>	<b>12,99</b>																							
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																							
100%	<b>16,55</b>																							
Limit	<b>15,74</b>																							
30% <sup>(1)</sup>	<b>4,98</b>																							
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																							
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																							
INN: <b>Donepezil hydrochloride</b>   ATC: <b>N06DA02</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>850204</b> (1) Choroba Alzheimera WP: Otepienie z ciałami Lewy'ego; otepienie w przebiegu choroby Parkinsona(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Odpowiedniki: Yasnal® Q-Tab [39,29], Ricordo [40,07]	Rx	INN: <b>Rosuvastatin</b>   ATC: <b>C10AA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>802647</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Odpowiedniki: Zahron [16,55], Rosutrox [16,64]																						
<b>Ylpio:</b> tabl. <b>80/2,5 mg</b> - 30 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>30,23</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>22,93</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>14,18</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>30,23</b>	Limit	<b>22,93</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>14,18</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>12,69</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>11,80</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>3,99</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>12,69</b>	Limit	<b>11,80</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>3,99</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.				
100%	<b>30,23</b>																							
Limit	<b>22,93</b>																							
30% <sup>(1)</sup>	<b>14,18</b>																							
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																							
100%	<b>12,69</b>																							
Limit	<b>11,80</b>																							
30% <sup>(1)</sup>	<b>3,99</b>																							
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																							
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																							
INN: <b>Indapamide + Telmisartan</b>   ATC: <b>C09DA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>146355</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>T1:C, T2:D, T3:D</b> PRO. MED. PL Sp. z o.o.	Rx	INN: <b>Rosuvastatin</b>   ATC: <b>C10AA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>333959</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Odpowiedniki: Zahron [12,69], Roswera [13,72]																						
<b>Zafiron®:</b> prosz. do inhal. [kaps. twarde] <b>12 µg/dawkę</b> - 60 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>61,73</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>6,77</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>61,73</b>	Limit	<b>0,00</b>	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>6,77</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>24,12</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>23,60</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>6,84</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>24,12</b>	Limit	<b>23,60</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>6,84</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	<b>61,73</b>																							
Limit	<b>0,00</b>																							
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																							
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																							
R <sup>(2)</sup>	<b>6,77</b>																							
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																							
100%	<b>24,12</b>																							
Limit	<b>23,60</b>																							
30% <sup>(1)</sup>	<b>6,84</b>																							
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																							
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																							
INN: <b>Formoterol</b>   ATC: <b>R03AC13</b>   wyk: <b>A</b>   EAN ~ <b>975914</b> (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Astma(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Odpowiedniki: Forastmin® [60,81], Foradil® [61,26], Zafiron® [61,73], Oxodil PPH [61,89]	Rx	INN: <b>Rosuvastatin</b>   ATC: <b>C10AA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>333973</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Odpowiedniki: Zaranta [24,07], Zahron [24,12], Roswera [24,25]																						
<b>Zafiron®:</b> prosz. do inhal. [kaps. twarde] <b>12 µg/dawkę</b> - 120 szt.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>116,32</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>C<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>6,40</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>116,32</b>	Limit	<b>0,00</b>	C <sup>(1)</sup>	bezpł.	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>6,40</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>18,03</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>15,74</b></td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td><b>6,31</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>18,03</b>	Limit	<b>15,74</b>	30% <sup>(1)</sup>	<b>6,31</b>	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	<b>116,32</b>																							
Limit	<b>0,00</b>																							
C <sup>(1)</sup>	bezpł.																							
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																							
R <sup>(2)</sup>	<b>6,40</b>																							
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																							
100%	<b>18,03</b>																							
Limit	<b>15,74</b>																							
30% <sup>(1)</sup>	<b>6,31</b>																							
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																							
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																							
INN: <b>Formoterol</b>   ATC: <b>R03AC13</b>   wyk: <b>A</b>   EAN ~ <b>937981</b> (1) Kobiety w ciąży(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Astma, Eozynoflowe zapalenie oskrzeli, Przewlekła obturacyjna choroba płuc(4) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Odpowiedniki: Forastmin® [116,28], Oxodil PPH [116,32], Zafiron® [116,32]	Rx	INN: <b>Rosuvastatin</b>   ATC: <b>C10AA07</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>802685</b> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>X</b> Odpowiedniki: Astrium [X], Rosuvastatin Medical Valley [15,81], Aporoza [16,47], Rosutrox [16,64], Suvardio [16,64], Zaranta [17,35], Ridlip [17,92], Roswera [17,96], Crosovo [18,03], Zahron [18,03]																						

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

Zahron: tabl. powł. 20 mg - 56 szt.	Rx	100%	31,06
		Limit	31,06
		30% <sup>(1)</sup>	8,39
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rosuvastatin</i>   ATC: C10AA07   wyk: B   EAN ~ 802708 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Zahron [31,06], Rosutrox [31,47]			
Zahron: tabl. powł. 30 mg - 28 szt.	Rx	100%	24,12
		Limit	23,60
		30% <sup>(1)</sup>	6,84
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rosuvastatin</i>   ATC: C10AA07   wyk: B   EAN ~ 334062 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Zahron [24,12], Roswera [26,28]			
Zahron: tabl. powł. 30 mg - 56 szt.	Rx	100%	45,25
		Limit	45,25
		30% <sup>(1)</sup>	12,22
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rosuvastatin</i>   ATC: C10AA07   wyk: B   EAN ~ 334086 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Zaranta [45,14], Zahron [45,25], Roswera [45,48]			
Zahron: tabl. powł. 40 mg - 28 szt.	Rx	100%	31,06
		Limit	31,06
		30% <sup>(1)</sup>	8,39
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rosuvastatin</i>   ATC: C10AA07   wyk: B   EAN ~ 802753 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Astrium [X], Rosuvastatin Medical Valley [29,83], Zaranta [31,06], Zahron [31,06], Aporoza [31,15], Crosuvo [31,19], Suwardio [31,23], Ridlip [31,47], Rosutrox [31,47], Roswera [34,14]			
Zahron: tabl. powł. 40 mg - 56 szt.	Rx	100%	58,32
		Limit	58,32
		30% <sup>(1)</sup>	15,75
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Rosuvastatin</i>   ATC: C10AA07   wyk: B   EAN ~ 802777 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: X Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Zahron [58,32], Rosutrox [59,14]			
Zalanzo®: kaps. dojelitowe, twarde 15 mg - 28 szt.	Rx	100%	8,58
		Limit	6,22
		50% <sup>(1)</sup>	5,47
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lansoprazole</i>   ATC: A02BC03   wyk: B   EAN ~ 064045 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Exeltis Poland Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Zalanzo® [8,58], Lanzul® S [9,61]			
Zalanzo®: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg - 28 szt.	Rx	100%	16,46
		Limit	12,43
		50% <sup>(1)</sup>	10,25
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Lansoprazole</i>   ATC: A02BC03   wyk: B   EAN ~ 064076 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Exeltis Poland Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Zalanzo® [16,46], Lanzul® [18,63]			
Zalasta®: tabl. 5 mg - 70 szt. ◆	Rx	100%	116,48
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,39
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 069293 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.			

Zalasta®: tabl. 5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	48,38
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,65
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 081812 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Olanzin - (IR) [X], Ranofren [33,38], Zalasta® - (IR) [35,25], Zalasta® - (IR) [35,27], Olanzarar [39,75], Olanzapina Mylan [42,83], Olazax [44,55], Olpina® [44,78], Olanzin [45,56], Olanzapine Apotex [47,73], Zalasta® [48,38], Egolanza [49,36], Olzapin [50,51]			
Zalasta®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	48,38
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,65
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 069705 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Olanzapine Apotex [18,00], Olanzapine Bluefish [30,99], Anzorin [39,05], Zopriodoxin [42,26], Olanzapina Mylan [42,83], Olazax Disperzi [44,55], Zalasta® [48,38], Zolaxa Rapid [48,40], Olanzapine Lekam [50,96], Zolafren® Swift [52,07]			
Zalasta®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 70 szt. ◆	Rx	100%	116,48
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,39
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 069750 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.			
Zalasta®: tabl. 10 mg - 70 szt. ◆	Rx	100%	222,73
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,47
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 069361 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.			
Zalasta®: tabl. 10 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	91,44
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 081911 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Olanzin - (IR) [X], Zalasta® - (IR) [60,09], Zalasta® - (IR) [65,24], Zalasta® - (IR) [76,23], Olanzapine Mylan - (IR) [77,32], Olanzarar [79,67], Olanzapina Mylan [80,36], Olazax [83,79], Olpina® [86,54], Egolanza - (IR) [89,74], Egolanza - (IR) [90,20], Olanzin [90,34], Zalasta® [91,44], Olzapin [92,44], Egolanza [93,41], Olanzapine Apotex [93,71], Ranofren [99,50]			
Zalasta®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	91,44
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 069866 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Olanzapine Bluefish [56,65], Anzorin [72,80], Olanzarar [79,67], Zopriodoxin [79,96], Olanzapina Mylan [80,36], Olazax Disperzi [83,79], Zalasta® [91,44], Olanzapine Apotex [93,71], Zolaxa Rapid [95,65], Olanzapine Lekam [96,61], Zolafren® Swift [98,85]			
Zalasta®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 70 szt. ◆	Rx	100%	222,73
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	7,47
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 069897 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona (3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Krka Polska Sp. z o.o.			



**ZOLPIC** Daj owcom odpocząć.  
zolidem



<b>Zalasta®</b> : tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>15 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>132,56</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>4,48</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** | ATC: **N05AH03** | wyk: **B** | EAN ~ **069958**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Olanzapine Bluefish [80,37], Anzolin [104,01], Olanzapina Mylan [106,65], Olazax Disperzi [121,07], Zopridoxin [125,21], **Zalasta®** [132,56], Olanzapine Lekam [140,30], Zolaxa Rapid [142,22], Zolafren® Swift [143,66]

<b>Zalasta®</b> : tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>15 mg</b> - 70 szt. ◆	Rx	100%	<b>327,61</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>11,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** | ATC: **N05AH03** | wyk: **B** | EAN ~ **069989**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Olanzapine Mylan [139,07], Zopridoxin [145,49], Olazax Disperzi [158,31], **Zalasta®** [173,61], Olanzapine Apotex [174,94], Olanzapine Lekam [183,96], Zolafren® Swift [188,43], Zolaxa Rapid [188,44]

<b>Zalasta®</b> : tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>20 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>173,61</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>5,97</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** | ATC: **N05AH03** | wyk: **B** | EAN ~ **070008**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Anzolin [135,18], Olanzapina Mylan [139,07], Zopridoxin [145,49], Olazax Disperzi [158,31], **Zalasta®** [173,61], Olanzapine Apotex [174,94], Olanzapine Lekam [183,96], Zolafren® Swift [188,43], Zolaxa Rapid [188,44]

<b>Zalasta®</b> : tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>20 mg</b> - 70 szt. ◆	Rx	100%	<b>432,52</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>14,93</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** | ATC: **N05AH03** | wyk: **B** | EAN ~ **070046**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Krka Polska Sp. z o.o.

<b>Zalasta® - (IR)</b> : tabl. <b>5 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>35,27</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** | ATC: **N05AH03** | wyk: **B** | EAN ~ **743078**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Inpharm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Anzolin - (IR) [X], Ranofren [33,38], **Zalasta® - (IR)** [35,25], **Zalasta® - (IR)** [35,27], Olanzaran [39,75], Olanzapina Mylan [42,83], Olazax [44,55], Olpinat® [44,78], Olanzin [45,56], Olanzapine Apotex [47,73], **Zalasta®** [48,38], Egolanza [49,36], Olzapin [50,51]

<b>Zalasta® - (IR)</b> : tabl. <b>10 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>60,09</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** | ATC: **N05AH03** | wyk: **B** | EAN ~ **144457**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Pretium Farm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Olanzin - (IR) [X], **Zalasta® - (IR)** [60,09], **Zalasta® - (IR)** [65,24], **Zalasta® - (IR)** [76,23], Olanzapine Mylan - (IR) [77,32], Olanzaran [79,67], Olanzapina Mylan [80,36], Olazax [83,79], Olpinat® [86,54], Egolanza - (IR) [89,74], Egolanza - (IR) [90,20], Olanzin [90,34], **Zalasta®** [91,44], Olzapin [92,44], Egolanza [93,41], Olanzapine Apotex [93,71], Ranofren [99,50]

<b>Zalasta® - (IR)</b> : tabl. <b>10 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>65,24</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** | ATC: **N05AH03** | wyk: **B** | EAN ~ **743061**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Inpharm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Olanzin - (IR) [X], **Zalasta® - (IR)** [60,09], **Zalasta® - (IR)** [65,24], **Zalasta® - (IR)** [76,23], Olanzapine Mylan - (IR) [77,32], Olanzaran [79,67], Olanzapina Mylan [80,36], Olazax [83,79], Olpinat® [86,54], Egolanza - (IR) [89,74], Egolanza - (IR) [90,20], Olanzin [90,34], **Zalasta®** [91,44], Olzapin [92,44], Egolanza [93,41], Olanzapine Apotex [93,71], Ranofren [99,50]

<b>Zalasta® - (IR)</b> : tabl. powł. <b>5 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>35,25</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** | ATC: **N05AH03** | wyk: **B** | EAN ~ **860082**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Olanzin - (IR) [X], Ranofren [33,38], **Zalasta® - (IR)** [35,25], **Zalasta® - (IR)** [35,27], Olanzaran [39,75], Olanzapina Mylan [42,83], Olazax [44,55], Olpinat® [44,78], Olanzin [45,56], Olanzapine Apotex [47,73], **Zalasta®** [48,38], Egolanza [49,36], Olzapin [50,51]

<b>Zalasta® - (IR)</b> : tabl. powł. <b>10 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx	100%	<b>76,23</b>
		Limit	<b>0,00</b>
		DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
		R <sup>(2)</sup>	<b>3,20</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Olanzapine** | ATC: **N05AH03** | wyk: **B** | EAN ~ **600123**  
 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
 Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Olanzin - (IR) [X], Ranofren [33,38], **Zalasta® - (IR)** [60,09], **Zalasta® - (IR)** [76,23], Olanzapine Mylan - (IR) [77,32], Olanzaran [79,67], Olanzapina Mylan [80,36], Olazax [83,79], Olpinat® [86,54], Egolanza - (IR) [89,74], Egolanza - (IR) [90,20], Olanzin [90,34], **Zalasta®** [91,44], Olzapin [92,44], Egolanza [93,41], Olanzapine Apotex [93,71], Ranofren [99,50]

<b>Zamur 250</b> : tabl. powł. <b>250 mg</b> - 10 szt. ◆	Rx	100%	<b>19,87</b>
		Limit	<b>17,93</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>10,91</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Cefuroxime** | ATC: **J01DC02** | wyk: **B** | EAN ~ **216383**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
 Teva B.V.

Odpowiedniki: **Zamur 250** [19,87], Xorimax® 250 [20,42]

<b>Zamur 250</b> : tabl. powł. <b>250 mg</b> - 14 szt. ◆	Rx	100%	<b>27,24</b>
		Limit	<b>25,10</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>14,69</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Cefuroxime** | ATC: **J01DC02** | wyk: **B** | EAN ~ **067946**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
 Teva B.V.

<b>Zamur 250</b> : tabl. powł. <b>250 mg</b> - 14 szt. ◆	Rx	100%	<b>27,24</b>
		Limit	<b>25,10</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>14,69</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Cefuroxime** | ATC: **J01DC02** | wyk: **B** | EAN ~ **067946**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
 Teva B.V.

Odpowiedniki: Xorimax® 250 [26,22], **Zamur 250** [27,24]

<b>Zamur 500</b> : tabl. powł. <b>500 mg</b> - 10 szt. ◆	Rx	100%	<b>37,48</b>
		Limit	<b>35,85</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>19,56</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Cefuroxime** | ATC: **J01DC02** | wyk: **B** | EAN ~ **216390**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
 Teva B.V.

Odpowiedniki: Cefuroxime Axetil Aurovitas [33,92], Furocef [35,20], Xorimax® 500 - (IR) [35,52], **Zamur 500** [37,48], Xorimax® 500 [38,51]

<b>Zamur 500</b> : tabl. powł. <b>500 mg</b> - 14 szt. ◆	Rx	100%	<b>51,10</b>
		Limit	<b>50,19</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>26,01</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Cefuroxime** | ATC: **J01DC02** | wyk: **B** | EAN ~ **067953**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
 Teva B.V.

Odpowiedniki: Cefuroxime Axetil Aurovitas [46,12], Furocef [47,90], Xorimax® 500 [49,27], **Zamur 500** [51,10]

<b>Zamur 500 - (IR)</b> : tabl. powł. <b>500 mg</b> - 8 szt. ◆	Rx	100%	<b>27,90</b>
		Limit	<b>27,90</b>
		50% <sup>(1)</sup>	<b>13,95</b>
		DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
		S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Cefuroxime** | ATC: **J01DC02** | wyk: **B** | EAN ~ **147162**  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
 Inpharm Sp. z o.o.

<b>Zanacodar:</b> tabl. 40 mg - 28 szt.	Rx	100%	12,77
		Limit	10,70
		30% <sup>(1)</sup>	5,28
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan** ATC: C09CA07 wyk: B EAN ~ 941841  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciskiennienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 r.  
(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

**Odpowiedniki:** Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tezeo - (IR) [11,23], Tezeo - (IR) [11,24], Telmisartan Bluefish [11,80], Telmisartan Mylan [11,91], Telmabax [12,07], **Zanacodar [12,77]**, Telmisartan Genoptim [12,86], Toptelmi [13,41], Tezeo [13,46], Telmisartan EGIS [13,58], Actelsar [13,75], Tolura [14,61], Telmex [15,74], Telmizek [16,88], Polsart [17,16], Pritor® [18,81], Micardis® [24,02]

<b>Zanacodar:</b> tabl. 80 mg - 28 szt.	Rx	100%	24,59
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	9,61
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan** ATC: C09CA07 wyk: B EAN ~ 941926  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciskiennienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 r.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 r.; leczenie renoprotektywne u dzieci do 18 r.  
(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

**Odpowiedniki:** Telmisartan Orion [X], Telmisartanum Teva B.V. [X], Tolura - (IR) [X], Tolura - (IR) [20,22], Telmisartan EGIS - (IR) [21,31], Tezeo - (IR) [21,34], Tezeo - (IR) [21,34], Telmabax [22,53], Telmisartan Mylan [22,65], Telmisartan Bluefish [22,75], Telmisartan EGIS - (IR) [22,99], **Zanacodar [24,59]**, Telmisartan Genoptim [24,76], Pritor® [24,98], Toptelmi [25,85], Tezeo [25,97], Telmisartan EGIS [26,19], Actelsar [26,88], Tolura [28,26], Telmex [30,52], Telmizek [32,79], Polsart [33,36], Micardis® [33,56]

<b>Zanacodar Combi:</b> tabl. 40/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	16,04
		Limit	10,70
		30% <sup>(1)</sup>	8,55
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan + Hydrochlorothiazide** ATC: C09DA07 wyk: B EAN ~ 226381  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciskiennienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

**Odpowiedniki:** Toptelmi HCT [12,31], Telmisartan + HCT Genoptim [13,24], Telmex Plus [14,21], Tezeo HCT [15,23], Tolucombi [15,75], Telmisartan HCT EGIS [15,87], **Zanacodar Combi [16,04]**, Polsart Plus [16,30], Telmizek HCT [17,47], PritorPlus® [28,41]

<b>Zanacodar Combi:</b> tabl. 40/12,5 mg - 56 szt.	Rx	100%	24,23
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	9,25
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan + Hydrochlorothiazide** ATC: C09DA07 wyk: B EAN ~ 133004  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciskiennienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

**Odpowiedniki:** Toptelmi HCT [23,61], **Zanacodar Combi [24,23]**, Tezeo HCT [29,52], Tolucombi [30,55]

<b>Zanacodar Combi:</b> tabl. 80/25 mg - 28 szt.	Rx	100%	31,12
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	16,14
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan + Hydrochlorothiazide** ATC: C09DA07 wyk: B EAN ~ 226404  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciskiennienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

**Odpowiedniki:** Toptelmi HCT [23,61], Telmisartan + HCT Genoptim [25,51], Telmex Plus [27,46], Tezeo HCT [29,52], Tolucombi [30,55], Actelsar HCT [31,00], Telmisartan HCT EGIS [31,00], Gisartan [31,12], **Zanacodar Combi [31,12]**, Polsart Plus [31,65], Telmizek HCT [33,98], PritorPlus® [35,35], MicardisPlus [39,36]

<b>Zanacodar Combi:</b> tabl. 80/12,5 mg - 28 szt.	Rx	100%	31,12
		Limit	21,40
		30% <sup>(1)</sup>	16,14
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan + Hydrochlorothiazide** ATC: C09DA07 wyk: B EAN ~ 226398  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciskiennienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

**Odpowiedniki:** Toptelmi HCT [23,61], Telmisartan + HCT Genoptim [25,51], Telmex Plus [27,46], Tezeo HCT [29,52], Tolucombi [30,55], Actelsar HCT [31,00], Telmisartan HCT EGIS [31,00], Gisartan [31,12], **Zanacodar Combi [31,12]**, Polsart Plus [31,65], Telmizek HCT [33,98], PritorPlus® [35,35], MicardisPlus [39,36]

<b>Zanacodar Combi:</b> tabl. 80/25 mg - 56 szt.	Rx	100%	45,90
		Limit	42,80
		30% <sup>(1)</sup>	15,94
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan + Hydrochlorothiazide** ATC: C09DA07 wyk: B EAN ~ 133006  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciskiennienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

**Odpowiedniki:** Toptelmi HCT [44,66], **Zanacodar Combi [45,90]**, Tezeo HCT [56,47], Tolucombi [58,53]

<b>Zanacodar Combi:</b> tabl. 80/12,5 mg - 56 szt.	Rx	100%	45,90
		Limit	42,80
		30% <sup>(1)</sup>	15,94
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Telmisartan + Hydrochlorothiazide** ATC: C09DA07 wyk: B EAN ~ 133005  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Naciskiennienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL(2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:D, T3:D  
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

**Odpowiedniki:** Toptelmi HCT [44,66], **Zanacodar Combi [45,90]**, Tezeo HCT [56,47], Tolucombi [58,53]

<b>Zaranta:</b> tabl. powł. 10 mg - 28 szt.	Rx	100%	9,13
		Limit	7,87
		30% <sup>(1)</sup>	3,62
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Rosuvastatin** ATC: C10AA07 wyk: B EAN ~ 777785  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** Astrium [X], Rosuvastatin Medical Valley [8,41], Crosuvo [8,73], Zahron [8,73], Suwardio [8,80], Rosutrox [8,82], **Zaranta [9,13]**, Ridlip [9,40], Roswera [9,42]

<b>Zaranta:</b> tabl. powł. 15 mg - 56 szt.	Rx	100%	24,07
		Limit	23,60
		30% <sup>(1)</sup>	7,55
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Rosuvastatin** ATC: C10AA07 wyk: B EAN ~ 369333  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** **Zaranta [24,07]**, Zahron [24,12], Roswera [24,25]

<b>Zaranta:</b> tabl. powł. 15 mg - 90 szt.	Rx	100%	36,82
		Limit	36,82
		30% <sup>(1)</sup>	11,05
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Rosuvastatin** ATC: C10AA07 wyk: B EAN ~ 347079  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** **Zaranta [36,82]**, Roswera [37,28]

<b>Zaranta:</b> tabl. powł. 20 mg - 28 szt.	Rx	100%	17,35
		Limit	15,74
		30% <sup>(1)</sup>	6,33
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Rosuvastatin** ATC: C10AA07 wyk: B EAN ~ 777839  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** Astrium [X], Rosuvastatin Medical Valley [15,81], Aporoz [16,47], Rosutrox [16,64], Suwardio [16,64], **Zaranta [17,35]**, Ridlip [17,92], Roswera [17,96], Crosuvo [18,03], Zahron [18,03]

<b>Zaranta:</b> tabl. powł. 30 mg - 56 szt.	Rx	100%	45,14
		Limit	45,14
		30% <sup>(1)</sup>	13,54
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Rosuvastatin** ATC: C10AA07 wyk: B EAN ~ 369340  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** **Zaranta [45,14]**, Zahron [45,25], Roswera [45,48]

<b>Zaranta:</b> tabl. powł. 30 mg - 90 szt.	Rx	100%	69,35
		Limit	69,35
		30% <sup>(1)</sup>	20,81
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Rosuvastatin** ATC: C10AA07 wyk: B EAN ~ 347109  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** **Zaranta [69,35]**, Roswera [70,24]

<b>Zaranta:</b> tabl. powł. 40 mg - 28 szt.	Rx	100%	31,06
		Limit	31,06
		30% <sup>(1)</sup>	9,32
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Rosuvastatin** ATC: C10AA07 wyk: B EAN ~ 077785  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

**Odpowiedniki:** Astrium [X], Rosuvastatin Medical Valley [29,83], Zahron [31,06], **Zaranta [31,06]**, Aporoz [31,15], Crosuvo [31,19], Suwardio [31,23], Ridlip [31,47], Rosutrox [31,47], Roswera [34,14]





Zenofo: tabl. powł. 1000 mg - 30 szt.	Rx	100% 8,07 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 3,48 S <sup>(3)</sup> bezpł.		Zenofo SR: tabl. o przedl. uwalnianiu 750 mg - 60 szt.	Rx	100% 18,27 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 9,79 S <sup>(3)</sup> bezpł.	
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Odpowiedniki: Metformin Bluefish [7,33], Metfogamma 1000 [7,93], Zenofo [8,07], Avamina [8,36], Siofo <sup>®</sup> 1000 [8,55], Formetic [8,61], Glucophage <sup>®</sup> 1000 mg [8,63], Metformax <sup>®</sup> 1000 [8,67]	ATC: A10BA02	wyk: B	EAN ~ 148834 Zentiva PL Sp. z o.o.	INN: <i>Metformin hydrochloride</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Odpowiedniki: Diabufor XR [16,01], Ranmet XR [16,01], Zenofo SR [18,27], Etfom SR [18,84], Symformin XR [22,16], Metformax <sup>®</sup> SR 750 [22,57], Avamina SR [24,11], Glucophage <sup>®</sup> XR [28,12]	ATC: A10BA02	wyk: B	EAN ~ 145353 Zentiva PL Sp. z o.o.
Zenofo: tabl. powł. 1000 mg - 60 szt.	Rx	100% 15,13 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 3,20 S <sup>(3)</sup> bezpł.		Zenofo SR: tabl. o przedl. uwalnianiu 1000 mg - 30 szt.	Rx	100% 12,29 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 7,70 S <sup>(3)</sup> bezpł.	
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Odpowiedniki: Glucophage <sup>®</sup> 1000 mg [X], Avamina [14,27], Metcrean [14,27], Metformax <sup>®</sup> 1000 - (IR) [15,07], Zenofo [15,13], Metformax <sup>®</sup> 1000 [16,16], Siofo <sup>®</sup> 1000 [16,16], Formetic [16,88], Etfom [17,36]	ATC: A10BA02	wyk: B	EAN ~ 148837 Zentiva PL Sp. z o.o.	INN: <i>Metformin hydrochloride</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Odpowiedniki: Glucophage <sup>®</sup> XR [X], Zenofo SR [12,29], Etfom SR [12,68], Siofo <sup>®</sup> XR 1000 mg [14,27], Metformax <sup>®</sup> SR 1000 [14,79], Symformin XR [14,86], Avamina SR [16,50]	ATC: A10BA02	wyk: B	EAN ~ 145355 Zentiva PL Sp. z o.o.
Zenofo: tabl. powł. 1000 mg - 90 szt.	Rx	100% 22,01 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 4,80 S <sup>(3)</sup> bezpł.		Zenofo SR: tabl. o przedl. uwalnianiu 1000 mg - 60 szt.	Rx	100% 24,04 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 11,67 S <sup>(3)</sup> bezpł.	
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Odpowiedniki: Avamina [19,69], Zenofo [22,01], Metformax <sup>®</sup> 1000 - (IR) [22,10], Siofo <sup>®</sup> 1000 [23,56], Metformax <sup>®</sup> 1000 [23,63], Formetic [23,95]	ATC: A10BA02	wyk: B	EAN ~ 148839 Zentiva PL Sp. z o.o.	INN: <i>Metformin hydrochloride</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Odpowiedniki: Diabufor XR [21,05], Ranmet XR [21,05], Zenofo SR [24,04], Etfom SR [24,81], Metformax <sup>®</sup> SR 1000 [28,92], Symformin XR [29,21], Avamina SR [32,48], Glucophage <sup>®</sup> XR [37,21]	ATC: A10BA02	wyk: B	EAN ~ 145357 Zentiva PL Sp. z o.o.
Zenofo: tabl. powł. 1000 mg - 120 szt.	Rx	100% 28,53 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 6,40 S <sup>(3)</sup> bezpł.		Zerlinda: inf. [roztw.] 4 mg/100 ml - 1 wor. 100 ml	Rx-z	100% 111,41 Limit 109,12 R <sup>(1)</sup> 5,49 S <sup>(2)</sup> bezpł.	
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Odpowiedniki: Metformax <sup>®</sup> 1000 - (IR) [28,53], Zenofo [28,53], Metformax <sup>®</sup> 1000 [29,80], Formetic [30,55], Siofo <sup>®</sup> 1000 [30,60], Etfom [30,94]	ATC: A10BA02	wyk: B	EAN ~ 148841 Zentiva PL Sp. z o.o.	INN: <i>Zoledronic acid</i> (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Actavis Group PTC ehf.	ATC: M05BA08	wyk: B	EAN ~ 103163
Zenofo SR: tabl. o przedl. uwalnianiu 500 mg - 30 szt.	Rx	100% 6,57 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 5,88 S <sup>(3)</sup> bezpł.		Zetuvit Plus: opatrunek z superabsorbentem 10x10 cm - 1 szt.	WM	100% 13,92 Limit 11,85 30% <sup>(1)</sup> 5,63 B <sup>(2)</sup> 2,07	
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Odpowiedniki: Zenofo SR [6,57], Etfom SR [6,76], Metcrean XR [6,86], Siofo <sup>®</sup> XR 500 mg [7,71], Symformin XR [7,81], Avamina SR [9,31], Glucophage <sup>®</sup> XR [9,32], Metformax <sup>®</sup> SR 500 [9,48]	ATC: A10BA02	wyk: B	EAN ~ 145349 Zentiva PL Sp. z o.o.	INN: <i>Emplastry microfibricum cellulosa</i> (1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	ATC: V20AA	wyk:	EAN ~ 616713
Zenofo SR: tabl. o przedl. uwalnianiu 500 mg - 60 szt.	Rx	100% 12,29 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 7,70 S <sup>(3)</sup> bezpł.		Zetuvit Plus: opatrunek z superabsorbentem 10x20 cm - 1 szt.	WM	100% 26,48 Limit 23,70 30% <sup>(1)</sup> 9,89 B <sup>(2)</sup> 2,78	
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Odpowiedniki: Diabufor XR [10,85], Ranmet XR [10,85], Zenofo SR [12,29], Etfom SR [12,68], Metcrean XR [12,89], Symformin XR [14,89], Avamina SR [17,25], Metformax <sup>®</sup> SR 500 [18,58], Glucophage <sup>®</sup> XR [18,87]	ATC: A10BA02	wyk: B	EAN ~ 145347 Zentiva PL Sp. z o.o.	INN: <i>Emplastry microfibricum cellulosa</i> (1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	ATC: V20AA	wyk:	EAN ~ 616751
Zenofo SR: tabl. o przedl. uwalnianiu 750 mg - 30 szt.	Rx	100% 9,43 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 6,79 S <sup>(3)</sup> bezpł.		Zetuvit Plus: opatrunek z superabsorbentem 20x40 cm - 1 szt.	WM	100% 93,91 Limit 93,91 30% <sup>(1)</sup> 28,17 B <sup>(2)</sup> bezpł.	
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Odpowiedniki: Zenofo SR [9,43], Etfom SR [9,69], Siofo <sup>®</sup> XR 750 mg [10,82], Symformin XR [11,26], Metformax <sup>®</sup> SR 750 [11,46], Avamina SR [13,07], Glucophage <sup>®</sup> XR [13,67]	ATC: A10BA02	wyk: B	EAN ~ 145351 Zentiva PL Sp. z o.o.	INN: <i>Emplastry microfibricum cellulosa</i> (1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	ATC: V20AA	wyk:	EAN ~ 276106
Zenofo SR: tabl. o przedl. uwalnianiu 750 mg - 30 szt.	Rx	100% 9,43 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 6,79 S <sup>(3)</sup> bezpł.		Zetuvit Plus Silicone: opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową 10x20 cm - 1 szt.	WM	100% 25,68 Limit 25,68 30% <sup>(1)</sup> 7,70 B <sup>(2)</sup> bezpł.	
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Odpowiedniki: Zenofo SR [9,43], Etfom SR [9,69], Siofo <sup>®</sup> XR 750 mg [10,82], Symformin XR [11,26], Metformax <sup>®</sup> SR 750 [11,46], Avamina SR [13,07], Glucophage <sup>®</sup> XR [13,67]	ATC: A10BA02	wyk: B	EAN ~ 145351 Zentiva PL Sp. z o.o.	INN: <i>Emplastry microfibricum cellulosa</i> (1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	ATC: V20AA	wyk:	EAN ~ 276106
Zenofo SR: tabl. o przedl. uwalnianiu 750 mg - 30 szt.	Rx	100% 9,43 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 6,79 S <sup>(3)</sup> bezpł.		Zetuvit Plus Silicone: opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową 12,5x12,5 cm - 1 szt.	WM	100% 20,36 Limit 20,36 30% <sup>(1)</sup> 6,11 B <sup>(2)</sup> bezpł.	
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Odpowiedniki: Zenofo SR [9,43], Etfom SR [9,69], Siofo <sup>®</sup> XR 750 mg [10,82], Symformin XR [11,26], Metformax <sup>®</sup> SR 750 [11,46], Avamina SR [13,07], Glucophage <sup>®</sup> XR [13,67]	ATC: A10BA02	wyk: B	EAN ~ 145351 Zentiva PL Sp. z o.o.	INN: <i>Emplastry microfibricum cellulosa</i> (1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	ATC: V20AA	wyk:	EAN ~ 276069
Zenofo SR: tabl. o przedl. uwalnianiu 750 mg - 30 szt.	Rx	100% 9,43 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpł. R <sup>(2)</sup> 6,79 S <sup>(3)</sup> bezpł.		Zetuvit Plus Silicone: opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową 20x25 cm - 1 szt.	WM	100% 58,87 Limit 58,87 30% <sup>(1)</sup> 17,66 B <sup>(2)</sup> bezpł.	
INN: <i>Metformin hydrochloride</i> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Cukrzyca WP: Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: B Odpowiedniki: Zenofo SR [9,43], Etfom SR [9,69], Siofo <sup>®</sup> XR 750 mg [10,82], Symformin XR [11,26], Metformax <sup>®</sup> SR 750 [11,46], Avamina SR [13,07], Glucophage <sup>®</sup> XR [13,67]	ATC: A10BA02	wyk: B	EAN ~ 145351 Zentiva PL Sp. z o.o.	INN: <i>Emplastry microfibricum cellulosa</i> (1) Przewlekłe owrzodzenia(2) Epidermolysis bullosa   Kat. ciąży: N PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	ATC: V20AA	wyk:	EAN ~ 276274





Skuteczny przepływ

pentoxifylline  
**polfilin**  
 prolongatum

400 mg x 20 tabl. ♥ 400 mg x 60 tabl.

Zinnat®: granulaty do przyg. zaw. 125 mg/5 ml - 1 but. 50 ml ◆	Rx	100%	20,82
		Limit	20,65
		50% <sup>(1)</sup>	10,50
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Cefuroxime axetil* ATC: J01DC02 wyk: B EAN ~ 051335  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Zinnat®: granulaty do przyg. zaw. 250 mg/5 ml - 1 but. 50 ml ◆	Rx	100%	41,30
		Limit	41,30
		50% <sup>(1)</sup>	20,65
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Cefuroxime axetil* ATC: J01DC02 wyk: B EAN ~ 468812  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Zinnat®: tabl. powł. 125 mg - 10 szt. ◆	Rx	100%	15,01
		Limit	8,96
		50% <sup>(1)</sup>	10,53
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Cefuroxime axetil* ATC: J01DC02 wyk: B EAN ~ 083213  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Zinnat®: tabl. powł. 250 mg - 10 szt. ◆	Rx	100%	20,44
		Limit	17,93
		50% <sup>(1)</sup>	11,48
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Cefuroxime axetil* ATC: J01DC02 wyk: B EAN ~ 083312  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Zinnat®: tabl. powł. 500 mg - 10 szt. ◆	Rx	100%	37,48
		Limit	35,85
		50% <sup>(1)</sup>	19,56
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Cefuroxime axetil* ATC: J01DC02 wyk: B EAN ~ 083411  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Odpowiedniki: Cefuroxime Genoptim [33,13], Ceroxim® [33,42], Zinnat - (IR) [33,81], Zinnat - (IR) [34,01], Zinnat - (IR) [34,57], Zinnat - (IR) [34,62], Zinnat - (IR) [34,62], Zinnat - (IR) [35,20], Cefox [35,43], Zinnox® [36,66], Zinnat® [37,48], Bioracet® [42,57]

Zinnat®: tabl. powł. 500 mg - 14 szt. ◆	Rx	100%	51,10
		Limit	50,19
		50% <sup>(1)</sup>	26,01
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Cefuroxime axetil* ATC: J01DC02 wyk: B EAN ~ 083435  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Odpowiedniki: Cefuroxime Genoptim [45,01], Zinnat - (IR) [45,94], Zinnat - (IR) [46,24], Zinnox® [48,64], Ceroxim® [50,19], Cefox [50,25], Zinnat® [51,10], Bioracet® [52,69]

Zinnox®: tabl. powł. 250 mg - 10 szt. ◆	Rx	100%	19,73
		Limit	17,93
		50% <sup>(1)</sup>	10,77
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Cefuroxime axetil* ATC: J01DC02 wyk: B EAN ~ 082932  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Polfarmex S.A.

Zinnox®: tabl. powł. 500 mg - 10 szt. ◆	Rx	100%	36,66
		Limit	35,85
		50% <sup>(1)</sup>	18,74
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Cefuroxime axetil* ATC: J01DC02 wyk: B EAN ~ 082949  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Polfarmex S.A.

Odpowiedniki: Cefuroxime Genoptim [33,13], Ceroxim® [33,42], Zinnat - (IR) [33,81], Zinnat - (IR) [34,01], Zinnat - (IR) [34,57], Zinnat - (IR) [34,62], Zinnat - (IR) [34,62], Zinnat - (IR) [35,20], Cefox [35,43], Zinnox® [36,66], Zinnat® [37,48], Bioracet® [42,57]

Zinnox®: tabl. powł. 500 mg - 14 szt. ◆	Rx	100%	48,64
		Limit	48,64
		50% <sup>(1)</sup>	24,32
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Cefuroxime axetil* ATC: J01DC02 wyk: B EAN ~ 140164  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: B  
 Polfarmex S.A.

Odpowiedniki: Cefuroxime Genoptim [45,01], Zinnat - (IR) [45,94], Zinnat - (IR) [46,24], Zinnox® [48,64], Ceroxim® [50,19], Cefox [50,25], Zinnat® [51,10], Bioracet® [52,69]

Zocor® 10: tabl. powł. 10 mg - 28 szt.	Rx	100%	7,00
		Limit	2,62
		30% <sup>(1)</sup>	5,17
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Simvastatin* ATC: C10AA01 wyk: B EAN ~ 036591  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
 MSD Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Simvastatinum Accord [X], Simvastatin Bluefish [4,68], Simvachol® [5,06], Simvacard® 10 [6,25], Vastan® [6,40], Vaslip® [6,68], Simratio 10 [6,89], Zocor® 10 [7,00], Simvastero® [7,54]

Zocor® 20: tabl. powł. 20 mg - 28 szt.	Rx	100%	13,22
		Limit	5,25
		30% <sup>(1)</sup>	9,55
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Simvastatin* ATC: C10AA01 wyk: B EAN ~ 366026  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
 MSD Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Simvastatinum Accord [X], Simvastatin Aurovitas [4,26], Simvastatin Bluefish [6,72], Simvagen 20 [7,35], Simvachol® [9,23], Simvacard® 20 [11,07], Vastan® [12,49], Simratio 20 [12,77], Ximve [12,91], Vaslip® [13,21], Zocor® 20 [13,22], Simvastero® [14,29]

Zocor® 40: tabl. powł. 40 mg - 28 szt.	Rx	100%	25,52
		Limit	10,49
		30% <sup>(1)</sup>	18,18
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: *Simvastatin* ATC: C10AA01 wyk: B EAN ~ 769124  
 (1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: X  
 MSD Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Simvastatinum Accord [X], Simvastatin Aurovitas [7,63], Simvastatin Bluefish [11,70], Simvagen 40 [13,87], Simcovas [16,02], Vaslip® [21,52], Simvacard® 40 [21,74], Simratio 40 [25,30], Zocor® 40 [25,52], Simvastero® [26,55]

Zofran®: tabl. powł. 4 mg - 10 szt.	Rx	100%	32,63
		Limit	18,26
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	16,20

INN: *Ondansetron hydrochloride* ATC: A04AA01 wyk: B EAN ~ 001811  
 (1) Chemioterapia ICD10: C.0.09. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Nowotwory złośliwe (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:B, T3:B  
 Sandoz GmbH

Zofran®: tabl. powł. 8 mg - 10 szt.	Rx	100%	52,54
		Limit	36,52
		B <sup>(1)</sup>	bezpł.
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	17,06

INN: *Ondansetron hydrochloride* ATC: A04AA01 wyk: B EAN ~ 001910  
 (1) Chemioterapia ICD10: C.0.09. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia (3) Nowotwory złośliwe (4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: T1:C, T2:B, T3:B  
 Sandoz GmbH

Odpowiedniki: Atossa® [36,51], Setronon® [36,51], Zofran® [52,54]

W trosce o pacjenta z migreną!

100 mg x 6 tabl.  
50 mg x 6 tabl.Sumamigren  
Sumatriptanum

Zofran® Zydys: liof. doustny 8 mg - 10 szt.	Rx	100% 57,48 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 15,34 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: Ondansetron hydrochloride (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Nowotwory złośliwe(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: T1:C, T2:B, T3:B ATC: A04AA01 wyk: B EAN ~ 888016 Sandoz GmbH			
Zoladex®: implant podskórny 3,6 mg - 1 strzyk.-aplik.	Rx	100% 238,80 Limit 175,95 R <sup>(1)</sup> 66,05 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: Goserelin (1) Rak prostaty, Rak piersi i rak trzonu macicy WP: Obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N ATC: L02AE03 wyk: B EAN ~ 082315 AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.			
Zoladex® LA : implant podskórny 10,8 mg - 1 strzyk.-aplik.	Rx	100% 723,07 Limit 527,85 R <sup>(1)</sup> 204,18 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: Goserelin (1) Rak prostaty WP: Obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu (2) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: N ATC: L02AE03 wyk: B EAN ~ 783212 AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.			
Zolafren®: kaps. 5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100% 51,98 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 5,37 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: Olanzapine (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C ATC: N05AH03 wyk: B EAN ~ 064518 Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Olanzin [23,76], Olanzin - (IR) [38,90], Olanzapine +pharma [48,51], Zolaxa [51,14], Zolafren® [51,98], Olzapin [54,06], Zolafren® [55,78]			
Zolafren®: kaps. 7,5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100% 75,30 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 4,21 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: Olanzapine (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C ATC: N05AH03 wyk: B EAN ~ 064617 Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Olanzin [23,76], Olanzin - (IR) [38,90], Olanzapine +pharma [48,51], Zolaxa [51,14], Zolafren® [51,98], Olzapin [54,06], Zolafren® [55,78]			
Zolafren®: kaps. 10 mg - 30 szt. ◆	Rx	100% 105,97 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 9,68 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: Olanzapine (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C ATC: N05AH03 wyk: B EAN ~ 064716 Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Olanzin [23,76], Olanzin - (IR) [38,90], Olanzapine +pharma [48,51], Zolaxa [51,14], Zolafren® [51,98], Olzapin [54,06], Zolafren® [55,78]			
Zolafren®: tabl. powł. 5 mg - 30 szt. ◆	Rx	100% 55,78 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 8,79 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: Olanzapine (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C ATC: N05AH03 wyk: B EAN ~ 916917 Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Olanzin [23,76], Olanzin - (IR) [38,90], Olanzapine +pharma [48,51], Zolaxa [51,14], Zolafren® [51,98], Olzapin [54,06], Zolafren® [55,78]			
Zolafren®: tabl. powł. 5 mg - 90 szt. ◆	Rx	100% 154,28 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 10,31 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: Olanzapine (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C ATC: N05AH03 wyk: B EAN ~ 191177 Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Zolaxa [144,17], Olzapin [149,13], Zolafren® [154,28]			
Zolafren®: tabl. powł. 5 mg - 120 szt. ◆	Rx	100% 196,48 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 5,76 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: Olanzapine (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C ATC: N05AH03 wyk: B EAN ~ 000603 Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Olzapin [174,58], Zolafren® [196,48]			
Zolafren®: tabl. powł. 10 mg - 30 szt. ◆	Rx	100% 105,97 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 9,68 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: Olanzapine (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C ATC: N05AH03 wyk: B EAN ~ 917013 Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Olanzin [45,20], Olanzin - (IR) [73,12], Olanzapine +pharma [91,44], Zolaxa [97,35], Olzapin [98,42], Zolafren® [105,97], Zolafren® [105,97]			
Zolafren®: tabl. powł. 10 mg - 90 szt. ◆	Rx	100% 297,11 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 10,31 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: Olanzapine (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C ATC: N05AH03 wyk: B EAN ~ 191184 Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Zolaxa [282,67], Olzapin [286,81], Zolafren® [297,11]			
Zolafren®: tabl. powł. 10 mg - 120 szt. ◆	Rx	100% 380,01 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 11,52 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: Olanzapine (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C ATC: N05AH03 wyk: B EAN ~ 000610 Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Olzapin [336,18], Zolafren® [380,01]			
Zolafren®: tabl. powł. 15 mg - 30 szt. ◆	Rx	100% 149,82 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 6,29 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: Olanzapine (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C ATC: N05AH03 wyk: B EAN ~ 400273 Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Zolafren® [149,82], Zolaxa [150,68]			
Zolafren®: tabl. powł. 15 mg - 90 szt. ◆	Rx	100% 425,79 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 12,96 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: Olanzapine (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C ATC: N05AH03 wyk: B EAN ~ 400274 Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Zolaxa [420,64], Zolafren® [425,79]			
Zolafren®: tabl. powł. 20 mg - 30 szt. ◆	Rx	100% 196,44 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 5,76 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: Olanzapine (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C ATC: N05AH03 wyk: B EAN ~ 400275 Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Zolafren® [196,44], Zolaxa [203,08]			
Zolafren®: tabl. powł. 20 mg - 90 szt. ◆	Rx	100% 563,41 Limit 0,00 DZ <sup>(1)</sup> bezpl. R <sup>(2)</sup> 17,28 S <sup>(3)</sup> bezpl.	
INN: Olanzapine (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C ATC: N05AH03 wyk: B EAN ~ 400276 Adamed Sp. z o.o.			
Odpowiedniki: Zolaxa [560,65], Zolafren® [563,41]			



<b>Zolafren® Swift:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>5 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>52,07</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>8,41</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>52,07</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>8,41</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Zolafren® Swift:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>15 mg</b> - 112 szt. ◆	Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>526,83</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>16,13</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>526,83</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>16,13</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	<b>52,07</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	<b>8,41</b>																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	<b>526,83</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	<b>16,13</b>																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <b>Olanzapine</b>   ATC: <b>N05AH03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>775675</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Adamed Sp. z o.o. Odpowiedniki: Olanzapine Apotex [18,00], Olanzapine Bluefish [30,99], Anzolin [39,05], Zopridoxin [42,26], Olanzapina Mylan [42,83], Olazax Disperzi [44,55], Zalasta® [48,38], Zolaxa Rapid [48,40], Olanzapine Lekam [50,96], Zolafren® Swift [52,07]		INN: <b>Olanzapine</b>   ATC: <b>N05AH03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>000702</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Adamed Sp. z o.o.																					
<b>Zolafren® Swift:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>5 mg</b> - 84 szt. ◆	Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>141,20</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>7,10</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>141,20</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>7,10</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Zolafren® Swift:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>20 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>188,43</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>9,61</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>188,43</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>9,61</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	<b>141,20</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	<b>7,10</b>																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	<b>188,43</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	<b>9,61</b>																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <b>Olanzapine</b>   ATC: <b>N05AH03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>000641</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Adamed Sp. z o.o.		INN: <b>Olanzapine</b>   ATC: <b>N05AH03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>775729</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Odpowiedniki: Anzolin [135,18], Olanzapina Mylan [139,07], Zopridoxin [145,49], Olazax Disperzi [158,31], Zalasta® [173,61], Olanzapine Apotex [174,94], Olanzapine Lekam [183,96], Zolafren® Swift [188,43], Zolaxa Rapid [188,44]																					
<b>Zolafren® Swift:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>5 mg</b> - 112 szt. ◆	Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>184,21</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>5,81</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>184,21</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>5,81</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Zolafren® Swift:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>20 mg</b> - 84 szt. ◆	Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>529,66</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>16,13</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>529,66</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>16,13</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	<b>184,21</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	<b>5,81</b>																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	<b>529,66</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	<b>16,13</b>																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <b>Olanzapine</b>   ATC: <b>N05AH03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>000658</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Adamed Sp. z o.o.		INN: <b>Olanzapine</b>   ATC: <b>N05AH03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>000689</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Adamed Sp. z o.o.																					
<b>Zolafren® Swift:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>10 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>98,85</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>9,17</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>98,85</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>9,17</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Zolafren® Swift:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>20 mg</b> - 112 szt. ◆	Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>698,13</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>21,50</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>698,13</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>21,50</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	<b>98,85</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	<b>9,17</b>																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	<b>698,13</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	<b>21,50</b>																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <b>Olanzapine</b>   ATC: <b>N05AH03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>775682</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Adamed Sp. z o.o. Odpowiedniki: Olanzapine Bluefish [56,65], Anzolin [72,80], Olanzaran [79,67], Zopridoxin [79,96], Olanzapina Mylan [80,36], Olazax Disperzi [83,79], Zalasta® [91,44], Olanzapine Apotex [93,71], Zolaxa Rapid [95,65], Olanzapine Lekam [96,61], Zolafren® Swift [98,85]		INN: <b>Olanzapine</b>   ATC: <b>N05AH03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>000719</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Adamed Sp. z o.o.																					
<b>Zolafren® Swift:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>10 mg</b> - 84 szt. ◆	Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>271,30</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>8,06</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>271,30</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>8,06</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Zolaxa:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>51,14</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>4,62</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>51,14</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>4,62</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	<b>271,30</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	<b>8,06</b>																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	<b>51,14</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	<b>4,62</b>																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <b>Olanzapine</b>   ATC: <b>N05AH03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>000665</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Adamed Sp. z o.o.		INN: <b>Olanzapine</b>   ATC: <b>N05AH03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>096816</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA Odpowiedniki: Olanzin [23,76], Olanzin - (IR) [38,90], Olanzapine +pharma [48,51], Zolaxa [51,14], Zolafren® [51,98], Olzapin [54,06], Zolafren® [55,78]																					
<b>Zolafren® Swift:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>10 mg</b> - 112 szt. ◆	Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>355,54</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>10,76</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>355,54</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>10,76</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Zolaxa:</b> tabl. powł. <b>5 mg</b> - 90 szt. ◆	Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>144,17</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>4,32</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>144,17</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>4,32</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	<b>355,54</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	<b>10,76</b>																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	<b>144,17</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	<b>4,32</b>																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <b>Olanzapine</b>   ATC: <b>N05AH03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>000696</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Adamed Sp. z o.o.		INN: <b>Olanzapine</b>   ATC: <b>N05AH03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>609693</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA Odpowiedniki: Zolaxa [144,17], Olzapin [149,13], Zolafren® [154,28]																					
<b>Zolafren® Swift:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>15 mg</b> - 28 szt. ◆	Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>143,66</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>9,32</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>143,66</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>9,32</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Zolaxa:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 30 szt. ◆	Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>97,35</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>2,88</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>97,35</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>2,88</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	<b>143,66</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	<b>9,32</b>																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	<b>97,35</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	<b>2,88</b>																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <b>Olanzapine</b>   ATC: <b>N05AH03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>775712</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Adamed Sp. z o.o. Odpowiedniki: Olanzapine Bluefish [80,37], Anzolin [104,01], Olanzapina Mylan [106,65], Olazax Disperzi [121,07], Zopridoxin [125,21], Zalasta® [132,56], Olanzapine Lekam [140,30], Zolaxa Rapid [142,22], Zolafren® Swift [143,66]		INN: <b>Olanzapine</b>   ATC: <b>N05AH03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>097011</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA Odpowiedniki: Olanzin [45,20], Olanzin - (IR) [73,12], Olanzapine +pharma [91,44], Zolaxa [97,35], Olzapin [98,42], Zolafren® [105,97], Zolafren® [105,97]																					
<b>Zolafren® Swift:</b> tabl. uleg. rozp. w j. ustnej <b>15 mg</b> - 84 szt. ◆	Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>400,49</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>12,10</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>400,49</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>12,10</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Zolaxa:</b> tabl. powł. <b>10 mg</b> - 90 szt. ◆	Rx <table border="1"> <tr><td>100%</td><td><b>282,67</b></td></tr> <tr><td>Limit</td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td><b>8,64</b></td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	<b>282,67</b>	Limit	<b>0,00</b>	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	<b>8,64</b>	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	<b>400,49</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	<b>12,10</b>																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	<b>282,67</b>																						
Limit	<b>0,00</b>																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	<b>8,64</b>																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <b>Olanzapine</b>   ATC: <b>N05AH03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>000672</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Adamed Sp. z o.o.		INN: <b>Olanzapine</b>   ATC: <b>N05AH03</b>   wyk: <b>B</b>   EAN ~ <b>609709</b> (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: <b>C</b> Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA Odpowiedniki: Zolaxa [282,67], Olzapin [286,81], Zolafren® [297,11]																					

<b>Zolaxa: tabl. powł. 15 mg - 30 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>150,68</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>7,07</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	150,68	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	7,07	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Zolaxa Rapid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>142,22</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>8,02</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	142,22	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	8,02	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	150,68																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	7,07																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	142,22																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	8,02																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 849581 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA		INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 892150 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA																					
Odpowiedniki: Zolafren® [149,82], Zolaxa [150,68]																							
<b>Zolaxa: tabl. powł. 15 mg - 90 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>420,64</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>12,96</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	420,64	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	12,96	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Zolaxa Rapid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 56 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>274,32</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>8,06</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	274,32	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	8,06	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	420,64																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	12,96																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	274,32																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	8,06																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 609716 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA		INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 892174 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA																					
Odpowiedniki: Zolaxa [420,64], Zolafren® [425,79]																							
<b>Zolaxa: tabl. powł. 20 mg - 30 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>203,08</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>11,38</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	203,08	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	11,38	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Zolaxa Rapid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>188,44</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>9,62</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	188,44	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	9,62	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	203,08																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	11,38																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	188,44																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	9,62																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 849635 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA		INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 892303 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA																					
Odpowiedniki: Zolafren® [196,44], Zolaxa [203,08]																							
<b>Zolaxa: tabl. powł. 20 mg - 90 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>560,65</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>17,28</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	560,65	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	17,28	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Zolaxa Rapid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg - 56 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>364,00</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>10,76</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	364,00	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	10,76	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	560,65																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	17,28																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	364,00																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	10,76																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 609723 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA		INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 892341 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA																					
Odpowiedniki: Zolaxa [560,65], Zolafren® [563,41]																							
<b>Zolaxa Rapid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>48,40</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>5,10</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	48,40	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	5,10	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Zoledronic Acid Noridem: inf. [konc. do przyg. roztw.] 4 mg/5 ml - 1 fiol. 5 ml ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>91,58</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>91,58</td></tr> <tr><td>B<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	91,58	Limit	91,58	B <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	48,40																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	5,10																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	91,58																						
Limit	91,58																						
B <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	3,20																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 892082 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA		INN: <i>Zoledronic acid</i>   ATC: M05BA08   wyk:   EAN ~ 300338 (1) Chemioterapia ICD10: C.68.; C.68.b.(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D NORIDEM ENTERPRISES LTD EVAGOROU & MAKARIOU																					
Odpowiedniki: Olanzapine Apotex [18,00], Olanzapine Bluefish [30,99], Anzolin [39,05], Zopridoxin [42,26], Olanzapina Mylan [42,83], Olazax Disperzi [44,55], Zalasta® [48,38], Zolaxa Rapid [48,40], Olanzapine Lekam [50,96], Zolafren® Swift [52,07]																							
<b>Zolaxa Rapid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 56 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>94,69</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>5,43</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	94,69	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	5,43	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Zoloff®: tabl. powł. 50 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>17,83</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>13,17</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>8,61</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	17,83	Limit	13,17	30% <sup>(1)</sup>	8,61	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	94,69																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	5,43																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	17,83																						
Limit	13,17																						
30% <sup>(1)</sup>	8,61																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 892105 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA		INN: <i>Sertraline</i>   ATC: N06AB06   wyk: B   EAN ~ 753116 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Upjohn EESV																					
Odpowiedniki: Sastium [11,26], Sertagen [12,02], Asentra® [14,50], Zoloff® [17,83], Zotal® [19,88]																							
<b>Zolaxa Rapid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>95,65</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>6,29</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	95,65	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	6,29	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Zoloff®: tabl. powł. 100 mg - 28 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>32,02</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>26,34</td></tr> <tr><td>30%<sup>(1)</sup></td><td>13,58</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(2)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	32,02	Limit	26,34	30% <sup>(1)</sup>	13,58	DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	95,65																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	6,29																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	32,02																						
Limit	26,34																						
30% <sup>(1)</sup>	13,58																						
DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 892129 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA		INN: <i>Sertraline</i>   ATC: N06AB06   wyk: B   EAN ~ 753215 (1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Upjohn EESV																					
Odpowiedniki: Olanzapine Bluefish [56,65], Anzolin [72,80], Olanzaran [79,67], Zopridoxin [79,96], Olanzapina Mylan [80,36], Olazax Disperzi [83,79], Zalasta® [91,44], Olanzapine Apotex [93,71], Zolaxa Rapid [95,65], Olanzapine Lekam [96,61], Zolafren® Swift [98,85]																							
<b>Zolaxa Rapid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 56 szt. ◆</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>183,96</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>DZ<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>5,59</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	183,96	Limit	0,00	DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	5,59	S <sup>(3)</sup>	bezpł.	<b>Zomikos: inf. [konc. do przyg. roztw.] 4 mg/5 ml - 1 fiol. 5 ml</b>	<table border="1"> <tr><td>100%</td><td>95,02</td></tr> <tr><td>Limit</td><td>91,58</td></tr> <tr><td>B<sup>(1)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> <tr><td>R<sup>(2)</sup></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>S<sup>(3)</sup></td><td>bezpł.</td></tr> </table>	100%	95,02	Limit	91,58	B <sup>(1)</sup>	bezpł.	R <sup>(2)</sup>	3,20	S <sup>(3)</sup>	bezpł.
100%	183,96																						
Limit	0,00																						
DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	5,59																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
100%	95,02																						
Limit	91,58																						
B <sup>(1)</sup>	bezpł.																						
R <sup>(2)</sup>	3,20																						
S <sup>(3)</sup>	bezpł.																						
INN: <i>Olanzapine</i>   ATC: N05AH03   wyk: B   EAN ~ 892143 (1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: C Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA		INN: <i>Zoledronic acid</i>   ATC: M05BA08   wyk: B   EAN ~ 094899 (1) Chemioterapia ICD10: C.68.; C.68.b.(2) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach(3) Pacjenci 65+   Kat. ciąży: D Vipharm SA																					
Odpowiedniki: Zoledronic Acid Noridem [91,58], Zomikos [95,02]																							



Naszym wyborem **enarenal**  
enalapryli maleas

Zopridoxin: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	42,26
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Olanzapine** ATC: **N05AH03** wyk: **B** EAN ~ **914630**  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Bausch Health  
Odpowiedniki: Olanzapine Apotex [18,00], Olanzapine Bluefish [30,99], Anzolin [39,05], Zopridoxin [42,26], Olanzapina Mylan [42,83], Olazax Disperzi [44,55], Zalasta® [48,38], Zolaxa Rapid [48,40], Olanzapine Lekam [50,96], Zolafren® Swift [52,07]

Zopridoxin: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	79,96
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	3,20
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Olanzapine** ATC: **N05AH03** wyk: **B** EAN ~ **914647**  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa WP: Choroba Huntingtona(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Bausch Health  
Odpowiedniki: Olanzapine Bluefish [56,65], Anzolin [72,80], Olanzaran [79,67], Zopridoxin [79,96], Olanzapina Mylan [80,36], Olazax Disperzi [83,79], Zalasta® [91,44], Olanzapine Apotex [93,71], Zolaxa Rapid [95,65], Olanzapine Lekam [96,61], Zolafren® Swift [98,85]

Zopridoxin: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	145,49
		Limit	0,00
		DZ <sup>(1)</sup>	bezpł.
		R <sup>(2)</sup>	5,97
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Olanzapine** ATC: **N05AH03** wyk: **B** EAN ~ **914661**  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Bausch Health  
Odpowiedniki: Anzolin [135,18], Olanzapina Mylan [139,07], Zopridoxin [145,49], Olazax Disperzi [158,31], Zalasta® [173,61], Olanzapine Apotex [174,94], Olanzapine Lekam [183,96], Zolafren® Swift [188,43], Zolaxa Rapid [188,44]

Zotral®: tabl. powł. 50 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	19,88
		Limit	13,17
		30% <sup>(1)</sup>	10,66
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Sertraline** ATC: **N06AB06** wyk: **B** EAN ~ **013982**  
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA  
Odpowiedniki: Sastium [11,26], Sertagen [12,02], Asentra® [14,50], Zoloff® [17,83], Zotral® [19,88]

Zotral®: tabl. powł. 100 mg - 28 szt. ◆	Rx	100%	36,12
		Limit	26,34
		30% <sup>(1)</sup>	17,68
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Sertraline** ATC: **N06AB06** wyk: **B** EAN ~ **569472**  
(1) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA  
Odpowiedniki: Asentra® - (IR) [20,64], Sastium [20,90], Sertagen [22,53], Asentra® [27,61], Zoloff® [32,02], Zotral® [36,12]

Zoxon® 1: tabl. 1 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	12,77
		Limit	4,80
		30% <sup>(1)</sup>	9,41
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	11,17
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: **Doxazosin** ATC: **C02CA04, G04CA** wyk: **B** EAN ~ **903320**  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż.; nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Przerost gruczołu krokowego(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Zentiva PL Sp. z o.o.  
Odpowiedniki: Doxiorion [7,14], Apo-Doxan 1 [12,75], Zoxon® 1 [12,77], Doxar [13,04], Doxanorm® [13,97]

Zoxon® 2: tabl. 2 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	17,61
		Limit	9,61
		30% <sup>(1)</sup>	10,88
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	11,20
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: **Doxazosin** ATC: **C02CA04, G04CA** wyk: **B** EAN ~ **903429**  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż.; nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Przerost gruczołu krokowego(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Zentiva PL Sp. z o.o.  
Odpowiedniki: Doxiorion [X], Doxazosin Aurovitas [8,33], Adadox [9,01], Kamiren® [17,45], Doxonex® [17,60], Zoxon® 2 [17,61], Apo-Doxan 2 [17,73], Doxanorm® [18,45], Doxar [18,90]

Zoxon® 4: tabl. 4 mg - 30 szt. ◆	Rx	100%	23,97
		Limit	19,21
		30% <sup>(1)</sup>	10,52
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	7,96
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: **Doxazosin** ATC: **C02CA04, G04CA** wyk: **B** EAN ~ **903511**  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Przerost gruczołu krokowego(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Zentiva PL Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Doxiorion [X], Doxazosin Aurovitas [15,40], Adadox [16,82], Doxar [23,53], Dozox [23,96], Zoxon® 4 [23,97], Doxanorm® [24,61], Kamiren® [24,73], Apo-Doxan 4 [26,90], Doxonex® [27,12]

Zoxon® 4: tabl. 4 mg - 90 szt. ◆	Rx	100%	68,02
		Limit	57,63
		30% <sup>(1)</sup>	27,68
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		R <sup>(3)</sup>	19,99
S <sup>(4)</sup>	bezpł.		

INN: **Doxazosin** ATC: **C02CA04, G04CA** wyk: **B** EAN ~ **080267**  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Przerost gruczołu krokowego(4) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Zentiva PL Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Adadox [45,36], Dozox [66,76], Zoxon® 4 [68,02]

Zyllt - (IR): tabl. powł. 75 mg - 28 szt.	Rx	100%	21,32
		Limit	21,32
		30% <sup>(1)</sup>	6,40
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Clopidogrel** ATC: **B01AC04** wyk: **B** EAN ~ **600475**  
(1) Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania, Miazdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Clopidogrel Teva [X], Trombex [X], Clopidogrel Genoptim [14,40], Zyllt - (IR) [21,32], Zyllt® - (IR) [21,35], Clopidogrel Bluefish [21,75], Agrexex - (IR) [21,80], Agrexex - (IR) [22,36], Agrexex - (IR) [22,38], Grepid [22,95], Pegorel [22,95], Clopidogrel KRKA [23,52], Zyllt® [23,52], Clopidogrel Apotex [25,70], Clopidogrel Aurovitas [25,76], Agrexex [25,80], Clopidix [26,33], Plavocorin® [27,08], Areplex® [34,83]

Zyllt®: tabl. powł. 75 mg - 28 szt.	Rx	100%	23,52
		Limit	23,52
		30% <sup>(1)</sup>	7,06
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Clopidogrel** ATC: **B01AC04** wyk: **B** EAN ~ **109219**  
(1) Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania, Miazdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
Krka Polska Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Clopidogrel Teva [X], Trombex [X], Clopidogrel Genoptim [14,40], Zyllt - (IR) [21,32], Zyllt® - (IR) [21,35], Clopidogrel Bluefish [21,75], Agrexex - (IR) [21,80], Agrexex - (IR) [22,36], Agrexex - (IR) [22,38], Grepid [22,95], Pegorel [22,95], Clopidogrel KRKA [23,52], Zyllt® [23,52], Clopidogrel Apotex [25,70], Clopidogrel Aurovitas [25,76], Agrexex [25,80], Clopidix [26,33], Plavocorin® [27,08], Areplex® [34,83]

Zyllt® - (IR): tabl. powł. 75 mg - 28 szt.	Rx	100%	21,35
		Limit	21,35
		30% <sup>(1)</sup>	6,41
		DZ <sup>(2)</sup>	bezpł.
		S <sup>(3)</sup>	bezpł.

INN: **Clopidogrel** ATC: **B01AC04** wyk: **B** EAN ~ **274338**  
(1) Miazdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania (2) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
Inpharm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Clopidogrel Teva [X], Trombex [X], Clopidogrel Genoptim [14,40], Zyllt - (IR) [21,32], Zyllt® - (IR) [21,35], Clopidogrel Bluefish [21,75], Agrexex - (IR) [21,80], Agrexex - (IR) [22,36], Agrexex - (IR) [22,38], Grepid [22,95], Pegorel [22,95], Clopidogrel KRKA [23,52], Zyllt® [23,52], Clopidogrel Apotex [25,70], Clopidogrel Aurovitas [25,76], Agrexex [25,80], Clopidix [26,33], Plavocorin® [27,08], Areplex® [34,83]

ZypAdhera: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.] 210 mg - 1 fiol. prosz. 0,21 g+ fiol. rozp. 3 ml ◆	Rx	100%	608,25
		Limit	607,13
		R <sup>(1)</sup>	4,32

INN: **Olanzapine** ATC: **N05AH03** wyk: **B** EAN ~ **686803**  
(1) Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego | Kat. ciąży: **C**  
Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

ZypAdhera: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.] 300 mg - 1 fiol. prosz. 0,3 g+ fiol. rozp. 3 ml ◆	Rx	100%	867,33
		Limit	867,33
		R <sup>(1)</sup>	3,20

INN: **Olanzapine** ATC: **N05AH03** wyk: **B** EAN ~ **686827**  
(1) Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego | Kat. ciąży: **C**  
Eli Lilly Polska Sp. z o.o.





**ZypAdhera:** inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.] **405 mg**  
- 1 fiol. prosz. 0,405 g+ fiol. rozp. 3 ml ◆

INN: **Olanzapine** | ATC: **N05AH03** | wyk: **B** | EAN ~ **686834**  
(1) Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego | Kat. ciąży: **C**  
Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

**Zypsila:** kaps. twarde **80 mg** - 56 szt. ◆

100%	<b>214,09</b>
Limit	<b>0,00</b>
DZ <sup>(1)</sup>	<b>bezpł.</b>
R <sup>(2)</sup>	<b>5,97</b>
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Ziprasidone** | ATC: **N05AE04** | wyk: **B** | EAN ~ **681228**  
(1) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(2) Schizofrenia WP: Zespół Tourette'a(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **C**  
Krka Polska Sp. z o.o.

**Zyrtec®:** krople doustne [roztw.] **10 mg/ml** - 1 but. 20 ml

100%	<b>18,63</b>
Limit	<b>18,63</b>
30% <sup>(1)</sup>	<b>5,59</b>
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Cetirizine dihydrochloride** | ATC: **R06AE07** | wyk: **B** | EAN ~ **184736**  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke-go - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
VEDIM Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Zyrtec® - (IR) [17,93], Zyrtec® - (IR) [18,60], Zyrtec® [18,63]

**Zyrtec®:** roztw. doust. **1 mg/ml** - 1 but. 75 ml

100%	<b>11,34</b>
Limit	<b>8,54</b>
30% <sup>(1)</sup>	<b>5,36</b>
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Cetirizine dihydrochloride** | ATC: **R06AE07** | wyk: **B** | EAN ~ **781515**  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke-go - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
VEDIM Sp. z o.o.

**Zyrtec®:** tabl. powł. **10 mg** - 30 szt.

100%	<b>16,62</b>
Limit	<b>13,46</b>
30% <sup>(1)</sup>	<b>7,20</b>
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Cetirizine dihydrochloride** | ATC: **R06AE07** | wyk: **B** | EAN ~ **184637**  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke-go - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
VEDIM Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Amertil® [14,54], Allertec® [15,35], Alermed® [15,36], Zyrtec® [16,62]

**Zyrtec® - (IR):** krople doustne [roztw.] **10 mg/ml** - 1 but. 20 ml

100%	<b>17,93</b>
Limit	<b>17,93</b>
30% <sup>(1)</sup>	<b>5,38</b>
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Cetirizine dihydrochloride** | ATC: **R06AE07** | wyk: **B** | EAN ~ **138667**  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke-go - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
Inpharm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Zyrtec® - (IR) [17,93], Zyrtec® - (IR) [18,60], Zyrtec® [18,63]

**Zyrtec® - (IR):** krople doustne [roztw.] **10 mg/ml** - 1 but. 20 ml

100%	<b>18,60</b>
Limit	<b>18,60</b>
30% <sup>(1)</sup>	<b>5,58</b>
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Cetirizine dihydrochloride** | ATC: **R06AE07** | wyk: **B** | EAN ~ **145702**  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke-go - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
Delfarma Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Zyrtec® - (IR) [17,93], Zyrtec® - (IR) [18,60], Zyrtec® [18,63]

**Zyx®:** tabl. powł. **5 mg** - 28 szt.

100%	<b>19,10</b>
Limit	<b>12,56</b>
30% <sup>(1)</sup>	<b>10,31</b>
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Levocetirizine dihydrochloride** | ATC: **R06AE09** | wyk: **B** | EAN ~ **765034**  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke-go - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
Biofarm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Lirra [14,06], Nossin [14,09], Zenaro [15,56], Cezera [18,58], Zyx® [19,10], Conhast [19,45], Xyzal® [31,87]

**Zyx®:** tabl. powł. **5 mg** - 56 szt.

100%	<b>34,18</b>
Limit	<b>25,12</b>
30% <sup>(1)</sup>	<b>16,60</b>
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Levocetirizine dihydrochloride** | ATC: **R06AE09** | wyk: **B** | EAN ~ **215014**  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke-go - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
Biofarm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Lirra [26,86], Conhast [27,38], Zyx® [34,18]

**Zyx®:** tabl. powł. **5 mg** - 84 szt.

100%	<b>39,42</b>
Limit	<b>37,67</b>
30% <sup>(1)</sup>	<b>13,05</b>
DZ <sup>(2)</sup>	<b>bezpł.</b>
S <sup>(3)</sup>	<b>bezpł.</b>

INN: **Levocetirizine dihydrochloride** | ATC: **R06AE09** | wyk: **B** | EAN ~ **215267**  
(1) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke-go - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia(2) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia(3) Pacjenci 65+ | Kat. ciąży: **B**  
Biofarm Sp. z o.o.

Odpowiedniki: Lirra [38,68], Zyx® [39,42], Conhast [39,53]

**ADRENALINA WZF** 300 mikrogramów/0,3 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (Adrenalinum). **Skład jakościowy i ilościowy:** 1 ml roztworu zawiera 1 mg adrenaliny w postaci adrenaliny winianu. Jedna dawka 0,3 ml zawiera 300 mikrogramów adrenaliny. **Wskazania do stosowania:** Leczenie doraźne w nagłych przypadkach ostrych reakcji alergicznych (anafilaksji), wywołanych przez pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów oraz inne alergeny, jak również w przypadku anafilaksji samoistnej. **Dawkowanie i sposób podawania:** Preparat należy wstrzykiwać wyłącznie domięśniowo. Ampułko-strzykawka ma blokadę umożliwiającą podanie jednorazowej dawki 300 mikrogramów adrenaliny. Ze względu na stabilność produktu ampułko-strzykawka zawiera 1 ml roztworu. Po podaniu dawki leku w ampułko-strzykawce pozostaje 0,7 ml roztworu, ale ampułko-strzykawka nie nadaje się do ponownego użytku i należy ją w bezpieczny sposób usunąć. Preparat należy podawać natychmiast po wystąpieniu objawów ciężkiej reakcji alergicznej (w tym wstrząsu anafilaktycznego). Mogą one wystąpić w ciągu kilku minut od zetknięcia się z alergenem i zazwyczaj są to: pokrzywka, zaczerwienienie lub obrzęk naczyńioruchowy. Objawy o ciężkim przebiegu obejmują układ oddechowy i krążenia. Preparat należy wstrzykiwać tylko w mięsień w przednio-bocznej części uda, nie wstrzykiwać w mięsień pośladka. Miejsce, w które wstrzyknięto preparat należy lekko masować przez 10 sekund po wykonaniu iniekcji. Zazwyczaj stosuje się od 0,005 mg/kg mc. do 0,01 mg/kg mc., jednak w niektórych przypadkach może być konieczne zastosowanie większej dawki. *Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 30 kg:* zazwyczaj stosuje się 300 mikrogramów (0,3 ml). U dorosłych o większej niż przeciętnej masie ciała może być konieczne powtórne wstrzyknięcie, aby odwrócić skutki reakcji alergicznej. W niektórych przypadkach pojedyncza dawka adrenaliny może być niewystarczająca do całkowitego odwrócenia skutków ostrej reakcji alergicznej. U tych pacjentów wstrzyknięcie dodatkowej dawki (z innej ampułko-strzykawki) może być wykonane po 10-15 minutach. Dzieciom o masie ciała poniżej 30 kg nie można podać dawki mniejszej niż 300 mikrogramów z odpowiednią dokładnością ze względu na konstrukcję ampułko-strzykawki. Dlatego też mniejsze dawki mogą być stosowane wyłącznie w sytuacjach zagrażających życiu i pod kontrolą lekarza. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na adrenalinę lub którykolwiek ze składników preparatu. **UWAGA:** w stanach zagrożenia życia nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do zastosowania adrenaliny. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Pacjentów, którym przepisano preparat należy poinformować o sposobie podawania oraz pouczyć, w jakich sytuacjach preparat należy stosować. Preparat jest przeznaczony do stosowania w sytuacjach zagrożenia życia, wynikającego z wystąpienia ciężkiej reakcji alergicznej. Pacjenci z ryzykiem wystąpienia ciężkiej reakcji alergicznej, w tym wstrząsu anafilaktycznego powinni nosić przy sobie preparat (w obowiązującym terminie ważności dopuszcza się przechowywanie produktu leczniczego przez okres 6 miesięcy w temperaturze poniżej 25°C). Po zastosowaniu preparatu pacjent powinien natychmiast uzyskać pomoc lekarską. Należy zachować ostrożność u osób z chorobą serca, np. chorobą wieńcową oraz chorobami mięśnia sercowego (lek może wywołać napad dławicy piersiowej), sercem płucnym, zaburzeniami rytmu serca lub tachykardią. U pacjentów z nadczynnością tarczycy, schorzeniami sercowo-naczyniowymi (ciężka dławica piersiowa, kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu z lewej komory i komorowe zaburzenia rytmu lub nadciśnienie tętnicze), guzem chromochłonnym, wysokim ciśnieniem śródgałkowym, ciężką niewydolnością nerek, gruczolakami gruczołu krokowego prowadzącym do zalegania moczu, hiperkalcemią, hipokaliemią, cukrzycą, a także u pacjentów w podeszłym wieku oraz u kobiet w ciąży istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych po podaniu adrenaliny. Dzieciom o masie ciała poniżej 30 kg nie można podać dawki mniejszej niż 300 mikrogramów adrenaliny z odpowiednią dokładnością ze względu na konstrukcję ampułko-strzykawki. Dlatego też mniejsze dawki mogą być stosowane wyłącznie w sytuacjach zagrażających życiu i pod kontrolą lekarza. Preparat zawiera pirosiarczyn sodu, który może wywołać reakcje alergiczne, w tym również objawy anafilaktyczne i skurcz oskrzeli u osób z nadwrażliwością, szczególnie u osób z astmą w wywiadzie. Pacjentów z tymi schorzeniami należy dokładnie poinformować o okolicznościach, w których mogą stosować preparat. W przypadku wykonywania wstrzykiwań w to samo miejsce może wystąpić martwica, spowodowana zwężeniem naczyń krwionośnych. Przypadkowe wstrzyknięcie do naczyńia może spowodować krwotok mózgowy, spowodowany nagłym wzrostem ciśnienia tętniczego krwi. Przypadkowe wstrzyknięcie w rękę lub stopy może wywołać nagłe zmniejszenie przepływu krwi do przylegających tkanek w wyniku zwężenia naczyń. **Działania niepożądane:** Wystąpienie działań niepożądanych zależy od wrażliwości pacjenta na adrenalinę oraz od podanej dawki. Działania niepożądane występujące często, nawet po podaniu małych dawek adrenaliny to: kołatanie serca, tachykardia, nadmierna potliwość, nudności, wymioty, trudności w oddychaniu, błądność, zawroty głowy, osłabienie, drżenie, ból głowy, stan lęgowy, stan lękowy, pobudliwość nerwowa, niepokój, zimne kończyny. Rzadko odnotowywano omamy, omdlenia, hiperglukemię, hipokaliemię, kwasicę metaboliczną, rozszerzenie źrenic, trudności w oddawaniu moczu z zatrzymaniem moczu wyłącznie, drżenie mięśni. Działania niepożądane, które występowały po zastosowaniu większych dawek adrenaliny lub u osób wrażliwych: zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków lub zatrzymanie czynności serca), nagły wzrost ciśnienia tętniczego (czasami prowadzący do krwotoku mózgowego) oraz skurcz naczyń (np. skóry, błon śluzowych, nerek). Preparat zawiera pirosiarczyn sodu, który może powodować reakcje alergiczne, w tym reakcje anafilaktyczne lub reakcje zagrażające życiu lub mniej ciężkie napady astmy u osób wrażliwych. **Podmiot odpowiedzialny:** Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa. www.polfawarszawa.pl. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 10697 wydane przez MZ. Lek wydawany na podstawie recepty. ChPL z dnia 2008.12.16

**Enarenal (Enalapryli maleas).** **Skład i postać:** Tabletki, 1 tabletkę zawiera odpowiednio 5 mg, 10 mg lub 20 mg enalaprylu maleinianu. **Wskazania:** Leczenie nadciśnienia tętniczego. Leczenie objawowej niewydolności serca. Zapobieganie objawowej niewydolności serca u pacjentów z bezobjawowym zaburzeniem czynności (dysfunkcją) lewej komory serca (frakcja wyrzutowa  $\leq 35\%$ ). **Dawkowanie i sposób podawania:** Pokarm nie wpływa na wchłanianie enalaprylu. Dawkę produktu leczniczego należy dostosować indywidualnie do potrzeb pacjenta oraz zależnie od uzyskanych wartości ciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze: W zależności od stopnia nadciśnienia tętniczego oraz stanu pacjenta (patrz poniżej) dawka początkowa produktu leczniczego wynosi od 5 do maksymalnie 20 mg. Produkt podaje się raz na dobę. W nadciśnieniu tętniczym łagodnym, zalecana dawka początkowa wynosi od 5 do 10 mg. U pacjentów ze zwiększoną aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron (np. pacjenci z nadciśnieniem tętniczym naczyniowo-nerkowym, niedoborem soli i (lub) płynów, niewyrównaną niewydolnością serca lub ciężkim nadciśnieniem tętniczym) może wystąpić nasilone obniżenie ciśnienia tętniczego po podaniu dawki początkowej. U tych pacjentów zaleca się zastosowanie dawki początkowej 5 mg lub mniejszej, a leczenie należy rozpocząć pod nadzorem lekarza. Wcześniejsze stosowanie dużych dawek leków moczopędnych może powodować niedobór płynów i ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego na początku leczenia enalaprylem. U tych pacjentów zaleca się dawkę początkową 5 mg lub mniejszą. Jeżeli jest to możliwe należy przerwać stosowanie leku moczopędnego 2 - 3 dni przed rozpoczęciem leczenia produktem Enarenal. Należy kontrolować czynność nerek i stężenie potasu w surowicy. Zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca wynosi 20 mg na dobę. Maksymalna dawka podtrzymująca wynosi 40 mg na dobę. Niewydolność serca / bezobjawowe zaburzenie czynności (dysfunkcja) lewej komory serca: W leczeniu objawowej niewydolności serca, Enarenal stosuje się w skojarzeniu z lekami moczopędnymi oraz, w razie potrzeby, z glikozydami naparstnicy lub  $\beta$ -adrenolitykami. Dawka początkowa produktu Enarenal u pacjentów z objawową niewydolnością serca lub bezobjawowymi zaburzeniami czynności lewej komory serca wynosi 2,5 mg; należy ją podawać pod ścisłym nadzorem lekarza w celu ustalenia wpływu na ciśnienie tętnicze na początku leczenia. Jeśli po rozpoczęciu leczenia niewydolności serca produktem Enarenal nie występuje objawowe niedociśnienie lub gdy zostało ono wyrównane, dawkę enalaprylu należy zwiększać stopniowo do zazwyczaj stosowanej dawki podtrzymującej 20 mg, podawanej w dawce pojedynczej lub w dwóch dawkach podzielonych, w zależności od tolerancji produktu przez pacjenta. Zaleca

się, aby dostosowywanie dawki odbywało się w okresie 2 do 4 tygodni. Maksymalna dawka wynosi 40 mg na dobę, podawana w dwóch dawkach podzielonych. Tydzień 1: **1 – 3 dzień:** 2,5 mg/dobę (Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub przyjmujących leki moczopędne) w dawce pojedynczej; **4 – 7 dzień:** 5 mg/dobę w dwóch dawkach podzielonych. Tydzień 2: 10 mg/dobę w dawce pojedynczej lub w dwóch dawkach podzielonych. Tydzień 3 i 4: 20 mg/dobę w dawce pojedynczej lub w dwóch dawkach podzielonych. Ponieważ opisywano występowanie niedociśnienia oraz (rzadziej) niewydolności nerek w jego następstwie, przed rozpoczęciem jak i w trakcie leczenia produktem Enarenal, należy monitorować ciśnienie tętnicze oraz czynność nerek. O ile to możliwe, przed rozpoczęciem leczenia produktem Enarenal należy zmniejszyć dawkę stosowanych leków moczopędnych. Wystąpienie niedociśnienia po podaniu pierwszej dawki produktu Enarenal nie przesądza, że wystąpi ono ponownie podczas przewlekłego stosowania i nie wyklucza dalszego stosowania produktu. W tym przypadku również należy kontrolować stężenie potasu w surowicy oraz czynność nerek. Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek: Zazwyczaj należy wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami i (lub) zmniejszyć dawkę. Klirens kreatyniny (KK) ml/min:  $30 < KK < 80$  ml/min – dawka początkowa: 5- 10 mg/ dobę;  $10 < KK \leq 30$  ml/min – 2,5 mg/ dobę;  $KK \leq 10$  ml/min – 2,5 mg/ dobę w dniach dializy. Enalaprylat jest usuwany podczas dializy. Dawkę produktu w dniach pomiędzy zabiegami dializy należy dostosować do wartości ciśnienia tętniczego. Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku: Dawkę należy dostosować w zależności od stopnia wydolności nerek pacjenta. Dzieci i młodzież: Doświadczenie z badań klinicznych dotyczących stosowania enalaprylu u dzieci z nadciśnieniem tętniczym jest ograniczone. W przypadku dzieci, które mogą połykać tabletki, dawkę należy określić indywidualnie w zależności od stanu pacjenta oraz uzyskanych wartości ciśnienia tętniczego. Zalecana dawka początkowa u dzieci o masie ciała od 20 kg do  $< 50$  kg wynosi 2,5 mg, a u pacjentów z masą ciała  $\geq 50$  kg – 5 mg. Enarenal stosuje się raz na dobę. W zależności od potrzeb można zwiększyć stosowaną dawkę maksymalnie do 20 mg na dobę u pacjentów o masie ciała od 20 kg do  $< 50$  kg oraz 40 mg u pacjentów o masie ciała  $\geq 50$  kg. Ze względu na brak odpowiednich danych nie zaleca się podawania enalaprylu noworodkom oraz dzieciom i młodzieży z współczynnikami przesączania kłębuszkowego (GFR)  $< 30$  ml/min/1,73 m<sup>2</sup>. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na enalapryl, na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na inny inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE). Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, związany z wcześniejszym leczeniem inhibitorem ACE. Dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy. Drugi i trzeci trymestr ciąży. **Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności:** Niedociśnienie tętnicze objawowe: U pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym objawowe niedociśnienie występuje rzadko. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, otrzymujących produkt leczniczy Enarenal, ryzyko wystąpienia niedociśnienia objawowego jest większe w przypadku niedoboru płynów, np. na skutek stosowania leków moczopędnych, diety z ograniczeniem soli, dializoterapii, występowania biegunki lub wymiotów. Objawowe niedociśnienie obserwowano również u pacjentów z niewydolnością serca, z lub bez współistniejącej niewydolności nerek. Jego wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne u pacjentów z bardziej nasiloną niewydolnością serca, stosujących duże dawki diuretyków pętlowych, w przypadku hiponatremii lub zaburzeń czynności nerek. U tych pacjentów leczenie należy rozpocząć pod nadzorem oraz zapewnić ścisłą kontrolę podczas każdej zmiany dawki enalaprylu i (lub) leku moczopędnego. Jeżeli to możliwe zaleca się tymczasowe przerwanie stosowania leku moczopędnego. Powyższe uwagi dotyczą również pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub chorobami naczyń mózgowych, u których nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego może spowodować wystąpienie zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu. W przypadku wystąpienia niedociśnienia, należy ułożyć pacjenta w pozycji poziomej z uniesionymi nogami i w razie konieczności podać dożylnie sól fizjologiczną. Przemijające niedociśnienie nie jest przeciwwskazaniem do podawania kolejnych dawek produktu po uzyskaniu normalizacji ciśnienia tętniczego poprzez zwiększenie objętości płynów. U niektórych pacjentów z niewydolnością serca i prawidłowym lub niskim ciśnieniem tętniczym, Enarenal może nadmiernie obniżyć ciśnienie tętnicze. Działanie to można przewidzieć i zazwyczaj nie stanowi przeciwwskazania do kontynuowania leczenia. Jeżeli wystąpią objawy niedociśnienia tętniczego, może być konieczne zmniejszenie dawki lub odstawienie leku moczopędnego i (lub) produktu Enarenal. Zwężenie zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej / kardiomiopatia przerostowa: Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia krwionośne, należy zachować ostrożność podczas stosowania enalaprylu u pacjentów ze zwężeniem zastawki aorty lub innym zwężeniem drogi odpływu krwi z lewej komory. Nie należy stosować enalaprylu w przypadku wstrząsu kardiogenego oraz zwężenia istotnego pod względem hemodynamicznym. Zaburzenia czynności nerek: W przypadku zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny  $< 80$  ml/min) dawkę początkową należy dostosować według klirensu kreatyniny, a następnie w zależności od reakcji pacjenta na lek. U tych pacjentów należy rutynowo oznaczać stężenie potasu oraz kreatyniny w osoczu. Podczas stosowania enalaprylu zgłaszano występowanie niewydolności nerek, zwłaszcza u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub wcześniej występującą chorobą nerek, w tym zwężeniem tętnicy nerkowej. W przypadku szybkiego rozpoznania i odpowiedniego leczenia, niewydolność nerek związana ze stosowaniem enalaprylu jest zazwyczaj przemijająca. U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, bez uprzednio rozpoznanej choroby nerek, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, jeśli enalapryl był stosowany jednocześnie z lekiem moczopędnym. Może być konieczne zmniejszenie dawki produktu Enarenal i (lub) przerwanie stosowania leku moczopędnego. W takim przypadku istnieje zwiększone prawdopodobieństwo występowania zwężenia tętnicy nerkowej. Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe: U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki, leczonych inhibitorami ACE, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego i niewydolności nerek. Zaburzenia czynności nerek mogą wyrażać się tylko niewielkimi zmianami stężenia kreatyniny w surowicy. U tych pacjentów leczenie należy rozpocząć pod ścisłą kontrolą lekarską, od bardzo małych dawek, bardzo ostrożnie zwiększać dawki i kontrolować czynność nerek. Przeszczepienie nerki: Brak doświadczenia dotyczącego stosowania enalaprylu u pacjentów po niedawno przebyłym przeszczepieniu nerki, dlatego u tych pacjentów nie zaleca się stosowania enalaprylu. Niewydolność wątroby: W rzadkich przypadkach stosowanie inhibitorów ACE wiązało się z występowaniem zespołu, który rozpoczyna się od żółtaczki cholestatycznej lub zapalenia wątroby i postępuje do piorunującej martwicy wątroby i (niekiedy) do zgonu. Mechanizm tego zespołu nie jest znany. U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, u których wystąpi żółtaczka lub znacznie zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, należy przerwać stosowanie inhibitorów ACE oraz rozpocząć odpowiednie leczenie. Neutropenia / agranulocytoza: Neutropenia lub agranulocytoza, małopłytkowość i niedokrwistość były obserwowane u pacjentów leczonych inhibitorami ACE. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek i bez innych czynników ryzyka, neutropenia występowała rzadko. Enalapryl należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z kolagenozami, otrzymujących leki immunosupresyjne, allopuryinol lub prokainamid bądź w przypadku współistnienia tych czynników, szczególnie, gdy wcześniej występowało zaburzenie czynności nerek. U niektórych pacjentów z tej grupy rozwijały się ciężkie zakażenia, które w nielicznych przypadkach nie reagowały na intensywne leczenie antybiotykami. Jeśli enalapryl jest stosowany u tych pacjentów, zaleca się okresową kontrolę liczby krwinek białych, a pacjentów należy poinformować, aby zgłaszali wszelkie objawy zakażenia. Nadwrażliwość / obrzęk naczynioruchowy: Obserwowano przypadki występowania obrzęku naczynioruchowego twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i (lub) krtani u pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym enalaprylem. Obrzęk naczynioruchowy może wystąpić w dowolnym momencie leczenia. W razie wystąpienia powyższych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie enalaprylu i odpowiednio monitorować pacjenta, aż do całkowitego ustąpienia objawów. Nawet w przypadkach, gdy obrzęk dotyczy jedynie języka, bez towarzyszących zaburzeń oddychania, konieczna może być dłuższa obserwacja, ponieważ podanie leków przeciwhistaminowych i kortykosteroidów może nie być wystarczające. Bardzo rzadko opisywano zgony spowodowane obrzękiem naczynioruchowym krtani lub języka. U pacjentów z obrzękiem języka, głośni lub krtani częściej stwierdza się niedrożność dróg oddechowych, szczególnie, gdy wcześniej przebyli zabieg chirurgiczny w obrębie dróg oddechowych. Jeśli wystąpi obrzęk języka, głośni lub krtani, mogący spowodować niedrożność dróg oddechowych, należy niezwłocznie rozpocząć

właściwe leczenie, polegające m.in. na podskórnym podaniu roztworu adrenaliny 1:1000 (0,3 ml do 0,5 ml) i (lub) utrzymaniu drożności dróg oddechowych. Obrzęk naczynioruchowy częściej występuje u pacjentów rasy czarnej stosujących inhibitory ACE niż u przedstawicieli innych ras. U pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie, niezwiązanym z leczeniem inhibitorem ACE, występuje zwiększone ryzyko pojawienia się obrzęku naczynioruchowego podczas stosowania inhibitora ACE. Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas odczulania jadem owadów błonkoskrzydłych: W rzadkich przypadkach u pacjentów leczonych inhibitorami ACE dochodziło do groźnych dla życia reakcji rzekomoanafilaktycznych podczas odczulania jadem owadów błonkoskrzydłych (np. jad pszczoł i os). Reakcji tych można uniknąć poprzez czasowe przerwanie stosowania inhibitora ACE przed każdym odczulaniem. Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas aferezy LDL: W rzadkich przypadkach u pacjentów otrzymujących inhibitory ACE dochodziło do groźnych dla życia reakcji rzekomoanafilaktycznych podczas aferezy LDL (lipoprotein o małej gęstości) z zastosowaniem siarczanu dekstranu. Reakcji tych można uniknąć, poprzez czasowe przerwanie stosowania inhibitorów ACE przed każdą aferezą. Pacjenci poddawani hemodializie: U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, poddawanych dializoterapii z zastosowaniem błon o dużej przepuszczalności (np. AN 69), występowały reakcje rzekomoanafilaktyczne. U tych pacjentów należy rozważyć użycie błon dializacyjnych innego typu lub leku przeciwnadciśnieniowego z innej grupy. Hipoglikemia: Należy poinformować pacjentów z cukrzycą, leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, u których rozpoczyna się podawanie inhibitora ACE, o konieczności ścisłej kontroli stężenia glukozy we krwi, zwłaszcza w pierwszym miesiącu leczenia skojarzonego. Kaszel: Podczas stosowania inhibitorów ACE może wystąpić suchy, uporczywy kaszel, który ustępuje po zaprzestaniu leczenia. W rozpoznaniu różnicowym kaszlu należy brać pod uwagę kaszel wywołany stosowaniem inhibitorów ACE. Zabiegi chirurgiczne / znieczulenie: U pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym lub znieczuleniu za pomocą preparatów powodujących niedociśnienie tętnicze, enalapryl hamuje wytwarzanie angiotensyny II, w odpowiedzi na kompensacyjne uwalnianie reniny. Niedociśnienie tętnicze spowodowane tym mechanizmem można skorygować przez zwiększenie objętości krwi krążącej. Hiperkaliemia: U niektórych pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym enalaprylem, obserwowano zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Czynniki ryzyka wystąpienia hiperkaliemii to: niewydolność nerek, pogorszenie czynności nerek, wiek powyżej 70 lat, cukrzyca, współistniejące zaburzenia, zwłaszcza odwodnienie, ostre niewyrównanie niewydolności serca, kwasica metaboliczna, jednoczesne stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas (np. spironolakton, eplerenon, triamteren lub amilorid), suplementów potasu lub zamienników soli zawierających potas, a także przyjmowanie innych leków powodujących zwiększenie stężenia potasu w surowicy (np. heparyny). Stosowanie suplementów potasu, leków moczopędnych oszczędzających potas lub zamienników soli zawierających potas, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek może prowadzić do znacznego zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Hiperkaliemia może powodować ciężkie, czasem zakończone zgonem, zaburzenia rytmu serca. Jeżeli zachodzi konieczność jednoczesnego stosowania enalaprylu z którymkolwiek z powyższych wymienionych produktów, należy zachować ostrożność i często oznaczać stężenie potasu w surowicy. Lit: Stosowanie soli litu jednocześnie z enalaprylem nie jest zalecane. Laktoza: Produkt leczniczy Enarenal zawiera laktozę jednowodną. Nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Dzieci i młodzież: Doświadczenie dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku powyżej 6 lat z nadciśnieniem tętniczym jest ograniczone, natomiast brak doświadczenia ze stosowaniem leku w innych wskazaniach. Są dostępne nieliczne dane dotyczące farmakokinetyki u dzieci w wieku powyżej 2 miesięcy. Nie zaleca się stosowania produktu Enarenal u dzieci w innych wskazaniach niż nadciśnienie tętnicze. Ze względu na brak odpowiednich danych nie zaleca się podawania produktu Enarenal noworodkom oraz dzieciom i młodzieży ze wskazaniami przesączania kłębuszkowego (GFR) <30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>. Ciąża i laktacja: Leczenia inhibitorami ACE nie należy rozpoczynać w czasie ciąży. U pacjentek planujących ciążę należy zastosować inne leczenie przeciwnadciśnieniowe o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży, chyba, że dalsze leczenie inhibitorami ACE uważa się za niezbędne. W przypadku rozpoznania ciąży, należy natychmiast przerwać leczenie inhibitorami ACE oraz zastosować leczenie alternatywne, jeżeli jest to konieczne. Nie zaleca się podawania enalaprylu w czasie karmienia piersią. Różnice etniczne: Podobnie jak inne inhibitory ACE, enalapryl jest wyraźnie mniej skuteczny w obniżeniu ciśnienia tętniczego u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras, prawdopodobnie z powodu częstszego występowania małej aktywności reniny w osoczu w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym. **Działania niepożądane:** Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Niezbyt często: niedokrwistość (w tym niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna); Rzadko: neutropenia, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie wartości hematokrytu, małopłytkowość, agranulocytoza, zahamowanie czynności szpiku kostnego, pancytopenia, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, choroby autoimmunologiczne. Zaburzenia endokrynologiczne: Nieznana: zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH). Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: Niezbyt często: hipoglikemia. Zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia psychiczne: Często: bóle głowy, depresja; Niezbyt często: dezorientacja, senność, bezsennosc, nerwowosc, parestezje, zawroty głowy pochodzenia obwodowego; Rzadko: niezwykle marzenia sennie, zaburzenia snu. Zaburzenia oka: Bardzo często: nieostre widzenie. Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe: Bardzo często: zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego; Często: niedociśnienie (w tym niedociśnienie ortostatyczne), omdlenie, ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, tachykardia; Niezbyt często: niedociśnienie ortostatyczne, kołatanie serca, zawał mięśnia sercowego lub incydent naczyniowo-mózgowy (częstości występowania w badaniach klinicznych były porównywalne zarówno w grupie placebo jak i grupie otrzymującej substancję czynną.), prawdopodobnie wtórny do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego u pacjentów z grupy dużego ryzyka; Rzadko: objaw Raynauda. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Bardzo często: kaszel; Często: duszność; Niezbyt często: wydzielina z nosa, ból gardła i chrypka, skurcz oskrzeli / astma; Rzadko: nacieki w płucach, zapalenie błony śluzowej nosa, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych / eozynofilowe zapalenie płuc. Zaburzenia żołądka i jelit: Bardzo często: nudności; Często: biegunka, ból brzucha, zaburzenia smaku; Niezbyt często: niedrożność jelit, zapalenie trzustki, wymioty, niestrawność, zaparcie, brak łaknienia, podrażnienie żołądka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wrzód trawienny; Rzadko: zapalenie / owrzodzenie (afty) jamy ustnej, zapalenie języka; Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy jelit. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Rzadko: niewydolność wątroby, zapalenie wątroby (wątrobowokomórkowe lub cholestatyczne), zapalenie wątroby, w tym martwica, zastój żółci (w tym żółtaczką). Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Często: wysypka, nadwrażliwość / obrzęk naczynioruchowy; obserwowano obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i (lub) krtani; Niezbyt często: nadmierne pocenie się, świąd, pokrzywka, wypadanie włosów; Rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, złuszczone zapalenie skóry, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, pęcherzyca, erytrodermia. Opisano również zespół, który może obejmować niektóre lub wszystkie spośród następujących objawów: gorączka, zapalenie błon surowiczych, zapalenie naczyń, ból / zapalenie mięśni, ból / zapalenie stawów, dodatnie miano przeciwciał przeciwjądrowych, przyspieszone OB, eozynofilia i leukocytoza. Może wystąpić wysypka, nadwrażliwość na światło i inne objawy skóry; Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Niezbyt często: zaburzenia nerek, niewydolność nerek, białkomocz; Rzadko: skąpomocz. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: Niezbyt często: impotencja; Rzadko: ginekomastia. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Bardzo często: osłabienie; Często: uczucie zmęczenia; Niezbyt często: kurcze mięśni, zaczerwienienie twarzy, szum uszny, złe samopoczucie, gorączka. Badania diagnostyczne: Często: hiperkaliemia, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy. Niezbyt często: zwiększenie stężenia mocznika we krwi, hiponatremia. Rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego

personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzanym działaniom niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. **Podmiot odpowiedzialny:** ZF Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Enarenal 5 mg, 10 mg lub 20 mg odpowiednio: R/0149, R/0150 i R/0208 wydane przez MR. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. [www.polpharma.pl](http://www.polpharma.pl). Lek wydawany na podstawie recepty. Cena urzędowa detaliczna leku dla dawki 5 mg opak. 30 tabl. i opak. 60 tabl. wynosi odpowiednio 3,89 PLN i 7,23 PLN. Kwota dopłaty dla pacjenta wynosi odpowiednio 3,89 PLN i 4,80 PLN. Cena urzędowa detaliczna leku dla dawki 10 mg opak. 30 tabl. i opak. 60 tabl. wynosi odpowiednio 6,12 PLN i 11,77 PLN. Kwota dopłaty dla pacjenta wynosi odpowiednio 3,69 PLN i 6,92 PLN. Cena urzędowa detaliczna leku dla dawki 20 mg opak. 30 tabl. i opak. 60 tabl. wynosi odpowiednio 11,25 PLN i 20,12 PLN. Kwota dopłaty dla pacjenta wynosi odpowiednio 6,40 PLN i 12,80 PLN. ChPL z dnia 17.04.2014 r.

**Loperamid WZF** (*Loperamidi hydrochloridum*). **Skład i postać:** Tabletki; 1 tabletkę zawiera 2 mg loperamidu chlorowodoru. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletkę zawiera 100 mg laktozy jednowodnej. **Wskazania:** Loperamid WZF jest wskazany w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki. U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego Loperamid WZF może być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji. Loperamid WZF jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i powyżej. **Dawkowanie i sposób podawania:** Dorośli i dzieci w wieku 6 lat i powyżej: Ostro biegunka: początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) dla dorosłych i 1 tabletkę (2 mg) dla dzieci; a następnie 1 tabletkę (2 mg) po każdym kolejnym wolnym stolcu; Przewlekła biegunka: początkowa dawka wynosi 2 tabletki (4 mg) na dobę dla dorosłych i 1 tabletkę (2 mg) na dobę dla dzieci; tę początkową dawkę należy zmodyfikować aż do momentu uzyskania od 1 do 2 normalnych stolców na dobę, co zazwyczaj osiąga się poprzez stosowanie dawki podtrzymującej wynoszącej od 1 do 6 tabletek (od 2 do 12 mg) na dobę; Dawka maksymalna w ostrej i przewlekłej biegunce wynosi 8 tabletek (16 mg) na dobę dla dorosłych; u dzieci dawka produktu musi być dostosowana do masy ciała (3 tabletki/20 kg mc./dobę). Osoby w podeszłym wieku: U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: Pomimo, że brak jest danych dotyczących farmakokinetyki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, w tej grupie pacjentów Loperamid WZF należy stosować ostrożnie z powodu zmniejszenia metabolizmu związanego z efektem pierwszego przejścia przez wątrobę. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na loperamid chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Loperamid WZF nie jest przeznaczony do leczenia dzieci w wieku poniżej 6 lat. Produktu Loperamid WZF nie należy stosować jako leczenia zasadniczego: u pacjentów z ostrą czerwonką, która charakteryzuje się obecnością krwi w kale i wysoką gorączką; u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego; u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju *Salmonella*, *Shigella* i *Campylobacter*; u pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim spektrum działania. Ogólnie, produktu Loperamid WZF nie należy stosować w przypadkach, w których powinno się unikać zwolnienia perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, okrężnicy obrzmiałej (*megacolon*) i toksycznego rozszerzenia okrężnicy (*megacolon toxicum*). Leczenie produktem Loperamid WZF należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit. Leczenie biegunki produktem Loperamid WZF jest leczeniem wyłącznie objawowym. W każdym przypadku, w którym możliwe jest ustalenie etiologii, gdy jest to uzasadnione (lub wskazane) należy zastosować leczenie przyczynowe. **Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności:** U pacjentów z biegunką, zwłaszcza u dzieci, może dojść do utraty płynów i elektrolitów. W tych przypadkach postępowaniem z wyboru jest uzupełnianie odpowiednich ilości płynów i elektrolitów. Ponieważ długotrwała biegunka może być objawem poważniejszych chorób, nie należy stosować loperamidu długotrwale, dopóki przyczyna biegunki nie zostanie ustalona. Jeżeli po podaniu leku w ostrej biegunce, w ciągu 48 godzin nie obserwuje się poprawy stanu klinicznego pacjenta, podawanie produktu Loperamid WZF należy przerwać i pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ może to powodować względne przedawkowanie, prowadzące do działania toksycznego na ośrodkowy układ nerwowy. Pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy uważnie obserwować, czy nie występują u nich objawy toksyczności ze strony ośrodkowego układu nerwowego. U pacjentów z AIDS leczonych z powodu biegunki loperamidem, należy przerwać podawanie produktu przy pierwszych objawach wzdęcia brzucha. Istnieją pojedyncze doniesienia o przypadkach wystąpienia toksycznego rozszerzenia okrężnicy podczas stosowania loperamidu u pacjentów z AIDS z zakaźnym zapaleniem okrężnicy wywołanym zarówno przez bakterie jak i wirusy. Ponieważ większość leku jest metabolizowana w wątrobie, a metabolity lub lek w postaci niezmiennionej są wydalane z kałem, nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Ze względu na zawartość laktozy, produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. **Działania niepożądane:** Wiele zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaniem loperamidu są częstymi objawami zespołów biegunkowych (dyskomfort i ból w jamie brzusznej, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, zmęczenie, senność, zawroty głowy, zaparcie, wzdęcia z oddawaniem wiatrów). Często objawy te trudno jest odróżnić od działań niepożądanych stosowanego leku. Poniżej przedstawiono działania niepożądane związane ze stosowaniem loperamidu: [bardzo rzadko (<1/10 000)]. Zaburzenia psychiczne: bardzo rzadko: senność. Zaburzenia układu nerwowego: bardzo rzadko: zawroty głowy. Zaburzenia żołądka i jelit: bardzo rzadko: ból brzucha, niedrożność jelit, wzdęcia brzucha, nudności, zaparcia, wymioty, rozszerzenie okrężnicy (*megacolon*), w tym toksyczne rozszerzenie okrężnicy (*megacolon toxicum*), wzdęcia z oddawaniem wiatrów i niestrawność. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: bardzo rzadko: wysypka, pokrzywka i świąd. Pojedyncze przypadki obrzęku naczynioruchowego, wysypki pęcherzowej, w tym zespołu Stevensa i Johnsona, rumienia wielopostaciowego i martwicy toksyczno-rozplywnej naskórka. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: bardzo rzadko: pojedyncze przypadki zatrzymania moczu. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: bardzo rzadko: pojedyncze przypadki reakcji alergicznych, niekiedy ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym wstrząs anafilaktyczny i reakcje przypominające anafilaksję. **Podmiot odpowiedzialny:** WZF Polfa S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/0382 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00, fax. +48 22 364 61 02. [www.polpharma.pl](http://www.polpharma.pl) Lek wydawany na podstawie recepty. Cena urzędowa detaliczna leku Loperamid WZF wynosi: 7,56 PLN. Kwota dopłaty pacjenta wynosi: 3,78 PLN. ChPL: 2014.07.28

**Metronidazol Polpharma** (*Metronidazolium*). **Skład i postać:** 1 tabletkę zawiera 250 mg metronidazolu. **Wskazania:** Leczenie zakażeń bakteriami beztlenowymi z rodzaju *Bacteroides*, *Fusobacterium*, *Clostridium*, *Eubacterium*, ziarniaki beztlenowe i *Gardnerella vaginalis*, a także pierwotniakami *Trichomonas*, *Entamoeba histolytica*, *Giardia lamblia* i *Balantidium*. Zapobieganie zakażeniom pooperacyjnym spowodowanych bakteriami beztlenowymi, szczególnie gatunkami z rodzaju *Bacteroides* i

Streptococcus. Lecznico w zakażeniach spowodowanych bakteriami beztlenowymi (posocznica, bakteremia, zapalenie otrzewnej, ropień mózgu, zapalenie płuc, zapalenie szpiku, gorączka połogowa, ropień w obrębie miednicy mniejszej, zapalenie przymacicza, zakażenia ran po zabiegach chirurgicznych). Rzęsistkowica układu moczowo-płciowego zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Bakteryjne zapalenie pochwy. Pełzakowica (ameboza). Giardioza (lamblioza). Ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł. Ostre zakażenia okołozębowe. Owrzodzenia kończyn dolnych i odleżyny (zakażenia bakteriami beztlenowymi). W skojarzeniu z innymi zalecanymi lekami w leczeniu wrzodu trawiennego z jednoczesnym zakażeniem *Helicobacter pylori*.

**Dawkowanie i sposób podawania:** Zwykle zaleca się następujące dawkowanie, doustnie: Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez bakterie beztlenowe. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: początkowo 1 g (4 tabletki 250 mg) w dawce jednorazowej, następnie po 1 tabletkę 250 mg 3 razy na dobę w czasie lub po posiłkach, do czasu głodówki przedoperacyjnej. Dzieci od 5 do 12 lat: 125 mg co 8 godzin przez 2 doby. Niemowlęta i dzieci do 5 lat: 5 mg/kg masy ciała co 8 godzin przez 2 doby. Zakażenia bakteriami beztlenowymi. Lecznico metronidazol można stosować jako jedyny lek lub łącznie z innymi preparatami przeciwbakteryjnymi. Przeciętny okres leczenia nie powinien trwać dłużej niż 7 dni. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 - 2 tabletki 250 mg 3 razy na dobę w czasie lub po posiłkach. Niemowlęta i dzieci do 12 lat: 7,5 mg/kg masy ciała 3 razy na dobę w czasie lub po posiłkach. Rzęsistkowica. Uwaga: leczenie przeprowadza się równocześnie u obojga partnerów seksualnych. Kobiety: 2 razy na dobę 250 mg (1 tabletkę 250 mg) rano i wieczorem w czasie posiłku przez 10 dni lub 750 mg rano i 1250 mg wieczorem przez 2 dni bądź 2 g w pojedynczej jednorazowej dawce. Mężczyźni: przeciętnie 2 razy na dobę 250 mg (1 tabletkę 250 mg) rano i wieczorem w czasie posiłku przez 10 dni lub 750 mg rano i 1250 mg wieczorem przez 2 dni, bądź 2 g w pojedynczej jednorazowej dawce. Dzieci: 35 - 50 mg/kg mc/dobę, w trzech dawkach podzielonych, przez 10 dni. Bakteryjne zapalenie pochwy. Dorośli: 500 mg (2 tabletki 250 mg) rano i wieczorem przez 7 dni lub 2 g jednorazowo. Pełzakowica (ameboza). Dorośli: 750 mg (3 tabletki 250 mg) 3 razy na dobę przez 5-10 dni. Dzieci: 35 - 50 mg/kg mc/dobę, w trzech dawkach podzielonych, przez 5-10 dni. Giardioza (lamblioza). Dorośli: 250 mg trzy razy na dobę przez 5-7 dni lub 2 g raz na dobę przez 3 dni. Dzieci: od 2 do 5 lat: ½ tabletki 250 mg 2 razy na dobę (dawka dobową 250 mg), od 6 do 10 lat: 3 razy na dobę po ½ tabletki 250 mg (375 mg na dobę). Powyżej 10 lat: 2 razy na dobę 1 tabletkę 250 mg (500 mg na dobę). Preparat przyjmuje się rano i wieczorem zazwyczaj przez 5 do 10 dni. Jeśli to konieczne, leczenie można powtórzyć po 4 - 6 tygodniach, o czym decyduje lekarz. Eradykacja *Helicobacter pylori*. Metronidazol powinien być stosowany przez co najmniej 7 dni w skojarzeniu z innymi lekami zalecanymi w leczeniu zakażeń *Helicobacter pylori*. Dorośli: 500 mg (2 tabletki 250 mg) od 2 do 3 razy na dobę przez 7 - 14 dni. Brak specjalnych zaleceń w przypadku stosowania u dzieci. Ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł. Dorośli: 250 mg 2 razy na dobę przez 3 dni. Dzieci: 35 - 50 mg/kg mc./dobę, w trzech dawkach podzielonych, przez 3 dni. Ostre zakażenia okołozębowe. Dorośli: 250 mg 2 razy na dobę przez 3-7 dni. Niemowlętom i dzieciom o wadze mniejszej niż 10 kg należy podawać proporcjonalnie mniejsze dawki. Pacjenci w podeszłym wieku; lek powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie podczas stosowania w dużych dawkach. Owrzodzenia kończyn dolnych i odleżyny. Dorośli: 500 mg 2 razy na dobę przez 7 dni. Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby. Metronidazol jest metabolizowany głównie na drodze utleniania w wątrobie. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby metronidazol metabolizowany jest powoli, czego efektem może być kumulowanie się metronidazolu i jego metabolitów w organizmie. Preparat może kumulować się w znacznym stopniu u pacjentów z encefalopatią wątrobową, a osiągnięte wysokie stężenia metronidazolu w osoczu mogą wywołać objawy encefalopatii. Dawkę dobową, którą można podawać raz na dobę, należy zmniejszyć do jednej trzeciej. Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek. W niewydolności nerek biologiczny okres półtrwania metronidazolu nie zmienia się. Zmniejszenie dawek preparatu nie jest więc konieczne. U pacjentów poddawanych hemodializie metronidazol i jego metabolity są usuwane w ciągu 8 godzin trwania dializy. Natychmiast po dializie, metronidazol należy podać pacjentowi powtórnie. U pacjentów poddawanych dializie otrzewnej przerywanej lub ambulatoryjnej ciągłej nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku. Preparat powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie podczas stosowania dużych dawek. Sposób użycia: UWAGA! Tabletki można rozkruszyć, aby ułatwić podawanie dzieciom. Preparat można przyjmować niezależnie od posiłków.

**Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na metronidazol, inne składniki preparatu lub inne pochodne 5-nitroimidazolu. Pierwszy trymestr ciąży.

**Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności:** Metronidazol powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów z czynną chorobą ośrodkowego układu nerwowego. Pacjenci, u których w czasie terapii wystąpiły zaburzenia neurologiczne (drgawienie, mrowienie kończyn lub drgawki), mogą przyjmować preparat tylko wtedy, jeśli korzyści z jego stosowania przewyższają ryzyko wystąpienia powikłań. Preparat należy ostrożnie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby oraz encefalopatią wątrobową. Metronidazol należy stosować ostrożnie u pacjentów leczonych kortykosteroidami oraz podatnych na występowanie obrzęków. Pacjenci, u których przed i po leczeniu metronidazolem stwierdzono znaczne nieprawidłowości w obrazie krwi i wzorze odsetkowym, w razie konieczności powtórnego zastosowania metronidazolu powinni pozostawać pod obserwacją. W czasie leczenia należy kontrolować obraz krwi. Jeśli lek stosuje się dłużej niż przez 10 dni, kontrola taka jest bezwzględnie konieczna. Po zastosowaniu metronidazolu może wystąpić kandydoza w obrębie jamy ustnej, pochwy i przewodu pokarmowego, które wymagają odpowiedniego leczenia. W czasie leczenia metronidazolem i przynajmniej jeden dzień po zakończeniu leczenia nie należy spożywać napojów alkoholowych, ze względu na możliwość wystąpienia reakcji niepożądanych. Metronidazol może wpływać na wskaźniki niektórych badań laboratoryjnych (AspAT, ALAT, LDH, trójglicerydy, glukoza).

**Działania niepożądane:** Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są: nudności, wymioty, biegunka, dyskomfort w jamie brzusznej, metaliczny smak w ustach, obłożony język. Ponadto mogą wystąpić. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: umiarkowana, przemijająca leukopenia i trombocytopenia; bardzo rzadko agranulocytoza, neutropenia i pancytopenia, często ustępujące po odstawieniu preparatu; opisano 1 przypadek aplazji szpiku. Zaburzenia układu nerwowego: neuropatia obwodowa charakteryzująca się drętwieniem, mrowieniem, parestezjami, w większości przypadków ustępująca po odstawieniu leku lub zmniejszeniu dawki; ataki padaczkopodobne, zawroty głowy, dezorientacja, nerwowość, depresja, osłabienie, senność, bezsenność, bóle głowy, omdlenia, bardzo rzadko występowała encefalopatia, podosty zespół mózdkowy (np. ataksja, upośledzenie wymowy, zaburzenia chodzenia, oczopląs, drżenie, zaburzenia koordynacji ruchowej) oraz zaburzenia psychiczne, w tym omamy oraz jądłowstręt. Zaburzenia oka: zaburzenia widzenia, w tym podwójne widzenie czy krótkowzroczność. Zaburzenia ucha i błędnika: szum w uszach, utrata słuchu. Zaburzenia żołądka i jelit: suchość w ustach, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie trzustki ustępujące po odstawieniu preparatu. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: bardzo rzadko nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, zapalenie wątroby cholestatyczne i żółtaczka, ustępujące po odstawieniu preparatu. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: zmiany skórne (wysypka), świąd. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: mialgia, artralgia. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: ciemniejsze zabarwienie moczu spowodowane obecnością dobrze rozpuszczalnych w wodzie barwników, powstających w wyniku przemian metronidazolu. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: ból w pochwie i zakażenie drożdżakowe. Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, świąd, obrzęk nacynioruchowy, rzadko - anafilaksja, rumień wielopostaciowy.

**Podmiot odpowiedzialny:** ZF Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/1602 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. [www.polpharma.pl](http://www.polpharma.pl). Lek wydawany na podstawie recepty. ChPL: 2008.05.21.

**Polfilin prolongatum 400 mg** tabletki o przedłużonym uwalnianiu (*Pentoxifyllinum*). **Skład i postać:** 1 tabletko o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg pentoksyfiliny. **Wskazania:** Chromanie przestankowe. Zaburzenia krążenia w obrębie gałki ocznej (ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia w obrębie siatkówki i naczyńki oka). Zaburzenia czynności ucha wewnętrznego (np. zaburzenia słuchu, nagła utrata słuchu itd.) spowodowane zmianami krążenia. Stany niedokrwienia mózgu (np. stany po udarze mózgu, zaburzenia czynności mózgu pochodzenia naczyniowego z objawami takimi, jak brak koncentracji, zawroty głowy, zaburzenia pamięci). **Dawkowanie i sposób podawania:** Tabletki należy przyjmować w całości, po posiłkach, popijając odpowiednią ilością płynu. Zwykle stosuje się: Dorosli: 1 tabletko o przedłużonym uwalnianiu 400 mg 2 do 3 razy na dobę. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia działanie produktu może przyspieszyć jednoczesne podawanie pentoksyfiliny we wlewie dożylnym. Czas trwania leczenia zależy od rodzaju choroby i określany jest indywidualnie przez lekarza. U pacjentów z obniżonym lub zmiennym ciśnieniem tętniczym może być konieczna modyfikacja dawkowania leku. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) dawkę leku należy zmniejszyć do 50-70% dawki standardowej - w zależności od indywidualnej tolerancji np. podawać dwie, zamiast trzech, tabletki na dobę. Zmniejszenie dawki jest niezbędne u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Lekarz prowadzący ustala dawkę w zależności od nasilenia objawów choroby i tolerancji leku. Nie ustalono dotychczas bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na pentoksyfilinę, jakakolwiek substancja pomocniczą lub nadwrażliwość na metyloksantyny (kofeina, teofilina, teobromina). Niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu. Krwawienie o znacznym nasileniu i schorzenia z dużym ryzykiem krwotoków. Wylew do siatkówki. **Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności:** Pentoksyfilinę należy z ostrożnością stosować u pacjentów z niedociśnieniem lub ciężką chorobą naczyń wieńcowych. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), należy zmniejszyć dawkę dobową pentoksyfiliny, aby zapobiec kumulacji leku. Dawkę leku należy również zmniejszyć u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Należy wnikliwie obserwować pacjentów. **Działania niepożądane:** Częstość występowania działań niepożądanych uszeregowana została na podstawie następującej klasyfikacji: Bardzo częste (> 1/10), Częste (≥ 1/100, < 1/10), Niezbyt częste (≥ 1/1000, < 1/100), Rzadkie (≥ 1/10 000, < 1/1000), Bardzo rzadkie (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki. Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe: Czasami mogą wystąpić uderzenia gorąca (zaczerwienienie twarzy, uczucie gorąca), rzadziej arytmia serca (np. tachykardia), niedociśnienie, bardzo rzadko objawy dławicy piersiowej. Objawy te występują przede wszystkim podczas stosowania dużych dawek pentoksyfiliny. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: W bardzo rzadkich przypadkach mogą w czasie leczenia pentoksyfiliną wystąpić epizody krwawienia (np. na skórze, błonie śluzowej, w żołądku, w obrębie jelit). W pojedynczych przypadkach obserwowano trombocytopenię. Zaburzenia żołądka i jelit: Czasami mogą wystąpić dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, takie jak nudności, wymioty, wzdęcia, uczucie pełności i biegunka. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Bardzo rzadko może wystąpić cholestaza wewnątrzwątrobowa, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferazy, fosfataza alkaliczna). Zaburzenia układu immunologicznego: Rzadko występują reakcje nadwrażliwości, takie jak świąd, rumień, pokrzywka (pęcherze i świąd). W pojedynczych przypadkach mogą rozwinąć się w pierwszych minutach po podaniu produktu bardzo ciężkie reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny). Inne: Rzadko odnotowywano zawroty i bóle głowy. Bardzo rzadko występowały pobudzenie i zaburzenia snu. **Podmiot odpowiedzialny:** ZF Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/2065 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. [www.polpharma.pl](http://www.polpharma.pl). Lek wydawany na podstawie recepty.

**Sumamigren (*Sumatriptanum*).** **Skład i postać:** tabletki powlekane, 1 tabletko powlekana zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu w postaci odpowiednio 70 mg i 140 mg bursztynianu sumatryptanu oraz substancje pomocnicze. **Wskazania:** Doraźne zwalczanie napadów migreny. **Dawkowanie i sposób podawania:** Sumamigren jest dostępny w postaci tabletek powlekanych 50 mg i 100 mg. Sumatryptanu nie należy stosować profilaktycznie. Wskazany jest do leczenia napadu migreny jako jedyny lek i nie należy go podawać jednocześnie z ergotaminą lub pochodnymi ergotaminy (włącznie z metyzergidem). Lek należy stosować jak najszybciej po wystąpieniu napadu migreny. Jest on również skuteczny po zastosowaniu w dowolnym stadium napadu bólu. **Dorośli:** Zalecaną doustną dawką jest 50 mg. U niektórych pacjentów wymagane jest podanie dawki 100 mg. W przypadku nie ustąpienia objawów po podaniu jednorazowej dawki leku, nie należy przyjmować kolejnej dawki leku podczas trwania tego samego napadu migreny. Następną tabletkę można przyjąć podczas kolejnego napadu. Jeżeli zastosowanie jednorazowej dawki leku spowodowało ustąpienie objawów, jednak napad migreny powrócił, drugą dawkę leku można przyjąć w ciągu kolejnych 24 godzin, pamiętając, że nie należy stosować dawki większej niż 300 mg na dobę. Tabletki należy połykać w całości popijając wodą. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg. **Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat):** Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży ze względu na brak wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. **Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):** Dane na temat stosowania sumatryptanu w postaci tabletek u pacjentów w wieku powyżej 65 lat są ograniczone. Nie wykazano znaczących różnic w farmakokinetyce między tą grupą badanych, a osobami młodszymi. Do czasu zebrania szczegółowych danych klinicznych stosowanie sumatryptanu w tej grupie pacjentów nie jest zalecane. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na sumatryptan lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Nie stosować w zapobieganiu napadom migrenowym. Nie stosować u pacjentów w wieku poniżej 18 lub powyżej 65 lat. Choroba niedokrwienna serca lub objawy z nią związane, skurcz naczyń wieńcowych (dusznicza Prinzmetal), przebyty zawał mięśnia sercowego. Przebyty udar mózgu lub przemijający mózgowy napad niedokrwienny. Choroby naczyń obwodowych. Umiarkowane i ciężkie nadciśnienie oraz niedostatecznie kontrolowane nadciśnienie. Stosowanie równocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (sumatryptanu nie można stosować przez 2 tygodnie od zakończenia leczenia inhibitorami monoaminooksydazy). Równoczesne stosowanie z lekami zawierającymi ergotaminę lub jej pochodne, jak np. metyzergid lub innymi lekami z grupy agonistów receptorów 5-HT<sub>1</sub>. Ciężka niewydolność wątroby. **Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności:** Lek należy stosować tylko u pacjentów po dokładnym rozpoznaniu migreny. Nie jest wskazany u pacjentów z migreną hemiplegiczną, podstawną lub okoporażną. Leku nie należy stosować u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, w tym pacjentów palących tytoń lub stosujących substytuty nikotyny bez poprzedniej oceny stanu układu krążenia. Szczególną ostrożność należy zachować u kobiet po menopauzie oraz u mężczyzn w wieku powyżej 40 lat, których także zalicza się do grupy ryzyka. Należy jednak wziąć pod uwagę, że nie w każdym przypadku przeprowadzone badania pozwalają prawidłowo zdiagnozować istniejącą chorobę serca, oraz to, że w bardzo rzadkich przypadkach ciężkie objawy sercowe mogą wystąpić bez współistniejącego schorzenia układu sercowo-naczyniowego. Po podaniu leku może wystąpić przemijający ból oraz uczucie ucisku w klatce piersiowej i gardle, czasami o znacznym nasileniu. Objawy te mogą sugerować chorobę niedokrwienną serca. W razie ich wystąpienia, zaleca się odstawienie leku i wykonanie odpowiednich badań. Lek może wywołać krótkotrwałe zwiększenie ciśnienia krwi i obwodowego oporu naczyniowego. Lek należy stosować bardzo ostrożnie u pacjentów z leczoną chorobą nadciśnieniową. U pacjentów z bólem głowy typu migrenowego, u których wcześniej nie rozpoznano migreny oraz u pacjentów z uprzednio rozpoznaną migreną, ale z nietypowym obrazem danego napadu bólu głowy, należy brać pod uwagę inną przyczynę dolegliwości - pochodzenia neurologicznego. Należy pamiętać, że pacjenci, u których występuje migrena, mogą należeć do osób z grupy ryzyka wystąpienia naczyniowego uszkodzenia mózgu, jak np.

przemijający mózgowy napad niedokrwienny czy udar mózgu. Podczas jednoczesnego stosowania leku i selektywnych inhibitorów wychwyty zwrotnego serotoniny (SSRI) odnotowano wystąpienie zespołu serotoninowego (w tym zmiany stanu psychicznego, niestabilność układu wegetatywnego oraz zaburzenia nerwowo-mięśniowe). Wystąpienie zespołu serotoninowego odnotowano także po jednoczesnym stosowaniu tryptanów z inhibitorami wychwyty zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Jeżeli równoczesne leczenie sumatryptanem i lekami z grupy SSRI/SNRI jest klinicznie uzasadnione zaleca się odpowiednią obserwację pacjenta. Lek należy podawać ostrożnie pacjentom, u których można spodziewać się zmian we wchłanianiu, metabolizmie lub wydalaniu leku np. w niewydolności wątroby lub nerek. Lek należy stosować z dużą ostrożnością u pacjentów, u których stwierdzano napady drgawek lub czynniki obniżające próg drgawkowy. U pacjentów uczulonych na sulfonamidy po podaniu leku mogą wystąpić objawy alergii o różnym nasileniu, od zmian skórnych do wstrząsu anafilaktycznego. Informacje na ten temat są ograniczone, niemniej jednak należy zachować ostrożność u tych pacjentów. Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek leków przeciwbólowych może spowodować nasilenie bólu głowy. Jeśli u pacjenta występuje lub jest podejrzewana taka przyczyna bólu głowy, powinien on odstawić lek i zasięgnąć porady lekarza. U pacjentów, u których występują częste lub codzienne bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw tym bólom, należy rozważyć rozpoznanie bólu głowy zależnego od ciągłego stosowania leków. Podczas jednoczesnego stosowania leku i preparatów zawierających ziele dziurawca (*Hypericum perforatum*) działania niepożądane mogą występować częściej. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana. Ze względu na zawartość laktozy, produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu „Lapp” lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Produkt zawiera lak czerwień koszenilowej, który może wywołać reakcje alergiczne. **Działania niepożądane:** Niektóre z wymienionych działań niepożądanych mogą być objawem migreny. Często: zawroty głowy, senność, zaburzenia uczucia, w tym parestezje i niedoczułca, przemijający wzrost ciśnienia tętniczego krwi wkrótce po podaniu leku, nagłe zaczerwienienie zwłaszcza twarzy, duszność, u niektórych pacjentów występują nudności i wymioty (ale ich związek z podawaniem sumatryptanu nie jest jasny), uczucie ciężkości (objaw zazwyczaj przemijający, może być silny i występować w różnych częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle), bóle mięśni, ból, uczucie gorąca lub zimna, napięcia lub ucisku (objawy te zazwyczaj są przemijające, mogą być silne i występować w różnych częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle), uczucie słabości, zmęczenie (objawy te najczęściej mają nasilenie łagodne do umiarkowanego i są przemijające). Bardzo rzadko: niewielkie zmiany wartości parametrów czynności wątroby. Częstość nieznaną: objawy nadwrażliwości od zmian skórnych (jak pokrzywka) do rzadkich przypadków wstrząsu anafilaktycznego, napady drgawek, które wystąpiły u osób z napadami drgawek stwierdzanymi w przeszłości lub współistniejącymi czynnikami predysponującymi do ich wystąpienia, jak i u osób bez czynników ryzyka, drżenie, dystonia, oczopląs, mroczek, migotanie światła, podwójne widzenie, zmiany w polu widzenia, utrata widzenia, w tym stałe ubytki widzenia (zaburzenia widzenia mogą być składową napadu migreny), bradykardia, tachykardia, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, przemijające zmiany niedokrwiennie w zapisie EKG, skurcz naczyń wieńcowych, dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego, niedociśnienie, zespół Raynauda, niedokrwiennie zapalenie okrężnicy, biegunka, sztywność karku, bóle stawów, łęk, nadmierne pocenie się. **Podmiot odpowiedzialny:** ZF Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Sumamigren 50 mg oraz Sumamigren 100 mg odpowiednio nr 8967 i 8968 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. [www.polpharma.pl](http://www.polpharma.pl). Lek wydawany na podstawie recepty. ChPL: 2013.05.27

**Zolpic (Zolpidemi tartras). Skład i postać:** tabletki powlekane, 1 tabl. zawiera 10 mg winianu zolpidemu. **Wskazania do stosowania:** Krótkotrwałe leczenie bezsenności. **Dawkowanie i sposób podawania:** Sposób podawania: doustnie. Winian zolpidemu jest lekiem działającym bardzo szybko, dlatego powinien być stosowany bezpośrednio przed pójściem spać lub w łóżku. Dorośli: Zalecana dawka dobową dla dorosłych wynosi 10 mg. Pacjenci w podeszłym wieku: U pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów osłabionych, którzy mogą być szczególnie wrażliwi na winian zolpidemu, zaleca się dawkę 5 mg na dobę. Pacjenci z niewydolnością wątroby: U pacjentów z niewydolnością wątroby, ze względu na zmniejszony klirens i metabolizm winianu zolpidemu, leczenie należy rozpocząć od dawki 5 mg na dobę. U dorosłych poniżej 65 lat, w dobrym stanie ogólnym i w przypadku niewystarczającej skuteczności mniejszej dawki, dawkę dobową można następnie zwiększyć do 10 mg na dobę. Dzieci i młodzież: Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania zolpidemu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie zostały określone. Z uwagi na to, nie należy stosować zolpidemu w tej grupie pacjentów. Zalecany czas stosowania leku wynosi od kilku dni do dwóch tygodni. Podobnie jak w przypadku innych leków nasennych, winianu zolpidemu nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu; napady bezdechu sennego; miastenia; ciężka niewydolność wątroby; ostra niewydolność płuc lub zaburzenia oddychania. Ze względu na brak wystarczających danych, leku nie należy stosować u dzieci i pacjentów z chorobami psychicznymi. **Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności:** Przed zaleceniem środka nasennego, należy w miarę możliwości wyjaśnić przyczynę bezsenności i wyeliminować czynniki ją wywołujące. Utrzymywanie się bezsenności po 7 – 14 dniach leczenia, może wskazywać na występowanie pierwotnych zaburzeń psychicznych lub fizycznych i powinno być poddane wnikliwej ocenie; Niewydolność oddechowca: Ze względu na to, że leki nasenne mogą hamować czynność ośrodka oddechowego, należy zachować ostrożność w przypadku stosowania zolpidemu u pacjentów z zaburzeniem czynności oddechowej. Stosowanie u dzieci i młodzieży: Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania zolpidemu u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat nie zostały ustalone. Z tego względu nie należy stosować zolpidemu w tej grupie pacjentów. W badaniach prowadzonych w czasie 8 tygodni u dzieci w wieku od 6 do 17 lat z objawami bezsenności związanymi z występowaniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami układu nerwowego, w grupie stosującej zolpidem obserwowano zwiększoną częstość występowania działań niepożądanych w porównaniu do grupy stosującej placebo. Dotyczyły to następujących działań niepożądanych: zawroty głowy (23,5% w stosunku do 1,5%), bóle głowy (12,5% w stosunku do 9,2%) i omamy (7,4% w stosunku do 0%); Depresja: Winian zolpidemu, tak jak inne leki nasenne, należy ostrożnie stosować u pacjentów z objawami depresji. Ze względu na istnienie ryzyka tendencji samobójczych w tej grupie pacjentów, przepisywana ilość leku powinna być jak najmniejsza, aby zapobiec celowemu przedawkowaniu. Podczas stosowania zolpidemu może ujawnić się wcześniej istniejąca depresja. Ze względu na to, że bezsenność może być objawem depresji, należy pacjenta ponownie zbadać w przypadku utrzymywania się bezsenności; Tolerancja: Podczas stosowania dłuższego niż kilka tygodni, obserwuje się niekiedy zmniejszenie skuteczności leków nasennych; Uzależnienie: Stosowanie leków nasennych może prowadzić do rozwoju uzależnienia psychicznego i fizycznego. Niebezpieczeństwo rozwoju uzależnienia wzrasta proporcjonalnie do stosowanej dawki oraz czasu trwania leczenia, jest ono również większe u pacjentów uzależnionych od alkoholu lub narkotyków w wywiadzie. Tacy pacjenci powinni być pod obserwacją podczas stosowania leków nasennych. U pacjentów, u których doszło do rozwoju uzależnienia, po nagłym odstawieniu leku mogą wystąpić objawy, takie jak na przykład: bóle głowy i mięśni, łęk i napięcie psychiczne, niepokój, splątanie i drażliwość, a w ciężkich przypadkach mogą również wystąpić: derealizacja, depersonalizacja, nadwrażliwość na bodźce dźwiękowe, światło i dotyk, drętwienie i mrowienie kończyn, omamy i napady drgawkowe. Bezsenność z odbicia: Jest to przemijający zespół, w którym nasileniu ulegają objawy będące przyczyną przepisania leku. Może on wystąpić po odstawieniu preparatu. Bezsenności z odbicia towarzyszyć mogą inne objawy, takie jak zmiany nastroju, niepokój, łęk. Pacjenta należy poinformować o możliwości wystąpienia bezsenności z odbicia. Ponieważ ryzyko wystąpienia tych objawów jest większe po nagłym odstawieniu leku, zaleca się stopniowe zmniejszanie jego dawki. Istnieją



doniesienia, że w przypadku stosowania leków nasennych o krótkim czasie działania, zespół odstawienny może występować w przerwie pomiędzy kolejnymi dawkami, zwłaszcza wtedy gdy dawki te są duże; Niepamięć: Leki nasenne mogą powodować niepamięć następczą, która występuje najczęściej w kilka godzin po przyjęciu leku. Aby zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia, pacjent powinien zapewnić sobie 7-8 godzin nieprzerwanego snu; Reakcje psychiczne i „paradoksalne”: Podczas stosowania leków nasennych (szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku) mogą wystąpić reakcje takie, jak: niepokój, pobudzenie, rozdrażnienie, agresywność, urojenia, napady wściekłości, koszmary nocne, omamy, psychozy, nieadekwatne zachowanie i inne zaburzenia zachowania. W takich przypadkach leczenie należy przerwać; Somnambulizm i podobne rodzaje zachowań: U pacjentów, którzy przyjmowali zolpidem i nie obudzili się całkowicie, mogą wystąpić następujące zaburzenia: chodzenie we śnie i podobne zaburzenia zachowania, takie jak prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowanie i spożywanie jedzenia, rozmowy telefoniczne lub stosunki seksualne we śnie z niepamięcią wykonywanych czynności. Jak się wydaje, spożycie alkoholu lub przyjęcie innych leków o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy, w skojarzeniu z zolpidemem, zwiększa ryzyko występowania takich zachowań, podobnie jak stosowanie zolpidemu w dawkach przekraczających maksymalną zalecaną dawkę. U pacjentów zgłaszających takie zachowania (np. prowadzenie pojazdu we śnie), ze względu na bezpieczeństwo pacjenta jak i innych osób należy rozważyć przerwanie stosowania zolpidemu. Produkt zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. **Działania niepożądane:** Istnieją dowody, że działania niepożądane po zastosowaniu winianu zolpidemu, zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego, zależą od dawki. Działania niepożądane są mniej nasilone, jeżeli lek jest przyjmowany bezpośrednio przed pójściem spać lub w łóżku. Obserwuje się częściej u pacjentów w podeszłym wieku; Zaburzenia układu nerwowego: Często: senna, bóle głowy, zawroty głowy, nasilenie bezsenności, niepamięć następcza (niepamięć może być związana z nieprawidłowym zachowaniem). Częstość nieznana: senna utrzymująca się następnego dnia po zażyciu leku, zaburzenia świadomości; Zaburzenia psychiczne: Często: omamy, pobudzenie, koszmary senna. Niezbyt często: stan splątania, drażliwość. Częstość nieznana: niepokój, agresja, urojenia, gniew, zaburzenia zachowania, psychozy, somnambulizm, uzależnienie (po przerwaniu leczenia mogą wystąpić objawy odstawienny lub zjawiska „z odbicia”), zaburzenia libido, aktywność podczas snu: chodzenie we śnie i podobne zaburzenia zachowania, takie jak prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowanie i spożywanie jedzenia, rozmowy telefoniczne lub stosunki seksualne we śnie z niepamięcią wykonywanych czynności. Większość psychicznych działań niepożądanych związana jest z reakcjami paradoksalnymi. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Często: zmęczenie. Częstość nieznana: zaburzenia chodu, tolerancja na lek, upadek (głównie u pacjentów w podeszłym wieku oraz w przypadkach, kiedy zolpidem nie był przyjmowany zgodnie z zaleceniami); Zaburzenia oka: Niezbyt często: podwójne widzenie; Zaburzenia żołądka i jelit: Często: biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha; Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Częstość nieznana: osłabienie mięśni; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Częstość nieznana: wysypka, świąd, pokrzywka, nadmierne pocenie się; Zaburzenia układu immunologicznego: Częstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy; Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Częstość nieznana: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. **Podmiot odpowiedzialny:** ZF Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 9890 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. [www.polpharma.pl](http://www.polpharma.pl). Lek wydawany na podstawie recepty. ChPL z dnia 14.12.2012 r.